

정답과 풀이

중학
수학

1·2

I	기본 도형	2
II	평면도형	21
III	입체도형	38
IV	자료의 정리와 해석	51

I. 기본 도형

1. 기본 도형

최고 수준

입문하기

P 8-P 12

01 ③, ④	02 16	03 ②	04 ④, ⑤
05 ③, ⑤	06 6개	07 (1) 10개 (2) 20개 (3) 10개	
08 14	09 ④	10 5 cm	11 12 cm
12 20 cm	13 4 cm	14 65°	15 75°
16 ④	17 60°	18 24°	19 45°
20 108°	21 127.5°	22 90°	
23 $\angle x=64^\circ, \angle y=26^\circ, \angle z=128^\circ$		24 25°	
25 125°	26 12쌍	27 ③	28 144°
29 4 cm	30 ③		

01 **Action** 교점과 교선의 뜻과 성질을 이해한다.

- ③ 교점은 선과 선 또는 선과 면이 만날 때 생긴다.
- ④ 면과 면이 만나서 생기는 교선은 직선 또는 곡선이다.

02 **Action** 각별에서 (교점의 개수)=(꼭짓점의 개수), (교선의 개수)=(모서리의 개수)임을 이용한다.

교점의 개수는 꼭짓점의 개수와 같으므로 6개
 $\therefore a=6$
 교선의 개수는 모서리의 개수와 같으므로 10개
 $\therefore b=10$
 $\therefore a+b=6+10=16$

03 **Action** 주어진 직선, 반직선, 선분이 서로 같은지 확인한다.

② \overrightarrow{BD} 와 \overrightarrow{DB} 는 시작점과 방향이 모두 다르므로 $\overrightarrow{BD} \neq \overrightarrow{DB}$

04 **Action** \overrightarrow{DB} 는 직선 l 위의 점 D에서 점 B의 방향으로 뺀 부분이다.

\overrightarrow{DB} 는 직선 l 위의 점 D에서 점 B의 방향으로 뺀 부분이므로 \overrightarrow{DB} 를 포함하는 것은 $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}$ 이다.

05 **Action** 직선, 반직선, 선분의 특징을 이해한다.

- ③ 서로 다른 세 점을 지나는 직선은 존재하지 않을 수도 있다.
- ⑤ 반직선과 직선의 길이는 생각할 수 없다.

06 **Action** 두 점을 지나는 서로 다른 직선의 개수를 세어 본다.

$\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CD}$ 의 6개이다.

07 **Action** 직선, 반직선, 선분의 개수를 각각 세어 본다.

- (1) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{DE}$ 의 10개
- (2) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{EA}, \overrightarrow{EB}, \overrightarrow{EC}, \overrightarrow{ED}$ 의 20개
- (3) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{DE}$ 의 10개

Lecture

직선, 반직선, 선분의 개수

어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 n 개의 점에 대하여 두 점을 지나는 직선, 반직선, 선분의 개수는 각각 다음과 같다.

- (1) 직선(또는 선분)의 개수 : $\frac{n(n-1)}{2}$ 개
- (2) 반직선의 개수 : $n(n-1)$ 개
 \rightarrow (반직선의 개수) = $2 \times$ (직선의 개수) = $2 \times$ (선분의 개수)

08 **Action** 세 점 B, C, D는 모두 직선 l 위의 점이므로 세 점 B, C, D를 지나는 직선은 1개이다.

서로 다른 직선은 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BD}$ 의 4개이므로 $a=4$

서로 다른 반직선은 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}$ 의 10개이므로 $b=10$

$\therefore a+b=4+10=14$

09 **Action** 선분의 중점은 그 선분의 길이를 이등분하는 점임을 이용하여 각 선분의 길이의 비를 생각한다.

④ $\overline{MN} = \frac{1}{4} \overline{AB}$

⑤ $\overline{AN} = \overline{AM} + \overline{MN} = \frac{1}{2} \overline{AB} + \frac{1}{4} \overline{AB} = \frac{3}{4} \overline{AB}$
 $\therefore \overline{AB} = \frac{4}{3} \overline{AN}$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

10 **Action** 두 점 M, N이 각각 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 의 중점이므로 $\overline{AM} = \frac{1}{2} \overline{AB}$,

$\overline{AN} = \frac{1}{2} \overline{AC}$ 임을 이용한다.

$\overline{AM} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 18 = 9$ (cm)

$\overline{AN} = \frac{1}{2} \overline{AC} = \frac{1}{2} \times (18 + 10) = \frac{1}{2} \times 28 = 14$ (cm)

$\therefore \overline{MN} = \overline{AN} - \overline{AM} = 14 - 9 = 5$ (cm)

- 11 **Action** $\overline{MC} = \overline{MB} + \overline{BC}$ 임을 이용한다.
 점 M이 \overline{AB} 의 중점이므로
 $\overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2} \times 12 = 6$ (cm) 30%
 이때 $\overline{BN} = \overline{AN} - \overline{AB} = 15 - 12 = 3$ (cm) 20%
 점 N이 \overline{BC} 의 중점이므로
 $\overline{BC} = 2\overline{BN} = 2 \times 3 = 6$ (cm) 30%
 $\therefore \overline{MC} = \overline{MB} + \overline{BC} = 6 + 6 = 12$ (cm) 20%

- 12 **Action** $\overline{BN} = \frac{1}{2}\overline{BC} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{4}\overline{AB}$ 임을 이용한다.
 $\overline{MN} = \overline{MB} + \overline{BN} = \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{4}\overline{BC}$
 $= \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\overline{AB}$
 $= \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{4}\overline{AB}$
 $= \frac{3}{4}\overline{AB}$
 $\therefore \overline{AB} = \frac{4}{3}\overline{MN} = \frac{4}{3} \times 15 = 20$ (cm)

- 13 **Action** $\overline{AB} : \overline{BC} = 3 : 1$ 임을 이용하여 \overline{BC} 의 길이를 구한다.
 점 M이 \overline{AB} 의 중점이므로
 $\overline{AB} = 2\overline{AM} = 2 \times 3 = 6$ (cm), $\overline{MB} = 3$ cm
 $\overline{AB} : \overline{BC} = 3 : 1$ 에서 $6 : \overline{BC} = 3 : 1$
 $3\overline{BC} = 6 \quad \therefore \overline{BC} = 2$ (cm)
 점 N이 \overline{BC} 의 중점이므로
 $\overline{BN} = \frac{1}{2}\overline{BC} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$ (cm)
 $\therefore \overline{MN} = \overline{MB} + \overline{BN} = 3 + 1 = 4$ (cm)

- 14 **Action** $\angle AOB + \angle BOC = 90^\circ$, $\angle BOC + \angle COD = 90^\circ$ 임을 이용한다.
 $\angle AOB + \angle BOC = 90^\circ$, $\angle BOC + \angle COD = 90^\circ$ 이고
 $\angle AOB + \angle COD = 50^\circ$ 이므로
 $\angle AOB = \angle COD = \frac{1}{2} \times 50^\circ = 25^\circ$
 $\therefore \angle BOC = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$

- 15 **Action** 평각의 크기는 180° 임을 이용한다.
 $(\angle x - 30^\circ) + 55^\circ + (\angle x + 5^\circ) = 180^\circ$ 이므로
 $2\angle x + 30^\circ = 180^\circ$, $2\angle x = 150^\circ$
 $\therefore \angle x = 75^\circ$

- 16 **Action** 먼저 $\angle COD$ 의 크기를 구한다.
 $\angle COD : \angle DOB = 4 : 3$ 에서
 $\angle COD : 48^\circ = 4 : 3$
 $3\angle COD = 192^\circ \quad \therefore \angle COD = 64^\circ$
 $\therefore \angle AOC = 180^\circ - (64^\circ + 48^\circ) = 68^\circ$

- 17 **Action** $\angle z = 180^\circ \times \frac{4}{3+5+4}$ 임을 이용한다.
 $\angle z = 180^\circ \times \frac{4}{3+5+4} = 180^\circ \times \frac{1}{3} = 60^\circ$

Lecture

각의 크기의 비가 주어진 경우


오른쪽 그림에서

$\angle x : \angle y : \angle z = a : b : c$

$\angle x = 180^\circ \times \frac{a}{a+b+c}$

$\angle y = 180^\circ \times \frac{b}{a+b+c}$

$\angle z = 180^\circ \times \frac{c}{a+b+c}$



- 18 **Action** $\angle AOC + \angle COB = 180^\circ$ 임을 이용하여 $\angle AOC$ 의 크기를 구한다.
 $\angle AOC + \angle COB = 180^\circ$ 에서
 $\angle AOC + \frac{2}{3}\angle AOC = 180^\circ$
 $\frac{5}{3}\angle AOC = 180^\circ \quad \therefore \angle AOC = 108^\circ$ 40%
 $\angle COB = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$ 이므로 30%
 $\angle x + (3\angle x - 24^\circ) = 72^\circ$, $4\angle x = 96^\circ$
 $\therefore \angle x = 24^\circ$ 30%

- 19 **Action** $\angle AOC + \angle COD + \angle DOE + \angle EOB = 180^\circ$ 임을 이용하여 $\angle COD + \angle DOE$ 의 크기를 구한다.
 $\angle AOC + \angle COD + \angle DOE + \angle EOB = 180^\circ$ 에서
 $3\angle COD + \angle COD + \angle DOE + 3\angle DOE = 180^\circ$
 $4(\angle COD + \angle DOE) = 180^\circ$
 $\therefore \angle COD + \angle DOE = 45^\circ$
 $\therefore \angle COE = \angle COD + \angle DOE = 45^\circ$

- 20 **Action** 먼저 $\angle COD$ 의 크기는 $\angle AOD$ 의 크기의 몇 배인지 구해 본다.
 $5\angle AOC = 2\angle AOD$ 이므로 $\angle AOC = \frac{2}{5}\angle AOD$
 $\therefore \angle COD = \frac{3}{5}\angle AOD$

$$5\angle DOE = 3\angle DOB \text{이므로 } \angle DOE = \frac{3}{5}\angle DOB$$

$$\therefore \angle COE = \angle COD + \angle DOE$$

$$= \frac{3}{5}\angle AOD + \frac{3}{5}\angle DOB$$

$$= \frac{3}{5}(\angle AOD + \angle DOB)$$

$$= \frac{3}{5} \times 180^\circ = 108^\circ$$

21 **Action** 시침과 분침이 움직인 각도를 각각 구한다.

시침은 1시간에 30° , 1분에 0.5° 씩 움직이고, 분침은 1분에 6° 씩 움직인다.
 시침이 12를 가리킬 때부터 4시간 45분 동안 움직인 각도는 $30^\circ \times 4 + 0.5^\circ \times 45 = 120^\circ + 22.5^\circ = 142.5^\circ$
 분침이 12를 가리킬 때부터 45분 동안 움직인 각도는 $6^\circ \times 45 = 270^\circ$
 따라서 시침과 분침이 이루는 각 중에서 작은 쪽의 각의 크기는 $270^\circ - 142.5^\circ = 127.5^\circ$

Lecture
 시계에서의 각의 크기

(1) 시침이 1시간 동안 움직이는 각의 크기는

$$360^\circ \times \frac{1}{12} = 30^\circ$$

시침이 1분 동안 움직이는 각의 크기는

$$30^\circ \times \frac{1}{60} = 0.5^\circ$$

(2) 분침이 1분 동안 움직이는 각의 크기는

$$360^\circ \times \frac{1}{60} = 6^\circ$$

22 **Action** 맞꼭지각의 크기가 서로 같음을 이용하여 $\angle x$ 의 크기를 구하고, 평각의 크기가 180° 임을 이용하여 $\angle y$ 의 크기를 구한다.

$$3\angle x + 10^\circ = 2\angle x + 50^\circ \text{에서 } \angle x = 40^\circ$$

$$\angle y + (3\angle x + 10^\circ) = 180^\circ \text{에서}$$

$$\angle y + (120^\circ + 10^\circ) = 180^\circ \quad \therefore \angle y = 50^\circ$$

$$\therefore \angle x + \angle y = 40^\circ + 50^\circ = 90^\circ$$

23 **Action** 평각의 크기가 180° 임을 이용하여 $\angle x, \angle z$ 의 크기를 각각 구하고, 맞꼭지각의 크기가 서로 같음을 이용하여 $\angle y$ 의 크기를 구한다.

$$26^\circ + \angle x + 90^\circ = 180^\circ \text{에서}$$

$$\angle x + 116^\circ = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 64^\circ$$

$$\angle y = 26^\circ$$

$$26^\circ + \angle z + 26^\circ = 180^\circ \text{에서}$$


$$\angle z + 52^\circ = 180^\circ \quad \therefore \angle z = 128^\circ$$

24 **Action** 맞꼭지각의 크기가 서로 같음을 이용하여 $\angle x$ 와 크기와 같은 각을 찾는다.

오른쪽 그림에서 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로

$$(2\angle x + 50^\circ) + \angle x + (3\angle x - 20^\circ) = 180^\circ$$

$$6\angle x + 30^\circ = 180^\circ, 6\angle x = 150^\circ$$

$$\therefore \angle x = 25^\circ$$


25 **Action** 평각의 크기가 180° 임을 이용하여 $\angle x$ 의 크기를 구하고, 맞꼭지각의 크기가 서로 같음을 이용하여 $\angle y$ 의 크기를 구한다.

$$90^\circ + (2\angle x + 15^\circ) + (3\angle x - 25^\circ) = 180^\circ \text{에서}$$

$$5\angle x + 80^\circ = 180^\circ, 5\angle x = 100^\circ$$

$$\therefore \angle x = 20^\circ$$

$$\therefore \angle y = 90^\circ + (2\angle x + 15^\circ)$$

$$= 90^\circ + (40^\circ + 15^\circ)$$

$$= 145^\circ$$

$$\therefore \angle y - \angle x = 145^\circ - 20^\circ = 125^\circ$$

26 **Action** 서로 다른 2개의 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 맞꼭지각은 모두 2쌍이다.

직선 AB와 직선 CD, 직선 AB와 직선 EF, 직선 AB와 직선 GH, 직선 CD와 직선 EF, 직선 CD와 직선 GH, 직선 EF와 직선 GH로 만들어지는 맞꼭지각이 각각 2쌍이므로 $2 \times 6 = 12$ (쌍)

27 **Action** 먼저 $\angle AOF, \angle FOD, \angle DOB$ 의 크기를 각각 구한다.

$$\angle AOF = \angle BOE = 180^\circ \times \frac{3}{3+4+2}$$

$$= 180^\circ \times \frac{1}{3} = 60^\circ$$

$$\angle FOD = \angle EOC = 180^\circ \times \frac{4}{3+4+2}$$

$$= 180^\circ \times \frac{4}{9} = 80^\circ$$

$$\angle DOB = \angle COA = 180^\circ \times \frac{2}{3+4+2}$$


$$= 180^\circ \times \frac{2}{9} = 40^\circ$$

- ① $\angle AOC = 40^\circ, \angle BOE = 60^\circ$ 이므로 $\angle AOC \neq \angle BOE$
- ② $\angle AOE = \angle AOC + \angle COE = 40^\circ + 80^\circ = 120^\circ$
- ④ $\angle COD$ 는 평각이다.
- ⑤ $\angle FOC = \angle FOA + \angle AOC = 60^\circ + 40^\circ = 100^\circ$ 이므로 둔각이다.

28 **Action** $\angle AOC + \angle COE = 180^\circ$ 임을 이용한다.
 $\angle AOB = \angle x, \angle DOE = \angle y$ 라 하면
 $\angle BOC = 4\angle x, \angle COD = 4\angle y$ 20%
 $\angle AOC + \angle COE = 180^\circ$ 이므로
 $\angle x + 4\angle x + 4\angle y + \angle y = 180^\circ$
 $5\angle x + 5\angle y = 180^\circ \quad \therefore \angle x + \angle y = 36^\circ$ 40%
 $\therefore \angle HOF = \angle HOG + \angle FOG$
 $= \angle COD + \angle BOC$
 $= 4\angle y + 4\angle x = 4(\angle x + \angle y)$
 $= 4 \times 36^\circ = 144^\circ$ 40%

29 **Action** 점 D와 \overline{BC} 사이의 거리는 점 D에서 \overline{BC} 에 내린 수선의 발까지의 거리이다.

오른쪽 그림과 같이 점 D와 \overline{BC} 사이의 거리는 점 D에서 \overline{BC} 에 내린 수선의 발 H까지의 거리이므로 \overline{DH} 의 길이와 같다.
 $\therefore \overline{DH} = \overline{AB} = 4 \text{ cm}$



30 **Action** 수직과 수선의 성질을 생각한다.
 ③ \overrightarrow{CD} 는 \overline{AB} 의 수직이등분선이다.

최고 수준 완성하기

P 13 - P 15

- | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|---------|
| 01 32 | 02 10 | 03 26개 | 04 ③ |
| 05 45개 | 06 7 cm | 07 9 | 08 15 m |
| 09 48° | 10 3시 $49\frac{1}{11}$ 분 | 11 61° | |
| 12 24 | | | |

01 **Action** 주어진 입체도형에서 (교점의 개수) = (꼭짓점의 개수), (교선의 개수) = (모서리의 개수)임을 이용한다.
 교점의 개수는 꼭짓점의 개수와 같으므로 $a = 8$
 교선의 개수는 모서리의 개수와 같으므로 $b = 13$
 면의 개수는 $c = 7$
 한 꼭짓점에서 만나는 교선의 개수는 3개 또는 4개이므로 $d = 4$
 $\therefore a + b + c + d = 8 + 13 + 7 + 4 = 32$

02 **Action** 직선과 반직선의 개수를 각각 세어 본다.
 직선은 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{CD}$ 의 8개이므로 $a = 8$ 40%
 반직선은 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{EA}, \overrightarrow{EB}, \overrightarrow{EC}$ 의 18개이므로 $b = 18$ 40%
 $\therefore b - a = 18 - 8 = 10$ 20%

03 **Action** 두 점을 지나는 서로 다른 반직선의 개수를 세어 본다.
 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BF}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CF}, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DF}, \overrightarrow{EA}, \overrightarrow{EB}, \overrightarrow{ED}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{FA}, \overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FC}, \overrightarrow{FD}, \overrightarrow{FE}$ 의 26개이다.

04 **Action** 반직선을 직접 그려 본다.
 ③ \overrightarrow{BA} 와 \overrightarrow{BD} 의 공통 부분은 점 B이다.


05 **Action** 직선의 개수에 따른 교점의 개수의 규칙성을 찾아 본다.
 직선의 개수가 2개일 때, 교점의 개수는 1개
 직선의 개수가 3개일 때, 교점의 개수는 $1 + 2 = 3$ (개)
 직선의 개수가 4개일 때, 교점의 개수는 $1 + 2 + 3 = 6$ (개)
 직선의 개수가 5개일 때, 교점의 개수는 $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ (개)
 \vdots
 따라서 직선의 개수가 10개일 때, 교점의 개수는 $1 + 2 + 3 + \dots + 9 = 45$ (개)

06 **Action** 먼저 \overline{PA} 의 길이를 구한다.
 $\overline{PA} = \frac{1}{3}\overline{PF} = \frac{1}{3} \times 15 = 5 \text{ (cm)}$ 이므로
 $\overline{AF} = \overline{PF} - \overline{PA} = 15 - 5 = 10 \text{ (cm)}$
 $\overline{CF} = \frac{3}{5}\overline{AF} = \frac{3}{5} \times 10 = 6 \text{ (cm)}$ 이므로
 $\overline{MF} = \frac{1}{2}\overline{CF} = \frac{1}{2} \times 6 = 3 \text{ (cm)}$
 $\therefore \overline{AM} = \overline{AF} - \overline{MF} = 10 - 3 = 7 \text{ (cm)}$


07 **Action** 주어진 조건을 만족시키도록 직선 위에 점을 나타내어 본다.
 (가)에서 두 점 D, E의 위치는 다음 그림과 같다.




(나)에서 점 F의 위치는 다음 그림과 같다.



(다)에서 두 점 G, H의 위치는 다음 그림과 같다.




따라서 점 C의 위치는 다음 그림과 같다.



이때 $\overline{AD}=6$ 이므로 $\overline{DC}=\frac{3}{2}\overline{AD}=\frac{3}{2}\times 6=9$

08 Action 주어진 조건을 만족시키도록 그림으로 나타내어 본다.



(가), (나)에서 편의점과 빵집, 빵집과 서점 사이의 거리는

$$\frac{1}{2} \times 36 = 18 \text{ (m)}$$

(다)에서 편의점과 약국 사이의 거리는

$$\frac{1}{4} \times 18 = 4.5 \text{ (m)}$$

(라)에서 빵집과 은행 사이의 거리는

$$7.5 - 4.5 = 3 \text{ (m)}$$

따라서 은행과 서점 사이의 거리는

$$18 - 3 = 15 \text{ (m)}$$

09 Action 주어진 그림에서 나타낼 수 있는 모든 각을 빠짐없이 구한다.

주어진 그림에서 나타낼 수 있는 모든 각은

$\angle A_1OA_2, \angle A_1OA_3, \angle A_1OA_4, \angle A_1OA_5, \angle A_2OA_3,$
 $\angle A_2OA_4, \angle A_2OA_5, \angle A_3OA_4, \angle A_3OA_5, \angle A_4OA_5$ 이
 므로 모든 각의 크기의 합은

$$\begin{aligned} &\angle a + (\angle a + \angle b) + (\angle a + \angle b + \angle c) \\ &\quad + (\angle a + \angle b + \angle c + \angle d) + \angle b + (\angle b + \angle c) \\ &\quad + (\angle b + \angle c + \angle d) + \angle c + (\angle c + \angle d) + \angle d \\ &= 4\angle a + 6\angle b + 6\angle c + 4\angle d = 600^\circ \end{aligned}$$

이때 $\angle b = 2\angle a, \angle c = 3\angle a, \angle d = 4\angle a$ 이므로

$$4\angle a + 12\angle a + 18\angle a + 16\angle a = 600^\circ$$

$$50\angle a = 600^\circ \quad \therefore \angle a = 12^\circ$$

$$\therefore \angle d = 4\angle a = 4 \times 12^\circ = 48^\circ$$

10 Action 시침과 분침이 서로 반대 방향을 가리키며 평각을 이루는 시

각을 3시 x 분으로 놓고 시침과 분침이 움직인 각도를 각각 구한다.

시침과 분침이 서로 반대 방향을 가리키며 평각을 이루는 시
 각을 3시 x 분이라 하자.

시침이 12를 가리킬 때부터 3시간 x 분 동안 움직인 각도는
 $30^\circ \times 3 + 0.5^\circ \times x$

분침이 12를 가리킬 때부터 x 분 동안 움직인 각도는

$$6^\circ \times x$$

3시와 4시 사이에서 시계의 시침과 분침이 이루는 각의 크
 가 180° 이므로

$$6^\circ \times x - (30^\circ \times 3 + 0.5^\circ \times x) = 180^\circ$$

$$5.5^\circ \times x = 270^\circ$$

$$\therefore x = \frac{270}{5.5} = \frac{540}{11} = 49\frac{1}{11}$$

따라서 구하는 시각은 3시 $49\frac{1}{11}$ 분이다.

11 Action $\angle EOG$ 의 크기를 구한 후 맞꼭지각의 크기는 서로 같음을
 이용한다.

$$\angle COG + \angle EOB = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ \text{이고}$$

$$\angle COG + \angle EOB$$

$$= (\angle COE + \angle EOG) + (\angle EOG + \angle GOB)$$

$$= (\angle COE + \angle GOB) + 2\angle EOG$$

$$= 58^\circ + 2\angle EOG$$

$$\text{이므로 } 180^\circ = 58^\circ + 2\angle EOG$$

$$\therefore \angle EOG = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 58^\circ) = 61^\circ$$

$$\therefore \angle HOF = \angle EOG = 61^\circ \text{ (맞꼭지각)}$$


12 Action 두 점 A, B와 네 점 P, Q, R, S를 좌표평면 위에 나타내어 본
 다.

두 점 A, B와 네 점 P, Q, R, S
 를 좌표평면 위에 나타내면
 오른쪽 그림과 같다.

따라서 사각형 PQRS의 넓
 이는 두 삼각형 SPR, PQR
 의 넓이의 합과 같으므로
 (사각형 PQRS의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 2 + \frac{1}{2} \times 8 \times 4$$

$$= 8 + 16 = 24$$



최고 수준 뛰어넘기

- 01 ④ 02 ①, ④ 03 $\frac{27}{2}$ 04 3 : 4
- 05 18 06 $\frac{24}{5}$

01 **Action** 선분은 양 끝점 중 한 끝점을 정하여 개수를 세어 보고, 반직선은 시작점을 정하여 개수를 세어 본다.

- (i) 왼쪽 끝점이 A_1 인 선분의 개수 : $(n-1)$ 개
- 왼쪽 끝점이 A_2 인 선분의 개수 : $(n-2)$ 개
- 왼쪽 끝점이 A_3 인 선분의 개수 : $(n-3)$ 개
- ⋮

왼쪽 끝점이 A_{n-1} 인 선분의 개수 : 1개
 $\therefore a = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-1)$

- (ii) 시작점이 A_1 인 반직선의 개수 : 1개
- 시작점이 A_2 인 반직선의 개수 : 2개
- 시작점이 A_3 인 반직선의 개수 : 2개
- ⋮

시작점이 A_{n-1} 인 반직선의 개수 : 2개
 시작점이 A_n 인 반직선의 개수 : 1개
 $\therefore b = 1 + 2(n-2) + 1 = 2n - 2$

(i), (ii)에서
 $a + b = \{1 + 2 + 3 + \dots + (n-1)\} + 2n - 2$

02 **Action** \overline{AB} 를 6등분 하는 점들을 그림으로 나타내어 확인해 본다. 다음 그림과 같이 \overline{AB} 를 6등분 하는 점을 차례대로 C, D, E, F, G라 하자.



- ① $(A \circ B) \triangle B = E \triangle B = F, A \blacktriangle B = F$ 이므로 $(A \circ B) \triangle B = A \blacktriangle B$
 - ② $(A \blacktriangle B) \circ A = F \circ A = D, A \circ B = E$ 이므로 $(A \blacktriangle B) \circ A \neq A \circ B$
 - ③ $A \triangle (A \circ B) = A \triangle E = C, A \blacktriangle B = F$ 이므로 $A \triangle (A \circ B) \neq A \blacktriangle B$
 - ④ $A \blacktriangle (B \circ A) = A \blacktriangle E = D, A \triangle B = D$ 이므로 $A \blacktriangle (B \circ A) = A \triangle B$
 - ⑤ $(B \circ A) \triangle B = E \triangle B = F, A \triangle B = D$ 이므로 $(B \circ A) \triangle B \neq A \triangle B$
- 따라서 옳은 것은 ①, ④이다.

03 **Action** $R_1, R_2, R_3, \dots, R_9$ 에 대응하는 수를 각각 구해 본다. 9개의 점 $R_1, R_2, R_3, \dots, R_9$ 에 대응하는 수를 각각 $r_1, r_2, r_3, \dots, r_9$ 라 하자.

$\overline{AB} = 2 - 1 = 1$ 이므로
 $\overline{AR}_1 = \frac{1}{10}, \overline{AR}_2 = \frac{2}{10}, \overline{AR}_3 = \frac{3}{10}, \dots, \overline{AR}_9 = \frac{9}{10}$
 따라서 $r_1 = 1 + \frac{1}{10}, r_2 = 1 + \frac{2}{10}, r_3 = 1 + \frac{3}{10}, \dots,$
 $r_9 = 1 + \frac{9}{10}$ 이므로

$$\begin{aligned} & r_1 + r_2 + r_3 + \dots + r_9 \\ &= \left(1 + \frac{1}{10}\right) + \left(1 + \frac{2}{10}\right) + \left(1 + \frac{3}{10}\right) + \dots + \left(1 + \frac{9}{10}\right) \\ &= 9 + \frac{1+2+3+\dots+9}{10} \\ &= 9 + \frac{45}{10} = \frac{27}{2} \end{aligned}$$

04 **Action** $\angle BOE = \angle b + \angle c + \angle d, \angle AOD = \angle a + \angle b + \angle c$ 임을 이용한다.

$\angle a : \angle b = \angle b : \angle c = \angle c : \angle d = 4 : 3$ 이므로

$\angle a = \frac{4}{3}\angle b, \angle b = \frac{4}{3}\angle c, \angle c = \frac{4}{3}\angle d$

세 식을 변끼리 더하면

$\angle a + \angle b + \angle c = \frac{4}{3}(\angle b + \angle c + \angle d)$

$\therefore (\angle a + \angle b + \angle c) : (\angle b + \angle c + \angle d) = 4 : 3$

이때 $\angle BOE = \angle b + \angle c + \angle d, \angle AOD = \angle a + \angle b + \angle c$ 이므로

$\angle BOE : \angle AOD = (\angle b + \angle c + \angle d) : (\angle a + \angle b + \angle c) = 3 : 4$

05 **Action** 처음으로 원래 직선과 겹쳐졌을 때 x 의 값이 가장 작으려면 180° 만큼 회전한 후이다.

원래 직선이 첫 번째 회전한 직선과 이루는 각의 크기는 x°
 원래 직선이 두 번째 회전한 직선과 이루는 각의 크기는 $x^\circ + 2x^\circ$


원래 직선이 세 번째 회전한 직선과 이루는 각의 크기는 $x^\circ + 2x^\circ + 3x^\circ$

원래 직선이 네 번째 회전한 직선과 이루는 각의 크기는 $x^\circ + 2x^\circ + 3x^\circ + 4x^\circ$

직선을 4번 회전시켰더니 처음으로 원래 직선과 겹쳐졌으므로 $x^\circ + 2x^\circ + 3x^\circ + 4x^\circ = 180^\circ, 10x^\circ = 180^\circ$
 $\therefore x = 18$

06 **Action** 꼭짓점 A에서 \overline{BC} 에 수선의 발을 내린 후 직각삼각형의 넓이를 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A에서 \overline{BC} 에 내린 수선의 발을 D라 하면



$$\begin{aligned} \triangle ABC &= \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{AD} \\ &= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} \end{aligned}$$

에서

$\frac{1}{2} \times 10 \times \overline{AD} = \frac{1}{2} \times 8 \times 6, 5\overline{AD} = 24 \quad \therefore \overline{AD} = \frac{24}{5}$

따라서 꼭짓점 A와 \overline{BC} 사이의 거리는 \overline{AD} 의 길이와 같으므로 $\frac{24}{5}$ 이다.

2. 위치 관계

최고 수준 입문하기

P 20 - P 23

01 ③, ⑤	02 ㉠, ㉡, ㉢	03 ②, ④	04 5
05 ⑤	06 ④	07 10	08 15
09 ①, ⑤	10 7	11 ⑤	12 ④
13 ④	14 244°		
15 (1) $\angle x = 75^\circ, \angle y = 65^\circ$	(2) $\angle x = 55^\circ, \angle y = 45^\circ$		
16 35°	17 ⑤	18 10°	19 60°
20 115°	21 40°	22 25°	23 60°
24 90°	25 64°	26 24°	

01 **Action** 점이 직선 위에 있다는 것은 직선이 그 점을 지난다는 뜻임에 주의한다.


- ③ 직선 l 은 점 B를 지나지 않는다.
- ⑤ 두 점 A, C를 지나는 직선은 l 이다.

02 **Action** 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계를 살펴본다.


- ㉠ 평면 P 위에 있는 점은 A, B, C, E의 4개이다. 따라서 옳은 것은 ㉠, ㉡, ㉢이다.

03 **Action** 그림으로 나타내어 생각해 본다.

- ② 오른쪽 그림에서 $l \parallel m, m \perp n$ 이면 $l \perp n$ 이다.



- ④ 오른쪽 그림에서 $l \perp m, l \perp n$ 이면 $m \parallel n$ 이다.



04 **Action** 한 평면 위에 있는 두 직선이 서로 만나지 않을 때, 두 직선은 서로 평행하다고 한다.

\overline{AB} 와 평행한 직선은 \overline{EF} 의 1개이므로 $a=1$
 \overline{AB} 와 만나는 직선은 $\overline{BC}, \overline{CD}, \overline{DE}, \overline{FG}, \overline{GH}, \overline{HA}$ 의 6개 이므로 $b=6$
 $\therefore b-a=6-1=5$

05 **Action** 평면이 하나로 정해질 조건을 생각해 본다.

- ⑤ 꼬인 위치는 공간에서의 두 직선의 위치 관계로 꼬인 위치에 있는 두 직선은 한 평면 위에 있지 않다.

06 **Action** 각 경우의 모서리를 그림에서 찾아 위치 관계를 확인한다.

- ④ 모서리 CD와 수직으로 만나는 모서리는 모서리 CH, 모서리 DI의 2개이다.

07 **Action** 주어진 조건을 만족시키는 모서리의 개수를 각각 구해 본다.

\overline{DG} 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 AB, 모서리 AE, 모서리 BC, 모서리 BF, 모서리 EF, 모서리 EH의 6개이므로

$a=6$ 40%

모서리 EF와 수직으로 만나는 모서리는 모서리 AE, 모서리 BF, 모서리 EH, 모서리 FG의 4개이므로

$b=4$ 40%

$\therefore a+b=6+4=10$ 20%

Lecture

꼬인 위치에 있는 모서리를 찾는 방법
 입체도형에서 한 모서리와 꼬인 위치에 있는 모서리를 찾을 때에는 '한 점에서 만나는 모서리'와 '평행한 모서리'를 찾아서 제외시키면 된다.

08 **Action** 점과 평면 사이의 거리는 점에서 평면에 내린 수선의 발까지의 거리와 같다.

꼭짓점 A와 면 DEF 사이의 거리는 \overline{AD} 의 길이와 같고 $\overline{AD}=\overline{CF}=8$ cm이므로

$a=8$

꼭짓점 B와 면 ADFC 사이의 거리는 \overline{AB} 의 길이와 같고 $\overline{AB}=12$ cm이므로

$b=12$

꼭짓점 C와 면 ABED 사이의 거리는 \overline{AC} 의 길이와 같고 $\overline{AC}=5$ cm이므로

$c=5$

$\therefore a+b-c=8+12-5=15$

09 **Action** 각 경우의 모서리와 면을 그림에서 찾아 위치 관계를 확인한다.

- ① 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 CF, 모서리 CG, 모서리 DG, 모서리 EF의 4개이다.

- ② 모서리 BF와 평행한 모서리는 없다.

- ③ 면 CFG와 수직인 모서리는 모서리 AC, 모서리 DG, 모서리 EF의 3개이다.

- ④ 면 ADGC와 평행한 모서리는 모서리 BE, 모서리 EF, 모서리 BF의 3개이다.

- ⑤ 모서리 BC를 포함하는 면은 면 ABC, 면 BFC의 2개이다.

따라서 옳은 것은 ①, ⑤이다.

10 **Action** 주어진 조건을 만족시키는 면과 모서리의 개수를 각각 구해 본다.

면 ABE와 수직인 면은 면 AEFD, 면 ABCD, 면 EBCF의 3개이므로

$$a=3$$

면 ABCD와 평행한 모서리는 모서리 EF의 1개이므로

$$b=1$$

모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 CF, 모서리 DF, 모서리 EF의 3개이므로

$$c=3$$

$$\therefore a+b+c=3+1+3=7$$

11 **Action** 공간에서 직선의 위치를 생각해 본다.

- ① l, n 은 한 점에서 만나거나 평행하거나 꼬인 위치에 있다.
- ③ l, n 은 수직으로 만나거나 꼬인 위치에 있다.
- ④ m, n 은 수직으로 만나거나 꼬인 위치에 있다.

Lecture

만나지 않는 두 직선의 위치 관계

- (1) 평면에서 두 직선이 만나지 않으면 두 직선은 평행하다.
- (2) 공간에서 두 직선이 만나지 않으면 두 직선은 평행하거나 꼬인 위치에 있다.

12 **Action** 공간에서 직선과 평면의 위치 관계를 생각해 본다.

- ① l, m 은 한 점에서 만나거나 평행하거나 꼬인 위치에 있다.
- ② l, m 은 한 점에서 만나거나 꼬인 위치에 있다.
- ③ P, Q 는 한 직선에서 만나거나 평행하다.
- ⑤ P, R 는 한 직선에서 만나거나 평행하다.

13 **Action** 서로 다른 두 직선이 한 직선과 만나서 생기는 각 중에서 동위각은 같은 위치에 있는 각이고, 엇각은 엇갈린 위치에 있는 각이다.


- ① $\angle a$ 의 동위각은 $\angle e, \angle l$ 이다.
- ② $\angle b$ 와 $\angle h$ 는 엇각이다.
- ③ $\angle d$ 의 엇각은 $\angle i$ 이다.
- ⑤ $\angle h$ 의 엇각은 $\angle b, \angle j$ 이다.

14 **Action** 먼저 주어진 그림에서 $\angle x$ 의 동위각을 모두 찾아본다.

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 동위각은 $\angle a$ 와 $\angle b$ 이다.

$$\angle a + 52^\circ = 180^\circ \text{에서}$$

$$\angle a = 128^\circ$$



$$\angle b = 116^\circ \text{ (맞꼭지각)}$$

$$\therefore \angle a + \angle b = 128^\circ + 116^\circ = 244^\circ$$

Lecture

문제와 같이 세 직선이 세 점에서 만나는 경우에는 한 교점을 가진 후 동위각, 엇각을 찾는다.

15 **Action** 서로 평행한 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, 동위각(또는 엇각)의 크기는 서로 같다.


(1) 오른쪽 그림에서

$$105^\circ + \angle x = 180^\circ$$

$$\therefore \angle x = 75^\circ$$

$$40^\circ + \angle y = 105^\circ$$

$$\therefore \angle y = 65^\circ$$



(2) 오른쪽 그림에서


$$125^\circ + \angle x = 180^\circ$$

$$\therefore \angle x = 55^\circ$$

$$80^\circ + \angle x + \angle y = 180^\circ \text{에서}$$

$$80^\circ + 55^\circ + \angle y = 180^\circ$$

$$\therefore \angle y = 45^\circ$$




16 **Action** 삼각형의 각의 크기의 합은 180° 임을 이용한다.

오른쪽 그림에서

$$40^\circ + (2\angle x + 10^\circ) + (\angle x + 25^\circ) = 180^\circ$$

$$3\angle x = 105^\circ$$

$$\therefore \angle x = 35^\circ$$



17 **Action** 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때 생기는 동위각(또는 엇각)의 크기가 같으면 두 직선은 서로 평행하다.


- ① $l \parallel m$ 이면 $\angle c = \angle e$ (엇각)
- ② $\angle a = \angle c$ (맞꼭지각)이므로 $\angle a = \angle g$ 이면 $\angle c = \angle g$
따라서 동위각의 크기가 같으므로 $l \parallel m$
- ③ $\angle b = \angle h$ 이면 엇각의 크기가 같으므로 $l \parallel m$
- ④ $l \parallel m$ 이면 $\angle c = \angle e$ (엇각)
이때 $\angle e + \angle f = 180^\circ$ 이므로 $\angle c + \angle f = 180^\circ$
- ⑤ $l \parallel m$ 이면 $\angle d = \angle h$ (동위각), $\angle h = \angle f$ (맞꼭지각)이므로 $\angle d = \angle f$
따라서 $\angle d \neq 90^\circ$ 이면 $\angle d + \angle f \neq 180^\circ$
따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

18 **Action** 정삼각형의 한 각의 크기는 60° 임을 이용한다.

$$\begin{aligned} \angle AEG &= \angle EGD \text{ (엇각)이므로} \\ \angle x + 60^\circ &= 7\angle x, 6\angle x = 60^\circ \quad \therefore \angle x = 10^\circ \end{aligned}$$


19 **Action** 꺾인 점을 지나고 주어진 직선에 평행한 직선을 그어 평행선에서 동위각과 엇각의 크기는 각각 같음을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m 에 평행한 직선 n 을 그으면
 $65^\circ + 55^\circ + \angle x = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 60^\circ$




20 **Action** 꺾인 점을 각각 지나고 주어진 직선에 평행한 두 직선을 그어 평각의 크기는 180° 임을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m 에 평행한 두 직선 p, q 를 그으면
 30%
 $(\angle x - 20^\circ) + 85^\circ = 180^\circ$
 40%
 $\therefore \angle x = 115^\circ$ 30%




21 **Action** 꺾인 점을 각각 지나고 주어진 직선에 평행한 두 직선을 그어 평행선에서 동위각과 엇각의 크기는 각각 같음을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m 에 평행한 두 직선 p, q 를 그으면
 $(2\angle x - 30^\circ) + (3\angle x + 10^\circ) = 180^\circ$
 $5\angle x = 200^\circ \quad \therefore \angle x = 40^\circ$




22 **Action** 꺾인 점을 각각 지나고 주어진 직선에 평행한 세 직선을 그어 평행선에서 동위각과 엇각의 크기는 각각 같음을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m 에 평행한 세 직선 p, q, r 를 그으면
 $2\angle x + (2\angle x - 40^\circ) = 60^\circ$
 $4\angle x = 100^\circ \quad \therefore \angle x = 25^\circ$



23 **Action** 먼저 $\angle ABC$ 의 크기를 구한다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m 에 평행한 직선 n 을 그으면
 $\angle ABC = 78^\circ + 22^\circ = 100^\circ$




$\angle ABD : \angle DBC = 3 : 2$ 이므로

$$\begin{aligned} \angle ABD &= \angle ABC \times \frac{3}{3+2} \\ &= 100^\circ \times \frac{3}{5} = 60^\circ \end{aligned}$$


24 **Action** 꺾인 점을 각각 지나고 주어진 직선에 평행한 네 직선을 그어 평행선에서 동위각과 엇각의 크기는 각각 같음을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m 에 평행한 네 직선을 그으면
 $30^\circ + \angle c + (\angle a + \angle b + 60^\circ) = 180^\circ$
 $\therefore \angle a + \angle b + \angle c = 90^\circ$




25 **Action** 접은 각의 크기는 같고 평행선에서 엇각의 크기는 같음을 이용한다.

오른쪽 그림에서
 $\angle FEG = \angle DEG = 58^\circ$
 (접은 각)
 $\angle EGF = \angle DEG = 58^\circ$ (엇각)
 이때 삼각형 EFG에서
 $58^\circ + \angle x + 58^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 64^\circ$



26 **Action** 접은 각의 크기는 같고 평행선에서 엇각의 크기는 같음을 이용한다.

오른쪽 그림에서
 $\angle ECD = \angle ECF = 24^\circ$ (접은 각)
 이므로
 $\angle z = 90^\circ - (24^\circ + 24^\circ) = 42^\circ$
 30%



$\angle y = \angle ECB = 24^\circ + \angle z = 24^\circ + 42^\circ = 66^\circ$ (엇각) 30%
 $\angle FEC = \angle DEC = 66^\circ$ (접은 각)이므로 30%
 $\angle x = 180^\circ - (66^\circ + 66^\circ) = 48^\circ$ 30%
 $\therefore \angle x - \angle y + \angle z = 48^\circ - 66^\circ + 42^\circ = 24^\circ$ 10%

최고 수준 완성하기

P 24 - P 27

01 7개	02 13	03 ⑤	04 ②
05 ㉠, ㉡	06 12	07 3	08 ③, ④
09 ㉠, ㉡	10 15°	11 30°	12 27°
13 115°	14 190°	15 135°	16 ④

01 **Action** 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점은 하나의 평면을 결정한다.

네 점 A, B, C, D 중 세 점으로 정해지는 평면은 모두 같은 평면이므로 1개

네 점 A, B, C, D 중 두 점과 점 O로 정해지는 평면은 면 ABO, 면 ACO, 면 ADO, 면 BCO, 면 BDO, 면 CDO의 6개

따라서 세 점으로 정해지는 서로 다른 평면의 개수는 $1+6=7$ (개)

02 **Action** 주어진 조건을 만족시키는 모서리의 개수를 각각 구해 본다.

모서리 BC와 평행한 모서리는 모서리 ED, 모서리 FG, 모서리 IH의 3개이므로 $a=3$ 30%

모서리 DE와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 AB, 모서리 AC, 모서리 BF, 모서리 CG, 모서리 GH, 모서리 FI의 6개이므로 $b=6$ 30%

모서리 DH와 수직으로 만나는 모서리는 모서리 CD, 모서리 DE, 모서리 GH, 모서리 HI의 4개이므로 $c=4$ 30%

$\therefore a+b+c=3+6+4=13$ 10%

03 **Action** 각 경우의 모서리와 면을 그림에서 찾아 위치 관계를 확인한다.


- ① 면 ABFE와 모서리 MD는 평행하지 않다.
- ② 모서리 NH와 모서리 AB는 꼬인 위치에 있다.
- ③ 면 BFNМ과 모서리 DH는 평행하다.
- ④ 모서리 DH와 평행한 면은 면 ABFE, 면 BFNМ의 2개이다.

04 **Action** 주어진 전개도로 정육면체를 만들어 본다.

주어진 전개도로 만든 정육면체는 오른쪽 그림과 같다.

모서리 BC와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 EF(=IH), 모서리 GH(=GF), 모서리 LM(=LK), 모서리 NM(=JK)이고, 면 ABCN과 평행한 모서리는 모서리 GH(=GF), 모서리 HK, 모서리 LM(=LK), 모서리 GL이다.

따라서 모서리 BC와 꼬인 위치에 있고, 동시에 면 ABCN과 평행한 모서리는 모서리 GH(=GF), 모서리 LM(=LK)이다.



05 **Action** 직선 l 과 평면 P 의 교점을 지나는 평면 P 위의 두 직선이 직선 l 과 수직이면 $l \perp P$ 임을 이용한다.

직선과 평면이 수직임을 보이려면 주어진 직선과 평면은 한 점에서 만나고, 그 점을 지나는 평면 위의 2개 이상의 직선과 주어진 직선이 수직이어야 한다.

즉 \overline{AB} 가 평면 P 와 점 B에서 만나므로 점 B를 지나는 평면 P 위의 두 선분 BD, BF가 \overline{AB} 와 수직이어야 한다.

따라서 필요한 조건은 ㉠, ㉡이다.

06 **Action** 주어진 조건을 만족시키는 면과 모서리의 개수를 각각 구해 본다.

면 EFPQH와 수직인 면은 면 ABFE, 면 AEHD, 면 BFP, 면 DQH의 4개이므로 $a=4$

모서리 AB와 평행한 면은 면 EFPQH, 면 DQH의 2개이므로 $b=2$

모서리 BP와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 AD, 모서리 AE, 모서리 DH, 모서리 EF, 모서리 EH, 모서리 HQ의 6개이므로 $c=6$

$\therefore a+b+c=4+2+6=12$

07 **Action** 주어진 전개도로 입체도형을 만들어 본다.


주어진 전개도로 만든 입체도형은 오른쪽 그림과 같다.

면 CEF와 수직인 면은 면 ABE,

면 ADF의 2개이므로 $a=2$

\overline{AF} 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 \overline{BE} (=CE)의 1개이므로 $b=1$

$\therefore a+b=2+1=3$



08 **Action** 공간에서 직선과 평면의 위치 관계를 생각해 본다.

- ① m, n 은 한 점에서 만나거나 꼬인 위치에 있다.
- ② P, R 는 한 직선에서 만나거나 평행하다.
- ⑤ l, m 은 한 점에서 만나거나 평행하거나 꼬인 위치에 있다.

Lecture

공간에서의 특수한 위치 관계

(1) 항상 평행한 위치 관계

① 한 직선에 평행한 서로 다른 두 직선

$\rightarrow l \parallel m, l \parallel n$ 이면 $m \parallel n$

② 한 평면에 평행한 서로 다른 두 평면

$\rightarrow P \parallel Q, P \parallel R$ 이면 $Q \parallel R$

③ 한 직선에 수직인 서로 다른 두 평면

$\rightarrow l \perp P, l \perp Q$ 이면 $P \parallel Q$

④ 한 평면에 수직인 서로 다른 두 직선

$\rightarrow P \perp l, P \perp m$ 이면 $l \parallel m$

(2) 항상 수직인 위치 관계

① 한 평면에 평행한 평면과 수직인 평면

$\rightarrow P \parallel Q, P \perp R$ 이면 $Q \perp R$

② 한 평면에 평행한 평면과 수직인 직선


$\rightarrow P \parallel Q, P \perp l$ 이면 $Q \perp l$

09 **Action** 서로 다른 두 직선이 한 직선과 만나면 동위각과 엇각이 생긴다.

- ㉠ $\angle g$ 의 엇각은 $\angle i, \angle m$ 이다.
 - ㉡ $\angle k$ 와 $\angle t$ 의 크기가 같은지는 알 수 없다.
- 따라서 옳은 것은 ㉠, ㉡이다.


10 **Action** 꺾인 점을 지나고 주어진 직선에 평행한 직선을 그어 평행선에서 동위각의 크기는 같음을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m 에 평행한 직선 n 을 그으면
 $(3\angle x + 13^\circ) + (5\angle x - 5^\circ) = 128^\circ$
 $8\angle x = 120^\circ \quad \therefore \angle x = 15^\circ$




11 **Action** 꺾인 점을 지나고 주어진 직선에 평행한 직선을 그어 삼각형의 각의 크기의 합은 180° 임을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m 에 평행한 직선 n 을 그으면
 $2\angle x + 75^\circ + (180^\circ - 3\angle x - 45^\circ) = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 30^\circ$




12 **Action** $l \parallel m$ 이고 $\angle ABC = 90^\circ$ 이므로 $\angle a + \angle b = 90^\circ$ 이다.

오른쪽 그림과 같이 점 B를 지나고 두 직선 l, m 에 평행한 직선 BF를 그으면
 $\angle ABF = \angle a$ (엇각),
 $\angle CBF = \angle b$ (엇각)이므로
 $\angle a + \angle b = 90^\circ$
 이때 $\angle a = 4\angle b$ 이므로 $4\angle b + \angle b = 90^\circ$
 $5\angle b = 90^\circ \quad \therefore \angle b = 18^\circ$
 또 $\angle EBF = \angle x$ (엇각)이므로 $\angle x + \angle b = 45^\circ$
 $\angle x + 18^\circ = 45^\circ \quad \therefore \angle x = 27^\circ$




13 **Action** 정삼각형의 한 각의 크기는 60° 임을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m 에 평행한 두 직선 p, q 를 그으면 정삼각형의 한 각의 크기는 60° 이므로
 $\angle x = 75^\circ + 40^\circ = 115^\circ$



14 **Action** 세 점 E, F, G를 각각 지나고 두 직선 l, m 에 평행한 세 직선을 그어 평행선에서 엇각의 크기는 같음을 이용한다.


오른쪽 그림과 같이 $\angle ABE = \angle a, \angle EDC = \angle b$ 라 하고 세 점 E, F, G를 각각 지나고 두 직선 l, m 에 평행한 세 직선을 그으면



$\angle a + \angle b = 38^\circ$
 $\angle ABF = 2\angle a, \angle FDC = 2\angle b$ 이므로
 $\angle x = 2\angle a + 2\angle b = 2(\angle a + \angle b) = 2 \times 38^\circ = 76^\circ$
 $\angle ABG = 3\angle a, \angle GDC = 3\angle b$ 이므로
 $\angle y = 3\angle a + 3\angle b = 3(\angle a + \angle b) = 3 \times 38^\circ = 114^\circ$
 $\therefore \angle x + \angle y = 76^\circ + 114^\circ = 190^\circ$


15 **Action** 꺾인 점을 지나고 주어진 직선에 평행한 직선을 그어 평행선에서 동위각과 엇각의 크기는 각각 같음을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선 m, n 에 평행한 세 직선 p, q, r 를 그으면
 $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + 45^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle a + \angle b + \angle c + \angle d = 135^\circ$



16 **Action** 접은 각의 크기는 서로 같음을 이용한다.

- ① $\angle BCF = \angle a$ (접은 각)
 이므로 $2\angle a = \angle AFB = 64^\circ$ (동위각)
 $\therefore \angle a = 32^\circ$
 - ② $\angle b = 180^\circ - (64^\circ + 70^\circ) = 46^\circ$
 - ③ $\angle c = \angle b = 46^\circ$ (엇각)
 - ④ $\angle GED = \angle d$ (접은 각)이므로
 $2\angle d = 180^\circ - \angle c = 180^\circ - 46^\circ = 134^\circ$
 $\therefore \angle d = 67^\circ$
 - ⑤ $\angle e = \angle c + \angle d = 46^\circ + 67^\circ = 113^\circ$ (엇각)
- 따라서 옳은 것은 ④이다.



최고 수준 **뛰어넘기**

- 01 (1) 모서리 CG (2) 8 (3) 15° 02 8개
- 03 8번째 04 48° 05 360° 06 60°

01 Action 삼각형 AEB는 정삼각형이고 삼각형 ABC는 직각이등변 삼각형이다.

(1) 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 CG, 모서리 DE, 모서리 EF, 모서리 FG, 모서리 GD이다.
 모서리 EF와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 AB, 모서리 AD, 모서리 BC, 모서리 CG이다.
 따라서 모서리 AB, 모서리 EF와 동시에 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 CG이다.

(2) 면 ABC와 평행한 모서리는 모서리 DE, 모서리 EF, 모서리 FG, 모서리 GD의 4개이므로
 $a=4$

면 BEF와 수직인 면은 면 ABC, 면 AED, 면 BFGC, 면 DEFG의 4개이므로
 $b=4$

$$\therefore a+b=4+4=8$$

(3) $\overline{AE}=\overline{AB}=\overline{EB}$ 이므로 삼각형 AEB는 정삼각형이다.
 $\therefore \angle ABE=60^\circ$

삼각형 ABC는 $\overline{AC}=\overline{BC}$, $\angle ACB=90^\circ$ 인 직각이등변 삼각형이므로

$$\angle ABC=\frac{1}{2} \times (180^\circ - 90^\circ) = 45^\circ$$

사각형 ADFB는 직사각형이므로


$$\angle BAD=90^\circ$$

$$\therefore \angle ABE + \angle ABC - \angle BAD = 60^\circ + 45^\circ - 90^\circ = 15^\circ$$

02 Action 주어진 전개도로 입체도형을 만들어 본다.


주어진 전개도로 만든 입체도형은 오른쪽 그림과 같다.

따라서 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 PQ(=RQ), 모서리 QM, 모서리 MN(=ML), 모서리 QD, 모서리 MH, 모서리 CD(=ED), 모서리 DH, 모서리 GH(=IH)의 8개이다.



03 Action 점 P를 지나고 반직선 l_2, l_3, \dots 과 평행한 반직선을 그려 본다.

오른쪽 그림과 같이 점 P를 지나고 $l_2 \parallel l_2', l_3 \parallel l_3', \dots$ 이 되도록 반직선 l_2', l_3', \dots 을 긋자.
 x 번째 반직선까지의 각의 크기의 합이 $180^\circ, 360^\circ, 540^\circ, 720^\circ, \dots$, 즉 $180^\circ \times n$ (n 은 자연수)일 때 x 번째 반직선은 직선 l 과 평행하게 된다.



$10^\circ + 20^\circ + 30^\circ + 40^\circ + 50^\circ + 60^\circ + 70^\circ + 80^\circ = 360^\circ$ 이므로 8번째 반직선이 처음으로 직선 l 과 평행하게 된다.

04 Action 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180° 임을 이용한다.

오른쪽 그림에서 $p \parallel q$ 이므로

$$\angle b = 60^\circ \text{ (맞꼭지각)}$$

$$\angle a : \angle b = 7 : 3 \text{ 이므로}$$


$$\angle a : 60^\circ = 7 : 3$$

$$3\angle a = 420^\circ$$

$$\therefore \angle a = 140^\circ$$

$$\text{따라서 } 32^\circ + 100^\circ + \angle x = 180^\circ \text{ 이므로}$$

$$\angle x = 48^\circ$$



05 Action 두 점 C, D를 각각 지나고 주어진 직선에 평행한 직선을 그어 평행선에서 동위각과 엇각의 크기는 각각 같음을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 두 점 C, D를 각각 지나고 두 직선 l, m 에 평행한 두 직선 p, q 를 긋자.

$\angle HCJ = \angle f$ 라 하면

삼각형 BID에서

$$\angle b + \angle a + (\angle c - \angle f) + \angle d$$

$$= 180^\circ$$

이므로

$$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d = 180^\circ + \angle f$$


이때 직선 p 에서 $\angle e + \angle f = 180^\circ$ 이므로

$$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e = (180^\circ + \angle f) + \angle e$$

$$= 180^\circ + (\angle f + \angle e)$$

$$= 180^\circ + 180^\circ$$

$$= 360^\circ$$



06 Action 평행사변형 모양의 종이의 접은 부분을 펼쳐서 생각한다.

오른쪽 그림과 같이 종이를 접기 전의 평행사변형 모양에서 점 D를 지나고 $\overline{AD'}$ 과 \overline{BC} 에 평행한 직선을 그으면


$$\angle x + 40^\circ = 60^\circ$$

$$\therefore \angle x = 20^\circ$$

$$\text{또 } (40^\circ + 2\angle y) + 60^\circ = 180^\circ \text{ 이므로}$$

$$2\angle y = 80^\circ \quad \therefore \angle y = 40^\circ$$

$$\therefore \angle x + \angle y = 20^\circ + 40^\circ = 60^\circ$$



3. 작도와 합동

최고 수준 **입문하기**

32 - 35

- 01 ㉠, ㉡ 02 ㉢
 03 ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤ → ㉥ 04 ①, ⑤
 05 4개 06 7개 07 ① 08 ㉠, ㉢, ㉤
 09 \overline{BC} 의 길이 또는 $\angle A$ 의 크기 또는 $\angle C$ 의 크기
 10 ④, ⑤ 11 (1) 2개 (2) 1개 (3) 0개 (4) 무수히 많다.
 12 ㉢ 13 ㉠, ㉢, ㉤
 14 (가) \overline{OC} (나) \overline{AB} (다) \overline{OB} (라) SAS 15 ④
 16 ② 17 ③ 18 88° 19 60°
 20 10 cm 21 15 cm 22 34° 23 90°
 24 16 cm^2

01 **Action** 작도는 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것이다.

- ㉠ 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것을 작도라 한다.
 - ㉡ 두 점을 지나는 직선을 그릴 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.
 - ㉢ 크기가 같은 각을 작도할 때에는 눈금 없는 자와 컴퍼스를 사용한다.
- 따라서 옳은 것은 ㉠, ㉡이다.

02 **Action** 크기가 같은 각의 작도 방법을 생각해 본다.

- ① $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{PC} = \overline{PD}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\angle AOB = \angle CPD$
- ③ $\overline{PD} = \overline{CD}$ 인지는 알 수 없다.

03 **Action** 엇각의 크기가 같으면 두 직선이 평행함을 이용한다.

- 작도 순서는
 ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤ → ㉥

Lecture
평행선의 작도
 평행선의 작도는 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, 동위각(또는 엇각)의 크기가 같으면 두 직선은 서로 평행하다는 성질을 이용한 것이다.

04 **Action** 가장 긴 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 작아야 한다.

- ① $3+3 > 5$ ② $3+5 < 9$ ③ $4+6 < 12$
 - ④ $5+5 = 10$ ⑤ $5+7 > 10$
- 따라서 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 있는 것은 ①, ⑤이다.

05 **Action** 먼저 가장 긴 변의 길이를 찾아본다.

가장 긴 변의 길이가 $x+3$ 이므로
 $x+3 < (x-2)+x$
 $\therefore x > 5$
 따라서 x 의 값이 될 수 있는 한 자리의 자연수는 6, 7, 8, 9의 4개이다.

06 **Action** 가장 긴 변의 길이를 정한 후 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작아야 함을 이용한다.

- (i) 가장 긴 변의 길이가 6일 때
 (2, 5, 6), (3, 4, 6), (3, 5, 6), (4, 5, 6)의 4개 30%
 - (ii) 가장 긴 변의 길이가 5일 때
 (2, 4, 5), (3, 4, 5)의 2개 30%
 - (iii) 가장 긴 변의 길이가 4일 때
 (2, 3, 4)의 1개 30%
- (i)~(iii)에서 만들 수 있는 삼각형의 개수는
 $4+2+1=7$ (개) 10%

Lecture
 길이가 6인 막대를 포함하여 세 개의 막대를 뽑는 경우는
 (1, 2, 6), (1, 3, 6), (1, 4, 6), (1, 5, 6), (2, 3, 6), (2, 4, 6),
 (2, 5, 6), (3, 4, 6), (3, 5, 6), (4, 5, 6)
 그런데 (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)을 만족시키는 경우는 (2, 5, 6), (3, 4, 6), (3, 5, 6), (4, 5, 6)뿐이다.

07 **Action** 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌을 때에는 선분을 작도한 후 두 각을 작도하거나 한 각을 작도한 후 선분을 작도하고 다른 한 각을 작도하면 된다.

- (i) 한 변의 길이 작도 → 한 각의 크기 작도 → 다른 한 각의 크기 작도 (③, ④)
- (ii) 한 각의 크기 작도 → 한 변의 길이 작도 → 다른 한 각의 크기 작도 (②, ⑤)

08 **Action** 삼각형이 하나로 정해지는 조건을 생각해 본다.

- ㉠ $\angle B$ 가 \overline{AB} 와 \overline{AC} 의 끼인각이 아니므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.
- ㉡ $\angle B = 180^\circ - (60^\circ + 45^\circ) = 75^\circ$
 즉 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌으므로 삼각형이 하나로 정해진다.
- ㉢ 모양은 같지만 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 만들어진다.
- ㉣ $\angle B + \angle C = 180^\circ$ 이므로 삼각형이 만들어지지 않는다.
 따라서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것은 ㉠, ㉢, ㉣이다.

09 **Action** $\angle B$ 가 끼인각이 되는 경우와 양 끝 각 중의 하나가 되는 경우로 나누어 생각한다.


- (i) $\angle B$ 가 끼인각이 되는 경우
 \overline{BC} 의 길이가 주어지면 삼각형이 하나로 정해진다.
- (ii) $\angle B$ 가 양 끝 각 중의 하나가 되는 경우
 $\angle A$ 의 크기가 주어지면 삼각형이 하나로 정해지고, $\angle C$ 의 크기가 주어지면 $\angle A$ 의 크기를 구할 수 있으므로 삼각형이 하나로 정해진다.

10 **Action** 삼각형이 하나로 정해지는 조건을 생각해 본다.

- ① $\angle B=80^\circ, \angle C=180^\circ-(30^\circ+80^\circ)=70^\circ$ 로 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 것이므로 삼각형이 하나로 정해진다.
 - ② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 것이므로 삼각형이 하나로 정해진다.
 - ③ 세 변의 길이가 주어진 것이므로 삼각형이 하나로 정해진다.
 - ④ $\angle B$ 의 크기 또는 $\angle C$ 의 크기 중 하나가 더 주어져야 한다.
 - ⑤ \overline{BC} 를 밑변으로 하는 이등변삼각형은 무수히 많이 만들어진다.
- 따라서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지지 않는 것은 ④, ⑤이다.

11 **Action** 각 경우에 그릴 수 있는 삼각형을 생각해 본다.

- (1) 두 변의 길이와 그 끼인각이 아닌 다른 한 각의 크기가 주어졌으므로 다음 그림과 같이 그릴 수 있는 삼각형은 2개이다.



- (2) $\angle B=180^\circ-(80^\circ+70^\circ)=30^\circ$, 즉 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌으므로 그릴 수 있는 삼각형은 1개이다.
- (3) $\angle A + \angle B=180^\circ$ 이므로 삼각형을 그릴 수 없다.
- (4) 세 각의 크기가 주어졌으므로 무수히 많은 삼각형이 그려진다.

12 **Action** 삼각형의 합동 조건을 알고 합동인 경우를 찾아본다.

- ① SSS 합동
- ② SAS 합동
- ④ ASA 합동
- ⑤ $\angle A = \angle D, \angle B = \angle E$ 이면 $\angle C = \angle F$ 이므로 ASA 합동

13 **Action** 삼각형의 합동 조건에 맞게 추가되어야 할 조건을 찾아본다.

- ㉠ SAS 합동
 - ㉡ $\angle A = \angle D, \angle C = \angle E$ 이면 $\angle B = \angle F$ 이므로 ASA 합동
 - ㉢ ASA 합동
- 따라서 필요한 조건은 ㉠, ㉡, ㉢이다.

14 **Action** $\triangle OAD$ 와 $\triangle OCB$ 가 합동임을 보인다.

$\triangle OAD$ 와 $\triangle OCB$ 에서
 $\overline{OA} = \overline{OC}$
 $\overline{OD} = \overline{OC} + \overline{CD} = \overline{OA} + \overline{AB} = \overline{OB}$
 $\angle O$ 는 공통
 $\therefore \triangle OAD \equiv \triangle OCB$ (SAS 합동)
 \therefore (가) \overline{OC} (나) \overline{AB} (다) \overline{OB} (라) SAS

15 **Action** $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로 $\angle ABC = \angle ACB$ 임을 이용한다.

- ①, ②, ⑤ $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로 $\angle ABC = \angle ACB$
 $\triangle BCD$ 와 $\triangle CBE$ 에서
 \overline{BC} 는 공통
 $\angle DBC = \angle ECB$
 $\angle DCB = 90^\circ - \angle DBC = 90^\circ - \angle ECB = \angle ECB$
 $\therefore \triangle BCD \equiv \triangle CBE$ (ASA 합동)
 $\therefore \overline{BD} = \overline{CE}, \overline{AD} = \overline{AB} - \overline{DB} = \overline{AC} - \overline{EC} = \overline{AE}$
 - ③ $\triangle PBC$ 에서 $\angle PBC = \angle PCB$ 이므로 $\overline{PB} = \overline{PC}$
 - ④ $\overline{AE} = \overline{BE}$ 인지는 알 수 없다.
- 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

16 **Action** 먼저 합동인 두 삼각형을 찾는다.

- ①, ③, ⑤ $\triangle ACE$ 와 $\triangle DCB$ 에서
 $\overline{AC} = \overline{DC}$
 $\overline{CE} = \overline{CB}$
 $\angle ACE = 60^\circ + \angle DCE = \angle DCB$
 $\therefore \triangle ACE \equiv \triangle DCB$ (SAS 합동)
 $\therefore \overline{AE} = \overline{DB}$
- ② $\overline{AP} = \overline{PE}$ 인지는 알 수 없다.
- ④ $\angle DCB = 180^\circ - \angle DCA = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$
따라서 옳지 않은 것은 ②이다.

17 **Action** 먼저 합동인 두 삼각형을 찾는다.

- ①, ②, ⑤ $\triangle ABP$ 와 $\triangle AER$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{AE}$
 $\angle ABP = \angle AER = 60^\circ$
 $\angle BAP = 60^\circ - \angle PAR = \angle EAR$
 $\therefore \triangle ABP \equiv \triangle AER$ (ASA 합동)
 $\therefore \overline{AP} = \overline{AR}$

- ③ $\angle APB = \angle ARD$ 인지는 알 수 없다.
- ④ $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 가 정삼각형이므로
 $\angle ABC = \angle AED = 60^\circ$
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

18 **Action** $\triangle AEC$ 와 $\triangle BDC$ 가 합동임을 이용한다.

$\triangle AEC$ 와 $\triangle BDC$ 에서
 $\overline{AC} = \overline{BC}$
 $\overline{EC} = \overline{DC}$
 $\angle ACE = \angle BCD = 60^\circ$
 $\therefore \triangle AEC \equiv \triangle BDC$ (SAS 합동)
 따라서 $\angle AEC = \angle BDC = 32^\circ + 60^\circ = 92^\circ$ 이므로
 $\angle BEA = 180^\circ - 92^\circ = 88^\circ$

19 **Action** $\triangle ADF$, $\triangle BED$, $\triangle CFE$ 가 합동임을 이용한다.

$\triangle ADF$ 와 $\triangle BED$ 와 $\triangle CFE$ 에서
 $\angle A = \angle B = \angle C = 60^\circ$
 $\overline{AD} = \overline{BE} = \overline{CF}$
 $\overline{AF} = \overline{BD} = \overline{CE}$
 $\therefore \triangle ADF \equiv \triangle BED \equiv \triangle CFE$ (SAS 합동)
 따라서 $\overline{DF} = \overline{ED} = \overline{FE}$ 이므로 $\triangle DEF$ 는 정삼각형이다.
 $\therefore \angle x = 60^\circ$

Lecture
 $\overline{AC} - \overline{FC} = \overline{BA} - \overline{DA} = \overline{CB} - \overline{EB}$ 이므로
 $\overline{AF} = \overline{BD} = \overline{CE}$ 이다.

20 **Action** $\triangle APC$ 와 $\triangle AQB$ 가 합동임을 이용한다.

$\triangle APC$ 와 $\triangle AQB$ 에서
 $\overline{AP} = \overline{AQ}$
 $\overline{AC} = \overline{AB}$
 $\angle PAC = \angle PAB + 60^\circ = \angle QAB$
 $\therefore \triangle APC \equiv \triangle AQB$ (SAS 합동)
 $\therefore \overline{QB} = \overline{PC} = \overline{PB} + \overline{BC}$
 $= 7 + 3 = 10$ (cm)

21 **Action** $\triangle BDA$ 와 $\triangle AEC$ 가 합동임을 이용한다.

$\triangle BDA$ 와 $\triangle AEC$ 에서
 $\overline{BA} = \overline{AC}$
 $\angle DBA = 90^\circ - \angle DAB = \angle EAC$
 $\angle DAB = 90^\circ - \angle EAC = \angle ECA$
 $\therefore \triangle BDA \equiv \triangle AEC$ (ASA 합동)

따라서 $\overline{BD} = \overline{AE}$, $\overline{AD} = \overline{CE}$ 이므로
 $\overline{DE} = \overline{DA} + \overline{AE} = \overline{EC} + \overline{BD}$ 에서
 $20 = 5 + \overline{BD}$
 $\therefore \overline{BD} = 15$ (cm)

22 **Action** $\triangle AED$ 와 $\triangle CED$ 가 합동임을 이용한다.

$\triangle AED$ 와 $\triangle CED$ 에서
 \overline{DE} 는 공통
 $\overline{AD} = \overline{CD}$
 $\angle ADE = \angle CDE = 45^\circ$
 $\therefore \triangle AED \equiv \triangle CED$ (SAS 합동) 40%
 한편, $\overline{AD} \parallel \overline{BF}$ 이므로
 $\angle DAF = \angle AFC = 28^\circ$ (엇각) 30%
 $\therefore \angle DCE = \angle DAE = 28^\circ$ 10%
 따라서 $\triangle ECF$ 에서
 $\angle CEF = 180^\circ - (28^\circ + 90^\circ + 28^\circ)$
 $= 34^\circ$ 20%

23 **Action** $\triangle ABE$ 와 $\triangle DAF$ 가 합동임을 이용한다.

$\triangle ABE$ 와 $\triangle DAF$ 에서
 $\overline{AE} = \overline{DF}$
 $\overline{AB} = \overline{DA}$
 $\angle BAE = \angle ADF = 90^\circ$
 $\therefore \triangle ABE \equiv \triangle DAF$ (SAS 합동)
 따라서 $\angle ABE = \angle DAF$ 이므로
 $\angle BGF = \angle AGE$ (맞꼭지각)
 $= 180^\circ - (\angle DAF + \angle BEA)$
 $= 180^\circ - (\angle ABE + \angle BEA)$
 $= 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$

24 **Action** $\triangle OHB$ 와 $\triangle OIC$ 가 합동임을 이용한다.

$\triangle OHB$ 와 $\triangle OIC$ 에서
 $\overline{OB} = \overline{OC}$
 $\angle OBH = \angle OCI = 45^\circ$
 $\angle HOB = 90^\circ - \angle BOI = \angle IOC$
 $\therefore \triangle OHB \equiv \triangle OIC$ (ASA 합동)
 \therefore (겹쳐진 부분의 넓이) = $\triangle OHB + \triangle OBI$
 $= \triangle OIC + \triangle OBI$
 $= \triangle OBC$
 $= \frac{1}{4} \times$ (정사각형 ABCD의 넓이)
 $= \frac{1}{4} \times 8 \times 8 = 16$ (cm²)

최고 수준 완성하기

P 36 - P 38


- | | | | |
|----------|--------|---------|-----------------------|
| 01 ㉠, ㉡ | 02 8 | 03 ④ | 04 3개 |
| 05 7개 | 06 60° | 07 8 cm | 08 23 cm |
| 09 20 cm | 10 47° | 11 45° | 12 64 cm ² |

01 **Action** 길이가 같은 선분의 작도와 크기가 같은 각의 작도를 이용한다.


- ㉠ 선분의 길이를 옮길 때 컴퍼스를 사용한다.
 - ㉡ 주어진 선분의 길이의 3배가 되는 선분은 길이가 같은 선분을 3번 연달아 작도하면 작도할 수 있다.
- 따라서 옳은 것은 ㉠, ㉡이다.

02 **Action** 작도 과정을 생각하여 컴퍼스 사용 횟수를 구한다.

동위각을 이용하여 한 직선과 평행한 직선을 작도하면 오른쪽 그림과 같다. 이때 컴퍼스의 최소 사용 횟수는 4회이므로 $a=4$



한 둔각과 크기가 같은 각을 작도하면 오른쪽 그림과 같다. 이때 컴퍼스의 최소 사용 횟수는 4회이므로 $b=4$
 $\therefore a+b=4+4=8$



03 **Action** 직각의 삼등분선의 작도이므로 $\angle AOC = \angle COD = \angle DOB = 30^\circ$ 이다.

④ 작도 순서는 ㉡ \rightarrow ㉠ \rightarrow ㉠이다.

Lecture

직각의 삼등분선의 작도

직각인 $\angle XOY$ 의 삼등분선은 다음과 같이 작도할 수 있다.

- ① 점 O를 중심으로 하여 임의의 원을 그려 \overline{OX} , \overline{OY} 와 만나는 점을 각각 A, B라 한다.
- ② 두 점 A, B를 중심으로 하고, 반지름의 길이가 \overline{OA} 인 원을 각각 그려 ①에서 그린 원과의 교점을 각각 P, Q라 한다.
- ③ 점 O와 점 P, 점 O와 점 Q를 각각 연결하면 \overline{OP} , \overline{OQ} 가 직각의 삼등분선이다.

04 **Action** 삼각형의 가장 긴 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 작아야 함을 이용한다.

삼각형이 만들어지려면 가장 긴 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 작아야 한다.

따라서 삼각형을 만들 수 있는 변의 길이를 순서쌍으로 나타내면 (2 m, 3 m, 4 m), ((1+2) m, 3 m, 4 m), (2 m, (1+3) m, 4 m)의 3개이다.

05 **Action** 가장 긴 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 작으면서 이등변삼각형인 경우를 찾는다.


세 변의 길이를 각각 a, a, b 라 하면 $2a+b=27$
 이를 만족하는 순서쌍 (a, a, b)는 (13, 13, 1), (12, 12, 3), (11, 11, 5), (10, 10, 7), (9, 9, 9), (8, 8, 11), (7, 7, 13)의 7개이다.

06 **Action** $\triangle AEC$ 와 $\triangle CDB$ 가 합동임을 이용한다.

$\triangle AEC$ 와 $\triangle CDB$ 에서
 $\overline{AC} = \overline{CB}$
 $\overline{EC} = \overline{DB}$
 $\angle ACE = \angle CBD = 60^\circ$
 $\therefore \triangle AEC \cong \triangle CDB$ (SAS 합동) 40%
 따라서 $\angle BCD = \angle CAE = 28^\circ$ 이므로
 $\angle ACF = 60^\circ - 28^\circ = 32^\circ$ 20%
 $\triangle AFC$ 에서
 $\angle AFC = 180^\circ - (28^\circ + 32^\circ) = 120^\circ$ 20%
 $\therefore \angle x = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ 20%

07 **Action** 꼭짓점 B에서 대각선 AC에 내린 수선의 발을 F라 하고 합동인 두 삼각형을 찾는다.

오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 B에서 대각선 AC에 내린 수선의 발을 F라 하자.



$\triangle BOF$ 와 $\triangle DOE$ 에서
 $\overline{BO} = \overline{DO}$
 $\angle BOF = \angle DOE$ (맞꼭지각)
 $\angle FBO = 90^\circ - \angle BOF$
 $= 90^\circ - \angle DOE = \angle EDO$
 $\therefore \triangle BOF \cong \triangle DOE$ (ASA 합동)
 $\therefore \overline{BF} = \overline{DE}$
 따라서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ACD$ 는 밑변의 길이와 높이가 각각 같으므로 넓이가 같다.


즉 $\triangle ABC = \triangle ACD = \frac{1}{2} \times 160 = 80$ (cm²)이므로
 $\triangle ACD = \frac{1}{2} \times 20 \times \overline{DE} = 80$
 $10\overline{DE} = 80$
 $\therefore \overline{DE} = 8$ (cm)

08 **Action** $\triangle ABC$ 와 $\triangle DBE$ 와 $\triangle FEC$ 가 합동임을 이용한다.

$\triangle ABC$ 와 $\triangle DBE$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{DB}$
 $\overline{BC} = \overline{BE}$
 $\angle ABC = 60^\circ - \angle ABE = \angle DBE$
 $\therefore \triangle ABC \equiv \triangle DBE$ (SAS 합동) ㉠
 또 $\triangle ABC$ 와 $\triangle FEC$ 에서
 $\overline{AC} = \overline{FC}$
 $\overline{BC} = \overline{EC}$
 $\angle ACB = 60^\circ - \angle ACE = \angle FCE$
 $\therefore \triangle ABC \equiv \triangle FEC$ (SAS 합동) ㉡
 ㉠, ㉡에서
 $\triangle ABC \equiv \triangle DBE \equiv \triangle FEC$ (SAS 합동)
 \therefore (오각형 EDBCF의 둘레의 길이)
 $= \overline{ED} + \overline{DB} + \overline{BC} + \overline{CF} + \overline{FE}$
 $= \overline{CA} + \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} + \overline{AB}$
 $= 3 + 5 + 7 + 3 + 5 = 23$ (cm)

09 **Action** \overline{BG} 를 그려 $\triangle BCG$ 와 $\triangle DCE$ 가 합동임을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 \overline{BG} 를 그
 으면 $\triangle BCG$ 와 $\triangle DCE$ 에서
 $\overline{BC} = \overline{DC}$
 $\overline{CG} = \overline{CE}$
 $\angle BCG = 90^\circ - \angle GCD$
 $= \angle DCE$
 $\therefore \triangle BCG \equiv \triangle DCE$ (SAS 합동)
 따라서 $\triangle BCG$ 의 넓이는 $\triangle DCE$ 의 넓이와 같으므로
 $\overline{AB} = x$ cm라 하면
 $\frac{1}{2}x^2 = 200, x^2 = 400$
 $\therefore x = 20$ ($\because x > 0$)
 따라서 \overline{AB} 의 길이는 20 cm이다.



10 **Action** $\triangle GBC$ 와 $\triangle EDC$ 가 합동임을 이용한다.

$\triangle GBC$ 와 $\triangle EDC$ 에서
 $\overline{BC} = \overline{DC}$
 $\overline{GC} = \overline{EC}$
 $\angle BCG = 90^\circ - \angle GCD = \angle DCE$
 $\therefore \triangle GBC \equiv \triangle EDC$ (SAS 합동)
 $\angle EDC = \angle GBC = 90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$
 $\angle DHE = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$
 따라서 $\triangle DHE$ 에서
 $\angle DEH = 180^\circ - (18^\circ + 115^\circ)$
 $= 47^\circ$

11 **Action** $\overline{EF} = \overline{BE} + \overline{DF}$ 임을 이용하여 합동인 두 삼각형을 찾는다.

$\triangle CFE$ 의 둘레의 길이가 정사각형 ABCD의 둘레의 길이
 의 $\frac{1}{2}$ 이므로
 $\overline{EF} + \overline{CE} + \overline{CF} = \overline{BC} + \overline{CD}$
 $\therefore \overline{EF} = (\overline{BC} - \overline{CE}) + (\overline{CD} - \overline{CF})$
 $= \overline{BE} + \overline{DF}$
 $\triangle AEF$ 와 $\triangle AGF$ 에서
 \overline{AF} 는 공통
 $\overline{AE} = \overline{AG}$
 $\overline{EF} = \overline{BE} + \overline{DF} = \overline{DG} + \overline{DF} = \overline{GF}$
 $\therefore \triangle AEF \equiv \triangle AGF$ (SSS 합동)
 $\therefore \angle EAF = \angle GAF$
 이때
 $\angle EAG = \angle EAD + \angle DAG$
 $= \angle EAD + \angle BAE$
 $= \angle BAD$
 $= 90^\circ$
 $\therefore \angle EAF = \frac{1}{2} \angle EAG$
 $= \frac{1}{2} \times 90^\circ = 45^\circ$

12 **Action** $\triangle ABF$ 와 $\triangle CEF$ 가 합동임을 이용한다.

$\triangle ABF$ 와 $\triangle CEF$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{CE}$
 $\angle B = \angle E = 90^\circ$
 $\angle BAF = 90^\circ - \angle AFB$
 $= 90^\circ - \angle CFE = \angle ECF$
 $\therefore \triangle ABF \equiv \triangle CEF$ (ASA 합동)
 따라서 $\overline{AB} = \overline{CE} = 8$ cm이고
 $\overline{BC} = \overline{BF} + \overline{FC} = \overline{EF} + \overline{FC} = 6 + 10 = 16$ (cm)이므로
 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 16 \times 8 = 64$ (cm²)

최고
수준
뛰어넘기

P 39 - P 40

- 01 39°
- 02 7개
- 03 45°
- 04 108°
- 05 22°
- 06 65°

01 **Action** 주어진 그림은 각의 이등분선을 작도한 것이다.

주어진 그림은 $\angle ABC$ 의 이등분선인 \overline{BD} 와 $\angle ACE$ 의 이등분선인 \overline{CD} 를 작도한 것이다.

$\angle ABD = \angle DBC = \angle x$, $\angle ACD = \angle DCE = \angle y$ 라 하면

$$\angle ACB = 180^\circ - (2\angle x + 78^\circ) = 102^\circ - 2\angle x$$

$$\angle ACB + \angle ACE = 180^\circ \text{이므로}$$

$$(102^\circ - 2\angle x) + 2\angle y = 180^\circ$$

$$2(\angle y - \angle x) = 78^\circ$$

$$\therefore \angle y - \angle x = 39^\circ$$

$\triangle BCD$ 에서 $\angle x + (180^\circ - \angle y) + \angle BDC = 180^\circ$ 이므로

$$\angle BDC = \angle y - \angle x = 39^\circ$$

02 **Action** $a \leq b \leq c$, $c < a + b$ 이고 $a + b + c = 180$ 이 되는 자연수 a, b, c 의 쌍을 모두 찾는다.

$a \leq b \leq c$, $c < a + b$ 이고 $a + b + c = 180$ 이므로

$$2c < a + b + c \text{에서 } 2c < 180 \quad \therefore c < 9$$

이때 c 는 자연수이므로

$$c = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$$

또 $a \leq c$, $b \leq c$ 이므로 $a + b + c \leq c + c + c = 3c$

$$\text{즉 } 180 \leq 3c \text{이므로 } 6 \leq c$$

$$\therefore c = 6, 7, 8$$

(i) $c = 6$ 이면 $a + b = 12$ 에서

(a, b) 는 $(6, 6)$ 의 1개

(ii) $c = 7$ 이면 $a + b = 11$ 에서

(a, b) 는 $(4, 7), (5, 6)$ 의 2개

(iii) $c = 8$ 이면 $a + b = 10$ 에서

(a, b) 는 $(2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 5)$ 의 4개

(i)~(iii)에서 구하는 삼각형의 개수는

$$1 + 2 + 4 = 7(\text{개})$$

03 **Action** $\overline{AB} = 4k$ ($k > 0$)로 놓고 주어진 선분의 길이를 k 를 사용하여 나타내어 본다.

$$\overline{AB} = 4k \text{ ($k > 0$)라 하면 } \overline{BC} = 7k$$

$$\overline{BE} : \overline{EC} = 3 : 4 \text{이므로}$$

$$\overline{BE} = 3k, \overline{EC} = 4k$$

또 $\overline{CF} : \overline{FD} = 3 : 1$ 이므로

$$\overline{CF} = 3k, \overline{FD} = k$$

$\triangle ABE$ 와 $\triangle ECF$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{EC}$$

$$\overline{BE} = \overline{CF}$$

$$\angle B = \angle C = 90^\circ$$

$$\therefore \triangle ABE \equiv \triangle ECF \text{ (SAS 합동)}$$

따라서 $\overline{AE} = \overline{EF}$ 이고

$$\angle AEF = 180^\circ - (\angle AEB + \angle FEC)$$

$$= 180^\circ - (\angle EFC + \angle FEC)$$

$$= 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

이므로 $\triangle AEF$ 는 직각이등변삼각형이다.

$$\therefore \angle AFE = 45^\circ$$

04 **Action** $\triangle ABD$ 와 $\triangle EBC$ 가 합동임을 이용한다.

$\angle ABE = \angle EBC = \angle a$ 라 하면

$$\angle ACB = \angle ABC = 2\angle a$$

$\triangle BCD$ 에서 $\overline{BC} = \overline{BD}$ 이므로

$$\angle BDC = \angle BCD = 2\angle a$$

$$\angle a + 2\angle a + 2\angle a = 180^\circ \text{이므로}$$

$$5\angle a = 180^\circ \quad \therefore \angle a = 36^\circ$$

$\triangle ABC$ 에서

$$\angle BAC = 180^\circ - (2\angle a + 2\angle a)$$

$$= 180^\circ - 4\angle a$$

$$= 180^\circ - 4 \times 36^\circ = 36^\circ$$

$\triangle ABD$ 와 $\triangle EBC$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{EB}$$

$$\overline{BD} = \overline{BC}$$

$$\angle ABD = \angle EBC$$

$$\therefore \triangle ABD \equiv \triangle EBC \text{ (SAS 합동)}$$

$$\therefore \angle BEC = \angle BAD = 36^\circ$$

$\triangle ABE$ 에서 $\overline{BA} = \overline{BE}$ 이므로

$$\angle AEB = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 36^\circ) = 72^\circ$$

$$\therefore \angle AEC = \angle AEB + \angle BEC$$

$$= 72^\circ + 36^\circ = 108^\circ$$

05 **Action** \overline{AD} 의 연장선 위에 $\overline{AC} = \overline{DF}$ 인 점 F 를 잡고 합동인 두 삼각형을 찾는다.

오른쪽 그림과 같이 \overline{AD} 의 연장선 위에 $\overline{AC} = \overline{DF}$ 인 점 F 를 잡으면

$$\overline{AE} = \overline{AC} + \overline{CE}$$

$$= \overline{DF} + \overline{AD} = \overline{AF}$$

$$\overline{AE} = \overline{AF}$$

$$= \overline{DF} + \overline{AD} = \overline{AF}$$

$\triangle AFE$ 에서

$$\angle AFE = \angle AEF = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 60^\circ) = 60^\circ$$

즉 $\triangle AFE$ 는 정삼각형이므로 $\overline{AF} = \overline{FE} = \overline{AE}$


$\triangle ABE$ 와 $\triangle FDE$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{FD}$$

$$\overline{AE} = \overline{FE}$$

$$\angle EAB = \angle EFD = 60^\circ$$

$$\therefore \triangle ABE \equiv \triangle FDE \text{ (SAS 합동)}$$




$\therefore \angle ABE = \angle FDE = 180^\circ - 82^\circ = 98^\circ$

따라서 $\triangle ABE$ 에서

$\angle AEB = 180^\circ - (60^\circ + 98^\circ) = 22^\circ$

06 Action \overline{AD} 의 연장선과 \overline{FE} 의 연장선의 교점을 G로 놓고 합동인 두 삼각형을 찾는다.



위 그림과 같이 \overline{AD} 의 연장선과 \overline{FE} 의 연장선의 교점을 G라 하자.

$\triangle GDE$ 와 $\triangle BCE$ 에서

$\overline{DE} = \overline{CE}$

$\angle GDE = \angle BCE = 90^\circ$

$\angle DEG = \angle CEB$ (맞꼭지각)

$\therefore \triangle GDE \cong \triangle BCE$ (ASA 합동)

$\therefore \overline{DG} = \overline{CB}$

즉 $\triangle DFG$ 는 $\overline{DF} = \overline{DG}$ 인 이등변삼각형이므로

$\angle DGE = \angle DFE = 25^\circ$

$\triangle DFG$ 에서

$\angle FDG = 180^\circ - (25^\circ + 25^\circ) = 130^\circ$

$\therefore \angle ADF = 180^\circ - \angle FDG = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$

이때 $\triangle DAF$ 는 $\overline{DA} = \overline{DF}$ 인 이등변삼각형이므로

$\angle DAF = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 50^\circ) = 65^\circ$

교과서 속 창의 사고력

P 41 - P 42

01 280°

02 $a \parallel r, c \parallel q$

03 104°

04 90 cm^2

01 Action $\angle x : \angle y : \angle z = 2 : 2 : 3$ 이므로

$\angle x = 2m, \angle y = 2m, \angle z = 3m (m > 0)$ 으로 놓는다.

$\angle x : \angle y : \angle z = 2 : 2 : 3$ 이므로

$\angle x = 2m, \angle y = 2m, \angle z = 3m (m > 0)$ 이라 하면

$\angle x + 2\angle y + \angle z = 360^\circ$ 에서

$2m + 4m + 3m = 360^\circ, 9m = 360^\circ$


$\therefore m = 40^\circ$

따라서 $\angle x = 80^\circ, \angle y = 80^\circ, \angle z = 120^\circ$ 이므로

$\angle x + \angle y + \angle z = 80^\circ + 80^\circ + 120^\circ = 280^\circ$

02 Action 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때 생기는 엇각의 크기가 같으면 두 직선은 서로 평행함을 이용한다.

서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때 생기는 엇각의 크기가 같으면 두 직선은 서로 평행하므로 오른쪽 그림에서 $a \parallel r, c \parallel q$ 이다.



03 Action 입사각과 반사각의 크기는 서로 같음을 이용한다.

오른쪽 그림에서 두 평면거울이 서로 평행하므로


$\angle a = 38^\circ$ (엇각)

이때 입사각과 반사각의 크기는 서로 같으므로

$\angle b = \angle a = 38^\circ$

따라서 $\angle a + \angle x + \angle b = 180^\circ$ 이므로

$38^\circ + \angle x + 38^\circ = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 104^\circ$



04 Action 두 점 D, E에서 $\overline{AI}, \overline{BF}$ 의 연장선에 각각 수선의 발을 내린 후 합동인 삼각형을 찾는다.

오른쪽 그림과 같이 점 D에서 \overline{AI} 의 연장선에 내린 수선의 발을 J라 하고, 점 E에서 \overline{BF} 의 연장선에 내린 수선의 발을 K라 하면

$\triangle ADJ$ 와 $\triangle ABC$ 에서

$\overline{AD} = \overline{AB}$

$\angle DAJ = 90^\circ - \angle JAB = \angle BAC$

$\angle ADJ = 90^\circ - \angle DAJ = 90^\circ - \angle BAC = \angle ABC$

$\therefore \triangle ADJ \cong \triangle ABC$ (ASA 합동)

따라서 $\overline{DJ} = \overline{BC} = 12 \text{ cm}$ 이므로

$\triangle AID = \frac{1}{2} \times \overline{AI} \times \overline{DJ} = \frac{1}{2} \times 5 \times 12 = 30 \text{ (cm}^2\text{)}$

같은 방법으로


$\triangle EBK \cong \triangle ABC$ (ASA 합동)

$\therefore \overline{EK} = \overline{AC} = 5 \text{ cm}$

$\triangle BEF = \frac{1}{2} \times \overline{BF} \times \overline{EK} = \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30 \text{ (cm}^2\text{)}$

$\triangle CGH = \frac{1}{2} \times \overline{CG} \times \overline{HC} = \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30 \text{ (cm}^2\text{)}$

\therefore (색칠한 부분의 넓이) = $\triangle AID + \triangle BEF + \triangle CGH$
 $= 30 + 30 + 30$
 $= 90 \text{ (cm}^2\text{)}$



II. 평면도형

1. 다각형

최고 수준

입문하기

P 45 - P 49

01 62°	02 ①, ⑤	03 41°	04 36°
05 120°	06 125°	07 163°	08 95°
09 12°	10 25°	11 27°	12 71°
13 11	14 ④	15 9개	16 90개
17 정삼각형	18 ⑤	19 12	20 25°
21 54개	22 ②	23 60°	24 ②
25 310°	26 144°	27 45°	28 ④
29 150°	30 (1) 72° (2) 30°	31 14°	
32 96°			

01 **Action** 다각형의 한 꼭짓점에서의 내각과 외각의 크기의 합은 180°이다.

$$\angle x = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$$

$$\angle y = 180^\circ - 114^\circ = 66^\circ$$

$$\therefore \angle x - \angle y = 128^\circ - 66^\circ = 62^\circ$$

02 **Action** 다각형과 정다각형에 대하여 생각해 본다.

- ② 변의 길이가 모두 같고, 내각의 크기가 모두 같은 다각형이 정다각형이다.
- ③ 다각형의 한 꼭짓점에 대하여 외각은 2개가 있다.
- ④ 정삼각형의 한 내각의 크기는 60°, 한 외각의 크기는 120°이므로 한 내각의 크기와 한 외각의 크기는 같지 않다.

03 **Action** 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180°임을 이용한다.

△ABC에서

$$\angle ACB = 180^\circ - (50^\circ + 46^\circ) = 84^\circ$$

∠DCE = ∠ACB = 84° (맞꼭지각)이므로

△DCE에서

$$\angle x = 180^\circ - (55^\circ + 84^\circ) = 41^\circ$$


Lecture

삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180°이므로

$$\angle a + \angle b = 180^\circ - \angle x$$

$$\angle c + \angle d = 180^\circ - \angle x$$

$$\therefore \angle a + \angle b = \angle c + \angle d$$



04 **Action** 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180°임을 이용한다.

삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180°이므로 가장 작은 각의 크기는

$$180^\circ \times \frac{2}{2+3+5} = 180^\circ \times \frac{1}{5} = 36^\circ$$

Lecture

삼각형 ABC에서 ∠A : ∠B : ∠C = x : y : z일 때,

$$\angle A = 180^\circ \times \frac{x}{x+y+z}$$

$$\angle B = 180^\circ \times \frac{y}{x+y+z}$$

$$\angle C = 180^\circ \times \frac{z}{x+y+z}$$

05 **Action** BD를 긋고 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180°임을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 BD를 그으면

△ABD에서

$$\angle CBD + \angle CDB$$

$$= 180^\circ - (60^\circ + 25^\circ + 35^\circ)$$


$$= 60^\circ$$

따라서 △CBD에서

$$\angle x = 180^\circ - (\angle CBD + \angle CDB)$$

$$= 180^\circ - 60^\circ$$

$$= 120^\circ$$



다른 풀이

오른쪽 그림과 같이 직선 AC를 그으면


△ABC와 △ACD에서

$$\angle x = (\angle a + 25^\circ) + (\angle b + 35^\circ)$$

$$= \angle a + \angle b + 60^\circ$$

$$= 60^\circ + 60^\circ$$

$$= 120^\circ$$



06 **Action** ∠IBC + ∠ICB = 1/2 × (∠ABC + ∠ACB)임을 이용한다.

△ABC에서

$$\angle ABC + \angle ACB = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ \quad \dots\dots 30\%$$

$$\therefore \angle IBC + \angle ICB = \frac{1}{2} \times (\angle ABC + \angle ACB)$$

$$= \frac{1}{2} \times 110^\circ = 55^\circ \quad \dots\dots 40\%$$

따라서 △IBC에서

$$\angle x = 180^\circ - (\angle IBC + \angle ICB)$$

$$= 180^\circ - 55^\circ$$

$$= 125^\circ \quad \dots\dots 30\%$$

07 **Action** 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않은 두 내각의 크기의 합과 같음을 이용한다.

$$\begin{aligned} \triangle ABD \text{에서} \\ \angle x &= 85^\circ - 40^\circ = 45^\circ \\ \triangle ADC \text{에서} \\ \angle y &= 33^\circ + 85^\circ = 118^\circ \\ \therefore \angle x + \angle y &= 45^\circ + 118^\circ = 163^\circ \end{aligned}$$

08 **Action** 먼저 $\angle ACB$ 의 크기를 구한다.

$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{에서} \\ 75^\circ + 65^\circ + \angle ACB &= 180^\circ \\ \therefore \angle ACB &= 40^\circ && \dots\dots 40\% \\ \angle ACD &= \frac{1}{2} \angle ACB = \frac{1}{2} \times 40^\circ = 20^\circ && \dots\dots 20\% \\ \text{따라서 } \triangle ADC \text{에서} \\ \angle x &= 75^\circ + 20^\circ = 95^\circ && \dots\dots 40\% \end{aligned}$$

09 **Action** $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로 $\angle B = \angle ACB$ 이다.

$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{는 } \overline{AB} = \overline{AC} \text{인 이등변삼각형이므로} \\ \angle B &= \frac{1}{2} \times (180^\circ - 52^\circ) = 64^\circ \\ \triangle DBC \text{는 } \overline{CB} = \overline{CD} \text{인 이등변삼각형이므로} \\ \angle BDC &= \angle B = 64^\circ \\ \text{따라서 } \triangle ADC \text{에서} \\ \angle x &= 64^\circ - 52^\circ = 12^\circ \end{aligned}$$

다른 풀이

$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{는 } \overline{AB} = \overline{AC} \text{인 이등변삼각형이므로} \\ \angle B &= \angle ACB \\ &= \frac{1}{2} \times (180^\circ - 52^\circ) = 64^\circ \\ \triangle DBC \text{는 } \overline{CB} = \overline{CD} \text{인 이등변삼각형이므로} \\ \angle BDC &= \angle B = 64^\circ \\ \therefore \angle DCB &= 180^\circ - (64^\circ + 64^\circ) = 52^\circ \\ \therefore \angle x &= \angle ACB - \angle DCB \\ &= 64^\circ - 52^\circ = 12^\circ \end{aligned}$$

10 **Action** 이등변삼각형의 두 내각의 크기는 서로 같음을 이용한다.

$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{에서 } \angle ACB &= \angle ABC = \angle x \\ \therefore \angle CAD &= \angle x + \angle x = 2\angle x \\ \triangle ACD \text{에서 } \angle CDA &= \angle CAD = 2\angle x \\ \triangle DBC \text{에서 } \angle DCE &= \angle x + 2\angle x = 3\angle x \\ \triangle DCE \text{에서 } \angle DEC &= \angle DCE = 3\angle x \\ \triangle DBE \text{에서 } \angle EDF &= \angle x + 3\angle x = 4\angle x \\ \text{즉 } 4\angle x &= 100^\circ \text{이므로 } \angle x = 25^\circ \end{aligned}$$

11 **Action** 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않은 두 내각의 크기의 합과 같음을 이용한다.

$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{에서 } \angle ACE &= 54^\circ + \angle ABC \\ \therefore \angle DCE &= \frac{1}{2} \angle ACE = \frac{1}{2} \times (54^\circ + \angle ABC) \\ &= 27^\circ + \frac{1}{2} \angle ABC && \dots\dots \textcircled{A} \end{aligned}$$


$$\triangle DBC \text{에서 } \angle DCE = \angle x + \frac{1}{2} \angle ABC \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

이때 \textcircled{A} , \textcircled{B} 에서

$$\begin{aligned} 27^\circ + \frac{1}{2} \angle ABC &= \angle x + \frac{1}{2} \angle ABC \\ \therefore \angle x &= 27^\circ \end{aligned}$$

12 **Action** 크기가 주어진 각을 내각으로 갖는 삼각형을 찾는다.

$$\begin{aligned} \text{오른쪽 그림에서} \\ (\angle x + \angle y) + 45^\circ + 64^\circ &= 180^\circ \\ (\angle x + \angle y) + 109^\circ &= 180^\circ \\ \therefore \angle x + \angle y &= 180^\circ - 109^\circ \\ &= 71^\circ \end{aligned}$$



13 **Action** n 각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $(n-3)$ 개이다.

$$\begin{aligned} \text{팔각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는} \\ 8 - 3 &= 5(\text{개}) \\ \therefore a &= 5 \\ \text{이때 생기는 삼각형의 개수는} \\ 8 - 2 &= 6(\text{개}) \\ \therefore b &= 6 \\ \therefore a + b &= 5 + 6 = 11 \end{aligned}$$

14 **Action** 주어진 다각형이 어떤 다각형인지 구한다.

$$\begin{aligned} \text{주어진 다각형을 } n \text{각형이라 하면} \\ n - 3 &= 8 \quad \therefore n = 11 \\ \text{따라서 십일각형의 대각선의 개수는} \\ \frac{11 \times (11 - 3)}{2} &= 44(\text{개}) \end{aligned}$$

15 **Action** n 각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$ 개임을 이용하여 주어진 다각형이 어떤 다각형인지 구한다.

$$\begin{aligned} \text{주어진 다각형을 } n \text{각형이라 하면} \\ \frac{n(n-3)}{2} &= 27 \\ n(n-3) &= 54 = 9 \times 6 \quad \therefore n = 9 \\ \text{따라서 구각형의 꼭짓점의 개수는 } 9 \text{개이다.} \end{aligned}$$

16 **Action** n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수는 $(n-2)$ 개이다.
 주어진 다각형을 n 각형이라 하면
 $n-2=13 \quad \therefore n=15$
 따라서 십오각형의 대각선의 개수는
 $\frac{15 \times (15-3)}{2} = 90(\text{개})$

17 **Action** 변의 길이가 모두 같고, 내각의 크기가 모두 같은 다각형은 정다각형이다.
 (가)에서 구하는 다각형은 정다각형이다. 30%
 구하는 다각형을 정 n 각형이라 하면 (나)에서
 $\frac{n(n-3)}{2} = 35$ 20%
 $n(n-3)=70=10 \times 7 \quad \therefore n=10$ 30%
 따라서 구하는 다각형은 정십각형이다. 20%

18 **Action** n 각형의 내부의 한 점에서 각 꼭짓점에 선분을 그으면 n 개의 삼각형이 생긴다.
 주어진 다각형을 n 각형이라 하면 n 각형의 내부의 한 점에서 각 꼭짓점에 선분을 그었을 때 생기는 삼각형의 개수는 n 개
 이므로 $n=13$
 따라서 십삼각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $13-3=10(\text{개})$

19 **Action** 버스 노선의 개수는 팔각형의 변의 개수와 같고, 철도 노선의 개수는 팔각형의 대각선의 개수와 같다.
 버스 노선의 개수는 팔각형의 변의 개수와 같으므로 $a=8$
 철도 노선의 개수는 팔각형의 대각선의 개수와 같으므로
 $b = \frac{8 \times (8-3)}{2} = 20$
 $\therefore b-a=20-8=12$


Lecture
 원 위의 n 개의 점에서
 (1) 이웃하는 점을 연결하면 $\rightarrow n$ 각형의 변의 개수
 (2) 이웃하지 않은 점을 연결하면 $\rightarrow n$ 각형의 대각선의 개수

20 **Action** n 각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (n-2)$ 임을 이용한다.
 오각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$ 이므로
 $(3\angle x - 10^\circ) + 130^\circ + 110^\circ + (5\angle x + 5^\circ) + 105^\circ = 540^\circ$
 $8\angle x + 340^\circ = 540^\circ, 8\angle x = 200^\circ$
 $\therefore \angle x = 25^\circ$


21 **Action** 주어진 다각형이 어떤 다각형인지 구한다.
 주어진 다각형을 n 각형이라 하면
 $180^\circ \times (n-2) = 1800^\circ$
 $n-2=10 \quad \therefore n=12$
 따라서 십이각형의 대각선의 개수는
 $\frac{12 \times (12-3)}{2} = 54(\text{개})$

22 **Action** 다각형의 외각의 크기의 합은 360° 임을 이용한다.
 다각형의 외각의 크기의 합은 360° 이므로
 $\angle x + (180^\circ - 115^\circ) + \angle y + (180^\circ - 120^\circ) + (180^\circ - 78^\circ) = 360^\circ$
 $\angle x + \angle y + 227^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x + \angle y = 133^\circ$


23 **Action** 보조선을 그어 내각의 크기의 합을 구할 수 있는 다각형이 이용한다.
 오른쪽 그림에서
 $\angle a + \angle b = 60^\circ + 40^\circ = 100^\circ$ 40%
 사각형의 내각의 크기의 합은 360° 이므로
 $(\angle a + \angle x) + 105^\circ + 95^\circ + (\angle b + \angle y) = 360^\circ$ 40%
 $\angle x + \angle y + 300^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x + \angle y = 60^\circ$ 20%



24 **Action** 보조선을 그어 내각의 크기의 합을 구할 수 있는 다각형이 이용한다.
 오른쪽 그림에서
 $\angle a + \angle b = \angle x + \angle y$
 육각형의 내각의 크기의 합은
 $180^\circ \times (6-2) = 720^\circ$ 이므로
 $(\angle a + 85^\circ) + 115^\circ + 123^\circ + 100^\circ + 140^\circ + (\angle b + 75^\circ) = 720^\circ$
 $\angle a + \angle b + 638^\circ = 720^\circ \quad \therefore \angle a + \angle b = 82^\circ$
 $\therefore \angle x + \angle y = \angle a + \angle b = 82^\circ$



25 **Action** 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않은 두 내각의 크기의 합과 같음을 이용하여 크기가 같은 각을 찾는다.
 오른쪽 그림에서 다각형의 외각의 크기의 합은 360° 이므로
 $(\angle a + 50^\circ) + (\angle b + \angle c) + (\angle d + \angle e) + (\angle f + \angle g) = 360^\circ$
 $\therefore \angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e + \angle f + \angle g = 310^\circ$



26 **Action** 정n각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$ 임을 이용한다.

주어진 정다각형을 정n각형이라 하면

$$n-3=7 \quad \therefore n=10$$

따라서 정십각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (10-2)}{10} = 144^\circ$$

27 **Action** 정n각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{n}$ 임을 이용한다.

주어진 정다각형을 정n각형이라 하면

$$180^\circ \times (n-2) = 1080^\circ$$

$$n-2=6 \quad \therefore n=8$$

따라서 정팔각형의 한 외각의 크기는

$$\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$$

28 **Action** 주어진 정다각형이 어떤 정다각형인지 구한다.

한 내각과 그와 이웃하는 외각의 크기의 합은 180° 이므로

$$(\text{한 외각의 크기}) = 180^\circ \times \frac{2}{7+2} = 40^\circ \quad (3)$$

구하는 정다각형을 정n각형이라고 하면 다각형의 외각의 크기의 합은 항상 360° 이므로

$$\frac{360^\circ}{n} = 40^\circ \quad \therefore n=9$$

따라서 구하는 정다각형은 정구각형이다. (1)

② 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (9-2) = 1260^\circ$

④ 대각선의 개수는 $\frac{9 \times (9-3)}{2} = 27$ (개)

⑤ 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $9-3=6$ (개)

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

Lecture

정n각형에서

$$(\text{한 내각의 크기}) : (\text{한 외각의 크기}) = \frac{180^\circ \times (n-2)}{n} : \frac{360^\circ}{n}$$

$$\text{이므로 } (\text{한 내각의 크기}) : (\text{한 외각의 크기}) = (n-2) : 2$$

한편 문제에서 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 7 : 2, 즉 $(9-2) : 2$ 이므로 구하는 정다각형은 정구각형이다.

29 **Action** $\triangle ABP$, $\triangle PCD$ 는 각각 이등변삼각형임을 이용하여

$\angle BPA$, $\angle CPD$ 의 크기를 각각 구한다.

$\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{BP}$ 이므로 $\triangle ABP$ 는 이등변삼각형이다.

..... 20%

이때 $\angle ABP = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ 이므로

$$\angle BPA = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 30^\circ) = 75^\circ \quad \text{..... 30\%}$$

같은 방법으로

$$\angle CPD = 75^\circ \quad \text{..... 20\%}$$

$$\therefore \angle x = 360^\circ - (75^\circ + 60^\circ + 75^\circ) = 150^\circ \quad \text{..... 30\%}$$

30 **Action** 정오각형과 정육각형의 한 내각의 크기를 각각 구한다.

(1) 정오각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$$

$$\angle BAC = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 108^\circ) = 36^\circ$$

$$\angle ABE = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 108^\circ) = 36^\circ$$

따라서 $\triangle ABF$ 에서

$$\angle x = 36^\circ + 36^\circ = 72^\circ$$

(2) 정육각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (6-2)}{6} = 120^\circ$$

$$\angle AFC = \frac{1}{2} \angle AFE = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ$$

$\triangle ABF$ 에서

$$\angle AFB = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 120^\circ) = 30^\circ$$

$$\therefore \angle x = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

31 **Action** 정오각형의 한 내각의 크기를 구한 후 평행선의 성질을 이용한다.

정오각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$$

오른쪽 그림과 같이 점 B를 지나

고 두 직선 l, m 에 평행한 직선을


그으면

$$\angle ABH = \angle FAB = 50^\circ \quad (\text{엇각})$$

$$\therefore \angle HBC = 108^\circ - 50^\circ = 58^\circ$$

따라서 $\angle BCI = \angle HBC = 58^\circ$ (엇각)이므로

$$\angle x = 180^\circ - (58^\circ + 108^\circ) = 14^\circ$$



32 **Action** 정육각형과 정오각형의 한 외각의 크기를 각각 구한다.

$$\text{정육각형의 한 외각의 크기는 } \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

$$\text{정오각형의 한 외각의 크기는 } \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$$


$$\therefore \angle x = 360^\circ - \{60^\circ + (60^\circ + 72^\circ) + 72^\circ\} = 96^\circ$$

최고 수준 완성하기

P 50 - P 53

- | | | | |
|---------|----------|---------|---------|
| 01 30개 | 02 20° | 03 61° | 04 40° |
| 05 125° | 06 210° | 07 19° | 08 540° |
| 09 13개 | 10 104개 | 11 325° | 12 540° |
| 13 140° | 14 정십이각형 | 15 8장 | 16 96° |


01 **Action** 점들을 연결하여 만들 수 있는 정사각형을 크기가 작은 것부터 빠짐없이 세어 본다.



따라서 구하는 정사각형의 개수는
 $12 + 6 + 2 + 6 + 4 = 30$ (개)

02 **Action** \overline{BC} 를 긋고 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 임을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 \overline{BC} 를 그으면 $\triangle FED$ 와 $\triangle FBC$ 에서
 $\angle FBC + \angle FCB$
 $= 20^\circ + 10^\circ$
 $= 30^\circ$
 $\triangle ABC$ 에서
 $75^\circ + (55^\circ + \angle FBC) + (\angle FCB + \angle x) = 180^\circ$
 $75^\circ + 55^\circ + 30^\circ + \angle x = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 20^\circ$



03 **Action** $\angle BED = \angle a$, $\angle CEF = \angle b$ 로 놓고 $\angle a + \angle b$ 의 크기를 구한다.

$\angle BED = \angle a$, $\angle CEF = \angle b$ 라 하면
 $\triangle BED$ 에서 $\overline{BD} = \overline{BE}$ 이므로
 $\angle BDE = \angle BED = \angle a$
 $\therefore \angle DBE = 180^\circ - 2\angle a$ 20%
 $\triangle CFE$ 에서 $\overline{CE} = \overline{CF}$ 이므로
 $\angle CFE = \angle CEF = \angle b$
 $\therefore \angle FCE = 180^\circ - 2\angle b$ 20%

따라서 $\triangle ABC$ 에서
 $58^\circ + (180^\circ - 2\angle a) + (180^\circ - 2\angle b) = 180^\circ$
 $2(\angle a + \angle b) = 238^\circ$
 $\therefore \angle a + \angle b = 119^\circ$ 40%
 $\therefore \angle x = 180^\circ - (\angle a + \angle b)$
 $= 180^\circ - 119^\circ = 61^\circ$ 20%

04 **Action** $\angle BAC + \angle BCA$ 의 크기를 구한다.

$\triangle ACD$ 에서
 $\angle DAC + \angle DCA = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ 이므로
 $\angle EAC + \angle ACF = 2(\angle DAC + \angle DCA)$
 $= 2 \times 110^\circ = 220^\circ$
 $\therefore \angle BAC + \angle BCA$
 $= (180^\circ - \angle EAC) + (180^\circ - \angle ACF)$
 $= 360^\circ - 220^\circ = 140^\circ$
 따라서 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle B = 180^\circ - (\angle BAC + \angle BCA)$
 $= 180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$

05 **Action** 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않은 두 내각의 크기의 합과 같음을 이용한다.

$\angle a = 180^\circ - (90^\circ + 20^\circ + 10^\circ + 35^\circ)$
 $= 25^\circ$ 30%
 $\angle b = \angle a + 20^\circ$
 $= 25^\circ + 20^\circ = 45^\circ$ 30%
 $\angle c = 180^\circ - (90^\circ + 35^\circ) = 55^\circ$ 30%
 $\therefore \angle a + \angle b + \angle c = 25^\circ + 45^\circ + 55^\circ$
 $= 125^\circ$ 10%

06 **Action** $\angle BAD = \angle DAC = \angle a$, $\angle ABE = \angle EBC = \angle b$ 로 놓고 $\angle a + \angle b$ 의 크기를 구한다.


$\angle BAD = \angle DAC = \angle a$, $\angle ABE = \angle EBC = \angle b$ 라 하면
 $\triangle ABC$ 에서
 $2\angle a + 2\angle b + 40^\circ = 180^\circ$
 $2(\angle a + \angle b) = 140^\circ$
 $\therefore \angle a + \angle b = 70^\circ$
 $\triangle ABD$ 에서 $\angle x = \angle a + 2\angle b$
 $\triangle ABE$ 에서 $\angle y = 2\angle a + \angle b$
 $\therefore \angle x + \angle y = (\angle a + 2\angle b) + (2\angle a + \angle b)$
 $= 3\angle a + 3\angle b$
 $= 3(\angle a + \angle b)$
 $= 3 \times 70^\circ = 210^\circ$

07 **Action** 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않은 두 내각의 크기의 합과 같음을 이용한다.

$$\begin{aligned} \angle ABD = \angle DBE = \angle EBC = \angle a, \\ \angle ACD = \angle DCE = \angle ECF = \angle b \text{라 하면} \\ \triangle ABC \text{에서} \\ 57^\circ + 3\angle a = 3\angle b \\ 3\angle b - 3\angle a = 57^\circ \quad \therefore \angle b - \angle a = 19^\circ \\ \triangle DBC \text{에서} \\ \angle x + 2\angle a = 2\angle b \\ \therefore \angle x = 2\angle b - 2\angle a \\ = 2(\angle b - \angle a) \\ = 2 \times 19^\circ = 38^\circ \\ \triangle EBC \text{에서 } \angle y + \angle a = \angle b \\ \therefore \angle y = \angle b - \angle a = 19^\circ \\ \therefore \angle x - \angle y = 38^\circ - 19^\circ = 19^\circ \end{aligned}$$

08 **Action** 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않은 두 내각의 크기의 합과 같음을 이용한다.

오른쪽 그림의 $\triangle ACJ$ 에서
 $\angle a + \angle c + \angle e + \angle f = 180^\circ$
 $\triangle BHG$ 에서
 $\angle b + \angle h + \angle g = 180^\circ$
 $\triangle IDJ$ 에서
 $\angle i + \angle d + \angle j = 180^\circ$
 $\therefore \angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e + \angle f + \angle g + \angle h + \angle i + \angle j = 180^\circ \times 3 = 540^\circ$



09 **Action** 사각형, 오각형은 한 꼭짓점에서 그 대각선에 의하여 각각 2개, 3개의 삼각형으로 나누어짐을 이용한다.


은수에게 주어진 다각형을 m 각형이라 하면
 $m - 2 = 3$ 에서 $m = 5$
 즉 은수에게 주어진 다각형은 오각형이므로 변의 개수는 5개이다.
 영민이에게 주어진 다각형을 n 각형이라 하면
 사각형, 오각형은 한 꼭짓점에서 그 대각선에 의하여 각각 2개, 3개의 삼각형으로 나누어지므로 n 각형은 $1 + 2 + 3 = 6$ (개)의 삼각형으로 나누어진다.
 $n - 2 = 6$ 에서 $n = 8$
 즉 영민이에게 주어진 다각형은 팔각형이므로 변의 개수는 8개이다.
 따라서 구하는 다각형의 변의 개수의 합은 $5 + 8 = 13$ (개)

10 **Action** 주어진 다각형이 어떤 다각형인지 구한다.

구하는 다각형을 n 각형이라 하면
 $a = n - 3, b = n - 2 \quad \dots\dots 40\%$
 $a + b = 27$ 이므로
 $(n - 3) + (n - 2) = 27$
 $2n = 32 \quad \therefore n = 16 \quad \dots\dots 30\%$
 따라서 십육각형의 대각선의 개수는
 $\frac{16 \times (16 - 3)}{2} = 104$ (개) $\dots\dots 30\%$

11 **Action** $\angle BGD = \angle a + \angle GHA = \angle a + \angle e + 35^\circ$ 임을 이용한다.


오른쪽 그림의 $\triangle EFH$ 에서
 $\angle EHA = \angle e + 35^\circ$
 $\triangle AGH$ 에서
 $\angle BGD = \angle a + \angle GHA = \angle a + \angle e + 35^\circ$
 이므로



$$\begin{aligned} \angle a + \angle e = \angle BGD - 35^\circ \\ \therefore \angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e = \angle BGD - 35^\circ + \angle b + \angle c + \angle d \\ = (\text{사각형 BCDG의 내각의 크기의 합}) - 35^\circ \\ = 360^\circ - 35^\circ \\ = 325^\circ \end{aligned}$$

12 **Action** 보조선을 긋고 삼각형 또는 사각형의 내각의 크기의 합을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 \overline{BC} 와 \overline{AD} 를 그으면
 $\angle CAD + \angle BDA = \angle ACB + \angle DBC$
 $\therefore \angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e + \angle f + \angle g$



$$\begin{aligned} &+ \angle f + \angle g \\ &= (\text{사각형 BCFG의 내각의 크기의 합}) \\ &\quad + (\text{삼각형 ADF의 내각의 크기의 합}) \\ &= 360^\circ + 180^\circ = 540^\circ \end{aligned}$$

다른 풀이

주어진 그림을 가운데의 칠각형과 7개의 삼각형으로 나누어 생각하면
 $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e + \angle f + \angle g = 180^\circ \times 7 - (\text{칠각형의 외각의 크기의 합}) \times 2 = 180^\circ \times 7 - 360^\circ \times 2 = 540^\circ$

13 **Action** n 각형의 모든 내각과 외각의 크기의 합은 $180^\circ \times n$ 임을 이용한다.

주어진 정다각형을 정 n 각형이라 하면
 모든 내각과 외각의 크기의 합은 $180^\circ \times n$ 이므로
 $180^\circ \times n = 1620^\circ$
 $\therefore n = 9$
 따라서 정구각형의 한 내각의 크기는
 $\frac{180^\circ \times (9-2)}{9} = 140^\circ$

Lecture
 n 각형의 내각과 외각의 크기의 합
 (n 각형의 내각의 크기의 합) + (n 각형의 외각의 크기의 합)
 $= 180^\circ \times (n-2) + 360^\circ$
 $= 180^\circ \times n - 360^\circ + 360^\circ$
 $= 180^\circ \times n$

14 **Action** 만들어지는 다각형은 한 외각의 크기가 30° 인 정다각형이다.

만들어지는 다각형은 모든 변의 길이가 같고, 모든 외각의 크기가 30° 로 같으므로 정다각형이다.
 만들어지는 정다각형을 정 n 각형이라 하면
 $\frac{360^\circ}{n} = 30^\circ \quad \therefore n = 12$
 따라서 만들어지는 다각형은 정십이각형이다.

15 **Action** 원의 내부에 생기는 정다각형의 한 내각의 크기를 구해 본다.

정오각형의 한 내각의 크기는
 $\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$
 즉 원의 내부에 생기는 정 n 각형의 한 내각의 크기는
 $360^\circ - 2 \times 108^\circ = 144^\circ$
 이때 $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n} = 144^\circ$ 에서
 $180^\circ \times n - 360^\circ = 144^\circ \times n$
 $36^\circ \times n = 360^\circ$
 $\therefore n = 10$
 따라서 원주를 빈틈없이 채우려면 정오각형 모양의 색종이가 8장 더 필요하다.

16 **Action** 정삼각형, 정사각형, 정오각형의 한 내각의 크기를 각각 구한다.

정삼각형, 정사각형, 정오각형의 한 내각의 크기는 각각 60° , 90° , $\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$ 이다.

오른쪽 그림의 $\triangle ICD$ 에서

$\angle CID = 60^\circ$

사각형 AFGE에서

$\angle FGE = 90^\circ$

$\triangle HDE$ 에서

$\angle HED = 108^\circ - 90^\circ = 18^\circ$,

$\angle HDE = 108^\circ - 60^\circ = 48^\circ$ 이므로

$\angle EHD = 180^\circ - (18^\circ + 48^\circ) = 114^\circ$


$\therefore \angle IHG = \angle EHD = 114^\circ$ (맞꼭지각)

따라서 사각형 IJGH의 내각의 크기의 합은 360° 이므로

$60^\circ + \angle x + 90^\circ + 114^\circ = 360^\circ$

$\angle x + 264^\circ = 360^\circ$

$\therefore \angle x = 96^\circ$



최고 수준 뛰어넘기

P 54 - P 55

- 01 80°
- 02 49
- 03 360°
- 04 5
- 05 20
- 06 22종류

01 **Action** \overline{BD} 를 긋고 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 임을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 \overline{BD} 를 긋고

$\angle ABE = \angle EBC = \angle a$,

$\angle ADE = \angle EDC = \angle b$ 라 하면

$\triangle CBD$ 에서

$\angle CBD + \angle CDB = 180^\circ - 160^\circ = 20^\circ$

$\triangle EBD$ 에서

$\angle EBD + \angle EDB = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$

이때 $\angle EBD = \angle a + \angle CBD$, $\angle EDB = \angle b + \angle CDB$ 이므로

$(\angle a + \angle CBD) + (\angle b + \angle CDB) = 60^\circ$

$\angle a + \angle b + 20^\circ = 60^\circ$

$\therefore \angle a + \angle b = 40^\circ$

따라서 $\triangle ABD$ 에서


$\angle A = 180^\circ - (\angle B + \angle D)$

$= 180^\circ - \{(2\angle a + \angle CBD) + (2\angle b + \angle CDB)\}$

$= 180^\circ - \{2(\angle a + \angle b) + (\angle CBD + \angle CDB)\}$

$= 180^\circ - (80^\circ + 20^\circ)$

$= 80^\circ$



02 **Action** 정 \$n\$각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$ 개이다.


정십이각형의 대각선의 개수는 $\frac{12 \times (12-3)}{2} = 54$ (개)이

므로 $a=54$

또, 길이가 서로 다른 대각선의 개수는

오른쪽 그림과 같이 5개이므로 $b=5$

$\therefore a-b=54-5=49$



03 **Action** $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}, \overline{DA}$ 를 그어 사각형의 내각의 합을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}, \overline{DA}$ 를 그으면

$\triangle ABF$ 에서

$$\angle FAB + \angle FBA = 180^\circ - \angle f$$

$\triangle BCG$ 에서

$$\angle GBC + \angle GCB = 180^\circ - \angle g$$

$\triangle CDH$ 에서

$$\angle HCD + \angle HDC = 180^\circ - \angle h$$


$\triangle DAE$ 에서

$$\angle EDA + \angle EAD = 180^\circ - \angle e$$

사각형 ABCD의 내각의 크기의 합은 360° 이므로

$$\begin{aligned} &\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + (180^\circ - \angle f) + (180^\circ - \angle g) \\ &\quad + (180^\circ - \angle h) + (180^\circ - \angle e) \\ &= (\angle a + \angle b + \angle c + \angle d) - (\angle e + \angle f + \angle g + \angle h) + 720^\circ \\ &= 360^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\angle e + \angle f + \angle g + \angle h) - (\angle a + \angle b + \angle c + \angle d) \\ = 360^\circ \end{aligned}$$



04 **Action** 길이가 3, x , y 인 세 변의 연장선으로 삼각형을 만들어 본다.


오른쪽 그림과 같이 길이가 3, x , y 인 세 변의 연장선으로 삼각형 ABC를 만들면 주어진 육각형의 내각의 크기가 모두 같으므로 한 외각의 크기도 $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$ 로 모두 같다.

따라서 $\triangle ABC$ 는 정삼각형이므로 세 변의 길이가 모두 같다.

$$\text{즉 } 4+3+3=3+x+5=5+y+4$$

$$\therefore x=2, y=1$$

$$\therefore 2x+y=2 \times 2+1=5$$



05 **Action** 주어진 그림은 정 \$n\$각형의 한 변을 밑변으로 하는 합동인 \$n\$개의 이등변삼각형을 꼭짓점끼리 붙여 놓은 것이다.

주어진 그림은 정 \$n\$각형의 한 변을 밑변으로 하는 합동인 \$n\$개의 이등변삼각형을 꼭짓점끼리 붙여 놓은 것이다.

$\angle A_1B_2B_1 = \angle a, \angle B_3B_2B_1 = \angle b$ 라 하면

$\triangle A_1B_2B_1$ 은 이등변삼각형이므로

$$\angle A_1B_1B_2 = \angle A_1B_2B_1 = \angle a$$

$$\triangle A_1B_2B_1 \text{에서 } \angle A_1 + 2\angle a = 180^\circ$$

$$\therefore \angle A_1 = 180^\circ - 2\angle a$$

이때 $\triangle A_2B_3B_2 \cong \triangle A_1B_2B_1$ (SAS 합동)이므로

$$\angle A_2B_2B_3 = \angle A_1B_1B_2 = \angle a$$

$$\therefore \angle A_2B_2A_1 = \angle A_1 + 18^\circ$$

$$= (180^\circ - 2\angle a) + 18^\circ$$

$$= 198^\circ - 2\angle a$$

$$\angle A_2B_2A_1 + \angle A_2B_2B_3 + \angle B_3B_2B_1 + \angle A_1B_2B_1 = 360^\circ$$

에서

$$(198^\circ - 2\angle a) + \angle a + \angle b + \angle a = 360^\circ$$

$$\angle b + 198^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle b = 162^\circ$$

즉 $\angle B_3B_2B_1$ 은 정 \$n\$각형의 한 내각이고 그 크기가 162° 이므로

$$\frac{180^\circ \times (n-2)}{n} = 162^\circ$$

$$180^\circ \times n - 360^\circ = 162^\circ \times n$$

$$18^\circ \times n = 360^\circ \quad \therefore n=20$$

Lecture

$\triangle A_2B_3B_2$ 와 $\triangle A_1B_2B_1$ 에서

$$\overline{A_2B_3} = \overline{A_1B_2}, \overline{A_2B_2} = \overline{A_1B_1}, \angle B_3A_2B_2 = \angle B_2A_1B_1$$

$$\therefore \triangle A_2B_3B_2 \cong \triangle A_1B_2B_1 \text{ (SAS 합동)}$$

06 **Action** 정다각형의 한 외각의 크기가 (정수) $^\circ$ 일 조건을 생각한다.

정다각형의 한 내각의 크기가 (정수) $^\circ$ 이면 한 외각의 크기도 $180^\circ - (\text{정수})^\circ = (\text{정수})^\circ$ 이다.

정 \$n\$각형의 한 외각의 크기, 즉 $\frac{360^\circ}{n}$ 가 (정수) $^\circ$ 가 되려면 \$n\$은 360의 약수이어야 한다.

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 이므로 360의 약수의 개수는

$$(3+1) \times (2+1) \times (1+1) = 24 \text{ (개)}$$

이때 \$n\$은 3 이상이어야 하므로 조건을 만족시키는 \$n\$은 1과 2를 제외한 22개이다.

따라서 한 내각의 크기가 (정수) $^\circ$ 인 정다각형은 모두 22종류이다.

Lecture

약수의 개수

자연수 \$A\$가 $A = a^m \times b^n$ (\$a, b\$는 서로 다른 소수)으로 소인수분해될 때

$$(A \text{의 약수의 개수}) = (m+1) \times (n+1) \text{ 개}$$

2. 원과 부채꼴

최고 수준

입문하기

P 57 - P 61

- 01 ②, ④ 02 60° 03 $x=8, y=120$
 04 80° 05 30° 06 75 cm 07 24 cm
 08 10 cm 09 4 cm 10 25° 11 45 cm²
 12 26 cm 13 ④ 14 ③ 15 22π cm
 16 $\frac{41}{2}\pi$ cm² 17 30π cm² 18 10π cm² 19 8π cm
 20 30° 21 둘레의 길이: (4π+8) cm, 넓이: 8π cm²
 22 8π cm 23 $(\frac{9}{2}\pi+9)$ cm
 24 둘레의 길이: (6π+24) cm, 넓이: (72-18π) cm²
 25 18 cm² 26 (9π-18) cm²
 27 $(\frac{9}{2}\pi-9)$ cm² 28 $\frac{16}{3}\pi$ cm² 29 30 cm²
 30 2π 31 (6π+18) cm
 32 (1) (4π+30) cm² (2) (2π+15) cm 33 6π cm

01 **Action** 원과 부채꼴에 대하여 알아본다.

- 부채꼴은 두 반지름과 호로 이루어진 도형이다.
- 합동인 두 원에 대하여 중심각의 크기가 같으면 현의 길이도 같다. 즉 반지름의 길이가 다른 두 원에서는 중심각의 크기가 같아도 현의 길이는 다르다.
- 반원은 부채꼴이면서 활꼴이다.

02 **Action** △OAB는 정삼각형임을 이용한다.

$\overline{AB}=\overline{OA}=\overline{OB}$ 이므로 △OAB는 정삼각형이다.
 $\therefore \angle x=60^\circ$

03 **Action** 한 원에서 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례함을 이용한다.

$$20^\circ : 80^\circ = 2 : x \text{ 이므로}$$

$$1 : 4 = 2 : x \quad \therefore x = 8$$

$$20^\circ : y^\circ = 2 : 12 \text{ 이므로}$$

$$20 : y = 1 : 6 \quad \therefore y = 120$$

04 **Action** 한 원에서 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례함을 이용한다.

$$\angle AOB = 360^\circ \times \frac{2}{2+3+4}$$

$$= 360^\circ \times \frac{2}{9} = 80^\circ$$

Lecture

호의 길이의 비에 대한 중심각의 크기

한 원에서 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로

$$\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = a : b : c \text{ 일 때,}$$

$$\angle AOB = 360^\circ \times \frac{a}{a+b+c}$$

$$\angle BOC = 360^\circ \times \frac{b}{a+b+c}$$

$$\angle COA = 360^\circ \times \frac{c}{a+b+c}$$

05 **Action** $\widehat{AC}=5\widehat{BC}$ 에서 $\widehat{AC} : \widehat{BC}=5 : 1$ 임을 이용한다.

$\widehat{AC}=5\widehat{BC}$ 에서 $\widehat{AC} : \widehat{BC}=5 : 1$ 이므로

$$\angle AOC : \angle BOC = 5 : 1 \quad \dots\dots 70\%$$

$$\therefore \angle BOC = 180^\circ \times \frac{1}{5+1}$$

$$= 180^\circ \times \frac{1}{6} = 30^\circ \quad \dots\dots 30\%$$

06 **Action** 원의 둘레의 길이를 x cm로 놓고 한 원에서 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례함을 이용한다.

원 O의 둘레의 길이를 x cm라 하면

$$24^\circ : 360^\circ = 5 : x$$

$$1 : 15 = 5 : x \quad \therefore x = 75$$

따라서 원 O의 둘레의 길이는 75 cm이다.

07 **Action** \overline{OD} 를 긋고 한 원에서 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례함을 이용한다.

$\overline{AD} \parallel \overline{OC}$ 이므로

$$\angle OAD = \angle BOC$$

$$= 36^\circ \text{ (동위각)}$$

오른쪽 그림과 같이 \overline{OD} 를 그으면

△ODA에서 $\overline{OA}=\overline{OD}$ 이므로


$$\angle ODA = \angle OAD = 36^\circ$$

$$\therefore \angle AOD = 180^\circ - (36^\circ + 36^\circ)$$

$$= 108^\circ$$

따라서 $\widehat{AD} : \widehat{BC} = 108^\circ : 36^\circ$ 이므로

$$\widehat{AD} : 8 = 3 : 1 \quad \therefore \widehat{AD} = 24 \text{ (cm)}$$




Lecture

한 원에서 호의 길이 또는 중심각의 크기를 구할 때

- 이등변삼각형을 찾거나 보조선을 그어 이등변삼각형을 만든다.
 - 두 밑각의 크기가 같음을 이용한다.
- 평행선을 긋는다.
 - 동위각 또는 엇각의 크기가 같음을 이용한다.

08 **Action** $\angle AOD = \angle x$ 로 놓고 $\angle BOC$ 의 크기를 $\angle x$ 를 사용하여 나타낸다.

오른쪽 그림과 같이 \overline{OC} 를 긋고
 $\angle AOD = \angle x$ 라 하면
 $\angle CAO = \angle AOD = \angle x$ (엇각)
 $\triangle OCA$ 에서 $\overline{OA} = \overline{OC}$ 이므로
 $\angle OCA = \angle OAC = \angle x$
 $\therefore \angle BOC = \angle x + \angle x = 2\angle x$
 따라서 $\widehat{AD} : \widehat{BC} = \angle x : 2\angle x$ 이므로
 $5 : \widehat{BC} = 1 : 2 \quad \therefore \widehat{BC} = 10$ (cm)



09 **Action** 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않은 두 내각의 크기의 합과 같음을 이용한다.

$\triangle COE$ 에서 $\overline{CO} = \overline{CE}$ 이므로
 $\angle COE = \angle CEO = 20^\circ$
 $\therefore \angle OCD = 20^\circ + 20^\circ = 40^\circ$ 30%
 $\triangle OCD$ 에서 $\overline{OC} = \overline{OD}$ 이므로
 $\angle ODC = \angle OCD = 40^\circ$
 $\triangle OED$ 에서
 $\angle DOB = 20^\circ + 40^\circ = 60^\circ$ 30%
 따라서 $\widehat{AC} : \widehat{BD} = 20^\circ : 60^\circ$ 이므로
 $\widehat{AC} : 12 = 1 : 3 \quad \therefore \widehat{AC} = 4$ (cm) 40%

10 **Action** 한 원에서 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례함을 이용한다.


$(\angle x + 5^\circ) : (5\angle x - 5^\circ) = 7 : 28$ 이므로
 $(\angle x + 5^\circ) : (5\angle x - 5^\circ) = 1 : 4$
 $5\angle x - 5^\circ = 4\angle x + 20^\circ$
 $\therefore \angle x = 25^\circ$

11 **Action** 한 원에서 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례함을 이용한다.

$\overline{AB} \parallel \overline{OC}$ 이므로
 $\angle OAB = \angle DOC = 40^\circ$ (동위각)
 $\triangle OAB$ 에서 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 이므로
 $\angle OBA = \angle OAB = 40^\circ$
 $\therefore \angle AOB = 180^\circ - (40^\circ + 40^\circ) = 100^\circ$
 따라서
 (부채꼴 AOB의 넓이) : (부채꼴 COD의 넓이) = $100^\circ : 40^\circ$
 이므로
 (부채꼴 AOB의 넓이) : 18 = 5 : 2
 \therefore (부채꼴 AOB의 넓이) = 45 (cm²)

12 **Action** 한 원에서 중심각의 크기가 같은 두 현의 길이는 같음을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 \overline{OA} 를 그으면
 $\widehat{AB} = \widehat{AC}$ 이므로
 $\angle AOB = \angle AOC$
 $\therefore \overline{AB} = \overline{AC} = 8$ cm
 $\overline{OC} = \overline{OB} = 5$ cm이므로
 (둘레의 길이) = $8 + 5 + 5 + 8$
 = 26 (cm)



13 **Action** 한 원에서 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않는다.

④ 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않으므로
 $\overline{CE} \neq 2\overline{AB}$

14 **Action** $\angle AOC, \angle BOC$ 의 크기를 각각 구해 본다.

$\overline{OB} = \overline{OC} = \overline{CB}$ 이므로 $\triangle OBC$ 는 정삼각형이다.
 $\therefore \angle COB = 60^\circ, \angle AOC = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

① $\widehat{AB} : \widehat{AC} = \angle AOB : \angle AOC$
 = $180^\circ : 120^\circ = 3 : 2$

② $\angle COB = 60^\circ, \angle AOC = 120^\circ$ 이므로
 $\angle COB = \frac{1}{2} \angle AOC$

③ $\angle AOB = 180^\circ, \angle OBC = 60^\circ$ 이므로
 $\angle AOB = 3 \angle OBC$

④ 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않는다.

⑤ $\angle AOC = 2 \angle COB$ 이므로
 (부채꼴 AOC의 넓이) = $2 \times$ (부채꼴 COB의 넓이)
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

15 **Action** 색칠한 부분의 둘레의 길이는 지름의 길이가 6 cm인 원과 지름의 길이가 16 cm인 원의 둘레의 길이의 합과 같다.

(둘레의 길이)
 = (지름의 길이가 6 cm인 원의 둘레의 길이)
 + (지름의 길이가 16 cm인 원의 둘레의 길이)
 = $2\pi \times 3 + 2\pi \times 8$
 = $6\pi + 16\pi$
 = 22π (cm)

16 **Action** (반지름의 길이가 r인 반원의 넓이) = $\pi r^2 \times \frac{1}{2}$ 임을 이용한다.

(넓이) = $\pi \times 9^2 \times \frac{1}{2} - \pi \times 7^2 \times \frac{1}{2} + \pi \times 3^2 \times \frac{1}{2}$
 = $\frac{81}{2}\pi - \frac{49}{2}\pi + \frac{9}{2}\pi$
 = $\frac{41}{2}\pi$ (cm²)

- 17 **Action** 색칠한 부채꼴의 중심각의 크기는 정오각형의 한 내각의 크기와 같음을 이용한다.

$$\begin{aligned} \text{(정오각형의 한 내각의 크기)} &= \frac{180^\circ \times (5-2)}{5} \\ &= 108^\circ \\ \therefore \text{(넓이)} &= \pi \times 10^2 \times \frac{108}{360} = 30\pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

- 18 **Action** 색칠한 부채꼴의 중심각의 크기의 합을 구한다.

색칠한 부채꼴의 중심각의 크기의 합은
 $10^\circ + 40^\circ + 30^\circ + 20^\circ = 100^\circ$
 따라서 구하는 부채꼴의 넓이의 합은 중심각의 크기가 100° 인 부채꼴의 넓이와 같으므로
 $\pi \times 6^2 \times \frac{100}{360} = 10\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

- 19 **Action** 반지름의 길이가 r , 호의 길이가 l 인 부채꼴의 넓이를 S 라 하면 $S = \frac{1}{2}rl$ 이다.

부채꼴의 호의 길이를 l cm라 하면
 $\frac{1}{2} \times 6 \times l = 24\pi \quad \therefore l = 8\pi$
 따라서 부채꼴의 호의 길이는 8π cm이다.

- 20 **Action** 먼저 부채꼴의 반지름의 길이를 구한다.

부채꼴의 반지름의 길이를 r cm라 하면
 $\frac{1}{2} \times r \times \pi = 3\pi \quad \therefore r = 6$ 50%
 부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라 하면
 $2\pi \times 6 \times \frac{x}{360} = \pi \quad \therefore x = 30$
 따라서 부채꼴의 중심각의 크기는 30° 이다. 50%

- 21 **Action** 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구할 때, 직선 부분을 빠뜨리지 않도록 주의한다.


$$\begin{aligned} \text{(둘레의 길이)} &= 2\pi \times 6 \times \frac{45}{360} + 2\pi \times 10 \times \frac{45}{360} + 4 + 4 \\ &= \frac{3}{2}\pi + \frac{5}{2}\pi + 8 \\ &= 4\pi + 8 \text{ (cm)} \\ \text{(넓이)} &= \pi \times 10^2 \times \frac{45}{360} - \pi \times 6^2 \times \frac{45}{360} \\ &= \frac{25}{2}\pi - \frac{9}{2}\pi \\ &= 8\pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

- 22 **Action** $\triangle ABC$ 가 정삼각형이므로 정삼각형의 한 내각의 크기는 60° 임을 이용한다.

$$\begin{aligned} \text{(둘레의 길이)} &= \widehat{AB} + \widehat{BC} + \widehat{CA} \\ &= \widehat{AB} \times 3 \\ &= \left(2\pi \times 8 \times \frac{60}{360}\right) \times 3 \\ &= 8\pi \text{ (cm)} \end{aligned}$$

- 23 **Action** 색칠한 부분에서 두 호의 길이의 합은 반지름의 길이가 9 cm이고 중심각의 크기가 90° 인 부채꼴의 호의 길이와 같다.


오른쪽 그림에서 $\widehat{PB} = \widehat{PC}$ 이므로
 $\text{(둘레의 길이)} = \widehat{AP} + \widehat{PB} + \widehat{AB}$
 $= \widehat{AP} + \widehat{PC} + \widehat{AB}$
 $= \widehat{AC} + \widehat{AB}$
 $= 2\pi \times 9 \times \frac{90}{360} + 9$
 $= \frac{9}{2}\pi + 9 \text{ (cm)}$



- 24 **Action** 색칠한 부분의 넓이를 구할 때, 같은 부분이 있으면 한 부분의 넓이를 구한 후 같은 부분의 개수를 곱한다.


$$\begin{aligned} \text{(둘레의 길이)} &= \left(2\pi \times 6 \times \frac{90}{360}\right) \times 2 + 6 \times 4 \\ &= 6\pi + 24 \text{ (cm)} \end{aligned}$$

구하는 넓이는 오른쪽 그림의 색칠한 부분의 넓이의 2배와 같으므로
 $\text{(넓이)} = \left(6 \times 6 - \pi \times 6^2 \times \frac{90}{360}\right) \times 2$
 $= 72 - 18\pi \text{ (cm}^2\text{)}$




- 25 **Action** 도형의 일부분을 옮겨 간단한 도형이 되도록 만든다.

오른쪽 그림에서
 $\text{(넓이)} = 3 \times 6 = 18 \text{ (cm}^2\text{)}$



- 26 **Action** 도형의 일부분을 옮겨 간단한 도형이 되도록 만든다.


오른쪽 그림에서
 $\text{(넓이)} = \pi \times 6^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 6 \times 6$
 $= 9\pi - 18 \text{ (cm}^2\text{)}$



27 **Action** 도형의 일부분을 옮겨 간단한 도형이 되도록 만든다.

오른쪽 그림에서

$$\begin{aligned} (\text{넓이}) &= \pi \times 6^2 \times \frac{45}{360} - \frac{1}{2} \times 6 \times 3 \\ &= \frac{9}{2}\pi - 9 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$



28 **Action** 반원의 넓이와 부채꼴의 넓이의 합과 차를 이용한다.

$$\begin{aligned} (\text{넓이}) &= (\text{부채꼴 } B'AB \text{의 넓이}) + (\text{반원 } O' \text{의 넓이}) \\ &\quad - (\text{반원 } O \text{의 넓이}) \\ &= (\text{부채꼴 } B'AB \text{의 넓이}) \\ &= \pi \times 8^2 \times \frac{30}{360} = \frac{16}{3}\pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

29 **Action** 반원의 넓이와 삼각형의 넓이의 합과 차를 이용한다.

$$\begin{aligned} (\text{넓이}) &= (\text{지름이 } \overline{AB} \text{인 반원의 넓이}) \\ &\quad + (\text{지름이 } \overline{AC} \text{인 반원의 넓이}) + \triangle ABC \\ &\quad - (\text{지름이 } \overline{BC} \text{인 반원의 넓이}) \\ &= \pi \times \left(\frac{5}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} + \pi \times 6^2 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 5 \times 12 \\ &\quad - \pi \times \left(\frac{13}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{25}{8}\pi + 18\pi + 30 - \frac{169}{8}\pi \\ &= 30 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

30 **Action** 색칠한 부분의 넓이가 서로 같음을 이용하여 넓이가 같은 두 도형을 찾아본다.

색칠한 두 부분의 넓이가 서로 같으므로 직사각형 ABCD의 넓이와 부채꼴 ABE의 넓이가 서로 같다.


따라서 $8 \times x = \pi \times 8^2 \times \frac{90}{360}$ 이므로 $x = 2\pi$

Lecture
문제에서 색칠한 부분의 넓이만을 비교하는 것은 어려우므로 넓이를 구할 수 있는 도형, 즉 직사각형과 부채꼴의 넓이가 서로 같음을 이용해야 한다.

31 **Action** 곡선 부분과 직선 부분으로 나누어서 각각의 길이를 구한다.

오른쪽 그림에서


$$\begin{aligned} (\text{곡선 부분의 길이}) &= \left(2\pi \times 3 \times \frac{120}{360}\right) \times 3 = 6\pi \text{ (cm)} \\ (\text{직선 부분의 길이}) &= 6 \times 3 = 18 \text{ (cm)} \\ \therefore (\text{최소 길이}) &= 6\pi + 18 \text{ (cm)} \end{aligned}$$



32 **Action** 원 O가 지나간 부분을 그려 본다.


(1) 원 O가 지나간 부분은 오른쪽 그림의 색칠한 부분과 같다.

$$\begin{aligned} \therefore (\text{넓이}) &= \left(\pi \times 2^2 \times \frac{120}{360}\right) \times 3 \\ &\quad + (5 \times 2) \times 3 \\ &= 4\pi + 30 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$




(2) 원 O의 중심이 움직인 부분은 오른쪽 그림과 같다.

$$\begin{aligned} \therefore (\text{거리}) &= \left(2\pi \times 1 \times \frac{120}{360}\right) \times 3 \\ &\quad + 5 \times 3 \\ &= 2\pi + 15 \text{ (cm)} \end{aligned}$$



33 **Action** 꼭짓점 B가 움직인 부분을 그려 본다.



위 그림에서

$$\begin{aligned} (\text{거리}) &= 2\pi \times 4 \times \frac{90}{360} + 2\pi \times 5 \times \frac{90}{360} + 2\pi \times 3 \times \frac{90}{360} \\ &= 2\pi + \frac{5}{2}\pi + \frac{3}{2}\pi = 6\pi \text{ (cm)} \end{aligned}$$

최고 수준 완성하기 P 62 - P 65

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| 01 26° | 02 1 : 1 | 03 10 cm | 04 108° |
| 05 (9π + 24) cm | 06 24π cm | 07 44π cm ² | |
| 08 8π cm | 09 (100 - 25π) cm ² | 10 16 | |
| 11 25π cm ² | 12 (9/4π + 15/2) cm ² | | |
| 13 (256 + 16π) cm ² | 14 6π cm ² | | |
| 15 (46π + 84) m ² | 16 (24π + 80) cm ² | | |


01 **Action** ∠APC = ∠x로 놓고 ∠BOD의 크기를 ∠x를 사용하여 나타낸다.

$$\begin{aligned} \angle APC &= \angle x \text{ 라 하면} \\ \triangle PCO \text{에서 } \overline{CP} &= \overline{CO} \text{ 이므로} \\ \angle COP &= \angle APC = \angle x \\ \therefore \angle OCD &= \angle x + \angle x = 2\angle x \end{aligned}$$

△OCD에서 $\overline{OC} = \overline{OD}$ 이므로
 $\angle ODC = \angle OCD = 2\angle x$
 △OPD에서
 $\angle BOD = \angle x + 2\angle x = 3\angle x$
 따라서 $3\angle x = 78^\circ$ 이므로 $\angle x = 26^\circ$


02 **Action** \overline{DO} 를 그어 한 원에서 중심각의 크기가 같은 두 현의 길이는 같음을 이용한다.

$\overline{CO} \parallel \overline{DB}$ 이므로
 $\angle COA = \angle DBO$ (동위각)
 오른쪽 그림과 같이 \overline{DO} 를 그으면
 △DOB에서 $\overline{OD} = \overline{OB}$ 이므로
 $\angle BDO = \angle DBO$
 이때 $\angle DOC = \angle BDO$ (엇각)이므로
 $\angle COA = \angle DOC$
 따라서 $\overline{AC} = \overline{CD}$ 이므로 $\overline{AC} : \overline{CD} = 1 : 1$



03 **Action** \overline{OC} 를 긋고 $\widehat{BC} : \widehat{BCD} = 5 : 7$ 임을 이용하여 $\angle BOC$ 의 크기를 구한다.

오른쪽 그림과 같이 \overline{OC} 를 그으면
 $\widehat{BC} : \widehat{BCD} = 5 : 7$ 이므로
 $\angle BOC = 360^\circ \times \frac{5}{5+7} = 150^\circ$
 $\therefore \angle AOC = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$
 $\angle CDO = 3\angle x$, $\angle AOD = 4\angle x$ 라 하면
 △OCD에서 $\overline{OC} = \overline{OD}$ 이므로
 $\angle OCD = \angle ODC = 3\angle x$
 △OCD에서
 $3\angle x + 3\angle x + (4\angle x + 30^\circ) = 180^\circ$
 $10\angle x = 150^\circ \quad \therefore \angle x = 15^\circ$
 따라서 $\angle AOD = 4\angle x = 4 \times 15^\circ = 60^\circ$ 이므로
 $\angle BOD = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$
 $\widehat{BD} : 30 = 120^\circ : 360^\circ$ 이므로
 $\widehat{BD} : 30 = 1 : 3 \quad \therefore \widehat{BD} = 10$ (cm)



04 **Action** 한 원에서 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례함을 이용한다.


$\angle SOT : 360^\circ = 3\pi : 15\pi$ 이므로
 $\angle SOT : 360^\circ = 1 : 5 \quad \therefore \angle SOT = 72^\circ$
 △POQ에서
 $\angle a + 72^\circ + \angle b = 180^\circ \quad \therefore \angle a + \angle b = 108^\circ$

05 **Action** 곡선 부분과 직선 부분으로 나누어 각각의 길이를 구한다.

(둘레의 길이)
 $= (\text{반지름의 길이가 3 cm인 원의 둘레의 길이}) \times \frac{1}{2}$
 $+ (\text{반지름의 길이가 2 cm인 원의 둘레의 길이})$
 $+ (\text{반지름의 길이가 1 cm인 원의 둘레의 길이}) + 3 \times 8$
 $= 2\pi \times 3 \times \frac{1}{2} + 2\pi \times 2 + 2\pi \times 1 + 3 \times 8$
 $= 3\pi + 4\pi + 2\pi + 24$
 $= 9\pi + 24$ (cm)

06 **Action** 색칠한 부분의 둘레의 길이는 \widehat{OA} 의 길이의 12배이다.

오른쪽 그림과 같이 \overline{AD} , \overline{BE} , \overline{CF} 를
 그으면 △ABO는 정삼각형이므로
 $\angle ABO = 60^\circ$
 \therefore (둘레의 길이)
 $= 12\widehat{OA}$
 $= 12 \times \left(2\pi \times 6 \times \frac{60}{360} \right)$
 $= 24\pi$ (cm)




07 **Action** 각 부채꼴의 중심각의 크기와 반지름의 길이를 각각 알아본다.

정오각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$
 점 B, C, D, E, A가 중심인 부채꼴의 반지름의 길이는 각각 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm이므로
 (넓이)
 $= \pi \times 2^2 \times \frac{72}{360} + \pi \times 4^2 \times \frac{72}{360} + \pi \times 6^2 \times \frac{72}{360}$
 $+ \pi \times 8^2 \times \frac{72}{360} + \pi \times 10^2 \times \frac{72}{360}$
 $= \frac{4}{5}\pi + \frac{16}{5}\pi + \frac{36}{5}\pi + \frac{64}{5}\pi + 20\pi$
 $= 44\pi$ (cm²)

08 **Action** 보조선을 그어 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구할 수 있는 부채꼴의 중심각의 크기를 구한다.


오른쪽 그림에서
 △EBC와 △FCD가 정삼각형
 이므로
 $\angle ECD = \angle FCB$
 $= 90^\circ - 60^\circ$
 $= 30^\circ \quad \dots\dots 30\%$
 $\therefore \angle ECF = 90^\circ - (30^\circ + 30^\circ) = 30^\circ \quad \dots\dots 20\%$



$$\begin{aligned} \therefore (\text{둘레의 길이}) &= 4\widehat{EF} = 4 \times \left(2\pi \times 12 \times \frac{30}{360} \right) \\ &= 8\pi \text{ (cm)} \quad \dots\dots 50\% \end{aligned}$$


09 Action 원에 외접하는 정사각형을 그려 본다.

오른쪽 그림과 같이 처음 원에 외접하는 정사각형 EFGH를 그리면 (넓이)
 =(정사각형 EFGH의 넓이)
 -(부채꼴 AEB의 넓이) × 4
 =10 × 10 - (π × 5² × $\frac{1}{4}$) × 4
 =100 - 25π (cm²)



10 Action 색칠한 부분의 넓이를 구할 때, 같은 부분이 있으면 한 부분의 넓이를 구한 후 같은 부분의 개수를 곱한다.

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 S라 하면 구하는 넓이는 4S이다.
 S=(반지름의 길이가 4인 사분원의 넓이)
 -(반지름의 길이가 2인 사분원의 넓이) × 2
 -(빗금친 부분의 넓이) × 2



$$\begin{aligned} &= \pi \times 4^2 \times \frac{1}{4} - \left(\pi \times 2^2 \times \frac{1}{4} \right) \times 2 \\ &\quad - \left(\pi \times 2^2 \times \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \right) \times 2 \\ &= 4\pi - 2\pi - 2\pi + 4 = 4 \end{aligned}$$


따라서 구하는 넓이는
 4S = 4 × 4 = 16

11 Action 부채꼴의 넓이와 삼각형의 넓이의 합과 차를 이용한다.

$$\begin{aligned} \angle DBA &= 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ \\ \angle EBD &= \angle CBA = 60^\circ \text{ 이므로} \\ \angle EBC &= 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ \\ \therefore (\text{넓이}) &= (\text{부채꼴 EBC의 넓이}) + (\text{삼각형 EDB의 넓이}) \\ &\quad - (\text{부채꼴 DBA의 넓이}) - (\text{삼각형 ABC의 넓이}) \\ &= (\text{부채꼴 EBC의 넓이}) - (\text{부채꼴 DBA의 넓이}) \\ &= \pi \times 10^2 \times \frac{120}{360} - \pi \times 5^2 \times \frac{120}{360} \\ &= \frac{100}{3}\pi - \frac{25}{3}\pi = 25\pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

12 Action 보조선을 그려 \widehat{DE} 와 \widehat{EC} 에 대한 중심각의 크기를 각각 구한다.


오른쪽 그림과 같이 점 E에서 \overline{AB} 에 내린 수선의 발을 F라 하고 \overline{EF} 와 \overline{CD} 의 교점을 G라 하면



$$\begin{aligned} \angle DGE &= \angle EGC = 90^\circ \\ \overline{CD} &\text{가 반원의 지름이고 } \widehat{DE} = \widehat{EC} \text{ 이므로 점 G는 반원의 중심이다.} \\ \therefore \overline{DG} &= \overline{GE} = 3 \text{ cm} \\ \therefore (\text{넓이}) &= (\text{사각형 FBCG의 넓이}) + (\text{부채꼴 EGC의 넓이}) \\ &\quad - \triangle FBE \\ &= 8 \times 3 + \pi \times 3^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 3 \times 11 \\ &= 24 + \frac{9}{4}\pi - \frac{33}{2} \\ &= \frac{9}{4}\pi + \frac{15}{2} \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

13 Action 도형의 일부분을 옮겨 간단한 도형이 되도록 만든다.


오른쪽 그림에서 (넓이)
 =(한 변의 길이가 16 cm인 정사각형의 넓이)
 +(반지름의 길이가 4 cm인 사분원의 넓이) × 4



$$\begin{aligned} &= 16 \times 16 + \left(\pi \times 4^2 \times \frac{90}{360} \right) \times 4 \\ &= 256 + 16\pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

14 Action 도형의 일부분을 옮겨 간단한 도형이 되도록 만든다.


오른쪽 그림과 같이 $\overline{DB'}$ 을 그으면



$$\begin{aligned} \angle BDA' &= \angle CDB' \\ &= 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ \\ \text{이므로} \\ \angle BDB' &= 15^\circ + 30^\circ + 15^\circ = 60^\circ \\ \therefore (\text{넓이}) &= \pi \times 6^2 \times \frac{60}{360} = 6\pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

15 Action 고리가 점 A에서 점 B를 거쳐 점 C까지 움직일 때, 염소가 움직일 수 있는 범위를 그려 본다.

염소가 움직일 수 있는 영역의 넓이는 오른쪽 그림의 색칠한 부분의 넓이와 같다.



①=②=③=④=⑤이므로

(염소가 움직일 수 있는 영역의 최대 넓이)


$$\begin{aligned} &= \left(\pi \times 6^2 \times \frac{90}{360}\right) \times 5 + \pi \times 2^2 \times \frac{90}{360} + 6 \times 4 + 10 \times 6 \\ &= 45\pi + \pi + 24 + 60 \\ &= 46\pi + 84 \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

16 Action 원 O가 지나간 부분을 그려 본다.

원 O가 지나간 부분은 오른쪽 그림의 색칠한 부분과 같으므로

(넓이)

$$\begin{aligned} &= \left(\pi \times 14^2 \times \frac{36}{360} - \pi \times 10^2 \times \frac{36}{360}\right) \\ &\quad + \left(\pi \times 4^2 \times \frac{90}{360}\right) \times 2 \\ &\quad + \pi \times 4^2 \times \frac{144}{360} + (10 \times 4) \times 2 \\ &= \frac{48}{5}\pi + 8\pi + \frac{32}{5}\pi + 80 \\ &= 24\pi + 80 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$



최고 수준 뛰어넘기

P 66 - P 67

- 01 30° 02 $l_1=l_2=l_3$ 03 $(64-18\pi) \text{ cm}^2$
 04 $\left(\frac{313}{4}\pi + 60\right) \text{ cm}^2$ 05 $10\pi \text{ cm}$ 06 성훈, 8 cm

01 Action $\angle OBD=4\angle x, \angle OCD=5\angle x$ 로 놓고 $\angle x$ 의 크기를 구한다.

$\angle OBD=4\angle x, \angle OCD=5\angle x$ 라 하고 오른쪽 그림과 같이 \overline{OD} 를 그으면

$\triangle OBD$ 에서 $\overline{OB}=\overline{OD}$ 이므로

$$\angle ODB = \angle OBD = 4\angle x$$

$\triangle ODC$ 에서 $\overline{OD}=\overline{OC}$ 이므로

$$\angle ODC = \angle OCD = 5\angle x$$

사각형 OBDC에서

$$90^\circ + 4\angle x + (4\angle x + 5\angle x) + 5\angle x = 360^\circ$$

$$18\angle x = 270^\circ \quad \therefore \angle x = 15^\circ$$

$\triangle OBD$ 에서


$$\angle OBD = \angle ODB = 4\angle x = 4 \times 15^\circ = 60^\circ$$

$$\therefore \angle DOB = 180^\circ - (60^\circ + 60^\circ) = 60^\circ$$

따라서 $\angle AOD = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ 이고

$\triangle AOD$ 에서 $\overline{OA}=\overline{OD}$ 이므로

$$\angle DAO = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 120^\circ) = 30^\circ$$



02 Action l_1, l_2, l_3 을 각각 x 를 사용하여 나타낸 후 그 대소를 비교한다.

(i) [그림 1]에서 가장 작은 반원의 반지름의 길이를 r_1 , 중간 크기의 반원의 반지름의 길이를 r_2 , 가장 큰 반원의 반지름의 길이를 r_3 이라 하면

$$r_1 + r_2 + r_3 = \frac{x}{2}$$

$$\therefore l_1 = \frac{1}{2} \times 2\pi \times r_1 + \frac{1}{2} \times 2\pi \times r_2 + \frac{1}{2} \times 2\pi \times r_3 + x$$

$$= \pi(r_1 + r_2 + r_3) + x$$

$$= \frac{1}{2}\pi x + x = \left(\frac{1}{2}\pi + 1\right)x$$

(ii) [그림 2]에서 작은 반원의 반지름의 길이를 r_4 , 큰 반원의 반지름의 길이를 r_5 라 하면

$$r_4 + r_5 = \frac{x}{2}$$

$$\therefore l_2 = \frac{1}{2} \times 2\pi \times r_4 + \frac{1}{2} \times 2\pi \times r_5 + x$$

$$= \pi(r_4 + r_5) + x$$

$$= \frac{1}{2}\pi x + x = \left(\frac{1}{2}\pi + 1\right)x$$

(iii) [그림 3]에서

$$l_3 = \frac{1}{2} \times 2\pi \times \frac{x}{2} + x$$

$$= \frac{1}{2}\pi x + x = \left(\frac{1}{2}\pi + 1\right)x$$

(i)~(iii)에서 $l_1 = l_2 = l_3$

03 Action 정사각형 ABCD의 넓이를 두 부채꼴의 넓이와 S_1, S_2, S_3 의 합과 차로 나타내어 본다.

(정사각형 ABCD의 넓이)

$$= (\text{반지름의 길이가 6 cm인 부채꼴의 넓이}) \times 2$$

$$+ S_1 + S_3 - S_2$$

이므로

$$8 \times 8 = \left(\pi \times 6^2 \times \frac{90}{360}\right) \times 2 + S_1 + S_3 - S_2$$

$$\therefore S_1 + S_3 - S_2 = 64 - 18\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

04 Action $\angle BAC + \angle B'AC' = 180^\circ$ 이고 $\overline{AB} = \overline{AB'}$ 이므로 $\triangle AC'B'$ 을 점 A를 중심으로 회전시켜 본다.


$\angle BAC + \angle B'AC' = 180^\circ$ 이고

$\overline{AB} = \overline{AB'}$ 이므로 오른쪽 그림과 같이

$\overline{AB'}$ 이 \overline{AB} 에 오도록 $\triangle AC'B'$ 을 점

A를 중심으로 90° 회전시키면 $\overline{C'C}$ 는


일직선이 된다.



∴ (넓이)

$$\begin{aligned} &= \pi \times 13^2 \times \frac{90}{360} + \pi \times 12^2 \times \frac{90}{360} + \frac{1}{2} \times 5 \times 24 \\ &= \frac{169}{4}\pi + 36\pi + 60 \\ &= \frac{313}{4}\pi + 60 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$


05 Action 중심 O가 움직인 부분을 그려 본다.



위 그림에서

$$\begin{aligned} \text{(거리)} &= \left(2\pi \times 5 \times \frac{90}{360}\right) \times 2 + 2\pi \times 5 \times \frac{1}{2} \\ &= 5\pi + 5\pi = 10\pi \text{ (cm)} \end{aligned}$$

06 Action 성훈이와 헤지가 사용한 끈의 길이를 각각 구한다.



성훈이의 방법에서 곡선 부분의 길이의 합은 반지름의 길이가 4 cm인 원의 둘레의 길이와 같다.

따라서 성훈이가 사용한 끈의 길이는

$$2\pi \times 4 + 8 \times 6 = 8\pi + 48 \text{ (cm)}$$

헤지의 방법에서 곡선 부분의 길이의 합은 반지름의 길이가 4 cm인 원의 둘레의 길이와 같다.

따라서 헤지가 사용한 끈의 길이는

$$2\pi \times 4 + (16 + 8 + 24 + 8) = 8\pi + 56 \text{ (cm)}$$

즉 성훈이가 끈을 8 cm 더 적게 사용하였다.

교과서 속 창의 사고력

P 68 - P 70

01 24° **02** 정삼각형, 정사각형, 정육각형, 풀이 참조

03 반복 8 {가자 5 ; 돌자 45} **04** $\frac{8}{3}\pi \text{ cm}^2$ **05** 16π cm

06 7π cm

01 Action 정다각형의 한 내각의 크기와 합동인 삼각형을 이용하여 ∠x, ∠y, ∠z의 크기를 각각 구한다.


정오각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$$

△BCA에서 $\overline{BC} = \overline{BA}$ 이므로

∠BCA = ∠BAC

$$= \frac{1}{2} \times (180^\circ - 108^\circ) = 36^\circ$$



$$\therefore \angle x = 108^\circ - (36^\circ + 60^\circ) = 12^\circ$$

정삼각형의 한 내각의 크기는 60°이므로

$$\angle PDE = 108^\circ - 60^\circ = 48^\circ$$

△DPE에서 $\overline{DP} = \overline{DE}$ 이므로

$$\angle PED = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 48^\circ) = 66^\circ$$

$$\therefore \angle y = 66^\circ - 36^\circ = 30^\circ$$

한편 \overline{BP} 를 그으면 △BCP와 △EDP에서

$\overline{BC} = \overline{ED}$

$\overline{PC} = \overline{PD}$

$$\angle BCP = \angle EDP = 48^\circ$$

$$\therefore \triangle BCP \cong \triangle EDP \text{ (SAS 합동)}$$

$$\therefore \overline{BP} = \overline{EP}$$

또 △ABP와 △AEP에서

$\overline{AB} = \overline{AE}$, $\overline{BP} = \overline{EP}$, \overline{AP} 는 공통

$$\therefore \triangle ABP \cong \triangle AEP \text{ (SSS 합동)}$$

$$\text{따라서 } \angle BAP = \frac{1}{2} \angle BAE = \frac{1}{2} \times 108^\circ = 54^\circ \text{ 이므로}$$

$$\angle z = 54^\circ - 36^\circ = 18^\circ$$

$$\therefore \angle x + \angle y - \angle z = 12^\circ + 30^\circ - 18^\circ = 24^\circ$$

02 Action 정다각형의 한 내각의 크기를 구한 후 한 점에 모인 정다각형의 내각의 크기의 합이 360°가 되는지 알아본다.

평면을 채우려면 한 점에 모인 정다각형의 내각의 크기의 합이 360°이어야 한다.

(i) 정삼각형

(정삼각형의 한 내각의 크기) = 60°

$360^\circ \div 60^\circ = 6$ 이므로 정삼각형 6개가 모이면 테셀레이션 만들 수 있다.

(ii) 정사각형

(정사각형의 한 내각의 크기) = 90°

$360^\circ \div 90^\circ = 4$ 이므로 정사각형 4개가 모이면 테셀레이션 만들 수 있다.

(iii) 정오각형

$$\text{(정오각형의 한 내각의 크기)} = \frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$$

$360^\circ \div 108^\circ = 3.333\cdots$ 이므로 정오각형으로는 테셀레이션 만들 수 없다.

(iv) 정육각형

$$(\text{정육각형의 한 내각의 크기}) = \frac{180^\circ \times (6-2)}{6} = 120^\circ$$

$360^\circ \div 120^\circ = 3$ 이므로 정육각형 3개가 모이면 테셀레이션 만들 수 있다.

(v) 정칠각형 이상은 한 꼭짓점에 3개의 도형이 모이면 360° 를 초과하므로 테셀레이션을 만들 수 없다.

(i)~(v)에서 테셀레이션을 만들 수 있는 정다각형은 정삼각형, 정사각형, 정육각형이다.

03 Action ‘돌자 y ’에서 y° 만큼 시계 반대 방향으로 회전하는 것은 정다각형의 한 외각의 크기만큼 시계 반대 방향으로 회전하는 것이다.

한 변의 길이가 x 인 정 n 각형을 그리기 위해서는 화살표가 x 만큼 앞으로 나아가며 선을 그린 후 정 n 각형의 한 외각의 크기만큼 시계 반대 방향으로 회전하는 것을 n 번 반복해야 한다.

즉 반복 n {가자 x ; 돌자 $\frac{360}{n}$ }이라는 명령이 필요하다.

이때 정팔각형의 한 외각의 크기는

$$\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$$

따라서 한 변의 길이가 5인 정팔각형을 그리기 위해 필요한 명령은 반복 8 {가자 5; 돌자 45}이다.

04 Action \overline{OC} , \overline{OD} , \overline{OF} , \overline{OG} 를 긋고 한 원에서 부채꼴의 호의 길이가 같으면 중심각의 크기도 같음을 이용한다.

오른쪽 그림과 같이 \overline{OC} , \overline{OD} ,

\overline{OF} , \overline{OG} 를 그으면

$$\begin{aligned} \widehat{AC} &= \widehat{CD} = \widehat{DE} = \widehat{EF} \\ &= \widehat{FG} = \widehat{GB} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \angle AOC &= \angle COD = \angle DOE \\ &= \angle EOF = \angle FOG = \angle GOB \\ &= 180^\circ \times \frac{1}{6} = 30^\circ \end{aligned}$$

$\triangle OCH$ 와 $\triangle DOI$ 에서


$$\overline{OC} = \overline{DO}$$

$$\angle COH = \angle ODI = 30^\circ$$

$$\angle OCH = \angle DOI = 60^\circ$$

$\therefore \triangle OCH \cong \triangle DOI$ (ASA 합동)

$$\begin{aligned} \therefore (\text{사각형 CHIP의 넓이}) &= \triangle OCH - \triangle OPI \\ &= \triangle DOI - \triangle OPI \\ &= \triangle POD \end{aligned}$$




따라서 도형 CHID의 넓이는 부채꼴 COD의 넓이와 같으므로

$$\begin{aligned} (\text{넓이}) &= (\text{부채꼴 COD의 넓이}) \times 2 \\ &= \left(\pi \times 4^2 \times \frac{30}{360} \right) \times 2 = \frac{8}{3} \pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$


05 Action 원 O가 지나간 부분을 그려 원 O의 중심이 움직인 거리를 구한다.

원 O가 두 원 P, Q의 둘레를 따라 한 바퀴 돌 때, 원 O가 두 원 P, Q와 동시에 만나는 경우는 오른쪽 그림과 같다.



이때 $\triangle OPQ$ 는 세 변의 길이가 세 원의 지름의 길이와 같은 정삼각형이므로 한 내각의 크기는 60° 이다.

즉 원 O의 중심이 움직인 부분은 다음 그림과 같다.




따라서 원 O의 중심이 움직인 거리는

$$2\widehat{ACB} = 2 \times \left(2\pi \times 6 \times \frac{240}{360} \right) = 16\pi \text{ (cm)}$$

06 Action 꼭짓점 A가 움직인 부분을 그려 본다.

정삼각형 ABC가 [그림1]의 위치에서 [그림2]의 위치까지 시계 반대 방향으로 회전할 때, 꼭짓점 A가 움직인 부분은 다음 그림과 같다.



첫 번째 그림에서 꼭짓점 A가 움직인 거리는 반지름의 길이가 3 cm이고 중심각의 크기가 각각 120° , 30° 인 부채꼴의 호의 길이이고, 두 번째 그림에서 꼭짓점 A가 움직인 거리는 반지름의 길이가 3 cm이고 중심각의 크기가 30° 인 부채꼴의 호의 길이이다.

또, 세 번째 그림과 네 번째 그림에서 꼭짓점 A가 움직인 거리는 반지름의 길이가 3 cm이고 중심각의 크기가 각각 120° 인 부채꼴의 호의 길이이다.

따라서 꼭짓점 A가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} &\left(2\pi \times 3 \times \frac{120}{360} \right) \times 3 + \left(2\pi \times 3 \times \frac{30}{360} \right) \times 2 \\ &= 6\pi + \pi = 7\pi \text{ (cm)} \end{aligned}$$

III. 입체도형

1. 다면체와 회전체

최고 수준

입문하기

P 74 - P 77

- | | | |
|-----------------------|--------|---|
| 01 ㉔, ㉕, ㉖, ㉗, ㉘ | 02 ㉕ | 03 ㉔, ㉕ |
| 04 ㉑, ㉒ | 05 12개 | 06 22 |
| 07 2 | 08 ㉕ | 09 정사면체 |
| 10 면 A : 4, 면 B : 5 | 11 ㉕ | 12 (1) \overline{FE} (2) $\overline{IA}, \overline{IJ} (= \overline{IH}), \overline{DG}, \overline{DH}$ |
| 13 ㉑, ㉒ | 14 6개 | 15 마름모 |
| 16 정사각형 | 17 ㉓ | 18 ㉑ |
| 19 180 cm^2 | 20 ㉓ | 21 ㉕ |
| 22 150° | 23 ㉕ | 24 $\frac{144}{25} \pi \text{ cm}^2$ |

01 **Action** 다면체는 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형이다.
구, 원기둥, 원뿔, 원뿔대는 회전체이다.
따라서 보기의 입체도형 중 다면체는 ㉔, ㉕, ㉖, ㉗, ㉘이다.

02 **Action** 각기둥, 각뿔, 각뿔대의 옆면의 모양은 차례로 직사각형, 삼각형, 사다리꼴이다.
① 육각기둥 - 직사각형 ② 삼각뿔 - 삼각형
③ 오각뿔대 - 사다리꼴 ④ 사각뿔대 - 사다리꼴

03 **Action** 주어진 전개도로 만들어지는 입체도형이 무엇인지 생각해 본다.
주어진 전개도로 만들어지는 입체도형은 사각뿔대이다.
② 꼭짓점의 개수는 8개이다.
④ 두 밑면은 서로 평행하지만 합동은 아니다.

04 **Action** 다면체의 면, 모서리, 꼭짓점의 개수를 차례로 생각해 본다.
② n 각뿔대의 꼭짓점의 개수는 $2n$ 개이다.
③ n 각뿔의 면의 개수는 $(n+1)$ 개, 모서리의 개수는 $2n$ 개 이므로 같지 않다.
⑤ n 각기둥의 모서리의 개수는 $3n$ 개, 밑면인 n 각형의 꼭짓점의 개수는 n 개이므로 3배이다.

Lecture

다면체의 면, 모서리, 꼭짓점의 개수

다면체	n 각기둥	n 각뿔	n 각뿔대
면의 개수 (개)	$n+2$	$n+1$	$n+2$
모서리의 개수 (개)	$3n$	$2n$	$3n$
꼭짓점의 개수 (개)	$2n$	$n+1$	$2n$

05 **Action** n 각뿔대의 면의 개수는 $(n+2)$ 개, 모서리의 개수는 $3n$ 개, 꼭짓점의 개수는 $2n$ 개이다.

조건 (가), (나)를 만족시키는 다면체는 각뿔대이므로 구하는 다면체를 n 각뿔대라 하면 조건 (다)에 의하여
 $3n + (n+2) = 26, 4n = 24 \quad \therefore n = 6$, 즉 육각뿔대
따라서 육각뿔대의 꼭짓점의 개수는
 $2 \times 6 = 12$ (개)

06 **Action** 밑면의 대각선의 개수가 14개임을 이용하여 밑면이 어떤 다각형인지 구한다.

주어진 각뿔의 밑면을 n 각형이라 하면
 $\frac{n(n-3)}{2} = 14, n(n-3) = 28$
 $\therefore n = 7$, 즉 칠각형 40%
따라서 주어진 각뿔은 칠각뿔이므로
 $v = 7 + 1 = 8, e = 2 \times 7 = 14$ 40%
 $\therefore v + e = 8 + 14 = 22$ 20%

07 **Action** v, e, f 의 값을 차례로 구한다.

주어진 입체도형의 꼭짓점의 개수는 14개, 모서리의 개수는 21개, 면의 개수는 9개이므로
 $v = 14, e = 21, f = 9$
 $\therefore v - e + f = 14 - 21 + 9 = 2$

08 **Action** 정다면체의 면의 모양과 한 꼭짓점에 모인 면의 개수를 생각해 본다.

⑤ 한 꼭짓점에 모인 면의 개수가 3개인 정다면체는 정사면체, 정육면체, 정십이면체이다.

09 **Action** 조건 (가), (나)를 만족시키는 정다면체를 각각 생각해 본다.

조건 (가)에서 각 면의 모양이 정삼각형인 정다면체는 정사면체, 정팔면체, 정이십면체이다.
조건 (나)에서 한 꼭짓점에 모인 면의 개수가 3개인 정다면체는 정사면체, 정육면체, 정십이면체이다.
따라서 조건 (가), (나)를 모두 만족시키는 정다면체는 정사면체이다.

Lecture


정다면체는 다음과 같이 나눌 수 있다.

- (1) 면의 모양에 따라
① 정삼각형 : 정사면체, 정팔면체, 정이십면체
② 정사각형 : 정육면체
③ 정오각형 : 정십이면체
- (2) 한 꼭짓점에 모이는 면의 개수에 따라
① 3개 : 정사면체, 정육면체, 정십이면체
② 4개 : 정팔면체
③ 5개 : 정이십면체

10 Action 주어진 전개도로 정육면체를 만들어 평행한 면을 찾는다.
주어진 전개도로 정육면체를 만들면 눈의 수가 1인 면과 눈의 수가 6인 면이 평행하므로 평행한 두 면의 눈의 수의 합은 7이다.
따라서 면 A는 눈의 수가 3인 면과 평행하므로 면 A의 눈의 수는 4, 면 B는 눈의 수가 2인 면과 평행하므로 면 B의 눈의 수는 5이다.


11 Action 주어진 전개도로 정육면체를 만들어 본다.

⑤ 오른쪽 그림의 두 면 ㉠, ㉡이 겹치므로 정육면체의 전개도가 아니다.



12 Action 겹치는 꼭짓점을 찾아 주어진 전개도로 만들어지는 정다면체를 그려 본다.

주어진 전개도로 만들어지는 정다면체는 다음 그림과 같은 정팔면체이다.



- (1) \overline{BC} 와 겹치는 모서리는 \overline{FE} 이다.
- (2) \overline{BC} 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 \overline{IA} , $\overline{IJ}(=\overline{IH})$, \overline{DG} , \overline{DH} 이다.

13 Action 면이 12개이므로 주어진 전개도로 만들어지는 정다면체는 정십이면체이다.

- ① 정십이면체이다.
- ② 면 ㉢과 평행한 면은 면 ㉣이다.

14 Action 정사면체의 각 면의 한가운데에 있는 점을 꼭짓점으로 하는 정다면체가 무엇인지 생각해 본다.


정사면체의 면의 개수는 4개이므로 정사면체의 각 면의 한가운데에 있는 점을 꼭짓점으로 하는 정다면체의 꼭짓점의 개수는 4개이다.
따라서 꼭짓점의 개수가 4개인 정다면체는 정사면체이므로 모서리의 개수는 6개이다.

Lecture
정다면체의 각 면의 한가운데에 있는 점을 꼭짓점으로 하는다면체는 처음 정다면체의 면의 개수만큼 꼭짓점을 갖는다.

- ① 정사면체 → 정사면체
- ② 정육면체 → 정팔면체
- ③ 정팔면체 → 정육면체
- ④ 정십이면체 → 정이십면체
- ⑤ 정이십면체 → 정십이면체


15 Action 세 점을 지나는 평면이 정육면체의 모서리와 만나는 다른 한 점을 찾아본다.

오른쪽 그림과 같이 세 점 D, P, F를 지나는 평면은 모서리 HG의 중점 Q를 지난다.
이때 $\overline{DP}=\overline{PF}=\overline{FQ}=\overline{QD}$ 이므로 단면의 모양은 마름모이다.




16 Action 세 점을 지나는 평면이 정사면체의 모서리와 만나는 다른 한 점을 찾아본다.

오른쪽 그림과 같이 세 점 P, Q, R를 지나는 평면은 모서리 BD의 중점 S를 지난다.
이때 $\overline{PQ}=\overline{QR}=\overline{RS}=\overline{SP}$ 이고, $\overline{PR}=\overline{QS}$ 이므로 단면의 모양은 정사각형이다.



17 Action 주어진 도형을 직선 l을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 그려 본다.

③ 주어진 평면도형을 직선 l을 축으로 하여 1회전 시키면 오른쪽 그림과 같은 회전체가 생긴다.




18 Action 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 회전축을 대칭축으로 하는 선대칭도형이다.

- ① 원뿔 — 이등변삼각형

19 Action 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면의 모양을 그려 본다.

회전체는 오른쪽 그림과 같은 원뿔대이므로 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 사다리꼴이다.



∴ (단면의 넓이)

$$= \left\{ \frac{1}{2} \times (5 + 10) \times 12 \right\} \times 2$$


$$= 180 \text{ (cm}^2\text{)} \quad \dots\dots 50\%$$

Lecture
회전체의 겨냥도는 다음 순서대로 그린다.

- ① 회전축을 대칭축으로 하는 선대칭도형을 그린다.
- ② 대응하는 점을 이은 선분을 지름으로 하는 원을 그린다.

20 **Action** 직사각형 ABCD를 대각선 AC를 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 그려 본다.

③ 직사각형 ABCD를 대각선 AC를 축으로 하여 1회전 시키면 오른쪽 그림과 같은 회전체가 생긴다.



21 **Action** 최단 거리는 전개도에서 직선으로 나타난다.

점 A에서 점 B까지 끈으로 연결할 때 끈의 길이가 가장 짧게 되는 경로는 주어진 원기둥의 전개도에서 옆면인 직사각형의 대각선과 같다.


22 **Action** 원뿔의 전개도에서 부채꼴의 호의 길이는 밑면의 둘레의 길이와 같다.

주어진 원뿔의 전개도는 오른쪽 그림과 같으므로 부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라 하면

$$2\pi \times 12 \times \frac{x}{360} = 2\pi \times 5 \quad \dots\dots 50\%$$


$$\frac{x}{15}\pi = 10\pi \quad \therefore x = 150$$

따라서 부채꼴의 중심각의 크기는 150° 이다. $\dots\dots 50\%$



23 **Action** 주어진 전개도로 만들어지는 회전체는 원뿔대이다.

주어진 전개도로 만들어지는 회전체는 원뿔대이다.




따라서 회전체를 한 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양이 아닌 것은 ④이다.

24 **Action** 회전체를 그려 보고, 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 모양을 생각해 본다.

회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때, 자른 단면의 넓이가 가장 큰 경우는 오른쪽 그림과 같이 자를 때이다.

이때 단면인 원의 반지름의 길이를 r cm라 하면

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 4 = \frac{1}{2} \times 5 \times r \quad \therefore r = \frac{12}{5}$$



따라서 구하는 단면의 넓이는

$$\pi \times \left(\frac{12}{5}\right)^2 = \frac{144}{25}\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

최고 수준 완성하기

P 78 - P 80

01 31	02 74	03 150개	04 오각뿔대
05 55	06 정십이면체	07 4	08 ④
09 $(60\pi + 24)$ cm	10 ②	11 48π cm ²	
12 $(16\pi - 32)$ cm ²			

01 **Action** 직육면체의 꼭짓점의 개수는 8개, 모서리의 개수는 12개, 면의 개수는 6개임을 이용한다.

직육면체의 꼭짓점의 개수는 8개, 모서리의 개수는 12개, 면의 개수는 6개이므로

$$v = 8 \times 30 - 29 = 211$$

$$e = 12 \times 30 = 360$$

$$f = 6 \times 30 = 180$$

$$\therefore v - e + f = 211 - 360 + 180 = 31$$

02 **Action** 정육면체의 꼭짓점에서 삼각뿔을 잘라 내면 잘라 낸 부분에 삼각형인 면이 만들어짐을 이용한다.

정육면체의 8개의 꼭짓점에서 삼각뿔을 잘라 내면 잘라 낸 부분에 삼각형인 면이 8개가 생기므로

$$a = 6 + 8 = 14$$

$$b = 8 \times 3 = 24$$

$$c = 12 + 8 \times 3 = 36$$

$$\therefore a + b + c = 14 + 24 + 36 = 74$$

03 **Action** 정오각형의 꼭짓점의 개수와 변의 개수는 각각 5개, 정육각형의 꼭짓점의 개수와 변의 개수는 각각 6개임을 이용한다.

정오각형 12개의 꼭짓점의 개수는

$$5 \times 12 = 60(\text{개})$$

정육각형 20개의 꼭짓점의 개수는

$$6 \times 20 = 120(\text{개})$$

한 꼭짓점에 3개의 면이 모이므로 주어진 입체도형의 꼭짓점의 개수는 $\frac{60 + 120}{3} = 60(\text{개})$ $\dots\dots 40\%$

정오각형 12개의 변의 개수는

$$5 \times 12 = 60(\text{개})$$


정육각형 20개의 변의 개수는

$$6 \times 20 = 120(\text{개})$$

한 모서리에 2개의 면이 모이므로 주어진 입체도형의 모서리의 개수는 $\frac{60+120}{2}=90(\text{개})$ 40%
 따라서 주어진 입체도형의 꼭짓점의 개수와 모서리의 개수의 합은 $60+90=150(\text{개})$ 20%

Lecture

축구공 모양의 다면체는 오른쪽 그림과 같이 정이십면체에서 각 모서리를 삼등분한 점들을 이어서 만든 오각뿔을 잘라 내고 남은 입체도형이다. 정이십면체의 각 꼭짓점에서 정오각형이 한 개씩 생기므로 정오각형의 개수는 12개, 정이십면체의 각 면에서 정육각형이 한 개씩 생기므로 정육각형의 개수는 20개이다. 따라서 축구공 모양의 다면체는 삼십이면체이다.




04 Action 주어진 다각형으로 만들어지는 다면체가 무엇인지 생각해 본다.

주어진 다각형으로 만들어지는 다면체는 오른쪽 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 같은 사각뿔, 사각기둥, 사각뿔이 차례로 붙어 있는 모양이다.

이 입체도형의 꼭짓점의 개수는 10개이므로 구하는 각뿔대를 n 각뿔대라 하면

$$2n=10 \quad \therefore n=5$$

따라서 구하는 각뿔대는 오각뿔대이다.



05 Action 정십이면체의 전개도를 그려 자르지 않아야 하는 모서리의 최대 개수를 생각해 본다.

정팔면체의 꼭짓점의 개수는 6개이므로

$$a=6$$


정이십면체의 모서리의 개수는 30개이므로

$$b=30$$

정십이면체의 모서리의 개수는 30개이지만 정십이면체의 모서리를 잘라 그 전개도를 만들려면 오른쪽 그림과 같이 최대 11개의 모서리는 자르지 않아야 한다.

따라서 잘라야 하는 최소한의 모서리의 개수는 $30-11=19(\text{개})$ 이므로 $c=19$

$$\therefore a+b+c=6+30+19=55$$



06 Action $v=\frac{5}{3}f, e=\frac{5}{2}f$ 를 $v-e+f=2$ 에 대입하여 f 의 값을 구한다.

$$3v=5f \text{에서 } v=\frac{5}{3}f$$

$$2e=5f \text{에서 } e=\frac{5}{2}f$$

$$v-e+f=2 \text{에 } v=\frac{5}{3}f, e=\frac{5}{2}f \text{를 대입하면}$$

$$\frac{5}{3}f - \frac{5}{2}f + f = 2$$

$$10f - 15f + 6f = 12 \quad \therefore f = 12$$

따라서 구하는 정다면체는 면의 개수가 12개인 정십이면체이다.

Lecture

적당히 부풀려서 구와 모양이 같아지게 할 수 있는 다면체에 대하여 꼭짓점의 개수를 v 개, 모서리의 개수를 e 개, 면의 개수를 f 개라 하면 $v-e+f=2$ 가 성립한다. 이 공식을 오일러의 공식이라 한다.

07 Action 주어진 전개도로 만들어지는 정팔면체를 그려 본다.

주어진 전개도로 정팔면체를 만들면 오른쪽 그림과 같다.

평행한 두 면에 적힌 수의 곱이 24로 일정하므로


$$a \times 2 = 24 \quad \therefore a = 12$$

$$b \times 3 = 24 \quad \therefore b = 8$$


$$c \times 4 = 24 \quad \therefore c = 6$$

$$d \times 6 = 24 \quad \therefore d = 4$$

$$\therefore \frac{a}{c} + \frac{b}{d} = \frac{12}{6} + \frac{8}{4} = 4$$




08 Action 정육면체를 평면으로 자른 단면의 모양을 생각해 본다.



따라서 단면의 모양이 될 수 없는 것은 ④이다.

Lecture

이 외에도 정육면체를 평면으로 자른 단면은 다음과 같다.



09 Action 주어진 원뿔대의 전개도를 그려 본다.

주어진 원뿔대의 전개도는

오른쪽 그림과 같다.

(작은 원의 둘레의 길이)

$$= 2\pi \times 5 = 10\pi \text{ (cm)}$$

(큰 원의 둘레의 길이)


$$= 2\pi \times 10 = 20\pi \text{ (cm)}$$

(옆면의 둘레의 길이) = $2\pi \times 5 + 2\pi \times 10 + 12 \times 2$

$$= 30\pi + 24 \text{ (cm)}$$

따라서 전개도의 둘레의 길이는

$$10\pi + 20\pi + (30\pi + 24) = 60\pi + 24 \text{ (cm)}$$




10 Action 주어진 도형을 직선 l을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 도형을 그려 본다.

주어진 도형을 직선 l을 축으로 하여 1회전 시키면 오른쪽 그림과 같은 도형이 생긴다.


이 도형에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 도형의 폭이 점점 좁아지므로 물의 높이는 점점 빠르게 증가한다.

따라서 두 변수 x, y 사이의 관계를 나타낸 그래프로 가장 알맞은 것은 ②이다.



11 Action 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 모양을 그려 본다.

회전체와 회전체를 원의 중심 O를 지나면서 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면은 다음 그림과 같다.



∴ (단면의 넓이) = (큰 원의 넓이) - (작은 원의 넓이)

$$= \pi \times 8^2 - \pi \times 4^2$$

$$= 48\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$


12 Action 원뿔의 색칠한 부분을 전개도에 나타내어 본다.

주어진 원뿔의 색칠한 부분을 전개도에 나타내면 오른쪽 그림의 색칠한 부분과 같다. …… 20%

부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라 하면

$$2\pi \times 8 \times \frac{x}{360} = 2\pi \times 2$$

$$\frac{2x}{45}\pi = 4\pi \quad \therefore x = 90$$



…… 40%

∴ (색칠한 부분의 넓이)

$$= (\text{부채꼴 OAA'의 넓이}) - \triangle OAA'$$

$$= \pi \times 8^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 8 \times 8$$

$$= 16\pi - 32 \text{ (cm}^2\text{)}$$

…… 40%

최고 수준 뛰어넘기

P 81 - P 82

- 01 최댓값 : 18, 최솟값 : 15 02 오각형 03 8개
- 04 30개 05 24 06 36개

01 Action 다각형이 만들어지기 위해서는 3개 이상의 선분이 필요하므로 m, n은 3 이상의 자연수이어야 한다.


m각기둥의 모서리의 개수는 3m개, n각뿔대의 꼭짓점의 개수는 2n개이므로 $3m + 2n = 40$ …… ㉠

이때 $m \geq 3, n \geq 3$ 이므로 ㉠을 만족시키는 두 자연수 m, n은 $m=4, n=14$ 또는 $m=6, n=11$ 또는 $m=8, n=8$ 또는 $m=10, n=5$

따라서 m+n의 최댓값은 $4+14=18$, 최솟값은 $10+5=15$ 이다.

02 Action 세 점을 지나는 평면이 정육면체의 모서리와 만나는 다른 점을 찾아본다.

주어진 전개도를 접어서 정육면체를 만든 후 세 점 P, Q, F를 지나는 평면으로 잘랐을 때 생기는 단면은 오른쪽 그림과 같은 오각형이다.



03 Action 주어진 정육면체의 각 꼭짓점마다 정삼각형을 3개씩 만들 수 있다.

주어진 정육면체의 꼭짓점 A에서는 정삼각형 AFC, AFH, ACH를 만들 수 있고, 꼭짓점 B에서는 정삼각형 BGD, BGE, BDE를 만들 수 있다.

이와 같이 정육면체의 각 꼭짓점마다 정삼각형을 3개씩 만들 수 있으므로 8개의 꼭짓점에서 만들 수 있는 정삼각형의 개수는 모두 $8 \times 3 = 24$ (개)이다.

그런데 정삼각형의 꼭짓점은 3개이므로 같은 정삼각형이 3번씩 중복된다.

따라서 정삼각형은 모두 $24 \div 3 = 8$ (개)를 만들 수 있다.

04 **Action** 주어진 다면체의 한 모서리에는 2개의 면이 모이고, 한 꼭짓점에는 3개의 면이 모인다.

정사각형의 개수를 a 개라 하면
한 모서리에 2개의 면이 모이고, 그 개수가 36개이므로

$$\frac{6 \times 8 + 4 \times a}{2} = 36, 48 + 4a = 72$$

$$4a = 24 \quad \therefore a = 6$$

즉 정사각형의 개수는 6개이다.
이때 한 꼭짓점에 3개의 면이 모이므로 꼭짓점의 개수는

$$\frac{6 \times 8 + 4 \times 6}{3} = \frac{72}{3} = 24(\text{개})$$

따라서 정사각형의 개수와 꼭짓점의 개수의 합은
 $6 + 24 = 30(\text{개})$

05 **Action** 원뿔대의 전개도에서 옆면의 짧은 호의 길이는 작은 원의 둘레의 길이와 같고, 긴 호의 길이는 큰 원의 둘레의 길이와 같다.

오른쪽 그림에서
 $2\pi b \times \frac{90}{360} = 2\pi r$ 이므로

$$r = \frac{1}{4}b$$

$2\pi(a+b) \times \frac{90}{360} = 2\pi R$ 이므로


$$R = \frac{1}{4}(a+b)$$

이때 $R - r = 6$ 이므로

$$\frac{1}{4}(a+b) - \frac{1}{4}b = 6$$

$$\frac{1}{4}a = 6 \quad \therefore a = 24$$

따라서 원뿔대의 모선의 길이는 24이다.



06 **Action** 정이십면체의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 구해 본다.


정이십면체의 꼭짓점의 개수는 12개이다.

오른쪽 그림과 같이 정이십면체의 한 꼭짓점 A에서 다른 꼭짓점으로 선분을 그을 때, 정이십면체의 면에 포함되는 경우는 빨간색으로 나타낸 선분 5개이다.

또, 자기 자신에는 선분을 그을 수 없으므로 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $12 - (5 + 1) = 6(\text{개})$ 이다.

따라서 정이십면체의 대각선의 개수는

$$\frac{12 \times 6}{2} = 36(\text{개})$$



2. 입체도형의 겉넓이와 부피

최고 수준 입문하기

84 - 88

- 01 5 cm 02 $42\pi \text{ cm}^2$ 03 (1) 45 cm^2 (2) 360 cm^3
- 04 $171\pi \text{ cm}^3$ 05 겉넓이 : $(52\pi + 60) \text{ cm}^2$, 부피 : $60\pi \text{ cm}^3$
- 06 292 cm^2 07 (1) 264 cm^2 (2) 248 cm^3 08 $520\pi \text{ cm}^3$
- 09 $\frac{54}{49} \text{ cm}$ 10 126 cm^2 11 5 12 10 cm
- 13 $85\pi \text{ cm}^2$ 14 72 cm^3 15 8 cm 16 $\frac{32}{3} \text{ cm}^3$
- 17 50 cm^3 18 $\frac{8}{3}$ 19 27분
- 20 (1) $90\pi \text{ cm}^2$ (2) $84\pi \text{ cm}^3$ 21 $448\pi \text{ cm}^3$ 22 $500\pi \text{ cm}^2$
- 23 $32\pi \text{ cm}^2$ 24 $30\pi \text{ cm}^3$ 25 $16\pi \text{ cm}^2$ 26 64개
- 27 겉넓이 : $119\pi \text{ cm}^2$, 부피 : $168\pi \text{ cm}^3$
- 28 원뿔 : $9\pi \text{ cm}^3$, 원기둥 : $27\pi \text{ cm}^3$ 29 $288\pi \text{ cm}^3$
- 30 $64\pi \text{ cm}^2$

01 **Action** (정육면체의 겉넓이) = (한 면의 넓이) \times 6임을 이용한다.

정육면체의 한 모서리의 길이를 $x \text{ cm}$ 라 하면
 $(x \times x) \times 6 = 150, x^2 = 25 \quad \therefore x = 5 (\because x > 0)$
따라서 정육면체의 한 모서리의 길이는 5 cm이다.

02 **Action** 원기둥의 밑면의 둘레의 길이는 전개도에서 직사각형의 가로 길이와 같다.

밑면의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라 하면
 $2\pi r = 6\pi \quad \therefore r = 3$
 $\therefore (\text{겉넓이}) = (\pi \times 3^2) \times 2 + 6\pi \times 4$
 $= 18\pi + 24\pi = 42\pi (\text{cm}^2)$

03 **Action** 밑면인 사각형의 넓이는 두 삼각형의 넓이의 합과 같다.

$$(1) (\text{밑넓이}) = \frac{1}{2} \times 10 \times 6 + \frac{1}{2} \times 10 \times 3$$

$$= 45 (\text{cm}^2) \quad \dots\dots 50\%$$

$$(2) (\text{부피}) = 45 \times 8 = 360 (\text{cm}^3) \quad \dots\dots 50\%$$

04 **Action** 입체도형의 부피는 두 원기둥의 부피의 합과 같다.

$$(\text{부피}) = (\pi \times 6^2) \times 4 + (\pi \times 3^2) \times 3$$

$$= 144\pi + 27\pi = 171\pi (\text{cm}^3)$$

05 **Action** 주어진 입체도형은 밑면이 부채꼴인 기둥이다.

(겉넓이)

$$= \left(\pi \times 3^2 \times \frac{240}{360}\right) \times 2 + \left(2\pi \times 3 \times \frac{240}{360} + 3 + 3\right) \times 10$$

$$= 12\pi + 40\pi + 60 = 52\pi + 60 (\text{cm}^2)$$

(부피) = $\left(\pi \times 3^2 \times \frac{240}{360}\right) \times 10 = 60\pi (\text{cm}^3)$

06 **Action** 주어진 입체도형은 큰 직육면체의 가운데에 작은 직육면체 모양으로 구멍이 뚫려 있는 것이다.

$$\begin{aligned} (\text{겉넓이}) &= (5 \times 6 - 2 \times 2) \times 2 + (5 + 6 + 5 + 6) \times 8 \\ &\quad + (2 + 2 + 2 + 2) \times 8 \\ &= 52 + 176 + 64 \\ &= 292 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

Lecture

$$\begin{aligned} &(\text{구멍이 뚫린 기둥의 겉넓이}) \\ &= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이}) \\ &= \{(\text{큰 기둥의 밑넓이}) - (\text{작은 기둥의 밑넓이})\} \times 2 \\ &\quad + (\text{큰 기둥의 옆넓이}) + (\text{작은 기둥의 옆넓이}) \end{aligned}$$

07 **Action** 잘라 내고 남은 입체도형의 겉넓이는 잘라 내기 전의 직육면체의 겉넓이와 같다.

(1) 주어진 입체도형의 겉넓이는 가로, 세로의 길이가 각각 6 cm, 높이가 8 cm인 직육면체의 겉넓이와 같으므로

$$\begin{aligned} (\text{겉넓이}) &= (6 \times 6) \times 2 + (6 + 6 + 6 + 6) \times 8 \\ &= 72 + 192 \\ &= 264 \text{ (cm}^2\text{)} \quad \dots\dots 50\% \end{aligned}$$

(2) (부피) = (큰 직육면체의 부피) - (작은 직육면체의 부피)

$$\begin{aligned} &= (6 \times 6) \times 8 - (4 \times 2) \times 5 \\ &= 288 - 40 \\ &= 248 \text{ (cm}^3\text{)} \quad \dots\dots 50\% \end{aligned}$$

Lecture


오른쪽 그림은 직육면체에서 작은 직육면체를 잘라 낸 입체도형이다.

① (잘라 내고 남은 입체도형의 겉넓이) = (잘라 내기 전의 직육면체의 겉넓이)

참고 잘린 부분의 면을 이동하여 생각한다.

② (잘라 내고 남은 입체도형의 부피) = (잘라 내기 전의 직육면체의 부피)


- (잘라 낸 직육면체의 부피)



08 **Action** 주어진 도형을 직선 l 을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 그려 본다.

회전체는 오른쪽 그림과 같다.

$$\begin{aligned} \therefore (\text{부피}) &= (\pi \times 9^2) \times 8 - (\pi \times 4^2) \times 8 \\ &= 648\pi - 128\pi \\ &= 520\pi \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$



Lecture

$$\begin{aligned} &(\text{구멍이 뚫린 기둥의 부피}) \\ &= (\text{큰 기둥의 부피}) - (\text{작은 기둥의 부피}) \end{aligned}$$

09 **Action** 줄어든 물의 부피는 정육면체의 부피와 같음을 이용한다.

물의 높이가 x cm 낮아진다고 하면

$$\left(\frac{1}{2} \times 7 \times 7\right) \times x = (3 \times 3) \times 3$$

$$\frac{49}{2}x = 27 \quad \therefore x = \frac{54}{49}$$

따라서 물의 높이는 $\frac{54}{49}$ cm 낮아진다.

10 **Action** 주어진 입체도형에서 맞닿아 있는 면은 2쌍, 즉 4개이다.

한 모서리의 길이가 3 cm인 정육면체 1개의 겉넓이는

$$(3 \times 3) \times 6 = 54 \text{ (cm}^2\text{)}$$

주어진 입체도형에서 맞닿아 있는 면은 4개이므로 구하는 겉넓이는

$$54 \times 3 - (3 \times 3) \times 4 = 162 - 36 = 126 \text{ (cm}^2\text{)}$$

11 **Action** 주어진 사각뿔의 옆넓이는 합동인 이등변삼각형 4개의 넓이의 합과 같다.

사각뿔의 겉넓이가 144 cm^2 이므로

$$8 \times 8 + \left(\frac{1}{2} \times 8 \times h\right) \times 4 = 144$$

$$64 + 16h = 144, 16h = 80 \quad \therefore h = 5$$

12 **Action** 모선의 길이를 l cm라 하고, 원뿔의 겉넓이를 l 을 사용한 식으로 나타낸다.

모선의 길이를 l cm라 하면

$$\pi \times 4^2 + \pi \times 4 \times l = 56\pi, 16\pi + 4\pi l = 56\pi$$

$$4\pi l = 40\pi \quad \therefore l = 10$$


따라서 모선의 길이는 10 cm이다.

Lecture

원뿔의 옆넓이는 전개도에서 부채꼴의 넓이와 같으므로 (원뿔의 옆넓이)

$$= \frac{1}{2} \times (\text{부채꼴의 반지름의 길이}) \times (\text{부채꼴의 호의 길이})$$

$$= \frac{1}{2} \times l \times 2\pi r = \pi r l$$



13 **Action** 원뿔의 전개도에서 밑면의 둘레의 길이는 부채꼴의 호의 길이와 같다.


밑면의 반지름의 길이를 r cm라 하면

$$2\pi \times 12 \times \frac{150}{360} = 2\pi r, 10\pi = 2\pi r \quad \therefore r = 5$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{겉넓이}) &= \pi \times 5^2 + \pi \times 5 \times 12 \\ &= 25\pi + 60\pi \\ &= 85\pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

14 **Action** 주어진 정사각형 ABCD로 만든 입체도형을 그려 본다.

주어진 정사각형 ABCD로 만든 입체도형은 오른쪽 그림과 같이 밑면이 $\triangle ECF$ 이고 높이가 \overline{AB} 인 삼각뿔이다.



$$\therefore (\text{부피}) = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 6 \right) \times 12 = 72 \text{ (cm}^3\text{)}$$

15 **Action** 두 그릇에 담긴 물의 부피가 서로 같음을 이용한다.

원기둥 모양의 그릇에 채워진 물의 높이를 h cm라 하면 $\frac{1}{3} \times (\pi \times 4^2) \times 6 = (\pi \times 2^2) \times h, 32\pi = 4\pi h \quad \therefore h = 8$ 따라서 원기둥 모양의 그릇에 채워진 물의 높이는 8 cm이다.

16 **Action** 사각뿔의 밑면의 넓이는 정육면체의 한 면의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이다.

사각뿔의 밑면의 넓이는 정육면체의 한 면의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$(\text{밑넓이}) = (4 \times 4) \times \frac{1}{2} = 8 \text{ (cm}^2\text{)}$$

이때 사각뿔의 높이는 정육면체의 한 모서리의 길이와 같으므로 4 cm이다.

$$\therefore (\text{부피}) = \frac{1}{3} \times 8 \times 4 = \frac{32}{3} \text{ (cm}^3\text{)}$$

17 **Action** 주어진 입체도형은 직육면체에서 삼각뿔을 잘라 낸 것이다.

$$\begin{aligned} (\text{부피}) &= (\text{직육면체의 부피}) - (\text{잘라 낸 삼각뿔의 부피}) \\ &= (4 \times 3) \times 5 - \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 3 \right) \times 5 \\ &= 60 - 10 = 50 \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

18 **Action** 두 그릇에 담긴 물의 부피가 서로 같음을 이용한다.

A 그릇에 들어 있는 물의 부피는 $\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 5 \right) \times 8 = 20 \text{ (cm}^3\text{)} \quad \dots\dots 30\%$

B 그릇에 들어 있는 물의 부피는 $\left(\frac{1}{2} \times 5 \times x \right) \times 3 = \frac{15}{2}x \text{ (cm}^3\text{)} \quad \dots\dots 40\%$

이때 두 그릇에 같은 양의 물이 들어 있으므로 $\frac{15}{2}x = 20 \quad \therefore x = \frac{8}{3} \quad \dots\dots 30\%$

19 **Action** 빈 그릇에 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간은 $\frac{(\text{그릇의 부피})}{4\pi}$

임을 이용한다.

$$\text{그릇의 부피는 } \frac{1}{3} \times (\pi \times 6^2) \times 9 = 108\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

1분에 $4\pi \text{ cm}^3$ 씩 물을 넣으므로 빈 그릇에 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간은 $\frac{108\pi}{4\pi} = 27$ (분)


20 **Action** (원뿔대의 옆넓이) = (큰 원뿔의 옆넓이) - (작은 원뿔의 옆넓이)임을 이용한다.

$$\begin{aligned} (1) (\text{겉넓이}) &= \pi \times 3^2 + \pi \times 6^2 + (\pi \times 6 \times 10 - \pi \times 3 \times 5) \\ &= 9\pi + 36\pi + 45\pi \\ &= 90\pi \text{ (cm}^2\text{)} \quad \dots\dots 50\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{부피}) &= \frac{1}{3} \times (\pi \times 6^2) \times 8 - \frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 4 \\ &= 96\pi - 12\pi \\ &= 84\pi \text{ (cm}^3\text{)} \quad \dots\dots 50\% \end{aligned}$$


Lecture

- ① (원뿔대의 겉넓이) = (두 밑넓이의 합) + (옆넓이)
이때 (옆넓이) = (큰 원뿔의 옆넓이) - (작은 원뿔의 옆넓이)
- ② (원뿔대의 부피) = (큰 원뿔의 부피) - (작은 원뿔의 부피)



21 **Action** 주어진 도형을 회전시킬 때 생기는 입체도형은 원뿔 2개를 붙여 놓은 것과 같다.

입체도형은 오른쪽 그림과 같다. 입체도형에서 위쪽 원뿔의 높이를 h_1 cm, 아래쪽 원뿔의 높이를 h_2 cm라 하면



$$\begin{aligned} (\text{부피}) &= \frac{1}{3} \times (\pi \times 8^2) \times h_1 \\ &\quad + \frac{1}{3} \times (\pi \times 8^2) \times h_2 \\ &= \frac{64}{3} \pi h_1 + \frac{64}{3} \pi h_2 = \frac{64}{3} \pi (h_1 + h_2) \\ &= \frac{64}{3} \pi \times 21 = 448\pi \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

22 **Action** 원 O의 둘레의 길이는 원뿔의 밑면의 둘레의 길이의 4배이다.

원뿔의 밑면의 둘레의 길이는 $2\pi \times 10 = 20\pi$ (cm)

원뿔의 모선의 길이를 l cm라 하면

$$\begin{aligned} 20\pi \times 4 &= 2\pi l, 80\pi = 2\pi l \quad \therefore l = 40 \\ \therefore (\text{원뿔의 겉넓이}) &= \pi \times 10^2 + \pi \times 10 \times 40 \\ &= 100\pi + 400\pi \\ &= 500\pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

23 **Action** 가족 조각 1개의 넓이는 야구공의 겉넓이의 $\frac{1}{2}$ 배이다.

$$(\text{야구공의 겉넓이}) = 4\pi \times 4^2 = 64\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\therefore (\text{가족 조각 1개의 넓이}) = 64\pi \times \frac{1}{2} = 32\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

24 **Action** (반구의 부피)=(구의 부피) $\times\frac{1}{2}$ 임을 이용한다.

$$\begin{aligned} \text{(부피)} &= \text{(원뿔의 부피)} + \text{(반구의 부피)} \\ &= \frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 4 + \frac{4}{3} \pi \times 3^3 \times \frac{1}{2} \\ &= 12\pi + 18\pi \\ &= 30\pi \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

25 **Action** 주어진 입체도형의 구면의 넓이가 구의 겹넓이의 몇 배인지 생각해 본다.

$$\begin{aligned} \text{(겹넓이)} &= 4\pi \times 2^2 \times \frac{3}{4} + \left(\pi \times 2^2 \times \frac{1}{2}\right) \times 2 \\ &= 12\pi + 4\pi \\ &= 16\pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

26 **Action** 반지름의 길이가 12 cm, 3 cm인 쇠공의 부피를 각각 구해 본다.

반지름의 길이가 12 cm인 쇠공의 부피는

$$\frac{4}{3}\pi \times 12^3 = 2304\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

반지름의 길이가 3 cm인 쇠공의 부피는

$$\frac{4}{3}\pi \times 3^3 = 36\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

따라서 반지름의 길이가 3 cm인 쇠공을 최대


$$\frac{2304\pi}{36\pi} = 64 \text{ (개)} \text{ 만들 수 있다.}$$

27 **Action** 주어진 도형을 직선 l 을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은 반구와 원기둥으로 이루어진다.

입체도형은 오른쪽 그림과 같다.

$$\begin{aligned} \therefore \text{(겹넓이)} &= 4\pi \times 3^2 \times \frac{1}{2} + (\pi \times 5^2 - \pi \times 3^2) \\ &\quad + 2\pi \times 5 \times 6 + \pi \times 5^2 \\ &= 18\pi + 16\pi + 60\pi + 25\pi \\ &= 119\pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(부피)} &= \frac{4}{3}\pi \times 3^3 \times \frac{1}{2} + (\pi \times 5^2) \times 6 \\ &= 18\pi + 150\pi \\ &= 168\pi \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$



28 **Action** 구의 반지름의 길이를 r cm라 하고, 구, 원뿔, 원기둥의 부피를 각각 r 를 사용한 식으로 나타낸다.

구의 반지름의 길이를 r cm라 하면

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = 18\pi \quad \therefore r^3 = \frac{27}{2} \quad \dots\dots 40\%$$

$$\begin{aligned} \text{(원뿔의 부피)} &= \frac{1}{3} \times \pi r^2 \times 2r = \frac{2}{3}\pi r^3 \\ &= \frac{2}{3}\pi \times \frac{27}{2} = 9\pi \text{ (cm}^3\text{)} \quad \dots\dots 30\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(원기둥의 부피)} &= \pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3 \\ &= 2\pi \times \frac{27}{2} = 27\pi \text{ (cm}^3\text{)} \quad \dots\dots 30\% \end{aligned}$$

다른 풀이

(원뿔의 부피) : (구의 부피) : (원기둥의 부피) = 1 : 2 : 3이고, 구의 부피가 $18\pi \text{ cm}^3$ 이므로

$$\begin{aligned} \text{(원뿔의 부피)} &= \text{(구의 부피)} \times \frac{1}{2} \\ &= 18\pi \times \frac{1}{2} = 9\pi \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(원기둥의 부피)} &= \text{(구의 부피)} \times \frac{3}{2} \\ &= 18\pi \times \frac{3}{2} = 27\pi \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

29 **Action** 구의 반지름의 길이를 r cm라 하고, 원기둥의 부피를 r 를 사용한 식으로 나타낸다.

구의 반지름의 길이를 r cm라 하면 원기둥의 밑면의 반지름의 길이는 r cm, 높이는 $6r$ cm이므로

$$\pi r^2 \times 6r = 1296\pi, \quad 6\pi r^3 = 1296\pi$$

$$r^3 = 216 \quad \therefore r = 6$$

따라서 구의 반지름의 길이는 6 cm이므로 구 1개의 부피는

$$\frac{4}{3}\pi \times 6^3 = 288\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

30 **Action** 정육면체에 구가 꼭 맞게 들어 있으므로 정육면체의 한 모서리의 길이는 구의 지름의 길이와 같다.

정육면체의 한 모서리의 길이를 x cm라 하면

$$(x \times x) \times x = 512, \quad x^3 = 512$$

$$\therefore x = 8$$

따라서 정육면체의 한 모서리의 길이는 8 cm이므로 구의 반지름의 길이는 4 cm이다.

$$\therefore \text{(구의 겹넓이)} = 4\pi \times 4^2 = 64\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

최고 수준 완성하기

01 432 cm^2 02 270 cm^2 03 $(56\pi - 32) \text{ cm}^2$

04 400 cm^3 05 $\left(\frac{125}{2}\pi - 125\right) \text{ cm}^3$ 06 72 cm^3

07 3 cm 08 겹넓이 : $(72\pi + 60) \text{ cm}^2$, 부피 : $80\pi \text{ cm}^3$

09 2 cm 10 $\frac{31}{3}\pi$ 11 $2016\pi \text{ cm}^3$ 12 7 : 8 : 12

01 **Action** 27개의 작은 정육면체의 겹넓이의 합에서 색이 칠해진 면의 넓이의 합을 뺀다.

정육면체의 겹넓이는 $(6 \times 6) \times 6 = 216 \text{ (cm}^2\text{)}$ 이므로 색이 칠해진 면의 넓이의 합은 216 cm^2 이다.

한편 작은 정육면체의 한 모서리의 길이는 2 cm 이므로 27개의 작은 정육면체의 겹넓이의 합은

$$\{(2 \times 2) \times 6\} \times 27 = 648 \text{ (cm}^2\text{)}$$

따라서 색이 칠해져 있지 않은 면의 넓이의 합은

$$648 - 216 = 432 \text{ (cm}^2\text{)}$$

02 **Action** 13개의 직육면체의 겹넓이의 합은 정육면체의 겹넓이와 새로 생긴 면의 넓이의 합을 더한 것과 같다.

정육면체의 겹넓이는

$$(3 \times 3) \times 6 = 54 \text{ (cm}^2\text{)} \quad \dots\dots 30\%$$

새로 생긴 면의 넓이의 합은


$$(3 \times 3) \times 12 \times 2 = 216 \text{ (cm}^2\text{)} \quad \dots\dots 50\%$$

따라서 13개의 직육면체의 겹넓이의 합은

$$54 + 216 = 270 \text{ (cm}^2\text{)} \quad \dots\dots 20\%$$

03 **Action** 색칠한 입체도형의 밑넓이를 먼저 구한다.

색칠한 입체도형의 밑넓이는 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 4 cm , 중심각의 크기가 90° 인 부채꼴의 넓이에서 직각삼각형의 넓이를 뺀 것의 2배이므로



$$\begin{aligned} \text{(밑넓이)} &= \left(\pi \times 4^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \right) \times 2 \\ &= (4\pi - 8) \times 2 \\ &= 8\pi - 16 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

\therefore (색칠한 입체도형의 겹넓이)

$$\begin{aligned} &= (8\pi - 16) \times 2 + \left\{ \left(2\pi \times 4 \times \frac{90}{360} \right) \times 10 \right\} \times 2 \\ &= 16\pi - 32 + 40\pi \\ &= 56\pi - 32 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

04 **Action** 주어진 입체도형의 겹넓이는 잘라 내기 전의 직육면체의 겹넓이와 같다.

주어진 입체도형의 겹넓이는 잘라 내기 전의 직육면체의 겹넓이와 같으므로 잘라 내기 전의 직육면체의 가로, 세로의 길이와 높이를 각각 $5a \text{ cm}$, $3a \text{ cm}$, $4a \text{ cm}$ ($a > 0$)라 하면

$$(5a \times 3a) \times 2 + (5a + 3a + 5a + 3a) \times 4a = 376$$


$$30a^2 + 64a^2 = 376, 94a^2 = 376$$

$$a^2 = 4 \quad \therefore a = 2 \text{ (} \because a > 0 \text{)}$$

따라서 잘라 내기 전의 직육면체의 가로, 세로의 길이와 높이가 각각 10 cm , 6 cm , 8 cm 이므로 주어진 입체도형의 부피는 $10 \times 6 \times 8 - 80 = 480 - 80 = 400 \text{ (cm}^3\text{)}$

05 **Action** 통에 남은 물의 밑면의 모양을 그려 본다.

통에 남은 물의 밑면은 오른쪽 그림의 색칠한 부분과 같으므로 남은 물의 양은



$$\begin{aligned} & \left(\pi \times 5^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 5 \times 5 \right) \times 10 \\ &= \left(\frac{25}{4} \pi - \frac{25}{2} \right) \times 10 \\ &= \frac{125}{2} \pi - 125 \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

06 **Action** 삼각뿔 C-AFH의 부피는 정육면체의 부피에서 네 삼각뿔 A-EFH, C-ABF, C-FGH, C-AHD의 부피를 뺀 것과 같다.

$$\begin{aligned} \text{(부피)} &= \text{(정육면체의 부피)} - \text{(삼각뿔 C-FGH의 부피)} \times 4 \\ &= (6 \times 6) \times 6 - \left\{ \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 6 \right) \times 6 \right\} \times 4 \\ &= 216 - 144 \\ &= 72 \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

07 **Action** 정팔면체의 부피는 사각뿔의 부피의 2배와 같다.

정육면체의 한 모서리의 길이를 $a \text{ cm}$ 라 하면 정팔면체의 부피는 밑면이 대각선의 길이가 $a \text{ cm}$ 인 정사각형이고, 높이가 $\frac{1}{2} a \text{ cm}$ 인 사각뿔의 부피의 2배와 같다. $\dots\dots 30\%$

$$\begin{aligned} \text{(정팔면체의 부피)} &= \text{(사각뿔의 부피)} \times 2 \\ &= \left\{ \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times a \times a \right) \times \frac{1}{2} a \right\} \times 2 \\ &= \frac{1}{6} a^3 \text{ (cm}^3\text{)} \quad \dots\dots 30\% \end{aligned}$$

이때 정팔면체의 부피가 $\frac{9}{2} \text{ cm}^3$ 이므로

$$\frac{1}{6} a^3 = \frac{9}{2}, a^3 = 27$$

$$\therefore a = 3 \quad \dots\dots 30\%$$

따라서 정육면체의 한 모서리의 길이는 3 cm 이다. $\dots\dots 10\%$

Lecture

정팔면체를 두 개의 사각뿔로 나누면 두 사각뿔은 크기와 모양이 같다. 사각뿔의 밑면인 사각형의 각 변은 정팔면체의 모서리이므로 네 변의 길이는 모두 같다. 또 사각뿔의 밑면인 사각형의 두 대각선은 정육면체의 한 모서리의 길이이므로 그 길이가 같다. 따라서 나누어진 사각뿔은 밑면이 정사각형인 사각뿔이다.

08 **Action** 반지름의 길이가 r , 호의 길이가 l 인 부채꼴의 넓이는 $\frac{1}{2}rl$ 이다.

주어진 입체도형의 밑면의 중심각의 크기는 $360^\circ - 72^\circ = 288^\circ$ 이므로

$$(\text{밑넓이}) = \pi \times 5^2 \times \frac{288}{360} = 20\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$(\text{옆넓이}) = \frac{1}{2} \times 13 \times \left(2\pi \times 5 \times \frac{288}{360} \right) + \left(\frac{1}{2} \times 5 \times 12 \right) \times 2 = 52\pi + 60 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\therefore (\text{겉넓이}) = 20\pi + (52\pi + 60) = 72\pi + 60 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$(\text{부피}) = \left[\frac{1}{3} \times (\pi \times 5^2) \times 12 \right] \times \frac{288}{360} = 80\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

09 **Action** \overline{PE} 의 길이를 x cm라 하고, V_1 과 V_2 를 각각 x 를 사용한 식으로 나타낸다.

$$(\text{삼각기둥의 부피}) = \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 4 \right) \times 5 = 40 \text{ (cm}^3\text{)}$$

꼭짓점 B를 포함하는 입체도형은 밑면이 $\triangle ABC$ 이고 높이가 \overline{BP} 인 삼각뿔이다.

$\overline{PE} = x$ cm라 하면 $\overline{BP} = (5-x)$ cm이므로

$$V_2 = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 4 \right) \times (5-x) = \frac{40}{3} - \frac{8}{3}x \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$V_1 = 40 - \left(\frac{40}{3} - \frac{8}{3}x \right) = \frac{80}{3} + \frac{8}{3}x \text{ (cm}^3\text{)}$$


이때 $V_1 = 4V_2$ 이므로

$$\frac{80}{3} + \frac{8}{3}x = 4 \left(\frac{40}{3} - \frac{8}{3}x \right), 80 + 8x = 160 - 32x$$

$$40x = 80 \quad \therefore x = 2$$

따라서 \overline{PE} 의 길이는 2 cm이다.

10 **Action** 주어진 사각형 ABCD를 회전시킬 때 생기는 입체도형을 그려 본다.



입체도형은 위의 그림과 같으므로 구하는 입체도형의 부피는 사각형 EFCD를 회전시킨 입체도형의 부피에서 사각형 EFBA를 회전시킨 입체도형의 부피를 뺀 것과 같다.

(사각형 EFCD를 회전시킨 입체도형의 부피)

$$= (\pi \times 2^2) \times 3 + \frac{1}{3} \times (\pi \times 2^2) \times 2 = 12\pi + \frac{8}{3}\pi = \frac{44}{3}\pi$$


(사각형 EFBA를 회전시킨 입체도형의 부피)

$$= (\pi \times 1^2) \times 4 + \frac{1}{3} \times (\pi \times 1^2) \times 1 = 4\pi + \frac{1}{3}\pi = \frac{13}{3}\pi$$

$$\therefore (\text{부피}) = \frac{44}{3}\pi - \frac{13}{3}\pi = \frac{31}{3}\pi$$

11 **Action** 공이 움직일 수 있는 공간을 그려 본다.

공이 움직일 수 있는 공간의 최대 부피는 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 12 cm인 구의 $\frac{7}{8}$ 이다.



따라서 공이 움직일 수 있는 공간의 최대 부피는

$$\frac{4}{3}\pi \times 12^3 \times \frac{7}{8} = 2016\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

12 **Action** 원뿔대, 반구, 원기둥의 부피를 각각 r 에 대한 식으로 나타낸다.

원뿔대의 부피를 V_1 , 반구의 부피를 V_2 , 원기둥의 부피를 V_3 이라 하면

$$V_1 = \frac{1}{3} \times \pi r^2 \times 2r - \frac{1}{3} \times \pi \times \left(\frac{1}{2}r \right)^2 \times r = \frac{2}{3}\pi r^3 - \frac{1}{12}\pi r^3 = \frac{7}{12}\pi r^3$$

$$V_2 = \frac{4}{3}\pi r^3 \times \frac{1}{2} = \frac{2}{3}\pi r^3$$

$$V_3 = \pi r^2 \times r = \pi r^3$$

$$\therefore V_1 : V_2 : V_3 = \frac{7}{12}\pi r^3 : \frac{2}{3}\pi r^3 : \pi r^3 = 7 : 8 : 12$$

최고 수준 뛰어넘기


P 92 - P 93

01 402 cm^2 **02** 768 cm^2 **03** $\left(\frac{15}{4}\pi + 102 \right) \text{ cm}^2$

04 385 cm^3 **05** $\frac{27}{16}a$ **06** $234\pi \text{ cm}^3$

01 **Action** 겉넓이가 최소가 되는 입체도형을 그려 본다.

세 정육면체의 모서리의 길이는 각각 2 cm, 5 cm, 7 cm이고, 입체도형이 오른쪽 그림과 같을 때 겉넓이가 최소가 된다.



$$\begin{aligned} \therefore (\text{겉넓이의 최솟값}) &= (2 \times 2 + 5 \times 5 + 7 \times 7) \times 6 \\ &\quad - (2 \times 2) \times 4 - (5 \times 5) \times 2 \\ &= 468 - 16 - 50 \\ &= 402 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

02 Action (입체도형의 겉넓이)=(외부의 6개의 면의 넓이)+(6개의 구멍의 겉넓이)임을 이용한다.


$$\begin{aligned} (\text{외부의 6개의 면의 넓이}) &= (10 \times 10 - 2 \times 2) \times 6 \\ &= 96 \times 6 \\ &= 576 \text{ (cm}^2\text{)} \\ (\text{6개의 구멍의 겉넓이}) &= \{(2 \times 4) \times 4\} \times 6 \\ &= 192 \text{ (cm}^2\text{)} \\ \therefore (\text{겉넓이}) &= 576 + 192 = 768 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

03 Action 입체도형을 그려 본다.

입체도형은 오른쪽 그림과 같다.

(밑넓이)

$$\begin{aligned} &= 7 \times 3 - \pi \times \left(\frac{5}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} \\ &= 21 - \frac{25}{8}\pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} (\text{옆넓이}) &= \left[1 + 3 + 7 + 3 + 1 + \left(2\pi \times \frac{5}{2} \times \frac{1}{2}\right)\right] \times 4 \\ &= \left(15 + \frac{5}{2}\pi\right) \times 4 \\ &= 60 + 10\pi \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{겉넓이}) &= \left(21 - \frac{25}{8}\pi\right) \times 2 + (60 + 10\pi) \\ &= 42 - \frac{25}{4}\pi + 60 + 10\pi \\ &= \frac{15}{4}\pi + 102 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

04 Action 직육면체의 가로 길이, 세로 길이, 높이를 각각 a cm, b cm, c cm라 하고, 직육면체의 부피와 잘라 낸 삼각뿔 1개의 부피를 각각 a, b, c 를 사용한 식으로 나타낸다.

직육면체의 가로 길이, 세로 길이, 높이를 각각 a cm, b cm, c cm라 하면 직육면체의 부피는

$$abc = 405 \text{ (cm}^3\text{)}$$

이때 잘라 낸 삼각뿔 1개의 부피는

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}a \times \frac{1}{3}b\right) \times \frac{1}{3}c &= \frac{1}{162}abc \\ &= \frac{1}{162} \times 405 \\ &= \frac{5}{2} \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$


따라서 구하는 입체도형의 부피는

$$405 - \frac{5}{2} \times 8 = 385 \text{ (cm}^3\text{)}$$

05 Action 주어진 그래프를 1회전 시킬 때 생기는 입체도형을 각각 그려 본다.

회전체는 오른쪽 그림과 같다.

$y=ax$ ($0 \leq x \leq 3$)의 그래프를 x 축을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 밑면의 반지름의 길이가 $3a$ 이고 높이가 3인 원뿔 모양이므로



$$V_1 = \frac{1}{3} \times \{\pi \times (3a)^2\} \times 3 = 9a^2\pi$$


$y=2ax$ ($0 \leq x \leq 2$)의 그래프를 y 축을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 밑면의 반지름의 길이가 2이고 높이가 $4a$ 인 원뿔 모양이므로

$$V_2 = \frac{1}{3} \times (\pi \times 2^2) \times 4a = \frac{16a}{3}\pi$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{V_1}{V_2} &= 9a^2\pi \div \frac{16a}{3}\pi \\ &= 9a^2\pi \times \frac{3}{16a\pi} = \frac{27}{16}a \end{aligned}$$

06 Action 주어진 도형을 1회전 시킬 때 생기는 입체도형을 그려 본다.

입체도형은 오른쪽 그림과 같으므로 회전체의 부피는 원뿔대 4개의 부피의 합에서 원뿔 2개의 부피의 합을 뺀 것과 같다.



(원뿔대 1개의 부피)

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \times (\pi \times 6^2) \times 6 \\ &\quad - \frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 3 \end{aligned}$$

$$= 72\pi - 9\pi = 63\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$(\text{원뿔 1개의 부피}) = \frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 3 = 9\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{부피}) &= 63\pi \times 4 - 9\pi \times 2 \\ &= 252\pi - 18\pi = 234\pi \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

교과서 속 창의 사고력

P 94 - P 96

- 01 152
- 02 6개
- 03 42 cm²
- 04 $\frac{11}{200}\pi$ cm
- 05 13 cm
- 06 (다)

01 **Action** 색이 칠해진 면의 개수에 따른 작은 정육면체의 위치를 파악한다.

한 면만 색이 칠해진 작은 정육면체의 개수는 오른쪽 그림과 같이 큰 정육면체의 꼭짓점과 모서리를 포함하지 않은 곳에 위치한 작은 정육면체의 개수와 같으므로

$$a = (6 \times 6) \times 6 = 216$$




두 면에 색이 칠해진 작은 정육면체의 개수는 오른쪽 그림과 같이 큰 정육면체의 꼭짓점을 포함하지 않고 모서리에 위치한 작은 정육면체의 개수와 같으므로

$$b = 6 \times 12 = 72$$

세 면에 색이 칠해진 작은 정육면체의 개수는 오른쪽 그림과 같이 큰 정육면체의 꼭짓점에 위치한 작은 정육면체의 개수와 같으므로

$$c = 8$$


$$\therefore a - b + c = 216 - 72 + 8 = 152$$



02 **Action** 정십이면체의 모서리의 개수와 각 면이 가진 변의 개수를 구한다.

정십이면체의 모서리의 개수는 30개이고 각 면은 5개의 변을 가지므로 최소한 $\frac{30}{5} = 6$ (개)의 모서리에 빨간색을 칠해야 한다.

예를 들면 오른쪽 그림과 같이 \overline{CD} , \overline{BI} , \overline{EO} , \overline{RJ} , \overline{TN} , \overline{PQ} 의 6개의 모서리에 빨간색을 칠하면 모든 면이 적어도 하나의 빨간색 모서리를 갖게 된다.




03 **Action** 겹넓이가 최소가 되도록 18개의 정육면체를 쌓는다.

겹넓이가 최소가 되려면 겹치는 면이 최대한 많아야 하므로 오른쪽 그림과 같이 쌓아야 한다.

∴ (겹넓이)

$$\begin{aligned} &= (3 \times 2) \times 2 + (2 + 3 + 2 + 3) \times 3 \\ &= 12 + 30 \\ &= 42 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$



04 **Action** 휴지를 통에 감았을 때와 통에서 풀었을 때의 부피는 같다.

통에 감긴 휴지의 부피와 통에서 풀었을 때의 휴지의 부피는 같으므로 휴지 한 겹의 두께를 x cm, 휴지의 폭을 y cm 라 하면

$$\begin{aligned} (\pi \times 8^2 - \pi \times 3^2) \times y &= 1000xy \\ \therefore x &= \frac{55}{1000} \pi = \frac{11}{200} \pi \end{aligned}$$

따라서 휴지 한 겹의 두께는 $\frac{11}{200} \pi$ cm이다.

05 **Action** (처음 통에 담겨 있던 주스의 부피) = (컵 1개에 담겨 있는 주스의 부피) $\times 6$ + (통에 남아 있는 주스의 부피)이다.

처음 통에 담겨 있던 주스의 높이를 h cm라 하면

처음 통에 담겨 있던 주스의 부피는

$$(\pi \times 8^2) \times h = 64\pi h \text{ (cm}^3\text{)}$$

원뿔 모양의 컵 1개에 담겨 있는 주스의 부피는

$$\left\{ \frac{1}{3} \times (\pi \times 4^2) \times 15 \right\} \times \frac{4}{5} = 64\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

통에 남아 있는 주스의 부피는

$$(\pi \times 8^2) \times 7 = 448\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$\text{즉 } 64\pi h = 64\pi \times 6 + 448\pi \text{ 이므로}$$

$$64\pi h = 832\pi \quad \therefore h = 13$$

따라서 처음 통에 담겨 있던 주스의 높이는 13 cm이다.

06 **Action** 겹넓이가 같음을 이용하여 사각기둥 모양의 탱크와 원기둥 모양의 탱크의 높이를 각각 구한다.

(a)에서 구 모양의 탱크의 겹넓이는 $4\pi r^2$ 이다.

(b)에서 사각기둥 모양의 탱크의 높이를 h_1 이라 하면 사각기둥 모양의 탱크와 구 모양의 탱크의 겹넓이가 같으므로

$$(r \times r) \times 2 + (r + r + r + r) \times h_1 = 4\pi r^2$$

$$2r^2 + 4rh_1 = 4\pi r^2, 4rh_1 = 4\pi r^2 - 2r^2$$

$$\therefore h_1 = \pi r - \frac{1}{2}r \quad \dots \textcircled{a}$$

(c)에서 원기둥 모양의 탱크의 높이를 h_2 라 하면

원기둥 모양의 탱크와 구 모양의 탱크의 겹넓이가 같으므로

$$\pi r^2 \times 2 + 2\pi r \times h_2 = 4\pi r^2$$

$$2\pi r^2 + 2\pi r h_2 = 4\pi r^2, 2\pi r h_2 = 2\pi r^2$$

$$\therefore h_2 = r \quad \dots \textcircled{b}$$

사각기둥 모양의 탱크의 부피는

$$(r \times r) \times h_1 = r^2 \times \left(\pi r - \frac{1}{2}r \right) = \pi r^3 - \frac{1}{2}r^3 \quad (\because \textcircled{a})$$

원기둥 모양의 탱크의 부피는

$$\pi r^2 \times h_2 = \pi r^2 \times r = \pi r^3 \quad (\because \textcircled{b})$$

구 모양의 탱크의 부피는 $\frac{4}{3} \pi r^3$

$$\text{이때 } r > 0 \text{ 이므로 } \pi r^3 - \frac{1}{2}r^3 < \pi r^3 < \frac{4}{3} \pi r^3$$

따라서 원유가 가장 많이 들어가는 탱크는 (c)이다.

IV. 자료의 정리와 해석

1. 도수분포표와 그래프

최고 수준

입문하기

P 100 - P 103

- 01 ⑤ 02 (1) 37분 (2) 20% 03 ②, ⑤
- 04 (1) 5개 (2) 4회 이상 6회 미만 (3) 6회 이상 8회 미만
- 05 ② 06 (1) 2명 (2) 13명 07 54%
- 08 13명 09 56% 10 ①, ④ 11 250타
- 12 36명 13 14명 14 7일 15 20%
- 16 ⑤ 17 8개 18 11명 19 18.75%
- 20 ①, ③

01 Action 전체 학생 수는 앞의 개수와 같다.

- ① 줄기가 3인 잎이 4개, 줄기가 4인 잎이 7개, 줄기가 5인 잎이 5개, 줄기가 6인 잎이 6개, 줄기가 7인 잎이 3개이므로 잎이 가장 많은 줄기는 4이다.
- ② 전체 학생 수는 $4+7+5+6+3=25$ (명)
- ③ 줄넘기 횟수가 40회 미만인 학생은 32회, 35회, 38회, 39회의 4명이다.
- ④ 줄넘기를 가장 많이 한 학생은 77회, 가장 적게 한 학생은 32회 하였으므로 그 차는 $77-32=45$ (회)

02 Action (백분율) = $\frac{\text{(사용 시간이 40분대인 학생 수)}}{\text{(전체 학생 수)}} \times 100 (\%)$

- (1) 줄기와 잎 그림에서 8번째로 큰 수는 37이므로 컴퓨터 사용 시간이 8번째로 많은 학생의 컴퓨터 사용 시간은 37분이다.
- (2) 전체 학생 수는 $3+5+6+4+2=20$ (명)이고, 컴퓨터 사용 시간이 40분대인 학생은 43분, 46분, 47분, 48분의 4명이므로 $\frac{4}{20} \times 100 = 20 (\%)$

03 Action 가운데 줄기를 기준으로 왼쪽은 남학생의 줄기와 잎 그림이고, 오른쪽은 여학생의 줄기와 잎 그림이다.

- ① 전체 학생 수는 $3+3+6+6+4+4=26$ (명)
- ② 여학생에서 잎이 가장 많은 줄기는 3이다.
- ④ 전체 26명 중 윗몸일으키기를 54회 한 학생은 기록이 좋은 쪽에서 6번째이므로 기록이 좋은 편이다.

⑤ 남학생의 잎이 여학생의 잎보다 대체로 줄기의 값이 큰 쪽으로 치우쳐 있으므로 남학생의 기록이 여학생의 기록보다 더 좋은 편이다.
따라서 옳지 않은 것은 ②, ⑤이다.

04 Action 통화 횟수가 10번째로 많은 학생이 속하는 계급은 통화 횟수가 8회 이상인 학생 수, 6회 이상인 학생 수, ... 를 차례로 구하여 10명 이상인 학생 수가 처음으로 나왔을 때의 계급이다.

(3) 통화 횟수가 8회 이상인 학생 수는 4명, 6회 이상인 학생 수는 $13+4=17$ (명)이므로 통화 횟수가 10번째로 많은 학생이 속하는 계급은 6회 이상 8회 미만이다.

05 Action 도수의 총합을 이용하여 A의 값을 구한다.

- ① (계급의 크기) = $40-35=45-40=...$
 $=60-55=5$ (kg)
- ② $4+7+16+A+6=36$ 에서 $A=3$
도수가 가장 작은 계급은 50 kg 이상 55 kg 미만이고 그 계급값은 $\frac{50+55}{2}=52.5$ (kg)
- ③ 몸무게가 50 kg 이상인 학생 수는 $3+6=9$ (명)이므로 $\frac{9}{36} \times 100 = 25 (\%)$
- ④ 몸무게가 40 kg 이상 50 kg 미만인 학생 수는 $7+16=23$ (명)
- ⑤ 몸무게가 55 kg 이상인 학생 수는 6명, 50 kg 이상인 학생 수는 $3+6=9$ (명), 45 kg 이상인 학생 수는 $16+3+6=25$ (명)이므로 몸무게가 무거운 쪽에서부터 19번째인 학생이 속하는 계급은 45 kg 이상 50 kg 미만이고 그 계급의 도수는 16명이다.
따라서 옳지 않은 것은 ②이다.

06 Action 145 cm 이상 150 cm 미만인 계급의 도수를 A명이라 하면 160 cm 이상 165 cm 미만인 계급의 도수는 5A명이다.

- (1) 145 cm 이상 150 cm 미만인 계급의 도수를 A명이라 하면 160 cm 이상 165 cm 미만인 계급의 도수는 5A명이므로 40%
 $A+7+8+5A+3=30$
 $6A=12 \quad \therefore A=2$
따라서 키가 145 cm 이상 150 cm 미만인 학생 수는 2명이다. 20%
- (2) 160 cm 이상 165 cm 미만인 계급의 도수는 $5A=5 \times 2=10$ (명)이므로 키가 160 cm 이상인 학생 수는 $10+3=13$ (명) 40%

07 **Action** 몸무게가 45 kg 미만인 학생 수를 구한 후 몸무게가 45 kg 이상 50 kg 미만인 학생 수를 구한다.

몸무게가 45 kg 미만인 학생 수는

$$50 \times \frac{30}{100} = 15(\text{명})$$

따라서 몸무게가 45 kg 이상 50 kg 미만인 학생 수는

$$50 - (15 + 8) = 27(\text{명}) \text{이므로}$$

$$\frac{27}{50} \times 100 = 54(\%)$$

08 **Action** 주어진 조건으로 전체 학생 수를 구한다.

기록이 20회 미만인 학생 수는 $7 + 11 = 18(\text{명})$ 이고 전체의 45%이므로

$$(\text{전체 학생 수}) \times \frac{45}{100} = 18$$

$$\therefore (\text{전체 학생 수}) = 40(\text{명})$$

따라서 기록이 20회 이상 30회 미만인 학생 수는

$$40 - (18 + 6 + 3) = 13(\text{명})$$

Lecture

$$(\text{백분율}) = \frac{(\text{어떤 계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})} \times 100(\%) \text{이므로}$$

$$(\text{도수의 총합}) \times \frac{(\text{백분율})}{100} = (\text{어떤 계급의 도수})$$

09 **Action** 히스토그램에서 전체 학생 수와 통학 시간이 20분 이상 40분 미만인 학생 수를 구한다.

전체 학생 수는

$$4 + 6 + 8 + 5 + 2 = 25(\text{명})$$

통학 시간이 20분 이상 40분 미만인 학생 수는

$$6 + 8 = 14(\text{명}) \text{이므로}$$

$$\frac{14}{25} \times 100 = 56(\%)$$

10 **Action** 히스토그램에서 세로의 길이는 도수를 나타낸다.

① 전체 학생 수는

$$8 + 10 + 13 + 6 + 3 = 40(\text{명})$$

② 도수가 가장 작은 계급은 90점 이상 100점 미만이다.

③ 점수가 70점 미만인 학생 수는 $8 + 10 = 18(\text{명})$ 이다.

④ 각 직사각형의 넓이는 각 계급의 도수에 정비례하므로 두 직사각형 A, B의 넓이의 비는

$$10 : 6 = 5 : 3$$

⑤ 점수가 90점 이상인 학생 수는 3명, 80점 이상인 학생 수는 $6 + 3 = 9(\text{명})$ 이므로 점수가 6번째로 좋은 학생이 속하는 계급은 80점 이상 90점 미만이다.

따라서 옳은 것은 ①, ④이다.

Lecture

히스토그램에서 각 직사각형의 넓이는 (계급의 크기) × (그 계급의 도수)이고, 계급의 크기는 모두 일정하다. 따라서 직사각형의 넓이는 계급의 도수에 정비례한다.

11 **Action** 전체 학생 수와 상위 20% 이내인 학생 수를 각각 구한다.

전체 학생 수는 $4 + 6 + 10 + 8 + 5 + 2 = 35(\text{명})$ 이므로 상위 20% 이내인 학생 수는

$$35 \times \frac{20}{100} = 7(\text{명})$$

분당 자관 입력 타수가 300타 이상인 학생 수는 2명, 250타 이상인 학생 수는 $5 + 2 = 7(\text{명})$ 이므로 상위 20% 이내인 학생의 분당 자관 입력 타수는 최소한 250타 이상이다.

12 **Action** 두 직사각형 A, B의 넓이의 비를 이용하여 8회 이상 10회 미만인 계급의 도수를 구한다.

도서관을 방문한 횟수가 8회 이상 10회 미만인 학생 수를 x 명이라 하면

$$x : 9 = 4 : 3 \text{이므로 } 3x = 36$$

$$\therefore x = 12$$

따라서 수영이네 반 전체 학생 수는

$$2 + 4 + 8 + 12 + 9 + 1 = 36(\text{명})$$

13 **Action** 주어진 조건으로 타율이 2.5할 이상인 선수의 수를 구한다.

타율이 2.5할 이상인 선수가 전체의 40%이므로 타율이 2.5할 이상인 선수의 수를 x 명이라 하면

$$\frac{x}{40} \times 100 = 40$$

$$\therefore x = 16$$

따라서 타율이 2.0할 이상 2.5할 미만인 선수의 수는

$$40 - (2 + 8 + 16) = 14(\text{명})$$

14 **Action** 주어진 조건으로 전체 날 수를 구한다.

기온이 26°C 이상 30°C 미만인 날은 $12 + 10 = 22(\text{일})$ 이고 전체의 55%이므로

$$(\text{전체 날 수}) \times \frac{55}{100} = 22$$

$$\therefore (\text{전체 날 수}) = 40(\text{일})$$

따라서 기온이 30°C 이상 32°C 미만인 날의 수는

$$40 - (5 + 12 + 10 + 6) = 7(\text{일})$$

15 **Action** 과학 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생 수를 x 명이라 하면 70점 이상 80점 미만인 학생 수는 $(2x-1)$ 명이다.

과학 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생 수를 x 명이라 하면 70점 이상 80점 미만인 학생 수는 $(2x-1)$ 명이므로

$$6+x+(2x-1)+9+4=45$$

$$3x+18=45$$

$$3x=27 \quad \therefore x=9$$

따라서 과학 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생 수는 9명이다

$$\frac{9}{45} \times 100 = 20 (\%)$$

16 **Action** 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 히스토그램의 각 직사각형의 넓이의 합과 같다.

② 전체 학생 수는

$$4+8+11+13+7+5=48(\text{명})$$

③ 도수가 가장 큰 계급은 8자루 이상 10자루 미만이므로

$$(\text{계급값}) = \frac{8+10}{2} = 9(\text{자루})$$

④ 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$(\text{계급의 크기}) \times (\text{도수의 총합}) = 2 \times 48 = 96$$

⑤ 연필의 수가 6자루 미만인 학생 수는 $4+8=12(\text{명})$ 이므로

$$\frac{12}{48} \times 100 = 25 (\%)$$

따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

17 **Action** 무게가 11번째로 가벼운 상자가 속하는 계급을 구하여 그 계급의 도수를 구한다.

무게가 5 kg 미만인 상자의 개수는 3개, 6 kg 미만인 상자의 개수는 $3+4=7(\text{개})$, 7 kg 미만인 상자의 개수는

$3+4+8=15(\text{개})$ 이므로 무게가 11번째로 가벼운 상자가 속하는 계급은 6 kg 이상 7 kg 미만이고 그 계급의 도수는 8개이다.

18 **Action** 주어진 조건으로 전체 학생 수를 구한다.

수학 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생 수는 10명이고 전체의 25%이므로

$$(\text{전체 학생 수}) \times \frac{25}{100} = 10$$

$$\therefore (\text{전체 학생 수}) = 40(\text{명}) \quad \dots\dots 60\%$$

따라서 수학 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수는

$$40 - (2+7+10+7+3) = 11(\text{명}) \quad \dots\dots 40\%$$

19 **Action** 주어진 조건으로 운동 시간이 40분 이상인 학생 수를 구한다.

운동 시간이 40분 이상인 학생 수는

$$32 \times \frac{50}{100} = 16(\text{명})$$

따라서 운동 시간이 30분 이상 40분 미만인 학생 수는

$$32 - (4+6+16) = 6(\text{명})\text{이므로}$$

$$\frac{6}{32} \times 100 = 18.75 (\%)$$

20 **Action** 그래프가 왼쪽에 치우쳐 있을수록 달리기 기록이 더 좋다.

㉠ 남학생 수는

$$1+3+7+9+3+2=25(\text{명})$$

여학생 수는

$$1+2+5+8+6+3=25(\text{명})$$

따라서 남학생 수와 여학생 수는 같다.

㉡ 전체적으로 남학생의 그래프가 여학생의 그래프보다 왼쪽에 치우쳐 있으므로 남학생의 기록이 여학생의 기록보다 더 좋다.

㉢ 계급의 크기가 1초이고, 남학생 수와 여학생 수가 같으므로 각각의 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 같다.

㉣ 계급값이 16.5초인 계급은 16초 이상 17초 미만이므로 여학생 수는 8명, 남학생 수는 3명이다.

따라서 여학생이 남학생보다 5명 더 많다.

따라서 옳은 것은 ㉠, ㉢이다.

최고 수준 완성하기

P 104 - P 106

- | | | | |
|------------------------|---------|-------|--------------|
| 01 30 % | 02 10개 | 03 13 | 04 43 |
| 05 150 cm 이상 155 cm 미만 | 06 12명 | 07 16 | |
| 08 30명 | 09 30 % | 10 8명 | 11 $S_1=S_2$ |
| 12 10 % | | | |

01 **Action** 반 전체 학생 수와 수학 성적이 85점 이상인 학생 수를 각각 구한다.

전체 학생 수는

$$4+4+8+8+6=30(\text{명})$$

수학 성적이 85점 이상인 학생 수는 9명이므로

$$\frac{9}{30} \times 100 = 30 (\%)$$

02 **Action** 전체 학생의 20%에 해당하는 학생 수를 먼저 구한다.

전체 학생 수는 $4+6+6+7+2=25$ (명)이므로 전체 학생의 20%는

$$25 \times \frac{20}{100} = 5(\text{명})$$

이때 SNS 게시물 수가 많은 순서대로 나열하면 56개, 51개, 48개, 47개, 46개, ...이므로 우리 학교 SNS 홍보 대사의 자격이 되는 학생 5명 중에서 SNS 게시물 수가 가장 많은 학생의 게시물 수는 56개, 가장 적은 학생의 게시물 수는 46개이다.

따라서 구하는 차는

$$56 - 46 = 10(\text{개})$$

03 **Action** (평균) = $\frac{\text{자료의 총합}}{\text{자료의 개수}}$ 임을 이용한다.

전체 선수의 수는

$$8+9+2+1=20(\text{명})$$

홈런의 총 개수는

$$2+3+4+4+5+5+x+8+10+11+12+13+13+15+15+16+19+22+(20+y)+30$$

$$=x+y+227(\text{개})$$

이때 홈런 수의 평균이 12개이므로

$$\frac{x+y+227}{20} = 12, x+y+227 = 240$$

$$\therefore x+y = 13$$

04 **Action** TV 시청 시간이 60분 미만인 학생이 전체의 10%임을 이용하여 TV 시청 시간이 60분 미만인 학생 수를 구한 후 120분 이상 150분 미만인 학생 수를 구한다.

TV 시청 시간이 60분 미만인 학생 수는

$$40 \times \frac{10}{100} = 4(\text{명})$$

이때 TV 시청 시간이 120분 이상 150분 미만인 학생 수는 $40 - (4+8+13+5) = 10$ (명)이므로 A의 값이 될 수 있는 가장 큰 수는 $13+10+5=28$ 이고 가장 작은 수는

$$10+5=15$$
이다.

따라서 구하는 합은

$$28+15=43$$

Lecture

90분 이상 120분 미만인 계급에 속하는 13명의 학생의 TV 시청 시간이 모두 100분 이상일 때, A의 값은 가장 크고, 13명의 학생의 TV 시청 시간이 모두 90분 이상 100분 미만이면 A의 값은 가장 작다.

05 **Action** 키가 150 cm 미만인 학생이 전체의 26%임을 이용하여 전체 학생 수를 구한다.

키가 150 cm 미만인 학생 수는 $6+7=13$ (명)이므로

$$(\text{전체 학생 수}) \times \frac{26}{100} = 13$$

$$\therefore (\text{전체 학생 수}) = 50(\text{명})$$

키가 큰 쪽에서부터 24번째인 학생은 키가 작은 쪽에서부터 $50 - 24 + 1 = 27$ (번째)이다.

이때 키가 145 cm 미만인 학생 수는 6명, 150 cm 미만인 학생 수는 $6+7=13$ (명), 155 cm 미만인 학생 수는 $6+7+15=28$ (명)이므로 키가 큰 쪽에서부터 24번째인 학생이 속하는 계급은 150 cm 이상 155 cm 미만이다.

06 **Action** 몸무게가 50 kg 이상 55 kg 미만인 학생 수를 x 명, 60 kg 이상 65 kg 미만인 학생 수를 y 명이라 하고 문제의 뜻에 알맞은 식을 세운다.

몸무게가 50 kg 이상 55 kg 미만인 학생 수를 x 명, 60 kg 이상 65 kg 미만인 학생 수를 y 명이라 하면

$$2+10+x+11+y+3=40$$
이므로

$$x+y=14$$

이때 x, y 의 최소공배수가 12이므로 x 와 y 는 12의 약수이고, 이 중 $x > y, x+y=14$ 를 만족시키는 x, y 의 값을 구하면

$$x=12, y=2$$

따라서 몸무게가 50 kg 이상 55 kg 미만인 학생 수는 12명이다.

07 **Action** 상위 30% 이내에 드는 학생 수와 상위 75% 이내에 드는 학생 수를 각각 구한다.

전체 학생 수는

$$3+7+10+8+7+5=40(\text{명})$$

상위 30% 이내에 드는 학생 수는

$$40 \times \frac{30}{100} = 12(\text{명})$$

이 중에서 영화를 가장 적게 본 학생이 속하는 계급은 10편 이상 12편 미만이므로 $a=10$

또 상위 75% 이내에 드는 학생 수는

$$40 \times \frac{75}{100} = 30(\text{명})$$

이 중에서 영화를 가장 적게 본 학생이 속하는 계급은 6편 이상 8편 미만이므로 $b=6$

$$\therefore a+b=10+6=16$$

08 Action 세로축의 눈금 한 칸이 나타내는 학생 수를 x 명이라 하고 문제의 뜻에 알맞은 식을 세운다.

세로축의 눈금 한 칸이 나타내는 학생 수를 x 명이라 하면
 30%

전체 학생 수가 80명이므로
 $2x + 5x + 6x + 2x + x = 80$
 $16x = 80 \quad \therefore x = 5$ 40%

따라서 한 뺨의 길이가 19 cm인 학생이 속하는 계급은
 18 cm 이상 20 cm 미만이므로 이 계급의 도수는
 $6x = 6 \times 5 = 30$ (명) 30%

Lecture
 세로축의 눈금 한 칸은 문제에 따라 1명인 경우도 있고, 2명인 경우도 있고, 그보다 더 많은 경우도 있다. 따라서 세로축이 찢어져 보이지 않을 때는 세로축의 눈금 한 칸이 나타내는 도수를 x 명으로 놓고 문제를 풀어야 한다.

09 Action 수학 성적이 75점 이상 80점 미만, 80점 이상 85점 미만, 85점 이상 90점 미만인 학생 수의 비를 한꺼번에 나타낸다.

수학 성적이 75점 이상 80점 미만인 학생 수와 80점 이상 85점 미만인 학생 수의 비가 4 : 7이고, 80점 이상 85점 미만인 학생 수와 85점 이상 90점 미만인 학생 수의 비가 2 : 1이므로 수학 성적이 75점 이상 80점 미만, 80점 이상 85점 미만, 85점 이상 90점 미만인 학생 수의 비는 8 : 14 : 7이다.
 세 계급의 도수를 각각 $8k$ 명, $14k$ 명, $7k$ 명이라 하면
 $2 + 4 + 7 + 8k + 14k + 7k + 5 + 3 = 50$
 $29k = 29 \quad \therefore k = 1$
 따라서 수학 성적이 85점 이상 90점 미만인 학생 수는 7명이므로 수학 성적이 85점 이상인 학생 수는
 $7 + 5 + 3 = 15$ (명)
 $\therefore \frac{15}{50} \times 100 = 30$ (%)


10 Action 영어 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수를 x 명이라 하면 60점 이상 70점 미만인 학생 수는 $(x+7)$ 명이다.

영어 성적이 80점 이상인 학생 수는 3명이고 전체의 5%이므로
 (전체 학생 수) $\times \frac{5}{100} = 3$
 \therefore (전체 학생 수) = 60(명)
 이때 영어 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수를 x 명이라 하면 60점 이상 70점 미만인 학생 수는 $(x+7)$ 명이므로
 $5 + 8 + 11 + 10 + (x+7) + x + 3 = 60$
 $2x = 16 \quad \therefore x = 8$
 따라서 영어 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수는 8명이다.

11 Action 전체 학생 수와 계급의 크기가 같으면 각 반의 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 서로 같음을 이용한다.

1반의 학생 수는
 $4 + 9 + 12 + 10 + 5 = 40$ (명)
 2반의 학생 수는
 $5 + 10 + 14 + 9 + 2 = 40$ (명)
 즉 1반과 2반의 학생 수가 같으므로 각 반의 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 서로 같다.

오른쪽 도수분포다각형에서 빗금친 부분의 넓이를 P 라 하면
 (1반의 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이)
 $= S_1 + P$
 (2반의 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이)
 $= P + S_2$
 따라서 $S_1 + P = P + S_2$ 이므로
 $S_1 = S_2$



12 Action A반에서 성적이 상위 22.5% 이내에 드는 학생의 성적은 몇 점 이상인지 구한다.

A반의 전체 학생 수는 $1 + 6 + 9 + 15 + 7 + 2 = 40$ (명)이므로 A반에서 상위 22.5% 이내에 드는 학생 수는
 $40 \times \frac{22.5}{100} = 9$ (명)
 A반에서 성적이 80점 이상인 학생 수가 $7 + 2 = 9$ (명)이므로 상위 22.5% 이내에 드는 학생의 성적은 80점 이상이다.
 한편, B반의 전체 학생 수는 $4 + 4 + 7 + 12 + 2 + 1 = 30$ (명)이고 B반에서 성적이 80점 이상인 학생 수는 $2 + 1 = 3$ (명)이므로
 $\frac{3}{30} \times 100 = 10$ (%)
 따라서 A반에서 성적이 상위 22.5% 이내에 드는 학생의 성적은 B반에서 최소 상위 10% 이내에 든다.

최고 수준 **뛰어넘기** P 107 - P 108

01 A=80, B=65	02 8	03 3년
04 7명	05 37 : 63	06 20 %

01 **Action** 주어진 자료를 이용하여 따로 도수분포표를 그려 본다.

주어진 자료에서 A, B 를 제외한 18개의 변량으로 도수 분포표를 만들면 오른쪽 표와 같다. 이를 주어진 도수분포표와 비교하면 A, B 는 60점 이상 70점 미만, 80점 이상 90점 미만에 각각 하나씩 들어감을 알 수 있다.

국어 성적(점)	도수(명)
50 ^{이상} ~ 60 ^{미만}	3
60 ~ 70	3
70 ~ 80	5
80 ~ 90	4
90 ~ 100	3
합계	18

이때 $A - B = 15$ 에서 $A > B$ 이므로
 $80 \leq A < 90, 60 \leq B < 70$
 한 문제당 점수가 5점씩이므로
 $A = 80$ 또는 $A = 85, B = 60$ 또는 $B = 65$
 따라서 $A - B = 15$ 이므로
 $A = 80, B = 65$

02 **Action** 기록이 24회 이상 32회 미만인 학생 수를 B 명이라 하고, 주어진 조건을 이용하여 A, B 에 대한 식을 세운다.

기록이 24회 이상 32회 미만인 학생 수를 B 명이라 하면
 $3 + A + 12 + B + 5 = 40$
 $\therefore A + B = 20$ ㉠
 기록이 10회 이하인 학생 수는 $40 \times \frac{20}{100} = 8$ (명)이므로
 $3 + A \geq 8 \quad \therefore A \geq 5$ ㉡
 기록이 25회 이상인 학생 수는 $40 \times \frac{30}{100} = 12$ (명)이므로
 $B + 5 \geq 12 \quad \therefore B \geq 7$ ㉢
 ㉠~㉢을 모두 만족시키는 자연수 A, B 의 값은 다음과 같다.

A	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	15	14	13	12	11	10	9	8	7

따라서 A 의 최댓값은 13, 최솟값은 5이므로 그 차는
 $13 - 5 = 8$

03 **Action** 12일 이상 15일 미만인 계급의 도수를 k 년이라 하면 3일 이상 6일 미만인 계급의 도수는 $2.5k$ 년이다.

12일 이상 15일 미만인 계급의 도수를 k 년이라 하면 3일 이상 6일 미만인 계급의 도수는 $2.5k$ 년이다.
 연간 황사 발생일 수가 9일 미만인 해가 전체 조사한 해의 70%이므로
 $6 + 2.5k + 3 = \frac{70}{100} \times (6 + 2.5k + 3 + 1 + k + 2 + 1)$
 $9 + 2.5k = 9.1 + 2.45k$
 $0.05k = 0.1 \quad \therefore k = 2$

따라서 3일 이상 6일 미만인 계급의 도수는
 $2.5k = 2.5 \times 2 = 5$ (년), 12일 이상 15일 미만인 계급의 도수는 2년이므로 구하는 도수의 차는
 $5 - 2 = 3$ (년)

04 **Action** 기록이 38 m 이상인 학생 수를 x 명이라 하면 기록이 38 m 미만인 학생 수는 $(5x - 4)$ 명이다.

기록이 38 m 이상인 학생 수를 x 명이라 하면 기록이 38 m 미만인 학생 수는 $(5x - 4)$ 명이므로
 $(5x - 4) + x = 50$
 $6x = 54 \quad \therefore x = 9$
 따라서 기록이 38 m 미만인 학생 수는
 $5x - 4 = 5 \times 9 - 4 = 41$ (명)이므로 기록이 34 m 이상 38 m 미만인 학생 수는
 $41 - (5 + 8 + 11 + 10) = 7$ (명)

05 **Action** 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 히스토그램의 직사각형의 넓이의 합과 같다.

기록이 38 m 이상 42 m 미만인 계급의 도수는 6명이므로 도수분포다각형에서 가장 높은 꼭짓점이 위치한 계급은 도수가 가장 큰 계급인 26 m 이상 30 m 미만이다.
 이때 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 히스토그램의 직사각형의 넓이의 합과 같으므로 A, B 의 값을 각각 구하면
 $A = 4 \times 5 + 4 \times 8 + 2 \times 11 = 74$
 $B = 2 \times 11 + 4 \times 10 + 4 \times 7 + 4 \times 6 + 4 \times 3 = 126$
 $\therefore A : B = 74 : 126 = 37 : 63$

06 **Action** 1반 학생이 2반으로 반을 옮기면 2반의 전체 학생 수는 1명 이 늘어난다.

1반의 전체 학생 수는 $3 + 5 + 10 + 9 + 2 + 1 = 30$ (명)이므로 1반에서 상위 10% 이내에 드는 학생 수는
 $30 \times \frac{10}{100} = 3$ (명)
 이때 1반에서 80점 이상인 학생 수가 $2 + 1 = 3$ (명)이므로 선미의 과학 성적은 80점 이상이다.
 한편 2반의 전체 학생 수는 $2 + 4 + 8 + 10 + 3 + 2 = 29$ (명)이고 2반에서 80점 이상인 학생 수는 $3 + 2 = 5$ (명)이므로 선미가 1반에서 2반으로 반을 옮기면 2반의 전체 학생 수는 $29 + 1 = 30$ (명), 2반에서 80점 이상인 학생 수는 $5 + 1 = 6$ (명)이 된다.
 $\therefore \frac{6}{30} \times 100 = 20$ (%)

2. 상대도수와 그 그래프

최고 수준

입문하기

P 110 - P 112

- 01 ⑤ 02 0,3 03 0,35 04 250
 05 $a=0,16, b=13$
 06 (1) 80명
 (2) $A=0,05, B=28, C=0,3, D=8, E=1$
 (3) 55 %
 07 0,24 08 3명 09 240명 10 ①
 11 18명 12 30명 13 4 14 9 : 10
 15 150 16 ③

01 **Action** (어떤 계급의 상대도수) = $\frac{\text{그 계급의 도수}}{\text{도수의 총합}}$ 임을 이용한다.

⑤ 상대도수의 총합은 항상 1이다.

02 **Action** 도수의 총합을 구하고, 도수가 가장 큰 계급의 도수를 구한다.

도수의 총합은 $3+5+9+7+4+2=30$ (명)
 도수가 가장 큰 계급은 5회 이상 7회 미만이고, 그 도수는 9명이므로 이 계급의 상대도수는 $\frac{9}{30}=0,3$

03 **Action** 수학 성적이 70점 미만인 학생 수를 구하여 수학 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수를 구한다.

수학 성적이 70점 미만인 학생 수는
 $40 \times \frac{40}{100} = 16$ (명) 30%
 수학 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수는
 $40 - (16+6+4) = 14$ (명) 30%
 따라서 70점 이상 80점 미만인 계급의 상대도수는
 $\frac{14}{40} = 0,35$ 40%

04 **Action** (도수의 총합) = $\frac{\text{그 계급의 도수}}{\text{어떤 계급의 상대도수}}$ 임을 이용한다.

(도수의 총합) = $\frac{60}{0,24} = 250$

05 **Action** 도수의 총합을 구하여 a, b 의 값을 각각 구한다.

(도수의 총합) = $\frac{17}{0,34} = 50$ 이므로
 $a = \frac{8}{50} = 0,16$
 $b = 50 \times 0,26 = 13$

06 **Action** 전체 학생 수를 구하고, $A \sim E$ 의 값을 차례로 구한다.

(1) (전체 학생 수) = $\frac{16}{0,2} = 80$ (명)
 (2) $A = \frac{4}{80} = 0,05, B = 80 \times 0,35 = 28,$
 $C = \frac{24}{80} = 0,3, D = 80 \times 0,1 = 8, E = 1$
 (3) 10회 이상 30회 미만인 계급의 상대도수의 합은
 $0,2 + 0,35 = 0,55$ 이므로
 $0,55 \times 100 = 55$ (%)

07 **Action** 주어진 조건으로 전체 학생 수를 먼저 구한다.

전체 학생 수는 $\frac{4}{0,08} = 50$ (명)이므로 구하는 상대도수는
 $\frac{12}{50} = 0,24$

08 **Action** 책을 10권 이상 읽은 학생이 전체의 65%이므로 책을 10권 이상 읽은 계급의 상대도수의 합은 0.65이다.

(전체 학생 수) = $\frac{4}{0,2} = 20$ (명)
 책을 10권 이상 읽은 학생이 전체의 65%이므로 5권 이상 10권 미만인 계급의 상대도수는
 $1 - (0,2 + 0,65) = 0,15$
 따라서 책을 5권 이상 10권 미만 읽은 학생 수는
 $20 \times 0,15 = 3$ (명)

09 **Action** 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례한다.

도수가 가장 큰 계급은 상대도수가 가장 큰 계급이다.
 따라서 도수가 가장 큰 계급은 7시간 이상 8시간 미만이고 그 계급에 속하는 학생 수는 $800 \times 0,3 = 240$ (명)

10 **Action** (어떤 계급의 도수) = (도수의 총합) \times (그 계급의 상대도수) 임을 이용한다.

① 상대도수가 가장 작은 계급은 15°C 이상 16°C 미만이고 그 계급의 도수는 1일이므로 기온을 측정할 전체 일수는
 $\frac{1}{0,04} = 25$ (일)
 ② 도수가 가장 큰 계급은 18°C 이상 19°C 미만이므로 그 계급값은 $\frac{18+19}{2} = 18,5$ (°C)
 ③ 17°C 미만인 계급의 상대도수의 합은
 $0,04 + 0,12 = 0,16$ 이므로 $0,16 \times 100 = 16$ (%)
 ④ 18°C 이상인 계급의 상대도수의 합은
 $0,44 + 0,08 = 0,52$ 이므로 $0,52 \times 100 = 52$ (%)
 ⑤ 계급값이 17,5°C인 계급은 17°C 이상 18°C 미만이므로 도수는 $25 \times 0,32 = 8$ (일)
 따라서 옳은 것은 ①이다.

11 **Action** 상대도수의 총합은 항상 1임을 이용하여 10회 이상 12회 미만인 계급의 상대도수를 구한다.

$$(\text{전체 학생 수}) = \frac{11}{0.22} = 50(\text{명}) \quad \dots\dots 30\%$$

10회 이상 12회 미만인 계급의 상대도수는

$$1 - (0.06 + 0.12 + 0.16 + 0.22 + 0.12 + 0.08) = 0.24 \quad \dots\dots 30\%$$

따라서 턱걸이 기록이 10회 이상 14회 미만인 학생 수는

$$50 \times (0.24 + 0.12) = 18(\text{명}) \quad \dots\dots 40\%$$

12 **Action** 주어진 조건을 이용하여 160 cm 이상 170 cm 미만인 계급의 상대도수를 구한다.

기록이 160 cm 이상인 학생이 전체의 32%이므로

$$160 \text{ cm 이상 } 170 \text{ cm 미만인 계급의 상대도수는}$$

$$0.32 - 0.12 = 0.2$$

따라서 기록이 160 cm 이상 170 cm 미만인 학생 수는

$$150 \times 0.2 = 30(\text{명})$$

13 **Action** 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례함을 이용하여 2반에서 50점 이상 60점 미만인 계급의 도수를 구한다.

1반에서 50점 이상 60점 미만인 계급의 상대도수는

$$\frac{5}{50} = 0.1$$

2반에서 50점 이상 60점 미만인 계급의 도수를 x 명이라 하면 이 계급의 상대도수는 $\frac{x}{40}$ 이므로

$$0.1 : \frac{x}{40} = 2 : 3 \text{에서}$$

$$\frac{x}{20} = 0.3 \quad \therefore x = 6$$

$$\therefore A = 40 - (1 + 6 + 10 + 14 + 5) = 4$$

14 **Action** A, B 두 집단의 전체 도수를 각각 $2x, 3x$ 라 하고, 어떤 계급의 도수를 각각 $3y, 5y$ 라 한다.

A, B 두 집단의 전체 도수를 각각 $2x, 3x$ 라 하고, 어떤 계급의 도수를 각각 $3y, 5y$ 라 하면 이 계급의 상대도수의 비는

$$\frac{3y}{2x} : \frac{5y}{3x} = \frac{3}{2} : \frac{5}{3} = \frac{9}{6} : \frac{10}{6} = 9 : 10$$

15 **Action** 상위 30%는 상대도수의 분포를 나타낸 그래프에서 점수가 높은 쪽에서 상대도수의 합이 0.3이 되는 것을 말한다.

A 학교에서 90점 이상인 계급의 상대도수는 0.05, 80점 이상인 계급의 상대도수의 합은 $0.1 + 0.05 = 0.15$, 70점 이상인 계급의 상대도수의 합은 $0.15 + 0.1 + 0.05 = 0.3$

즉 A 학교에서 상위 30% 이내에 들려면 70점 이상 받아야 하므로 $x = 70$

B 학교에서 90점 이상인 계급의 상대도수는 0.05, 80점 이상인 계급의 상대도수의 합은 $0.25 + 0.05 = 0.3$

즉 B 학교에서 상위 30% 이내에 들려면 80점 이상 받아야 하므로 $y = 80$

$$\therefore x + y = 70 + 80 = 150$$

16 **Action** 그래프가 오른쪽에 치우쳐 있을수록 등교 시각이 늦고, 왼쪽에 치우쳐 있을수록 등교 시각이 빠르다.

① A 중학교 학생들의 그래프가 B 중학교 학생들의 그래프보다 왼쪽에 치우쳐 있으므로 A 중학교 학생들이 B 중학교 학생들보다 일찍 등교한다.

② A 중학교 학생들 중 8시 이전에 학교에 도착하는 학생들이 속하는 계급의 상대도수의 합은

$$0.1 + 0.2 + 0.4 = 0.7$$

$$\therefore 0.7 \times 100 = 70(\%)$$

③ B 중학교 학생들 중 8시부터 학교에 도착하는 학생들의 상대도수의 합은 $0.35 + 0.2 = 0.55$

$$\therefore 0.55 \times 100 = 55(\%)$$

④ 8시부터 8시 20분 이전에 등교하는 학생들의 상대도수는 A 중학교는 0.25, B 중학교는 0.35이므로 비율은 B 중학교 학생들이 A 중학교 학생들에 비해 상대적으로 높다.

⑤ 계급의 크기가 같고, 상대도수의 총합이 1로 같으므로 각각의 상대도수의 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 같다.

따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

최고 수준 완성하기

P 113 - P 114

01 0.27	02 24	03 225장	04 420명
05 140명	06 3 : 8	07 48등	

01 **Action** 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례하고, 상대도수의 총합은 1임을 이용하여 a, b 의 값을 각각 구한다.

$$a : b = 5 : 2 \text{에서}$$

$$2a = 5b \quad \therefore a = \frac{5}{2}b$$

상대도수의 총합은 항상 1이므로

$$\frac{5}{2}b + 0.11 + 0.26 + b = 1$$

$$\frac{7}{2}b = 0.63 \quad \therefore b = 0.18$$

따라서 $a = \frac{5}{2}b = \frac{5}{2} \times 0.18 = 0.45$ 이므로

$$a - b = 0.45 - 0.18 = 0.27$$

02 **Action** 상대도수의 총합은 항상 1이고, 도수는 학생 수이므로 자연수임을 이용한다.

상대도수의 총합은 항상 1이므로 6시간 이상 7시간 미만인 계급의 상대도수는

$$1 - \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{4}$$

따라서 영희네 반 전체 학생 수가 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 수는 상대도수의 분모 3, 4, 6, 8의 최소공배수이므로 24이다.

03 **Action** 시민들이 가장 많이 개찰구를 통과하는 시간대는 상대도수가 가장 큰 시간대이다.

7시 40분 이상 7시 50분 미만인 시간대에 개찰구를 통과하는 시민들이 속하는 계급의 상대도수가 0.1이므로

$$(\text{전체 시민 수}) = \frac{75}{0.1} = 750(\text{명}) \quad \dots\dots 50\%$$

시민들이 가장 많이 개찰구를 통과하는 시간대는 상대도수가 0.3으로 가장 큰 8시 10분 이상 8시 20분 미만이고, 전체 시민 수가 750명이므로 필요한 홍보 전단지 는 모두 $750 \times 0.3 = 225(\text{장})$ 이다. $\dots\dots 50\%$

04 **Action** 전체 학생 수를 x 명이라 하고 주어진 조건을 이용하여 문제의 뜻에 알맞은 식을 세운다.

전체 학생 수를 x 명이라 하면
 $0.4x = (0.25 + 0.1)x + 21, 0.05x = 21 \quad \therefore x = 420$
 따라서 전체 학생 수는 420명이다.

05 **Action** 대기 시간이 20분 이상 25분 미만인 학생 수를 $2x$ 명, 25분 이상 30분 미만인 학생 수를 $3x$ 명이라 한다.

대기 시간이 30분 이상인 학생 수가 50명이고 그 상대도수의 합이 $0.16 + 0.04 = 0.2$ 이므로 전체 학생 수는

$$\frac{50}{0.2} = 250(\text{명})$$

대기 시간이 20분 이상 25분 미만인 학생 수와 25분 이상 30분 미만인 학생 수를 각각 $2x$ 명, $3x$ 명이라 하면

$$250 \times (0.08 + 0.12) + 2x + 3x + 50 = 250$$

$$5x + 100 = 250, 5x = 150 \quad \therefore x = 30$$

따라서 대기 시간이 25분 이상인 학생 수는 $3x + 50 = 3 \times 30 + 50 = 140(\text{명})$

06 **Action** 1반의 전체 학생 수를 x 명, 2반의 전체 학생 수를 y 명이라 한다.

1반의 전체 학생 수를 x 명, 2반의 전체 학생 수를 y 명이라 하면 읽은 책의 수가 24권 이상 28권 미만인 1반과 2반의 학생 수의 비가 9 : 2이므로

$$0.45x : 0.09y = 9 : 2$$

$$0.9x = 0.81y \quad \therefore x = 0.9y$$

따라서 읽은 책의 수가 20권 미만인 1반과 2반의 학생 수의 비는

$$\{(0.05 + 0.15) \times x\} : \{(0.2 + 0.28) \times y\}$$

$$= 0.2x : 0.48y$$

$$= (0.2 \times 0.9y) : 0.48y$$

$$= 0.18y : 0.48y$$

$$= 3 : 8$$

07 **Action** 1반의 전체 학생 수를 구한 후 1반에서 10등인 학생이 속하는 계급을 찾는다.

1반의 전체 학생 수는

$$\frac{10}{0.2} = 50(\text{명})$$

1반에서 수학 성적이 90점 이상인 학생 수는

$$50 \times 0.04 = 2(\text{명}), 80\text{점 이상인 학생 수는}$$

$50 \times (0.16 + 0.04) = 10(\text{명})$ 이므로 1반에서 10등인 학생의 성적은 80점 이상이다.

한편 1학년 전체 학생 수는

$$\frac{32}{0.16} = 200(\text{명})$$

이때 1학년 전체에서 수학 성적이 80점 이상인 학생 수는 $200 \times (0.14 + 0.1) = 48(\text{명})$ 이므로 1반에서 10등인 학생은 1학년 전체에서 적어도 48등 안에 든다고 할 수 있다.

최고 수준 **뛰어넘기**

P 115 - P 116

- 01 0.075
- 02 $A = 0.52, B = 0.16$
- 03 160명
- 04 66%
- 05 2학년이 22명 더 많다.
- 06 24명

01 **Action** 전체 고객 수와 1만 원 이상 1만 5천 원 미만인 계급의 도수를 구한다.

전체 고객 수는 $\frac{6}{0.05} = 120(\text{명})$

5천 원 이상 1만 원 미만인 계급의 도수는

$120 \times 0.1 = 12(\text{명})$, 1만 5천 원 이상 2만 원 미만인 계급의 도수는 $120 \times 0.3 = 36(\text{명})$ 이므로 1만 원 이상 1만 5천 원 미만인 계급의 도수는

$$63 - (6 + 12 + 36) = 9(\text{명})$$

이때 구입한 물품의 금액이 5천 원 미만인 고객 수는 6명, 1만 원 미만인 고객 수는 $6 + 12 = 18(\text{명})$, 1만 5천 원 미만인 고객 수는 $6 + 12 + 9 = 27(\text{명})$

따라서 구입한 물품의 금액이 25번째로 적은 고객이 속하는 계급은 1만 원 이상 1만 5천 원 미만이고 이 계급의 상대도수는 $\frac{9}{120}=0.075$ 이다.

02 Action 지난 학기와 이번 학기의 도수의 변화를 살펴본다.

진희네 반 학생들은 변함이 없으므로 이번 학기의 각 계급의 도수를 구하면 다음 표와 같다.

과학 성적(점)	지난 학기 도수(명)	이번 학기 도수(명)
40 ^{이상} ~ 50 ^{미만}	3	$25 \times 0.04 = 1$
50 ~ 60	4	$25 \times 0.2 = 5$
60 ~ 70	12	$25 \times A$
70 ~ 80	1	0
80 ~ 90	3	$25 \times B$
90 ~ 100	2	$25 \times 0.08 = 2$
합계	25	25

지난 학기에 40점 이상 50점 미만인 학생들 중 2명이 한 계급 올라갔고, 이번 학기에 50점 이상 60점 미만인 학생은 1명이 증가했으므로 지난 학기에 50점 이상 60점 미만인 학생들 중 1명이 한 계급 올라갔다.

즉 이번 학기에 60점 이상 70점 미만인 학생 수는 $12 + 1 = 13$ (명)

$$\therefore A = \frac{13}{25} = 0.52$$

또 지난 학기에 70점 이상 80점 미만인 학생들 중 1명이 한 계급 올라갔고, 90점 이상 100점 미만인 계급의 지난 학기와 이번 학기의 도수가 같으므로 지난 학기에 80점 이상 90점 미만인 학생들 중 계급이 올라간 학생은 없다.

즉 이번 학기에 80점 이상 90점 미만인 학생 수는 $3 + 1 = 4$ (명)

$$\therefore B = \frac{4}{25} = 0.16$$

03 Action a, b 의 최대공약수가 8이므로 a, b 는 각각 8의 배수이다.

$a = 8k, b = 8k'$ (k, k' 은 서로소)라 하면

5시간 이상 10시간 미만인 계급에서 전체 학생 수는

$$\frac{8k}{0.25} = 32k \text{ (명)}$$

20시간 이상 25시간 미만인 계급에서 전체 학생 수는

$$\frac{8k'}{0.2} = 40k' \text{ (명)}$$

이때 $32k = 40k'$ 이고 k, k' 은 서로소이므로

$$8 \times 4 \times k = 8 \times 5 \times k' \text{ 에서}$$

$$k = 5, k' = 4$$

따라서 조사에 참여한 학생 수는

$$40k' = 40 \times 4 = 160 \text{ (명)}$$

다른 풀이

주어진 상대도수를 기약 분수로 나타내면 오른쪽 표와 같다.

봉사 활동 시간(시간)	상대도수
0 ^{이상} ~ 5 ^{미만}	$\frac{1}{5}$
5 ~ 10	$\frac{1}{4}$
10 ~ 15	$\frac{1}{10}$
15 ~ 20	$\frac{1}{8}$
20 ~ 25	$\frac{1}{5}$
25 ~ 30	$\frac{1}{8}$
합계	1

각 계급의 도수가 자연수가 되어야 하므로 도수의 총합은 각 계급의 상대도수의 분모 4, 5, 8, 10의 최소공배수의 배수이다. 즉 도수의 총합은 40의 배수이므로 도수의 총합을 $40n$ 명이라 하면

$$a = 40n \times \frac{1}{4} = 10n, b = 40n \times \frac{1}{5} = 8n$$

이때 $10n, 8n$ 의 최대공약수는 $2n$ 이고 a, b 의 최대공약수가 8이므로

$$2n = 8 \quad \therefore n = 4$$

따라서 조사에 참여한 학생은

$$40n = 40 \times 4 = 160 \text{ (명)}$$

04 Action 상대도수의 총합은 항상 1임을 이용하여 a, b 를 사용한 식을 만든다.

상대도수의 총합은 항상 1이므로

$$0.04 + 0.26 + a + b + 0.16 + 0.06 = 1$$

$$a + b = 0.48 \quad \therefore 25a + 25b = 12$$

이때 $25a, 25b$ 가 모두 3의 배수이고 $a > b$ 이므로

$$25a = 9, 25b = 3$$

$$\therefore a = 0.36, b = 0.12$$

따라서 70점 미만인 계급의 상대도수의 합은

$$0.04 + 0.26 + 0.36 = 0.66 \text{ 이므로}$$

$$0.66 \times 100 = 66 \text{ (\%)}$$

05 Action 각 그래프에서 기록이 25초 이상인 학생 수를 각각 구하여 비교한다.

1학년의 그래프에서 15초 미만인 계급의 상대도수의 합은

$$0.12 + 0.2 = 0.32 \text{ 이므로 1학년 전체 학생 수는}$$

$$\frac{80}{0.32} = 250 \text{ (명)}$$

이때 25초 이상 30초 미만인 계급의 상대도수는

$$1 - (0.12 + 0.2 + 0.4 + 0.24) = 0.04 \text{ 이므로 기록이 25초 이상인 학생 수는 } 250 \times 0.04 = 10 \text{ (명)}$$

2학년의 그래프에서 15초 미만인 계급의 상대도수의 합은

$$0.04 + 0.1 = 0.14 \text{ 이므로 2학년 전체 학생 수는}$$

$$\frac{28}{0.14} = 200 \text{ (명)}$$

이때 25초 이상 30초 미만인 계급의 상대도수는
 $1 - (0.04 + 0.1 + 0.34 + 0.36) = 0.16$ 이므로
 기록이 25초 이상인 학생 수는
 $200 \times 0.16 = 32$ (명)
 따라서 기록이 25초 이상인 학생 수는 2학년이
 $32 - 10 = 22$ (명) 더 많다.

06 **Action** B 헬스클럽의 그래프에서 상대도수의 총합은 항상 1임을 이용하여 세로축의 눈금 한 칸이 나타내는 상대도수를 구한다.

세로축의 눈금 한 칸이 나타내는 상대도수를 x 라 하면
 B 헬스클럽의 그래프에서 상대도수의 총합은 항상 1이므로
 $x + 8x + 6x + 4x + x = 1$

$$20x = 1 \quad \therefore x = 0.05$$

이때 A 헬스클럽의 그래프에서 50세 이상 60세 미만인 계급의 상대도수는

$$1 - (3x + 7x + 6x + x) = 1 - (0.15 + 0.35 + 0.3 + 0.05) = 0.15$$

이므로 나이가 50세 이상인 회원 수는

$$120 \times (0.15 + 0.05) = 24$$
(명)

교과서 속 창의 사고력

P 117 - P 119

- 01 25명 02 47 03 19 : 30 이상 20 : 00 미만
- 04 최댓값 : 165명, 최솟값 : 75명 05 ⑤
- 06 180명

01 **Action** (평균) = $\frac{\text{자료의 총합}}{\text{자료의 개수}}$ 임을 이용한다.

10점대인 학생 수와 40점대인 학생 수를 각각 $3a$ 명, $2a$ 명이라 하자.

10점대인 학생들의 점수의 평균이 17점이므로 이 학생들의 점수의 총합은

$$17 \times 3a = 51a$$
(점)

20점대인 학생들의 점수의 총합은

$$20 + 21 + 21 + 23 + 25 + 26 + 28 = 164$$
(점)

30점대인 학생들의 점수의 총합은

$$32 + 32 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 = 283$$
(점)

40점대인 학생들의 점수의 평균이 44점이므로 이 학생들의 점수의 총합은

$$44 \times 2a = 88a$$
(점)

전체 학생 수는 $3a + 7 + 8 + 2a = 5a + 15$ (명)이고 반 전체 학생들의 점수의 평균이 29점이므로

$$\frac{51a + 164 + 283 + 88a}{5a + 15} = 29$$

$$139a + 447 = 29 \times (5a + 15)$$

$$139a + 447 = 145a + 435, 6a = 12 \quad \therefore a = 2$$

따라서 전체 학생 수는

$$5a + 15 = 5 \times 2 + 15 = 25$$
(명)

02 **Action** 4점을 받은 학생은 A 지역에서만 또는 C 지역에서만 봉사 활동을 하였고, 9점을 받은 학생은 A 지역과 B 지역에서 또는 B 지역과 C 지역에서 봉사 활동을 하였다.

주어진 표를 이용하여 각 지역에서 봉사 활동을 한 경우를 ○, 하지 않은 경우를 ×로 나타내어 표를 만들면 다음과 같다.

점수(점)	A	B	C	학생 수(명)
4	○	×	×	a_1
4	×	×	○	a_2
5	×	○	×	7
8	○	×	○	10
9	○	○	×	b_1
9	×	○	○	b_2
13	○	○	○	7

4점을 받은 학생은 A 지역에서만 또는 C 지역에서만 봉사 활동을 하였으므로 $a_1 + a_2 = 5$

9점을 받은 학생은 A 지역과 B 지역에서 또는 B 지역과 C 지역에서 봉사 활동을 하였으므로 $b_1 + b_2 = 8$

$$x = a_1 + 10 + b_1 + 7 = a_1 + b_1 + 17$$

$$y = a_2 + 10 + b_2 + 7 = a_2 + b_2 + 17$$

$$\therefore x + y = (a_1 + b_1 + 17) + (a_2 + b_2 + 17)$$

$$= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) + 34$$

$$= 5 + 8 + 34 = 47$$

03 **Action** 콘서트장에 남아 있는 관객 수는

(입장 관객 수) - (퇴장 관객 수) + (이전 계급에 남아 있는 관객 수)이다.

각 계급의 입장 관객 수, 퇴장 관객 수, 콘서트장에 남아 있는 관객 수를 도수분포표로 나타내면 다음과 같다.

시간	입장 관객 수(명)	퇴장 관객 수(명)	남아 있는 관객 수(명)
17 : 30 ^{이상} ~ 18 : 00 ^{미만}	90	5	85
18 : 00 ~ 18 : 30	80	10	155
18 : 30 ~ 19 : 00	65	5	215
19 : 00 ~ 19 : 30	55	30	240
19 : 30 ~ 20 : 00	10	100	150
20 : 00 ~ 20 : 30	0	145	5
합계	300		

따라서 콘서트장에 남아 있는 관객 수가 네 번째로 많은 계급은 19 : 30 이상 20 : 00 미만이다.

04 **Action** 관객 수가 최대가 되는 경우와 최소가 되는 경우를 각각 생각한다.

사전 공연을 본 관객 수가 최대가 되는 경우는 18시부터 18시 10분 이전에 80명이 입장하고 18시 20분부터 18시 30분 이전에 10명이 퇴장한 경우이므로

$$85 + 80 = 165(\text{명})$$

사전 공연을 본 관객 수가 최소가 되는 경우는 18시부터 18시 10분 이전에 10명이 퇴장하고 18시 20분부터 18시 30분 이전에 80명이 입장한 경우이므로

$$85 - 10 = 75(\text{명})$$

05 **Action** 남학생 수를 x 명이라 하면 여학생 수는 $(500 - x)$ 명이다.

조사한 학생 수가 500명이므로 남학생 수를 x 명이라 하면 여학생 수는 $(500 - x)$ 명이다.

취미가 E인 학생 수에서

$$\frac{5}{100} \times x + \frac{0}{100} \times (500 - x) = \frac{4}{100} \times 500$$

$$5x = 2000 \quad \therefore x = 400$$

따라서 남학생 수는 400명, 여학생 수는 100명이므로 조사한 학생 수는 다음 표와 같다.

학생 수 \ 취미	A	B	C	D	E	합계
남학생(명)	60	144	120	56	20	400
여학생(명)	6	20	60	14	0	100
전교생(명)	66	164	180	70	20	500

- ① 취미가 A인 남학생 수는 취미가 A인 여학생 수의 10배이다.
- ② 취미가 A인 남학생 수와 취미가 D인 여학생 수는 46명 차이가 난다.
- ③ 취미가 C인 여학생 수는 취미가 C인 남학생 수의 $\frac{1}{2}$ 배이다.
- ④ 취미가 D인 남학생 수와 취미가 D인 여학생 수는 같지 않다.
- ⑤ 취미가 E인 남학생 수와 취미가 B인 여학생 수는 20명으로 같다.

따라서 옳은 것은 ⑤이다.

06 **Action** 주어진 도수분포다각형에서 $S_1 = S_2$ 임을 이용한다.

$$S_1 = S_2 \text{이고 } S_1 + S_2 = 45 \text{이므로 } S_1 = S_2 = \frac{45}{2}$$

세로축의 눈금 한 칸이 나타내는 학생 수를 x 명이라 하면

$$S_1 = S_2 = \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \times \frac{3}{2} x = \frac{45}{2}$$

$$\frac{15}{8} x = \frac{45}{2} \quad \therefore x = 12$$

따라서 키가 160 cm 이상 170 cm 미만인 학생 수는

$$10x + 5x = 10 \times 12 + 5 \times 12 = 180(\text{명})$$

