

정답과 해설

I 지수함수와 로그함수

01 지수	2쪽
02 로그	18쪽
03 지수함수	36쪽
04 로그함수	56쪽

II 삼각함수

05 삼각함수	82쪽
06 삼각함수의 그래프	99쪽
07 사인법칙과 코사인법칙	125쪽

III 수열

08 등차수열	145쪽
09 등비수열	163쪽
10 수열의 합	184쪽
11 수학적 귀납법	205쪽

01 지수

I 지수함수와
로그함수

개념 완성하기

p. 7~8

01 답 $-1, \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$
 $x^3 = -1$ 이라 하면 $x^3 + 1 = 0$
 $(x+1)(x^2 - x + 1) = 0$
 $\therefore x = -1$ 또는 $x = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

02 답 $2, -1 \pm \sqrt{3}i$
 $x^3 = 8$ 이라 하면 $x^3 - 8 = 0$
 $(x-2)(x^2 + 2x + 4) = 0$
 $\therefore x = 2$ 또는 $x = -1 \pm \sqrt{3}i$

03 답 $-3, \frac{3 \pm 3\sqrt{3}i}{2}$
 $x^3 = -27$ 이라 하면 $x^3 + 27 = 0$
 $(x+3)(x^2 - 3x + 9) = 0$
 $\therefore x = -3$ 또는 $x = \frac{3 \pm 3\sqrt{3}i}{2}$

04 답 $\pm 2i, \pm 2$
 $x^4 = 16$ 이라 하면 $x^4 - 16 = 0$
 $(x^2 + 4)(x^2 - 4) = 0, (x^2 + 4)(x+2)(x-2) = 0$
 $\therefore x = \pm 2i$ 또는 $x = \pm 2$

05 답 $\pm 3i, \pm 3$
 $x^4 = 81$ 이라 하면 $x^4 - 81 = 0$
 $(x^2 + 9)(x^2 - 9) = 0, (x^2 + 9)(x+3)(x-3) = 0$
 $\therefore x = \pm 3i$ 또는 $x = \pm 3$

06 답 $\pm 5i, \pm 5$
 $x^4 = 625$ 라 하면 $x^4 - 625 = 0$
 $(x^2 + 25)(x^2 - 25) = 0, (x^2 + 25)(x+5)(x-5) = 0$
 $\therefore x = \pm 5i$ 또는 $x = \pm 5$

07 답 ± 6
 $x^2 = 36$ 이라 하면 $x = \pm 6$
따라서 36의 제곱근 중 실수인 것은 ± 6 이다.

08 답 0.6
 $x^3 = 0.216$ 이라 하면 $x^3 - 0.216 = 0$
 $(x-0.6)(x^2 + 0.6x + 0.36) = 0$
 $\therefore x = 0.6$ 또는 $x = -0.3 \pm \frac{3\sqrt{3}}{10}i$
따라서 0.216의 세제곱근 중 실수인 것은 0.6이다.

09 답 $\pm \frac{3}{2}$
 $x^4 = \frac{81}{16}$ 이라 하면 $x^4 - \frac{81}{16} = 0$

$$\left(x^2 + \frac{9}{4}\right)\left(x^2 - \frac{9}{4}\right) = 0, \left(x^2 + \frac{9}{4}\right)\left(x + \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{3}{2}\right) = 0$$

$$\therefore x = \pm \frac{3}{2}i \text{ 또는 } x = \pm \frac{3}{2}$$

따라서 $\frac{81}{16}$ 의 네제곱근 중 실수인 것은 $\pm \frac{3}{2}$ 이다.

10 답 ± 5
 $x^4 = (-5)^4$ 이라 하면 $x^4 = 625$
 $x^4 - 625 = 0, (x^2 + 25)(x^2 - 25) = 0$
 $(x^2 + 25)(x+5)(x-5) = 0$
 $\therefore x = \pm 5i$ 또는 $x = \pm 5$
따라서 $(-5)^4$ 의 네제곱근 중 실수인 것은 ± 5 이다.

11 답 3
 $\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$

12 답 2
 $\sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2$

13 답 -5
 $\sqrt[3]{-125} = \sqrt[3]{(-5)^3} = -5$

14 답 -3
 $\sqrt[5]{-243} = \sqrt[5]{(-3)^5} = -3$

15 답 -2
 $-\sqrt[4]{16} = -\sqrt[4]{2^4} = -2$

16 답 2
 $-\sqrt[3]{(-2)^3} = -(-2) = 2$

17 답 -2
 $-\sqrt[6]{(-2)^6} = -\sqrt[6]{2^6} = -2$

18 답 0.2
 $\sqrt[4]{0.0016} = \sqrt[4]{0.2^4} = 0.2$

19 답 -0.3
 $\sqrt[3]{-0.027} = \sqrt[3]{(-0.3)^3} = -0.3$

20 답 7
 $\sqrt[3]{7} \times \sqrt[3]{49} = \sqrt[3]{7 \times 49} = \sqrt[3]{7^3} = 7$

21 답 6
 $\sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{4 \times 54} = \sqrt[3]{6^3} = 6$

22 답 3
 $\frac{\sqrt[4]{243}}{\sqrt[4]{3}} = \sqrt[4]{\frac{243}{3}} = \sqrt[4]{3^4} = 3$

23 답 7
 $\frac{\sqrt[3]{686}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{\frac{686}{2}} = \sqrt[3]{7^3} = 7$

24 36

$$(\sqrt[5]{6})^{10} = \sqrt[5]{6^{10}} = \sqrt[5]{(6^2)^5} = 6^2 = 36$$

25 5

$$(\sqrt[6]{25})^3 = \sqrt[6]{25^3} = \sqrt[6]{(5^2)^3} = \sqrt[6]{5^6} = 5$$

26 7

$$\sqrt[3]{\sqrt[4]{7^{12}}} = \sqrt[12]{7^{12}} = 7$$

27 3

$$\sqrt[5]{\sqrt[3]{3^{15}}} = \sqrt[15]{3^{15}} = 3$$

28 2

$$\sqrt[4]{\sqrt[3]{256}} = \sqrt[8]{2^8} = 2$$

29 3

$$\sqrt[3]{\sqrt[6]{729}} = \sqrt[6]{3^6} = 3$$

30 2

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{\sqrt[3]{81}} \times (\sqrt[6]{4})^3 \div \sqrt[6]{9} &= \sqrt[4]{\sqrt[3]{81}} \times \sqrt[6]{4^3} \div \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[4]{\sqrt[3]{3^4}} \times \sqrt[6]{2^3} \div \sqrt[6]{3^2} \\ &= \sqrt[3]{3} \times \sqrt[6]{2^3} \div \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[3]{3} \times 2 \div \sqrt[3]{3} = 2 \end{aligned}$$

31 $24\sqrt{a}$

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt{a}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[4]{a}}} \div \sqrt{\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt{a}}} &= \frac{\sqrt[12]{a}}{\sqrt[6]{a}} \times \frac{\sqrt[6]{a}}{\sqrt[8]{a}} \times \frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[6]{a}} = \frac{\sqrt[12]{a} \times \sqrt[4]{a}}{\sqrt[6]{a} \times \sqrt[8]{a}} \\ &= \frac{\sqrt[24]{a^2} \times \sqrt[24]{a^6}}{\sqrt[24]{a^4} \times \sqrt[24]{a^3}} = \sqrt[24]{\frac{a^2 \times a^6}{a^4 \times a^3}} \\ &= \sqrt[24]{\frac{a^8}{a^7}} = \sqrt[24]{a} \end{aligned}$$

32 $12\sqrt[5]{a^5}$

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt{a}}} \div \sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{a}}{a}} \times \sqrt{\frac{a}{\sqrt[3]{a}}} &= \frac{\sqrt[12]{a}}{\sqrt[6]{a}} \times \frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[12]{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt[6]{a}} = \frac{\sqrt[4]{a} \times \sqrt{a}}{\sqrt[6]{a} \times \sqrt[6]{a}} \\ &= \frac{\sqrt[12]{a^3} \times \sqrt[12]{a^6}}{\sqrt[12]{a^2} \times \sqrt[12]{a^2}} = \sqrt[12]{\frac{a^3 \times a^6}{a^2 \times a^2}} \\ &= \sqrt[12]{\frac{a^9}{a^4}} = \sqrt[12]{a^5} \end{aligned}$$

33 $\frac{1}{9}$

$$3^{-5} \times 3^3 = 3^{-5+3} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

34 64

$$(2^{-3})^{-2} = 2^{-3 \times (-2)} = 2^6 = 64$$

35 a^7

$$a^4 \div (a^3)^{-1} = a^4 \div a^{-3} = a^{4-(-3)} = a^7$$

36 $a^{-4}b^6$

$$(a^2b^{-3})^{-2} = a^{2 \times (-2)}b^{-3 \times (-2)} = a^{-4}b^6$$

37 a^9

$$a^2 \div a^{-3} \times a^4 = a^{2-(-3)+4} = a^9$$

38 a^{-14}

$$\begin{aligned} (a^{-3})^2 \times (a^2)^{-4} &= a^{-3 \times 2} \times a^{2 \times (-4)} = a^{-6} \times a^{-8} \\ &= a^{-6+(-8)} = a^{-14} \end{aligned}$$

39 $5^{\frac{1}{8}}$

$$5^{\frac{1}{2}} \times 5^{-\frac{3}{8}} = 5^{\frac{1}{2} + (-\frac{3}{8})} = 5^{\frac{1}{8}}$$

40 4

$$2^{-\frac{2}{3}} \div 2^{-\frac{8}{3}} = 2^{-\frac{2}{3} - (-\frac{8}{3})} = 2^2 = 4$$

41 $a^{\frac{1}{2}}$

$$(a^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{4}} = a^{\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}} = a^{\frac{1}{2}}$$

42 a^3b^2

$$(a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}})^6 = a^{\frac{1}{2} \times 6}b^{\frac{1}{3} \times 6} = a^3b^2$$

43 1

$$a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{3}} \div a^{\frac{5}{6}} = a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{5}{6}} = a^0 = 1$$

44 ab^3

$$\sqrt[3]{a^5b^{10}} \div \sqrt[3]{a^2b} = a^{\frac{5}{3}}b^{\frac{10}{3}} \div a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{3} - \frac{2}{3}}b^{\frac{10}{3} - \frac{1}{3}} = ab^3$$

45 $a^{\frac{1}{6}}$

$$\begin{aligned} \sqrt[6]{a^2b^3} \times \sqrt{ab} \div \sqrt[3]{a^2b^3} &= a^{\frac{2}{6}}b^{\frac{3}{6}} \times a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} \div a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{3}{3}} \\ &= a^{\frac{2}{6} + \frac{1}{2} - \frac{2}{3}}b^{\frac{3}{6} + \frac{1}{2} - \frac{3}{3}} \\ &= a^{\frac{1}{6}}b^0 = a^{\frac{1}{6}} \end{aligned}$$

46 $ab^{\frac{1}{4}}$

$$\begin{aligned} \sqrt[12]{a^3b} \times \sqrt[4]{a^5b^2} \div \sqrt[6]{a^3b^2} &= a^{\frac{3}{12}}b^{\frac{1}{12}} \times a^{\frac{5}{4}}b^{\frac{2}{4}} \div a^{\frac{3}{6}}b^{\frac{2}{6}} \\ &= a^{\frac{3}{12} + \frac{5}{4} - \frac{3}{6}}b^{\frac{1}{12} + \frac{2}{4} - \frac{2}{6}} \\ &= ab^{\frac{1}{4}} \end{aligned}$$

47 $2^{4\sqrt{2}}$

$$2^{\sqrt{2}} \times 2^{\sqrt{18}} = 2^{\sqrt{2}} \times 2^{3\sqrt{2}} = 2^{\sqrt{2} + 3\sqrt{2}} = 2^{4\sqrt{2}}$$

48 $6^{2\sqrt{3}}$

$$6^{\frac{27}{\sqrt{3}}} \div 6^{\sqrt{3}} \div 6^{\sqrt{3}} = 6^{3\sqrt{3} - \sqrt{3} - \sqrt{3}} = 6^{2\sqrt{3}}$$

49 $\frac{1}{9}$

$$(3^{\sqrt{2}})^{-\sqrt{2}} = 3^{\sqrt{2} \times (-\sqrt{2})} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

50 $2^{\sqrt{3}}$

$$4^{\sqrt{3}} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{3}} = (2^2)^{\sqrt{3}} \times (2^{-1})^{\sqrt{3}} = 2^{2\sqrt{3}} \times 2^{-\sqrt{3}} = 2^{2\sqrt{3} + (-\sqrt{3})} = 2^{\sqrt{3}}$$

51 ㉡ 2

$$(2^{\sqrt{8}} \div 2^{\sqrt{2}})^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = (2^{2\sqrt{2}} \div 2^{\sqrt{2}})^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = (2^{2\sqrt{2}-\sqrt{2}})^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = 2^{\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}}} = 2$$

52 ㉡ $\frac{5}{3}$

$$\begin{aligned} \left\{ \left(\frac{9}{25} \right)^{\frac{5}{8}} \right\}^{-\frac{4}{5}} &= \left(\frac{9}{25} \right)^{\frac{5}{8} \times \left(-\frac{4}{5} \right)} = \left(\frac{9}{25} \right)^{-\frac{1}{2}} = \left\{ \left(\frac{3}{5} \right)^2 \right\}^{-\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{3}{5} \right)^{2 \times \left(-\frac{1}{2} \right)} = \left(\frac{3}{5} \right)^{-1} = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

53 ㉡ $\frac{4}{7}$

$$\begin{aligned} \left\{ \left(\frac{49}{16} \right)^{-\frac{3}{4}} \right\}^{\frac{2}{3}} &= \left(\frac{49}{16} \right)^{-\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}} = \left(\frac{49}{16} \right)^{-\frac{1}{2}} = \left\{ \left(\frac{7}{4} \right)^2 \right\}^{-\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{7}{4} \right)^{2 \times \left(-\frac{1}{2} \right)} = \left(\frac{7}{4} \right)^{-1} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

54 ㉡ $\frac{4}{9}$

$$\begin{aligned} \left(\frac{4}{9} \right)^{\frac{3}{4}} \times \left(\frac{27}{8} \right)^{-\frac{1}{6}} &= \left\{ \left(\frac{2}{3} \right)^2 \right\}^{\frac{3}{4}} \times \left\{ \left(\frac{3}{2} \right)^3 \right\}^{-\frac{1}{6}} \\ &= \left(\frac{2}{3} \right)^{2 \times \frac{3}{4}} \times \left(\frac{3}{2} \right)^{3 \times \left(-\frac{1}{6} \right)} \\ &= \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{3}{2}} \times \left(\frac{3}{2} \right)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{3}{2}} \times \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}} = \left(\frac{2}{3} \right)^2 \\ &= \frac{4}{9} \end{aligned}$$

55 ㉡ $\frac{1}{4}$

$$\begin{aligned} 16^3 \times \left(\frac{1}{8} \right)^3 \div 32 &= (2^4)^3 \times (2^{-3})^3 \div 2^5 = 2^{4 \times 3} \times 2^{-3 \times 3} \div 2^5 \\ &= 2^{12} \times 2^{-9} \div 2^5 = 2^{12+(-9)-5} \\ &= 2^{-2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

56 ㉡ 4

$$\begin{aligned} (3\sqrt{4})^6 \div 3\sqrt{32^2} &= (3\sqrt{2^2})^6 \div 3\sqrt{(2^5)^2} = 3\sqrt{2^{12}} \div 3\sqrt{2^{10}} = 2^{\frac{12}{3}} \div 2^{\frac{10}{3}} \\ &= 2^4 \div 2^2 = 2^{4-2} = 2^2 = 4 \end{aligned}$$

57 ㉡ $\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} 2^{\frac{2}{3}} \div 8 \times \sqrt[3]{4^2} &= 2^{\frac{2}{3}} \div 2^3 \times \sqrt[3]{(2^2)^2} = 2^{\frac{2}{3}} \div 2^3 \times \sqrt[3]{2^4} \\ &= 2^{\frac{2}{3}} \div 2^3 \times 2^{\frac{4}{3}} = 2^{\frac{2}{3}-3+\frac{4}{3}} \\ &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

58 ㉡ $5^{\frac{1}{2}}$

$$\sqrt[4]{625} = \sqrt[8]{5^4} = 5^{\frac{4}{8}} = 5^{\frac{1}{2}}$$

59 ㉡ $3^{\frac{2}{3}}$

$$\sqrt[3]{81} = \sqrt[6]{3^4} = 3^{\frac{4}{6}} = 3^{\frac{2}{3}}$$

유형 완성하기

p. 9~23

01 ㉡ ③

① -8의 세제곱근을 x 라 하면 $x^3 = -8$

$$x^3 + 8 = 0, (x+2)(x^2-2x+4) = 0$$

$$\therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 1 \pm \sqrt{3}i$$

② -7의 세제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[3]{-7}$ 이다.

③ 81의 네제곱근을 x 라 하면 $x^4 = 81$

$$x^4 - 81 = 0, (x^2+9)(x+3)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = \pm 3i \text{ 또는 } x = \pm 3$$

즉 81의 네제곱근 중 실수인 것은 ± 3 이다.

④ n 이 홀수일 때, -3의 n 제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[n]{-3}$ 의 한 개이다.

⑤ n 이 짝수일 때, 4의 n 제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[n]{4}$, $-\sqrt[n]{4}$ 의 두 개이다.

따라서 옳은 것은 ③이다.

01-1 ㉡ ④

① 5의 다섯제곱근은 방정식 $x^5 = 5$ 의 근이므로 5개이다.

② -2의 세제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[3]{-2}$ 이다.

③ -3^6 의 세제곱근 중 실수인 것은

$$\sqrt[3]{-3^6} = \sqrt[3]{-729} = \sqrt[3]{(-9)^3} = -9 \text{이다.}$$

④ n 이 2 이상의 홀수일 때, n 의 n 제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[n]{n}$ 의 한 개이다.

⑤ n 이 2 이상의 짝수일 때, $-n$ 의 n 제곱근 중 실수인 것은 존재하지 않는다.

따라서 옳은 것은 ④이다.

02 ㉡ 3

$$\begin{aligned} \sqrt[5]{(-5)^5} + \sqrt[6]{(-6)^6} + \sqrt[7]{(-7)^7} + \sqrt[8]{(-8)^8} \\ + \sqrt[9]{(-9)^9} + \sqrt[10]{(-10)^{10}} \\ = -5 + 6 + (-7) + 8 + (-9) + 10 = 3 \end{aligned}$$

02-1 ㉡ 7

$$\begin{aligned} \sqrt{(-2)^2} + \sqrt[3]{(-3)^3} + \sqrt[4]{(-4)^4} + \cdots + \sqrt[12]{(-12)^{12}} \\ = 2 + (-3) + 4 + (-5) + 6 + (-7) + 8 + (-9) \\ + 10 + (-11) + 12 \\ = -1 \times 5 + 12 = 7 \end{aligned}$$

03 ㉡ 20

-125의 세제곱근 중 실수인 것은

$$\sqrt[3]{-125} = \sqrt[3]{(-5)^3} = -5 \text{이므로 } a = -5 \quad \cdots \cdots ①$$

256의 네제곱근 중 음수인 것은

$$-\sqrt[4]{256} = -\sqrt[4]{4^4} = -4 \text{이므로 } b = -4 \quad \cdots \cdots ②$$

$$\therefore ab = -5 \times (-4) = 20 \quad \cdots \cdots ③$$

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40%
② b 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ ab 의 값을 구할 수 있다.	20%

03-1 ㉔ ②

2^{100} 의 다섯제곱근 중 실수인 것은

$$\sqrt[5]{2^{100}} = \sqrt[5]{(2^{20})^5} = 2^{20} \text{이므로 } x = 2^{20}$$

x , 즉 2^{20} 의 네제곱근 중 음수인 것은

$$-\sqrt[4]{2^{20}} = -\sqrt[4]{(2^5)^4} = -2^5 \text{이므로 } y = -2^5$$

따라서 y , 즉 -2^5 의 세제곱근 중 실수인 것은

$$\sqrt[3]{-2^5} = -\sqrt[3]{2^5}$$

04 ㉔ 3

n 이 짝수일 때, -2 의 n 제곱근 중 실수인 것은 존재하지 않으므로

$$a = 0$$

8의 세제곱근은 방정식 $x^3 = 8$ 의 근이므로 3개이다.

$$\therefore b = 3$$

$$\therefore a + b = 0 + 3 = 3$$

04-1 ㉔ ⑤

-64 의 세제곱근 중 실수인 것은

$$\sqrt[3]{-64} = \sqrt[3]{(-4)^3} = -4 \text{의 1개이므로 } a = 1$$

16의 네제곱근 중 실수인 것은

$$\pm \sqrt[4]{16} = \pm \sqrt[4]{2^4} = \pm 2 \text{의 2개이므로 } b = 2$$

81의 여섯제곱근은 방정식 $x^6 = 81$ 의 근이므로 6개이다.

$$\therefore c = 6$$

$$\therefore a + b + c = 1 + 2 + 6 = 9$$

05 ㉔ 4

-3 의 3제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[3]{-3}$ 의 1개이므로

$$f(3, -3) = 1 \quad \dots\dots ①$$

-4 의 4제곱근 중 실수인 것은 존재하지 않으므로

$$f(4, -4) = 0 \quad \dots\dots ②$$

5의 5제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[5]{5}$ 의 1개이므로

$$f(5, 5) = 1 \quad \dots\dots ③$$

6의 6제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[6]{6}$, $-\sqrt[6]{6}$ 의 2개이므로

$$f(6, 6) = 2 \quad \dots\dots ④$$

$$\therefore f(3, -3) + f(4, -4) + f(5, 5) + f(6, 6)$$

$$= 1 + 0 + 1 + 2 = 4 \quad \dots\dots ⑤$$

채점 기준	비율
① $f(3, -3)$ 의 값을 구할 수 있다.	20%
② $f(4, -4)$ 의 값을 구할 수 있다.	20%
③ $f(5, 5)$ 의 값을 구할 수 있다.	20%
④ $f(6, 6)$ 의 값을 구할 수 있다.	20%
⑤ $f(3, -3) + f(4, -4) + f(5, 5) + f(6, 6)$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

05-1 ㉔ 18

$f(n)$ 은 16의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수이므로 방정식 $x^n = 16$ 의 실근의 개수와 같다.

n 이 홀수이면 $f(n) = 1$ 이므로

$$f(3) = f(5) = f(7) = f(9) = f(11) = f(13) = 1$$

n 이 짝수이면 $f(n) = 2$ 이므로

$$f(2) = f(4) = f(6) = f(8) = f(10) = f(12) = 2$$

$$\therefore f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(13) = 1 \times 6 + 2 \times 6 = 18$$

06 ㉔ 6

$$B = \{4, 25\} \text{이므로}$$

(i) $b = 4$ 일 때

$$\sqrt[4]{-5}, \sqrt[4]{-2} \text{는 실수가 아니고 } \sqrt[4]{2}, \sqrt[4]{5} \text{는 실수이다.}$$

(ii) $b = 25$ 일 때

$$\sqrt[25]{-5}, \sqrt[25]{-2}, \sqrt[25]{2}, \sqrt[25]{5} \text{는 모두 실수이다.}$$

(i), (ii)에서

$$X = \{\sqrt[4]{2}, \sqrt[4]{5}, \sqrt[25]{-5}, \sqrt[25]{-2}, \sqrt[25]{2}, \sqrt[25]{5}\}$$

따라서 집합 X 의 원소의 개수는 6이다.

06-1 ㉔ 8

$$B = \{3, 5\} \text{이므로} \quad \dots\dots ①$$

(i) $y = 3$ 일 때

$$\sqrt[3]{-5}, \sqrt[3]{-3}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{5} \text{는 모두 실수이다.}$$

(ii) $y = 5$ 일 때

$$\sqrt[5]{-5}, \sqrt[5]{-3}, \sqrt[5]{3}, \sqrt[5]{5} \text{는 모두 실수이다.}$$

(i), (ii)에서

$$X = \{\sqrt[3]{-5}, \sqrt[3]{-3}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[5]{-5}, \sqrt[5]{-3}, \sqrt[5]{3}, \sqrt[5]{5}\} \quad \dots\dots ②$$

따라서 집합 X 의 원소의 개수는 8이다. ③

채점 기준	비율
① 집합 B 를 원소나열법으로 나타낼 수 있다.	30%
② 집합 X 를 원소나열법으로 나타낼 수 있다.	60%
③ 집합 X 의 원소의 개수를 구할 수 있다.	10%

07 ㉔ ⑤

$$① \sqrt[3]{2} \times \sqrt[4]{2} = \sqrt[12]{2^4} \times \sqrt[12]{2^3} = \sqrt[12]{2^4 \times 2^3} = \sqrt[12]{2^7}$$

$$② \sqrt[3]{-2} \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{-2} \sqrt[3]{4^3} = \sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{(-2)^3} = -2$$

$$③ \sqrt[5]{3} \sqrt[3]{32} = \sqrt[15]{3^3} \sqrt[15]{2^5} = \sqrt[15]{2^5}$$

$$④ \frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{-8}} = \frac{\sqrt[3]{3^3}}{\sqrt[3]{(-2)^3}} = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}, \quad -\sqrt[3]{\frac{27}{8}} = -\sqrt[3]{\left(\frac{3}{2}\right)^3} = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore \frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{-8}} = -\sqrt[3]{\frac{27}{8}}$$

$$⑤ \left(\sqrt[3]{5} \times \frac{1}{\sqrt[3]{5}}\right)^6 = (\sqrt[3]{5})^6 \times \frac{1}{(\sqrt[3]{5})^6} = \{(\sqrt[3]{5})^3\}^2 \times \frac{1}{\{(\sqrt[3]{5})^3\}^2}$$

$$= 5^2 \times \frac{1}{5^2} = \frac{1}{5}$$

07-1 ㉔ ②

$$\neg. \sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{8} = \sqrt[4]{2 \times 8} = \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = 2$$

$$\neg. \sqrt[6]{625} \times \sqrt[6]{5} = \sqrt[6]{5^4} \times \sqrt[6]{5} = \sqrt[6]{5^5}$$

$$\neg. (\sqrt[8]{9})^4 = \sqrt[8]{9^4} = \sqrt[8]{(3^2)^4} = \sqrt[8]{3^8} = 3$$

$$\neg. \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{2^6} = 2$$

따라서 옳은 것은 $\neg$, ρ 이다.

08 ㉔ (1) 6 (2) 7 (3) 3

$$(1) (\sqrt[4]{4})^2 + \sqrt[5]{32^3} \times \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{16}} = \sqrt[4]{4^2} + \sqrt[5]{(2^5)^3} \times \sqrt[3]{\frac{2}{16}}$$

$$= \sqrt[4]{(2^2)^2} + \sqrt[5]{(2^3)^5} \times \sqrt[3]{\frac{1}{8}}$$

$$= \sqrt[4]{2^4} + 2^3 \times \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}\right)^3}$$

$$= 2 + 2^3 \times \frac{1}{2}$$

$$= 2 + 2^2 = 6$$

$$\begin{aligned}
 (2) \sqrt[4]{3} \times \sqrt{\sqrt{27}} + \frac{(\sqrt[3]{16})^2}{\sqrt[3]{4}} &= \sqrt[4]{3} \times \sqrt[4]{3^3} + \frac{\sqrt[3]{2^8}}{\sqrt[3]{2^2}} \\
 &= \sqrt[4]{3 \times 3^3} + \sqrt[3]{\frac{2^8}{2^2}} \\
 &= \sqrt[4]{3^4} + \sqrt[3]{2^6} \\
 &= 3 + \sqrt[3]{(2^2)^3} \\
 &= 3 + 2^2 = 7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \frac{(\sqrt[3]{2}+1)(\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}+1)}{(\sqrt[3]{2}-1)(\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1)} &= \frac{(\sqrt[3]{2}+1)\{(\sqrt[3]{2})^2-\sqrt[3]{2} \times 1+1^2\}}{(\sqrt[3]{2}-1)\{(\sqrt[3]{2})^2+\sqrt[3]{2} \times 1+1^2\}} \\
 &= \frac{(\sqrt[3]{2})^3+1}{(\sqrt[3]{2})^3-1} = \frac{2+1}{2-1} = 3
 \end{aligned}$$

08-1 ㉔ (1) 42 (2) 21 (3) $\sqrt[3]{25}$

$$\begin{aligned}
 (1) \sqrt[4]{36^2} + (\sqrt[3]{6})^3 + \sqrt[3]{6^6} - \sqrt[4]{(-6)^4} \\
 = \sqrt[4]{(6^2)^2} + \sqrt[3]{6^3} + \sqrt[3]{(6^2)^3} - \sqrt[4]{6^4} \\
 = 6 + 6 + 6^2 - 6 \\
 = 42
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \sqrt[3]{3^4} \div \sqrt[3]{3} \times (\sqrt[3]{7})^3 &= \sqrt[3]{\frac{3^4}{3}} \times \sqrt[3]{7^3} \\
 &= \sqrt[3]{3^3} \times \sqrt[3]{7^3} \\
 &= 3 \times 7 \\
 &= 21
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \sqrt[3]{3\sqrt{5}} \times \sqrt{\frac{125}{9}} &= \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{5} \times \frac{\sqrt{5^3}}{\sqrt{3^2}} \\
 &= \sqrt[3]{3^2} \times \sqrt[3]{5} \times \frac{\sqrt{5^3}}{\sqrt{3^2}} \\
 &= \sqrt[3]{5^4} = \sqrt[3]{25}
 \end{aligned}$$

09 ㉔ ②

$$\begin{aligned}
 \sqrt{\frac{4\sqrt{3}}{2^5}} \times \sqrt{\frac{2}{\sqrt[6]{3}}} &= \frac{\sqrt[3]{4\sqrt{3}}}{\sqrt[6]{2^5}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[6]{3}} = \frac{12\sqrt{3}}{\sqrt[6]{2^5}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[6]{3}} \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[6]{2^5}} = \frac{\sqrt[6]{2^3}}{\sqrt[6]{2^5}} = \frac{1}{\sqrt[6]{2^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}
 \end{aligned}$$

$$\therefore m=3$$

09-1 ㉔ ⑤

$$\begin{aligned}
 \frac{\sqrt{2\sqrt[3]{3\sqrt[4]{4}}}}{\sqrt[12]{12}} &= \frac{\sqrt{2} \times \sqrt[6]{3} \times \sqrt[24]{4}}{\sqrt[12]{12}} = \frac{12\sqrt[26]{2^6 \times 12^3 \times 2^{12}}}{\sqrt[12]{12}} \\
 &= \frac{12\sqrt[26]{2^7 \times 3^2}}{\sqrt[12]{2^2 \times 3}} = \sqrt[12]{2^5 \times 3} = \sqrt[12]{96}
 \end{aligned}$$

$$\therefore a=96$$

10 ㉔ 12

$$\begin{aligned}
 \sqrt{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}} \div \sqrt{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}} &= \frac{\sqrt{\sqrt{a}}}{\sqrt[3]{\sqrt{a}}} \times \frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{a}} \div \frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{\sqrt[3]{a}}} \\
 &= \frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[6]{a}} \times \frac{\sqrt[8]{a}}{\sqrt[4]{a}} \times \frac{\sqrt[12]{a}}{\sqrt[8]{a}} \\
 &= \frac{12\sqrt{a}}{\sqrt[6]{a}} = \frac{12\sqrt{a}}{\sqrt[12]{a^2}} \\
 &= \sqrt[12]{\frac{a}{a^2}} = \sqrt[12]{\frac{1}{a}}
 \end{aligned}$$

$$\therefore n=12$$

10-1 ㉔ 1

$$\begin{aligned}
 \sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[5]{a}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[4]{5a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt[5]{\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[4]{a}}} &= \frac{\sqrt[3]{\sqrt[4]{a}}}{\sqrt[5]{\sqrt[4]{a}}} \times \frac{\sqrt[4]{5a}}{\sqrt[4]{\sqrt[3]{a}}} \times \frac{\sqrt[5]{\sqrt[3]{a}}}{\sqrt[5]{\sqrt[4]{a}}} \\
 &= \frac{12\sqrt{a}}{15\sqrt[4]{a}} \times \frac{20\sqrt{a}}{12\sqrt[4]{a}} \times \frac{15\sqrt{a}}{20\sqrt[4]{a}} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

11 ㉔ a

$$\begin{aligned}
 \sqrt{a^3b} \div \sqrt[3]{a^4b^2} \times \sqrt[6]{a^5b} &= \frac{\sqrt[6]{a^9b^3} \times \sqrt[6]{a^5b}}{\sqrt[6]{a^8b^4}} = \sqrt[6]{\frac{a^{14}b^4}{a^8b^4}} \\
 &= \sqrt[6]{a^6} = a
 \end{aligned}$$

Lecture 거듭제곱근의 성질

실수 a 와 2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a & (n \text{은 홀수}) \\ |a| & (n \text{은 짝수}) \end{cases}$$

11-1 ㉔ ⑤

$$\begin{aligned}
 \sqrt[3]{a^8} \times \sqrt{b^2} \div \sqrt[3]{a^2b} &= \frac{\sqrt[3]{a^8} \times \sqrt[6]{b^2}}{\sqrt[3]{a^2} \times \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^8} \times \sqrt[6]{b^2}}{\sqrt[3]{a^2} \times \sqrt[6]{b^2}} \\
 &= \sqrt[3]{a^6} = \sqrt[3]{(a^2)^3} = a^2
 \end{aligned}$$

12 ㉔ 7

$$\begin{aligned}
 \frac{\sqrt{\sqrt{a^3} \times \sqrt[4]{a}}}{\sqrt[6]{a}} &= \frac{\sqrt[4]{a^3} \times \sqrt[8]{a}}{\sqrt[6]{a}} = \frac{24\sqrt[24]{a^{18}} \times 24\sqrt[24]{a^3}}{24\sqrt[24]{a^4}} \\
 &= \frac{24\sqrt[24]{a^{21}}}{24\sqrt[24]{a^4}} = \sqrt[24]{\frac{a^{21}}{a^4}} \\
 &= \sqrt[24]{a^{17}}
 \end{aligned}$$

따라서 $m=24, n=17$ 이므로

$$m-n=24-17=7$$

12-1 ㉔ ④

$$\begin{aligned}
 \sqrt{a \times \sqrt[3]{a^2} \times \sqrt[4]{a}} &= \sqrt{a} \times \sqrt[6]{a^2} \times \sqrt[24]{a} = \sqrt[24]{a^{12}} \times \sqrt[24]{a^8} \times \sqrt[24]{a} \\
 &= \sqrt[24]{a^{12} \times a^8 \times a} = \sqrt[24]{a^{21}} = \sqrt[8]{a^7}
 \end{aligned}$$

따라서 $m=7, n=8$ 이므로

$$m+n=7+8=15$$

13 ㉔ ④

3, 4, 6의 최소공배수가 12이므로

$$\sqrt[3]{3} = \sqrt[12]{3^4} = \sqrt[12]{81}$$

$$\sqrt[4]{6} = \sqrt[12]{6^3} = \sqrt[12]{216}$$

$$\sqrt[6]{7} = \sqrt[12]{7^2} = \sqrt[12]{49}$$

따라서 $\sqrt[12]{49} < \sqrt[12]{81} < \sqrt[12]{216}$ 이므로

$$\sqrt[6]{7} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[4]{6}$$

13-1 ㉔ ③

3, 5, 7의 최소공배수가 105이므로

$$\sqrt[3]{9} = \sqrt[105]{9^{35}} = \sqrt[105]{(3^2)^{35}} = \sqrt[105]{3^{70}}$$

$$\sqrt[5]{27} = \sqrt[105]{27^{21}} = \sqrt[105]{(3^3)^{21}} = \sqrt[105]{3^{63}}$$

$$\sqrt[7]{243} = \sqrt[105]{243^{15}} = \sqrt[105]{(3^5)^{15}} = \sqrt[105]{3^{75}}$$

따라서 $105\sqrt[3]{3^{63}} < 105\sqrt[3]{3^{70}} < 105\sqrt[3]{3^{75}}$ 이므로
 $5\sqrt[5]{27} < 3\sqrt[3]{9} < \sqrt[7]{243}$

14 ㉠ $C < B < A$

$$A = \sqrt[3]{3\sqrt{3}} = \sqrt[3]{3} \times \sqrt[6]{3} = \sqrt[6]{3^2} \times \sqrt[6]{3} = \sqrt[6]{3^3} = \sqrt[3]{3}$$

$$B = \sqrt{2\sqrt[3]{2}} = \sqrt{2} \times \sqrt[6]{2} = \sqrt[6]{2^3} \times \sqrt[6]{2} = \sqrt[6]{2^4} = \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$$

$$C = \sqrt[6]{5\sqrt{5}} = \sqrt[6]{5} \times \sqrt[12]{5} = \sqrt[12]{5^2} \times \sqrt[12]{5} = \sqrt[12]{5^3} = \sqrt[4]{5}$$

이때 2, 3, 4의 최소공배수가 12이므로

$$A = \sqrt[3]{3} = \sqrt[12]{3^6} = \sqrt[12]{729}$$

$$B = \sqrt[3]{4} = \sqrt[12]{4^4} = \sqrt[12]{256}$$

$$C = \sqrt[4]{5} = \sqrt[12]{5^3} = \sqrt[12]{125}$$

따라서 $\sqrt[12]{125} < \sqrt[12]{256} < \sqrt[12]{729}$ 이므로

$$C < B < A$$

..... ①

..... ②

..... ③

채점 기준	비율
① 세 수 A, B, C를 $\sqrt[n]{n}$ 꼴로 나타낼 수 있다.	30%
② 세 수 A, B, C를 $\sqrt[n]{a}$ 꼴로 나타낼 수 있다.	30%
③ 세 수 A, B, C의 대소 관계를 나타낼 수 있다.	40%

14-1 ㉠ ④

$$\sqrt[3]{3\sqrt{2}} = \sqrt[3]{3} \times \sqrt[6]{2} = \sqrt[6]{3^2} \times \sqrt[6]{2} = \sqrt[6]{18}$$

$$\sqrt[3]{2\sqrt{3}} = \sqrt[3]{2} \times \sqrt[6]{3} = \sqrt[6]{2^2} \times \sqrt[6]{3} = \sqrt[6]{12}$$

$$\sqrt{2\sqrt[3]{3}} = \sqrt{2} \times \sqrt[6]{3} = \sqrt[6]{2^3} \times \sqrt[6]{3} = \sqrt[6]{24}$$

$$\text{즉 } \sqrt[6]{12} < \sqrt[6]{18} < \sqrt[6]{24} \text{ 이므로 } a = \sqrt[6]{24}, b = \sqrt[6]{12}$$

$$b \leq \sqrt[n]{n} \leq a \text{ 에서 } \sqrt[6]{12} \leq \sqrt[n]{n} \leq \sqrt[6]{24}$$

$$\therefore 12 \leq n \leq 24$$

따라서 자연수 n의 값은 12, 13, 14, ..., 24이므로 그 개수는 13이다.

15 ㉠ 505

3, 4, 6의 최소공배수가 12이므로

$$A = \sqrt{\frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{1}{4^4}} = \sqrt{\frac{1}{256}}$$

$$B = \sqrt[4]{\frac{1}{6}} = \sqrt[12]{\frac{1}{6^3}} = \sqrt[12]{\frac{1}{216}}$$

$$C = \sqrt[6]{\frac{1}{17}} = \sqrt[12]{\frac{1}{17^2}} = \sqrt[12]{\frac{1}{289}}$$

$$\text{즉 } \sqrt[12]{\frac{1}{289}} < \sqrt[12]{\frac{1}{256}} < \sqrt[12]{\frac{1}{216}} \text{ 이므로}$$

$$a = \sqrt[12]{\frac{1}{216}}, b = \sqrt[12]{\frac{1}{289}}$$

$$\therefore \left(\frac{1}{a}\right)^{12} + \left(\frac{1}{b}\right)^{12} = 216 + 289 = 505$$

15-1 ㉠ 56

$$\sqrt[3]{15} = \sqrt[6]{15} = \sqrt[12]{15^2} = \sqrt[12]{225}$$

$$\sqrt[4]{6} = \sqrt[6]{6} = \sqrt[12]{6^3} = \sqrt[12]{216}$$

$$\sqrt[3]{16} = \sqrt[6]{16} = \sqrt[12]{16^2} = \sqrt[12]{256}$$

$$\sqrt[4]{2\sqrt[3]{25}} = \sqrt[4]{2} \times \sqrt[12]{25} = \sqrt[12]{2^3} \times \sqrt[12]{25} = \sqrt[12]{200}$$

$$\text{즉 } \sqrt[12]{200} < \sqrt[12]{216} < \sqrt[12]{225} < \sqrt[12]{256} \text{ 이므로}$$

$$a = \sqrt[12]{256}, b = \sqrt[12]{200}$$

$$\therefore a^{12} - b^{12} = 256 - 200 = 56$$

16 ㉠ ④

$$\neg. 2^{3+\sqrt{3}} \div 2^{\sqrt{3}} = 2^{3+\sqrt{3}-\sqrt{3}} = 2^3 = 8$$

$$\begin{aligned} \neg. (3^{\sqrt{2}} \div 9)^{\sqrt{2}+2} &= (3^{\sqrt{2}} \div 3^2)^{\sqrt{2}+2} = (3^{\sqrt{2}-2})^{\sqrt{2}+2} \\ &= 3^{(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}+2)} = 3^{-2} = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

$$\neg. \{(3\sqrt{3})^{\sqrt{3}}\}^{\sqrt{3}} = (3\sqrt{3})^{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = (3\sqrt{3})^3 = \sqrt[3]{3^3} = 3$$

$$\begin{aligned} \neg. (27^2)^{\frac{1}{6}} \times 32^{-\frac{1}{5}} &= \{(3^3)^2\}^{\frac{1}{6}} \times (2^5)^{-\frac{1}{5}} \\ &= 3^{3 \times 2 \times \frac{1}{6}} \times 2^{5 \times (-\frac{1}{5})} \\ &= 3 \times 2^{-1} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다.

16-1 ㉠ ③

$$\neg. \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$$

$$\neg. (-2)^3 \times (-2)^2 = (-2)^{3+2} = (-2)^5$$

$$\neg. \{(-1)^6\}^{\frac{1}{2}} = 1^{\frac{1}{2}} = 1$$

$$\neg. (3^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = 3^{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = 3^2 = 9$$

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다.

17 ㉠ ④

$$\begin{aligned} a^{-8} \times (a^{-3})^{-2} \div a^{-5} &= a^{-8} \times a^{-3 \times (-2)} \div a^{-5} = a^{-8} \times a^6 \div a^{-5} \\ &= a^{-8+6-(-5)} = a^3 \end{aligned}$$

$$\text{즉 } a^3 = a^k \text{ 이므로 } k=3$$

17-1 ㉠ $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \{(64^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{2}} \times 32^{-\frac{1}{5}} \div (8^{\frac{2}{3}})^{-\frac{1}{4}}\} &= 64^{2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}} \times (2^5)^{-\frac{1}{5}} \div 8^{\frac{2}{3} \times (-\frac{1}{4})} \\ &= (2^6)^{\frac{1}{3}} \times 2^{5 \times (-\frac{1}{5})} \div (2^3)^{-\frac{1}{6}} \\ &= 2^{6 \times \frac{1}{3}} \times 2^{-1} \div 2^{3 \times (-\frac{1}{6})} \\ &= 2^2 \times 2^{-1} \div 2^{-\frac{1}{2}} \\ &= 2^{2+(-1)-(-\frac{1}{2})} \\ &= 2^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

$$\text{즉 } 2^{\frac{3}{2}} = 2^k \text{ 이므로 } k = \frac{3}{2}$$

18 ㉠ $\frac{9}{2}$

$$\begin{aligned} \left\{\left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{3}{4}}\right\}^{\frac{2}{3}} \times \left\{\left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}\right\}^{\frac{1}{2}} &= \left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}} \times \left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{1}{2}} \times \left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{1}{3}} \\ &= \left\{\left(\frac{2}{3}\right)^2\right\}^{-\frac{1}{2}} \times \left\{\left(\frac{1}{3}\right)^3\right\}^{-\frac{1}{3}} \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} \\ &= \frac{3}{2} \times 3 = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

18-1 ㉠ $\frac{9}{16}$

$$\begin{aligned} a &= 27^{\frac{5}{3}} \times 64^{-\frac{5}{3}} = (3^3)^{\frac{5}{3}} \times (2^6)^{-\frac{5}{3}} \\ &= 3^{3 \times \frac{5}{3}} \times 2^{6 \times (-\frac{5}{3})} = 3^5 \times 2^{-10} \end{aligned}$$

..... ①

$$b = \left\{ \left(\frac{9}{16} \right)^{-\frac{2}{3}} \right\}^{\frac{9}{4}} = \left[\left\{ \left(\frac{3}{2^2} \right)^2 \right\}^{-\frac{2}{3}} \right]^{\frac{9}{4}}$$

$$= \left(\frac{3}{2^2} \right)^{2 \times \left(-\frac{2}{3} \right) \times \frac{9}{4}}$$

$$= \left(\frac{3}{2^2} \right)^{-3} = \frac{2^6}{3^3}$$

$$\therefore ab = 3^5 \times 2^{-10} \times \frac{2^6}{3^3} = 3^{5-3} \times 2^{-10+6}$$

$$= 3^2 \times 2^{-4} = \frac{9}{16}$$

..... ②

..... ③

채점 기준	비율
① a 를 2, 3의 거듭제곱으로 나타낼 수 있다.	40%
② b 를 2, 3의 거듭제곱으로 나타낼 수 있다.	40%
③ ab 의 값을 구할 수 있다.	20%

19 ㉮ ③

$$\left(a^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \right)^{-\frac{\sqrt{2}}{4}} \times a^3 \div a^{\frac{1}{4}} = a^{\frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} \right)} \times a^3 \div a^{\frac{1}{4}}$$

$$= a^{-\frac{1}{4}} \times a^3 \div a^{\frac{1}{4}}$$

$$= a^{-\frac{1}{4} + 3 - \frac{1}{4}}$$

$$= a^{\frac{5}{2}}$$

이때 $a^5 = 16 = 2^4$ 이므로

$$a^{\frac{5}{2}} = (a^5)^{\frac{1}{2}} = (2^4)^{\frac{1}{2}} = 2^{4 \times \frac{1}{2}} = 2^2 = 4$$

19-1 ㉮ 4√6

$$(a^{\sqrt{2}})^{3\sqrt{3}} \div a^{2\sqrt{6}} \times (a^{\frac{1}{4}})^{12\sqrt{6}} = a^{\sqrt{2} \times 3\sqrt{3}} \div a^{2\sqrt{6}} \times a^{\frac{1}{4} \times 12\sqrt{6}}$$

$$= a^{3\sqrt{6}} \div a^{2\sqrt{6}} \times a^{3\sqrt{6}}$$

$$= a^{3\sqrt{6} - 2\sqrt{6} + 3\sqrt{6}}$$

$$= a^{4\sqrt{6}}$$

즉 $a^{4\sqrt{6}} = a^k$ 이므로 $k = 4\sqrt{6}$

20 ㉮ ③

$$\left(\frac{1}{16} \right)^{\frac{a}{6}} = (4^{-2})^{\frac{a}{6}} = 4^{-\frac{a}{3}} = (4^a)^{-\frac{1}{3}}$$

$$= 27^{-\frac{1}{3}} = (3^3)^{-\frac{1}{3}} = 3^{-1}$$

$$= \frac{1}{3}$$

20-1 ㉮ ③

$$9^a = \frac{4}{25} \text{에서 } (3^a)^2 = \left(\frac{2}{5} \right)^2$$

$$\therefore 3^a = \frac{2}{5}$$

$$\therefore 2 \times 3^{2-a} = 2 \times 3^2 \div 3^a = 2 \times 3^2 \div \frac{2}{5}$$

$$= 2 \times 3^2 \times \frac{5}{2} = 45$$

21 ㉮ ②

$$\sqrt[3]{a^5 \sqrt[5]{a^4}} = \sqrt[3]{a^5 \times \sqrt[5]{a^4}} = \sqrt[3]{a^5 \times a^{\frac{4}{5}}} = a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{15}} \times a^{\frac{1}{60}}$$

$$= a^{\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{60}} = a^{\frac{5}{12}}$$

즉 $a^{\frac{5}{12}} = a^{\frac{n}{m}}$ 이므로 $m = 12, n = 5$

$$\therefore m + n = 12 + 5 = 17$$

21-1 ㉮ ②

$$\sqrt[3]{2^4 \sqrt[4]{4} \times \sqrt[3]{16}} \div \sqrt[6]{2^3 \sqrt[2]{k}} = \sqrt[3]{2} \times \sqrt[12]{2^2} \times \sqrt[9]{2^4} \div (\sqrt[6]{2} \times \sqrt[18]{2^k})$$

$$= 2^{\frac{1}{3}} \times 2^{\frac{2}{12}} \times 2^{\frac{4}{9}} \div (2^{\frac{1}{6}} \times 2^{\frac{k}{18}})$$

$$= 2^{\frac{1}{3} + \frac{2}{12} + \frac{4}{9}} \div 2^{\frac{1}{6} + \frac{k}{18}}$$

$$= 2^{\frac{17}{18}} \div 2^{\frac{1}{6} + \frac{k}{18}}$$

$$= 2^{\frac{17}{18} - (\frac{1}{6} + \frac{k}{18})}$$

$$= 2^{\frac{7}{9} - \frac{k}{18}}$$

$$\text{즉 } 2^{\frac{7}{9} - \frac{k}{18}} = 1 \text{이므로 } \frac{7}{9} - \frac{k}{18} = 0$$

$$\therefore k = 14$$

22 ㉮ 9

$$\sqrt[3]{\frac{4\sqrt{3}}{3}} \times \sqrt{\frac{a\sqrt{3}}{6\sqrt{3}}} = \sqrt{\frac{1}{3}} \text{에서 } \sqrt[3]{3^{\frac{1}{4}} \div 3^{\frac{1}{3}}} \times \sqrt{3^{\frac{1}{a}} \div 3^{\frac{1}{6}}} = \sqrt[18]{3^{-1}}$$

$$\sqrt[3]{3^{\frac{1}{4} - \frac{1}{3}}} \times \sqrt{3^{\frac{1}{a} - \frac{1}{6}}} = \sqrt[18]{3^{-1}}, \sqrt[3]{3^{-\frac{1}{12}}} \times \sqrt{3^{\frac{1}{a} - \frac{1}{6}}} = \sqrt[18]{3^{-1}}$$

$$(3^{-\frac{1}{12}})^{\frac{1}{3}} \times (3^{\frac{1}{a} - \frac{1}{6}})^{\frac{1}{2}} = 3^{-\frac{1}{18}}, 3^{-\frac{1}{36}} \times 3^{\frac{1}{2a} - \frac{1}{12}} = 3^{-\frac{1}{18}}$$

$$3^{-\frac{1}{36} + \frac{1}{2a} - \frac{1}{12}} = 3^{-\frac{1}{18}}, 3^{\frac{1}{2a} - \frac{1}{9}} = 3^{-\frac{1}{18}}$$

$$\text{즉 } \frac{1}{2a} - \frac{1}{9} = -\frac{1}{18} \text{이므로 } \frac{1}{2a} = \frac{1}{18}$$

$$\therefore a = 9$$

22-1 ㉮ -4

$$\sqrt[12]{\frac{1}{4}} \times \sqrt[6]{\frac{1}{6}} \times \sqrt[3]{\frac{1}{8}} \times \sqrt{\frac{1}{9}} \times \sqrt{\frac{1}{12}}$$

$$= 4^{-\frac{1}{12}} \times 6^{-\frac{1}{6}} \times 8^{-\frac{1}{3}} \times 9^{-\frac{1}{2}} \times 12^{-\frac{1}{2}}$$

$$= 2^{-\frac{1}{6}} \times (2^{-\frac{1}{6}} \times 3^{-\frac{1}{6}}) \times 2^{-1} \times 3^{-1} \times (2^{-1} \times 3^{-\frac{1}{2}})$$

$$= 2^{-\frac{1}{6} - \frac{1}{6} - 1 - 1} \times 3^{-\frac{1}{6} - 1 - \frac{1}{2}}$$

$$= 2^{-\frac{7}{3}} \times 3^{-\frac{5}{3}}$$

..... ①

$$\text{즉 } 2^{-\frac{7}{3}} \times 3^{-\frac{5}{3}} = 2^a \times 3^b \text{이므로 } a = -\frac{7}{3}, b = -\frac{5}{3}$$

..... ②

$$\therefore a + b = -\frac{7}{3} + \left(-\frac{5}{3} \right) = -4$$

..... ③

채점 기준	비율
① 좌변을 밑이 2, 3이고 지수가 유리수인 수로 나타낼 수 있다.	60%
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ $a + b$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

23 ㉮ ③

$$\frac{\sqrt[3]{a\sqrt{a}} \times \sqrt[4]{a\sqrt[3]{a^2}}}{a} = \frac{\sqrt[3]{a} \times \sqrt[6]{a} \times \sqrt[4]{a} \times \sqrt[12]{a^2}}{a} = \frac{a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{6}} \times a^{\frac{1}{4}} \times a^{\frac{1}{6}}}{a}$$

$$= a^{\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - 1} = a^{-\frac{1}{12}}$$

$$\text{즉 } a^{-\frac{1}{12}} = a^k \text{이므로 } k = -\frac{1}{12}$$

23-1 ㉮ ②

$$\sqrt{a\sqrt{a}} \sqrt[3]{a^2} = \sqrt{a} \times \sqrt[4]{a} \times \sqrt[12]{a^2} = a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{4}} \times a^{\frac{1}{6}} = a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}} = a^{\frac{11}{12}}$$

$$\sqrt[3]{\frac{4\sqrt[4]{a^n}}{a}} = \frac{\sqrt[12]{4a^n}}{\sqrt[6]{a}} = \frac{a^{\frac{n}{12}}}{a^{\frac{1}{6}}} = a^{\frac{n}{12} - \frac{1}{6}}$$

$$\text{즉 } \frac{11}{12} = \frac{n}{12} - \frac{1}{6} \text{이므로 } \frac{n}{12} = \frac{13}{12}$$

$$\therefore n = 13$$

24 ㉮ 10

$$a=2^5\text{에서 } 2=a^{\frac{1}{5}}$$

$$b=9^2\text{에서 } b=(3^2)^2=3^4 \quad \therefore 3=b^{\frac{1}{4}}$$

$$\therefore 12^{10}=(2^2 \times 3)^{10}=2^{20} \times 3^{10}=(a^{\frac{1}{5}})^{20} \times (b^{\frac{1}{4}})^{10}=a^4 b^{\frac{5}{2}}$$

따라서 $m=4, n=\frac{5}{2}$ 이므로

$$mn=4 \times \frac{5}{2}=10$$

24-1 ㉮ ②

$$a=9\text{에서 } a=3^2 \quad \therefore 3=a^{\frac{1}{2}}$$

$$b=\frac{1}{16}\text{에서 } b=2^{-4} \quad \therefore 2=b^{-\frac{1}{4}}$$

$$\therefore \frac{1}{18^4}=\frac{1}{(2 \times 3^2)^4}=\frac{1}{2^4 \times 3^8}=\frac{1}{(b^{-\frac{1}{4}})^4 \times (a^{\frac{1}{2}})^8}=a^{-4}b$$

따라서 $m=-4, n=1$ 이므로

$$m+n=-4+1=-3$$

25 ㉮ ④

$$a=32^3\text{에서 } a=(2^5)^3=2^{15} \quad \therefore 2=a^{\frac{1}{15}}$$

$$\therefore 1024^3=(2^{10})^3=2^{30}=(a^{\frac{1}{15}})^{30}=a^2$$

즉 $a^2=a^k$ 이므로 $k=2$

25-1 ㉮ ②

$$a=\sqrt[5]{27^2}\text{에서 } a=\sqrt[5]{(3^3)^2}=\sqrt[5]{3^6}=3^{\frac{6}{5}} \quad \therefore 3=a^{\frac{5}{6}}$$

$$\therefore 243^4=(3^5)^4=3^{20}=(a^{\frac{5}{6}})^{20}=a^{\frac{50}{3}}$$

따라서 $p=3, q=50$ 이므로

$$p+q=3+50=53$$

26 ㉮ ①

$$a=\sqrt{2}\text{에서 } a=2^{\frac{1}{2}} \quad \therefore 2=a^2$$

$$b=\sqrt[3]{3}\text{에서 } b=3^{\frac{1}{3}} \quad \therefore 3=b^3$$

$$\therefore \sqrt[6]{6}=(2 \times 3)^{\frac{1}{6}}=(a^2 \times b^3)^{\frac{1}{6}}=a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{2}}$$

26-1 ㉮ $a^{\frac{5}{8}}b^{\frac{10}{9}}$

16의 세제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[3]{16}$ 이므로

$$a=\sqrt[3]{16}=\sqrt[3]{2^4}=2^{\frac{4}{3}}$$

$$\therefore 2=a^{\frac{3}{4}} \quad \dots\dots ①$$

27의 네제곱근 중 양수인 것은 $\sqrt[4]{27}$ 이므로

$$b=\sqrt[4]{27}=\sqrt[4]{3^3}=3^{\frac{3}{4}} \quad \therefore 3=b^{\frac{4}{3}} \quad \dots\dots ②$$

$$\therefore \sqrt[12]{36^5}=36^{\frac{5}{12}}=(2^2 \times 3^2)^{\frac{5}{12}}$$

$$=\{(a^{\frac{3}{4}})^2 \times (b^{\frac{4}{3}})^2\}^{\frac{5}{12}}$$

$$=(a^{\frac{3}{2}}b^{\frac{8}{3}})^{\frac{5}{12}}=a^{\frac{5}{8}}b^{\frac{10}{9}} \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 2를 a 의 거듭제곱으로 나타낼 수 있다.	30%
② 3을 b 의 거듭제곱으로 나타낼 수 있다.	30%
③ $\sqrt[12]{36^5}$ 을 a, b 를 사용하여 나타낼 수 있다.	40%

27 ㉮ ②

$$(1-x^{\frac{1}{4}})(1+x^{\frac{1}{4}})(1+x^{\frac{1}{2}})(1+x)$$

$$=\{1-(x^{\frac{1}{4}})^2\}(1+x^{\frac{1}{2}})(1+x)$$

$$=(1-x^{\frac{1}{2}})(1+x^{\frac{1}{2}})(1+x)$$

$$=\{1-(x^{\frac{1}{2}})^2\}(1+x)$$

$$=(1-x)(1+x)$$

$$=1-x^2$$

$$=1-(\sqrt{3})^2 \quad \leftarrow x=\sqrt{3}\text{을 대입}$$

$$=-2$$

27-1 ㉮ ②

$$(a^{\frac{1}{4}}-b^{\frac{1}{4}})(a^{\frac{1}{4}}+b^{\frac{1}{4}})(a^{\frac{1}{2}}+b^{\frac{1}{2}})=\{(a^{\frac{1}{4}})^2-(b^{\frac{1}{4}})^2\}(a^{\frac{1}{2}}+b^{\frac{1}{2}})$$

$$=(a^{\frac{1}{2}}-b^{\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}}+b^{\frac{1}{2}})$$

$$=(a^{\frac{1}{2}})^2-(b^{\frac{1}{2}})^2$$

$$=a-b$$

$$=9-3 \quad \leftarrow a=9, b=3\text{을 대입}$$

$$=6$$

28 ㉮ (1) 65 (2) 7

$$(1)(x^{\frac{5}{2}}+x^{-\frac{1}{2}})^2+(x^{\frac{5}{2}}-x^{-\frac{1}{2}})^2$$

$$=\{(x^{\frac{5}{2}})^2+2x^{\frac{5}{2}}x^{-\frac{1}{2}}+(x^{-\frac{1}{2}})^2\}$$

$$+\{(x^{\frac{5}{2}})^2-2x^{\frac{5}{2}}x^{-\frac{1}{2}}+(x^{-\frac{1}{2}})^2\}$$

$$=(x^5+2x^2+x^{-1})+(x^5-2x^2+x^{-1})$$

$$=2(x^5+x^{-1})$$

$$=2(2^5+2^{-1}) \quad \leftarrow x=2\text{를 대입}$$

$$=65$$

$$(2)(x^{\frac{1}{3}}+x^{-\frac{2}{3}})^3+(x^{\frac{1}{3}}-x^{-\frac{2}{3}})^3$$

$$=\{(x^{\frac{1}{3}})^3+3x^{\frac{2}{3}}x^{-\frac{2}{3}}+3x^{\frac{1}{3}}x^{-\frac{4}{3}}+(x^{-\frac{2}{3}})^3\}$$

$$+\{(x^{\frac{1}{3}})^3-3x^{\frac{2}{3}}x^{-\frac{2}{3}}+3x^{\frac{1}{3}}x^{-\frac{4}{3}}-(x^{-\frac{2}{3}})^3\}$$

$$=(x+3+3x^{-1}+x^{-2})+(x-3+3x^{-1}-x^{-2})$$

$$=2x+6x^{-1}$$

$$=2 \times 2 + 6 \times 2^{-1} \quad \leftarrow x=2\text{를 대입}$$

$$=7$$

28-1 ㉮ 256

$$2^{3+\sqrt{3}}=A, 2^{3-\sqrt{3}}=B\text{라 하면}$$

$$(\text{주어진 식})=(A+B)^2-(A-B)^2$$

$$=A^2+2AB+B^2-(A^2-2AB+B^2)$$

$$=4AB$$

$$=2^2 \times 2^{3+\sqrt{3}} \times 2^{3-\sqrt{3}} \quad \leftarrow A=2^{3+\sqrt{3}}, B=2^{3-\sqrt{3}}\text{을 대입}$$

$$=2^{2+(3+\sqrt{3})+(3-\sqrt{3})}$$

$$=2^8=256$$

29 ㉮ -15

$$p=\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\left(1+\frac{1}{2^4}\right)\left(1+\frac{1}{2^8}\right)\text{의 양변에}$$

$$\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}\text{을 곱하면}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}p &= \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^4}\right)\left(1 + \frac{1}{2^8}\right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^4}\right)\left(1 + \frac{1}{2^8}\right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2^4}\right)\left(1 + \frac{1}{2^4}\right)\left(1 + \frac{1}{2^8}\right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2^8}\right)\left(1 + \frac{1}{2^8}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{2^{16}}\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{1}{2}p = 1 - \frac{1}{2^{16}} \text{ 이므로 } p = 2 - \frac{1}{2^{15}} \quad \dots\dots ①$$

$$2 - p = \frac{1}{2^{15}} = 2^{-15} \quad \therefore k = -15 \quad \dots\dots ②$$

채점 기준	비율
① p 의 값을 구할 수 있다.	60%
② k 의 값을 구할 수 있다.	40%

29-1 ㉔ ②

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (1 - 2^{\frac{1}{4}})(1 + 2^{\frac{1}{4}})(1 + 2^{\frac{1}{2}})(1 + 2)(1 + 2^2) \\ &= (1 - 2^{\frac{1}{2}})(1 + 2^{\frac{1}{2}})(1 + 2)(1 + 2^2) \\ &= (1 - 2)(1 + 2)(1 + 2^2) \\ &= (1 - 2^2)(1 + 2^2) \\ &= 1 - 2^4 = -15\end{aligned}$$

30 ㉔ $-\sqrt{2}$

$$\begin{aligned}(a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}})^2 &= a + a^{-1} - 2 = 4 - 2 = 2 \\ \therefore a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}} &= -\sqrt{2} \quad (\because 0 < a < 1)\end{aligned}$$

30-1 ㉔ ④

$$\begin{aligned}(a + a^{-1})^3 &= a^3 + 3a + 3a^{-1} + a^{-3} \\ &= a^3 + a^{-3} + 3(a + a^{-1}) \\ \therefore a^3 + a^{-3} &= (a + a^{-1})^3 - 3(a + a^{-1}) \\ &= 3^3 - 3 \times 3 = 18\end{aligned}$$

31 ㉔ $\frac{5}{2}$

$x = 2^{\frac{1}{3}} + 2^{-\frac{1}{3}}$ 이므로 양변을 세제곱하면

$$\begin{aligned}x^3 &= (2^{\frac{1}{3}} + 2^{-\frac{1}{3}})^3 \\ x^3 &= 2 + 2^{-1} + 3(2^{\frac{1}{3}} + 2^{-\frac{1}{3}}) \\ x^3 &= \frac{5}{2} + 3x \quad \therefore x^3 - 3x = \frac{5}{2}\end{aligned}$$

다른 풀이

$$\begin{aligned}x &= 2^{\frac{1}{3}} + 2^{-\frac{1}{3}} \text{이므로} \\ x^3 - 3x &= (2^{\frac{1}{3}} + 2^{-\frac{1}{3}})^3 - 3(2^{\frac{1}{3}} + 2^{-\frac{1}{3}}) \\ &= \{2 + 2^{-1} + 3(2^{\frac{1}{3}} + 2^{-\frac{1}{3}})\} - 3(2^{\frac{1}{3}} + 2^{-\frac{1}{3}}) \\ &= 2 + 2^{-1} = \frac{5}{2}\end{aligned}$$

31-1 ㉔ ⑤

$x = 3^{\frac{1}{3}} - 3^{-\frac{1}{3}}$ 의 양변을 세제곱하면

$$\begin{aligned}x^3 &= (3^{\frac{1}{3}} - 3^{-\frac{1}{3}})^3 \\ x^3 &= 3 - 3^{-1} - 3(3^{\frac{1}{3}} - 3^{-\frac{1}{3}}) \quad \text{--- } x \\ &\approx 3x^3 = 8 - 9x \text{ 이므로 } 3x^3 + 9x = 8 \\ \therefore 3x^3 + 9x + 2 &= 8 + 2 = 10\end{aligned}$$

32 ㉔ 2

$x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}} = 2$ 의 양변을 제곱하면

$$\begin{aligned}(x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}})^2 &= 2^2 \\ x + x^{-1} - 2 &= 4 \quad \therefore x + x^{-1} = 6 \quad \dots\dots ①\end{aligned}$$

$x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}} = 2$ 의 양변을 세제곱하면

$$\begin{aligned}(x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}})^3 &= 2^3 \\ x^{\frac{3}{2}} - x^{-\frac{3}{2}} - 3(x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}}) &= 8 \\ x^{\frac{3}{2}} - x^{-\frac{3}{2}} - 3 \times 2 &= 8 \\ \therefore x^{\frac{3}{2}} - x^{-\frac{3}{2}} &= 14 \quad \dots\dots ② \\ \therefore \frac{x^{\frac{3}{2}} - x^{-\frac{3}{2}}}{x + x^{-1} + 1} &= \frac{14}{6 + 1} = 2 \quad \dots\dots ③\end{aligned}$$

채점 기준	비율
① $x + x^{-1}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
② $x^{\frac{3}{2}} - x^{-\frac{3}{2}}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $\frac{x^{\frac{3}{2}} - x^{-\frac{3}{2}}}{x + x^{-1} + 1}$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

32-1 ㉔ 5

$3^x - 3^{-x} = 3$ 의 양변을 제곱하면

$$\begin{aligned}(3^x - 3^{-x})^2 &= 3^2 \\ 3^{2x} + 3^{-2x} - 2 &= 9 \quad \therefore 3^{2x} + 3^{-2x} = 11\end{aligned}$$

$3^x - 3^{-x} = 3$ 의 양변을 세제곱하면

$$\begin{aligned}(3^x - 3^{-x})^3 &= 3^3 \\ 3^{3x} - 3^{-3x} - 3(3^x - 3^{-x}) &= 27, \quad 3^{3x} - 3^{-3x} - 3 \times 3 = 27 \\ 3^{3x} - 3^{-3x} - 9 &= 27 \quad \therefore 3^{3x} - 3^{-3x} = 36 \\ \therefore \frac{3^{3x} - 3^{-3x} + 9}{3^{2x} + 3^{-2x} - 2} &= \frac{36 + 9}{11 - 2} = \frac{45}{9} = 5\end{aligned}$$

33 ㉔ $\frac{7}{2}$

주어진 식의 분모, 분자에 각각 a^x 을 곱하면

$$\begin{aligned}\frac{a^{3x} - a^{-3x}}{a^x - a^{-x}} &= \frac{a^x(a^{3x} - a^{-3x})}{a^x(a^x - a^{-x})} = \frac{a^{4x} - a^{-2x}}{a^{2x} - 1} \\ &= \frac{(a^{2x})^2 - (a^{2x})^{-1}}{a^{2x} - 1} = \frac{2^2 - 2^{-1}}{2 - 1} \\ &= \frac{7}{2}\end{aligned}$$

다른 풀이

$$\begin{aligned}\frac{a^{3x} - a^{-3x}}{a^x - a^{-x}} &= \frac{(a^x - a^{-x})(a^{2x} + a^{-2x} + 1)}{a^x - a^{-x}} = a^{2x} + a^{-2x} + 1 \\ &= a^{2x} + (a^{2x})^{-1} + 1 = 2 + 2^{-1} + 1 = \frac{7}{2}\end{aligned}$$

33-1 ㉔ ③

좌변의 분모, 분자에 각각 a^x 을 곱하면

$$\frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}} = \frac{a^x(a^x + a^{-x})}{a^x(a^x - a^{-x})} = \frac{a^{2x} + 1}{a^{2x} - 1}$$

$$\approx \frac{a^{2x}+1}{a^{2x}-1}=2 \text{이므로 } a^{2x}+1=2a^{2x}-2$$

$$\therefore a^{2x}=3$$

주어진 식의 분모, 분자에 각각 a^x 을 곱하면

$$\begin{aligned} \frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}} &= \frac{a^x(a^{3x}+a^{-3x})}{a^x(a^x+a^{-x})} = \frac{a^{4x}+a^{-2x}}{a^{2x}+1} \\ &= \frac{(a^{2x})^2+(a^{2x})^{-1}}{a^{2x}+1} = \frac{3^2+3^{-1}}{3+1} \\ &= \frac{7}{3} \end{aligned}$$

34 ㉔ 2

$$3^{\frac{1}{x}}=25 \text{에서 } 3=25^x \quad \therefore 5^{2x}=3$$

주어진 식의 분모, 분자에 각각 5^x 을 곱하면

$$\frac{5^x+5^{-x}}{5^x-5^{-x}} = \frac{5^x(5^x+5^{-x})}{5^x(5^x-5^{-x})} = \frac{5^{2x}+1}{5^{2x}-1} = \frac{3+1}{3-1} = 2$$

34-1 ㉔ $\frac{7}{5}$

$$6^{\frac{1}{x}}=9 \text{에서 } 6=9^x \quad \therefore 3^{2x}=6$$

주어진 식의 분모, 분자에 각각 3^x 을 곱하면

$$\frac{3^x+3^{-x}}{3^x-3^{-x}} = \frac{3^x(3^x+3^{-x})}{3^x(3^x-3^{-x})} = \frac{3^{2x}+1}{3^{2x}-1} = \frac{6+1}{6-1} = \frac{7}{5}$$

35 ㉔ $\frac{3+2\sqrt{3}}{2}$

주어진 식의 분모, 분자에 각각 a^x 을 곱하면

$$\begin{aligned} \frac{a^{3x}-a^{-3x}}{a^x+a^{-3x}} &= \frac{a^x(a^{3x}-a^{-3x})}{a^x(a^x+a^{-3x})} = \frac{a^{4x}-1}{a^{2x}+a^{-2x}} = \frac{(a^{2x})^2-1}{a^{2x}+(a^{2x})^{-1}} \\ &= \frac{(2+\sqrt{3})^2-1}{2+\sqrt{3}+\frac{1}{2+\sqrt{3}}} = \frac{7+4\sqrt{3}-1}{2+\sqrt{3}+2-\sqrt{3}} \\ &= \frac{3+2\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

35-1 ㉔ $3-\sqrt{2}$

주어진 식의 분모, 분자에 각각 3^x 을 곱하면

$$\begin{aligned} \frac{3^{3x}-3^{-3x}}{3^x+3^{-x}} &= \frac{3^x(3^{3x}-3^{-3x})}{3^x(3^x+3^{-x})} = \frac{3^{4x}-3^{-2x}}{3^{2x}+1} \\ &= \frac{(3^{2x})^2-(3^{2x})^{-1}}{3^{2x}+1} \quad \dots\dots ① \\ &= \frac{(\sqrt{2}+1)^2-\frac{1}{\sqrt{2}+1}}{\sqrt{2}+1+1} \\ &= \frac{3+2\sqrt{2}-(\sqrt{2}-1)}{2+\sqrt{2}} \\ &= \frac{4+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = 3-\sqrt{2} \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① 주어진 식을 3^{2x} 을 포함하는 식으로 변형할 수 있다.	60%
② 주어진 식의 값을 구할 수 있다.	40%

36 ㉔ ②

$$5^x=81 \text{에서 } 5=81^{\frac{1}{x}}=(3^4)^{\frac{1}{x}}=3^{\frac{4}{x}} \quad \dots\dots ①$$

$$45^y=243 \text{에서 } 45=243^{\frac{1}{y}}=(3^5)^{\frac{1}{y}}=3^{\frac{5}{y}} \quad \dots\dots ②$$

$$① \div ② \text{을 하면 } \frac{5}{45}=3^{\frac{4}{x}} \div 3^{\frac{5}{y}}$$

$$3^{\frac{4}{x}-\frac{5}{y}}=\frac{1}{9}=3^{-2} \quad \therefore \frac{4}{x}-\frac{5}{y}=-2$$

36-1 ㉔ 2

$$28^x=32 \text{에서 } 28=32^{\frac{1}{x}}=(2^5)^{\frac{1}{x}}=2^{\frac{5}{x}} \quad \dots\dots ①$$

$$49^y=64 \text{에서 } 49=64^{\frac{1}{y}}=(2^6)^{\frac{1}{y}}=(2^{\frac{3}{y}})^2 \text{이므로}$$

$$7^2=(2^{\frac{3}{y}})^2 \quad \therefore 7=2^{\frac{3}{y}} \quad \dots\dots ②$$

$$① \div ② \text{을 하면 } \frac{28}{7}=2^{\frac{5}{x}} \div 2^{\frac{3}{y}}$$

$$2^{\frac{5}{x}-\frac{3}{y}}=4=2^2 \quad \therefore \frac{5}{x}-\frac{3}{y}=2$$

37 ㉔ 1

$$4^x=12 \text{에서 } 2^{2x}=12 \quad \therefore 2=12^{\frac{1}{2x}} \quad \dots\dots ① \quad \dots\dots ①$$

$$6^y=12 \text{에서 } 6=12^{\frac{1}{y}} \quad \dots\dots ② \quad \dots\dots ②$$

$$① \times ② \text{을 하면 } 12=12^{\frac{1}{2x}} \times 12^{\frac{1}{y}}$$

$$12^{\frac{1}{2x}+\frac{1}{y}}=12 \quad \therefore \frac{1}{2x}+\frac{1}{y}=1 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 2를 12의 거듭제곱으로 나타낼 수 있다.	30%
② 6을 12의 거듭제곱으로 나타낼 수 있다.	30%
③ $\frac{1}{2x}+\frac{1}{y}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

37-1 ㉔ 100

$$4^a=k \text{에서 } 4=k^{\frac{1}{a}} \quad \dots\dots ①$$

$$40^b=k \text{에서 } 40=k^{\frac{1}{b}} \quad \dots\dots ②$$

$$② \div ① \text{을 하면 } \frac{40}{4}=k^{\frac{1}{b}} \div k^{\frac{1}{a}}$$

$$\therefore k^{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}=10$$

$$\text{이때 } \frac{1}{b}-\frac{1}{a}=\frac{1}{2} \text{이므로 } k^{\frac{1}{2}}=10$$

$$\therefore k=100$$

38 ㉔ $\frac{5}{8}$

$$64^x=8 \text{에서 } 64=8^{\frac{1}{x}}=(2^3)^{\frac{1}{x}}=2^{\frac{3}{x}} \quad \dots\dots ①$$

$$\sqrt{10^y}=2 \text{에서 } 10^{\frac{y}{2}}=2 \quad \therefore 10=2^{\frac{2}{y}} \quad \dots\dots ②$$

$$a^z=2 \text{에서 } a=2^{\frac{1}{z}} \quad \dots\dots ③$$

$$① \div ② \times ③ \text{을 하면 } \frac{64}{10}a=2^{\frac{3}{x}} \div 2^{\frac{2}{y}} \times 2^{\frac{1}{z}}$$

$$\therefore 2^{\frac{3}{x}-\frac{2}{y}+\frac{1}{z}}=\frac{32}{5}a$$

$$\text{이때 } \frac{3}{x}-\frac{2}{y}+\frac{1}{z}=2 \text{이므로}$$

$$\frac{32}{5}a=2^2=4 \quad \therefore a=\frac{5}{8}$$

38-1 ㉔ ④

$$a^x=5 \text{에서 } a=5^{\frac{1}{x}} \quad \dots\dots ①$$

$$(ab)^y=5^2 \text{에서 } ab=5^{\frac{2}{y}} \quad \dots\dots ②$$

$$(abc)^z = 5^{\frac{3}{z}} \text{에서 } abc = 5^{\frac{3}{z}}$$

.....㉔

$$\textcircled{1} \times \textcircled{2} \div \textcircled{3} \text{을 하면 } \frac{a \times ab}{abc} = 5^{\frac{1}{x}} \times 5^{\frac{2}{y}} \div 5^{\frac{3}{z}}$$

$$\therefore 5^{\frac{1}{x} + \frac{2}{y} - \frac{3}{z}} = \frac{a}{c}$$

39 ㉔ ④

10년 후의 방사성 물질의 양이 $\frac{1}{4}m_0$ 이므로

$$m(10) = m_0 \times a^5 = \frac{1}{4}m_0 \quad \therefore a^5 = \frac{1}{4}$$

따라서 15년 후의 이 물질의 양은

$$\begin{aligned} m(15) &= m_0 \times a^{\frac{15}{2}} = m_0 \times (a^5)^{\frac{3}{2}} = m_0 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}} \\ &= m_0 \times \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^2\right\}^{\frac{3}{2}} = m_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}m_0 \end{aligned}$$

$$\therefore k = \frac{1}{8}$$

39-1 ㉔ ③

배양한 지 2시간 후의 박테리아의 개체수가 $5n$ 이므로

$$5n = n \times 2^{2k} \quad \therefore 2^{2k} = 5$$

배양한 지 5시간 후의 개체수는

$$n \times 2^{5k} = n \times (2^{2k})^{\frac{5}{2}} = n \times 5^{\frac{5}{2}} = 25\sqrt{5}n$$

따라서 배양한 지 5시간 후의 개체수는 처음 개체수의 $25\sqrt{5}$ 배이다.

40 ㉔ 16배

pH=6.1인 용액 1 L 속에 들어 있는 수소 이온의 g 이온수는 $10^{-6.1}$

pH=7.3인 용액 1 L 속에 들어 있는 수소 이온의 g 이온수는 $10^{-7.3}$

$$\therefore \frac{10^{-6.1}}{10^{-7.3}} = 10^{-6.1 - (-7.3)} = 10^{1.2} = (10^{0.3})^4 = 2^4 = 16(\text{배})$$

40-1 ㉔ 10

해수면으로부터 높이가 960 m인 곳의 기압은

$$P_{960} = 10^{-\frac{960}{18400}} \times P_0$$

해수면으로부터 높이가 2800 m인 곳의 기압은

$$P_{2800} = 10^{-\frac{2800}{18400}} \times P_0$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{P_{960}}{P_{2800}} &= \frac{10^{-\frac{960}{18400}} \times P_0}{10^{-\frac{2800}{18400}} \times P_0} = 10^{-\frac{960}{18400} - (-\frac{2800}{18400})} \\ &= 10^{\frac{1840}{18400}} = 10^{\frac{1}{10}}(\text{배}) \end{aligned}$$

$$\therefore k^{10} = (10^{\frac{1}{10}})^{10} = 10$$

41 ㉔ ⑤

A 지역에서 전년도에 비하여 감소한 연간 자동차 휘발유 소비량의 비율을 x 라 하면 2016년의 연간 자동차 휘발유 소비량이 a 이므로 2024년, 즉 8년 후의 연간 자동차 휘발유 소비량은 ax^8

$$\text{이때 } ax^8 = \frac{1}{3}a \text{이므로 } x^8 = \frac{1}{3}$$

$$\therefore x = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{8}}$$

A 지역의 2030년, 즉 14년 후의 연간 자동차 휘발유 소비량은

$$a \times \left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{8}}\right\}^{14} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{7}{4}} \times a$$

따라서 $p=4, q=7$ 이므로

$$p+q=4+7=11$$

41-1 ㉔ 4

반음 1개만큼 올라갈 때 증가한 진동수의 비율을 x 라 하면 음이 한 옥타브, 즉 반음 12개만큼 올라갈 때 진동수가 2배가 되므로

$$x^{12} = 2 \quad \therefore x = 2^{\frac{1}{12}}$$

따라서 '미'음의 진동수는 '도'음의 진동수의

$$(2^{\frac{1}{12}})^4 = 2^{\frac{1}{3}}(\text{배})$$

$$\therefore k^6 = (2^{\frac{1}{3}})^6 = 2^2 = 4$$

42 ㉔ ④

$$H=72, t=10 \text{일 때, } P_1 = \frac{72-65}{14} \times 1.05^{10} = \frac{1}{2} \times 1.05^{10}$$

$$H=79, t=24 \text{일 때, } P_2 = \frac{79-65}{14} \times 1.05^{24} = 1.05^{24}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{P_1}{P_2} &= \frac{\frac{1}{2} \times 1.05^{10}}{1.05^{24}} = \frac{1}{2} \times 1.05^{10-24} = \frac{1}{2} \times 1.05^{-14} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{1.05^{14}} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

42-1 ㉔ 1.6

압력 750 hPa, 기온 24 °C일 때의 건조공기의 온위 θ_1 은

$$\theta_1 = 24 \times \left(\frac{1000}{750}\right)^{0.286} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

압력 1500 hPa, 기온 18 °C일 때의 건조공기의 온위 θ_2 는

$$\theta_2 = 18 \times \left(\frac{1000}{1500}\right)^{0.286} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\theta_1}{\theta_2} &= \frac{24 \times \left(\frac{1000}{750}\right)^{0.286}}{18 \times \left(\frac{1000}{1500}\right)^{0.286}} = \frac{4}{3} \times 2^{0.286} \\ &= \frac{4}{3} \times 1.2 = 1.6 \quad \dots\dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① θ_1 의 값을 구할 수 있다.	30%
② θ_2 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ $\frac{\theta_1}{\theta_2}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

유형 **완성하기**

p.24

43 ㉔ 15

$$\left(\frac{1}{256}\right)^{-\frac{1}{n}} = 256^{\frac{1}{n}} = (2^8)^{\frac{1}{n}} = 2^{\frac{8}{n}}$$

즉 $2^{\frac{8}{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 정수 n 은 8의 양의 약수이므로 $n=1, 2, 4, 8$

따라서 모든 정수 n 의 값의 합은

$$1+2+4+8=15$$

44 12

$$a^4=3 \text{에서 } a=3^{\frac{1}{4}}$$

$$b^3=5 \text{에서 } b=5^{\frac{1}{3}}$$

$$c^2=7 \text{에서 } c=7^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore (abc)^n = (3^{\frac{1}{4}} \times 5^{\frac{1}{3}} \times 7^{\frac{1}{2}})^n = 3^{\frac{n}{4}} \times 5^{\frac{n}{3}} \times 7^{\frac{n}{2}} \quad \dots\dots ①$$

따라서 $(abc)^n$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 n 은 2, 3, 4의 공배수이므로 n 의 최솟값은 2, 3, 4의 최소공배수인 12이다. $\dots\dots ②$

채점 기준	비율
① $(abc)^n$ 을 3, 5, 7의 거듭제곱으로 나타낼 수 있다.	50%
② 자연수 n 의 최솟값을 구할 수 있다.	50%

45 36

$$(\sqrt[3]{2^4})^{\frac{1}{3}} = (2^{\frac{4}{3}})^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{4}{9}}$$

$2^{\frac{4}{9}}$ 이 자연수 N 의 n 제곱근이므로

$$N = (2^{\frac{4}{9}})^n = 2^{\frac{4n}{9}}$$

이때 $2^{\frac{4n}{9}}$ 이 자연수이므로 $\frac{4n}{9}$ 이 자연수이어야 한다.

즉 n 이 9의 배수이어야 하므로 $2 \leq n \leq 50$ 인 자연수 n 의 값은

9, 18, 27, 36, 45

따라서 n 의 최댓값은 45, 최솟값은 9이므로

$$a=45, b=9$$

$$\therefore a-b=45-9=36$$

참고 4는 9와 서로소이므로 $\frac{4n}{9}$ 이 자연수하려면 n 이 9의 배수이어야 한다.

46 0

$2^x=3^y=6^z=k$ ($k>0$)라 하면 $xyz \neq 0$ 이므로 $k \neq 1$ ↳ 밑을 k 로 통일한다. ↳ $x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$

$$2^x=k \text{에서 } 2=k^{\frac{1}{x}} \quad \dots\dots ㉠$$

$$3^y=k \text{에서 } 3=k^{\frac{1}{y}} \quad \dots\dots ㉡$$

$$6^z=k \text{에서 } 6=k^{\frac{1}{z}} \quad \dots\dots ㉢$$

$$㉠ \times ㉡ \div ㉢ \text{을 하면 } \frac{2 \times 3}{6} = k^{\frac{1}{x}} \times k^{\frac{1}{y}} \div k^{\frac{1}{z}}$$

$$\therefore k^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{z}} = 1$$

$$\text{그런데 } k \neq 1 \text{이므로 } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{z} = 0$$

47 27/8

$$x^y=y^x \text{에서 } x=y^{\frac{x}{y}}=y^{\frac{2}{3}} \left(\because \frac{x}{y}=\frac{2}{3} \right)$$

$$\frac{x}{y}=\frac{2}{3} \text{에서 } x=\frac{2}{3}y \text{이므로 } \frac{2}{3}y=y^{\frac{2}{3}}$$

$$\frac{y}{y^{\frac{2}{3}}}=\frac{3}{2}, y^{\frac{1}{3}}=\frac{3}{2} \quad \therefore y=\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{27}{8}$$

48 4

$4^x=9^y=48^z=k$ ($k>0$)라 하면 $x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$ 이므로 $k \neq 1$

$$4^x=k \text{에서 } 2^{2x}=k \quad \therefore 2=k^{\frac{1}{2x}}$$

$$9^y=k \text{에서 } 3^{2y}=k \quad \therefore 3=k^{\frac{1}{2y}}$$

$$48^z=k \text{에서 } 48=k^{\frac{1}{z}}$$

이때 $48=2^4 \times 3$ 이므로

$$k^{\frac{1}{z}} = (k^{\frac{1}{2x}})^4 \times k^{\frac{1}{2y}} = k^{\frac{2}{x} + \frac{1}{2y}}$$

$$\therefore k^{\frac{2}{z}} = k^{\frac{4}{x} + \frac{1}{y}}$$

$$\text{그런데 } k \neq 1 \text{이므로 } \frac{4}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2}{z}$$

$$\therefore a=4$$

학교 시험 대비 문제

p.25~28

01 3

③ 256의 네제곱근을 x 라 하면 $x^4=256$

$$x^4-256=0, (x^2+16)(x^2-16)=0$$

$$(x^2+16)(x+4)(x-4)=0$$

$$\therefore x=\pm 4i \text{ 또는 } x=\pm 4$$

즉 256의 네제곱근 중 실수인 것은 $-4, 4$ 이다.

따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

02 2

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{25} + \sqrt{\sqrt{16}} &= \sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{5^2} + \sqrt{2^4} = \sqrt[3]{5 \times 5^2} + \sqrt{2^4} \\ &= \sqrt[3]{5^3} + \sqrt{2^4} = 5 + 2 = 7 \end{aligned}$$

03 2

$$\sqrt[3]{\frac{4\sqrt{3}}{2^5}} \times \sqrt{\frac{n\sqrt{2}}{6^3}} = \frac{\sqrt[3]{4\sqrt{3}}}{\sqrt[3]{2^5}} \times \frac{\sqrt{n\sqrt{2}}}{\sqrt{6^3}} = \frac{\sqrt[3]{4\sqrt{3}}}{\sqrt[3]{2^5}} \times \frac{\sqrt{n\sqrt{2}}}{\sqrt{6^3}} = \frac{12\sqrt{3}}{6\sqrt{2^5}} \times \frac{2n\sqrt{2}}{12\sqrt{3}} = \frac{2n\sqrt{2}}{6\sqrt{2^5}}$$

$$\approx \frac{2n\sqrt{2}}{6\sqrt{2^5}} = \frac{1}{3\sqrt{4}} \text{이므로 } \frac{2n\sqrt{2}}{6\sqrt{2^5}} = \frac{\sqrt{2^5}}{3\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{2^5}}{\sqrt{2^4}} = \sqrt{\frac{2^5}{2^4}} = \sqrt{2}$$

$$2n=6 \quad \therefore n=3$$

04 1

$$\sqrt{a^k} \div \sqrt[3]{a} = \sqrt[m]{a^4} \sqrt[a^7]{a} \text{에서}$$

$$\sqrt{a^k} \times \sqrt{a} \div \sqrt[3]{a} = \sqrt[m]{a^4} \times \sqrt[m]{a^7} \times \sqrt[m]{\sqrt{a}}$$

$$\sqrt{a^k} \times \sqrt{a} \div \sqrt[3]{a} = \sqrt[m]{a^4} \times \sqrt[m]{a^7} \times \sqrt[m]{a}$$

$$\frac{12\sqrt{a^{6k}} \times \frac{12\sqrt{a^3}}{12\sqrt{a^2}}}{12\sqrt{a^{6k}} \times a^3 \div a^2} = \frac{4m\sqrt{a^{16}} \times 4m\sqrt{a^{14}} \times 4m\sqrt{a}}{12\sqrt{a^{6k}} \times a^3 \div a^2} = \frac{4m\sqrt{a^{16}} \times a^{14} \times a}{12\sqrt{a^{6k+3-2}}} = \frac{4m\sqrt{a^{16+14+1}}}{12\sqrt{a^{6k+1}}} = \frac{4m\sqrt{a^{31}}}{12\sqrt{a^{6k+1}}} = \frac{4m\sqrt{a^{31}}}{12\sqrt{a^{m(6k+1)}}} = \frac{4m\sqrt{a^{31}}}{12\sqrt{a^{93}}}$$

즉 $m(6k+1)=93=3 \times 31$ 이므로

$$m=3, 6k+1=31 \text{ 또는 } m=31, 6k+1=3$$

$$\therefore m=3, k=5 \text{ 또는 } m=31, k=\frac{1}{3}$$

그런데 m, k 는 자연수이므로 $m=3, k=5$

$$\therefore mk=3 \times 5=15$$

05 ㉔ ②

$$(\sqrt{2\sqrt[3]{4}})^3 = (\sqrt[3]{2^3 \times 4})^3 = (\sqrt[3]{32})^3 = \sqrt{32}$$

이때 $\sqrt{25} < \sqrt{32} < \sqrt{36}$ 이므로 $(\sqrt{2\sqrt[3]{4}})^3$ 보다 작은 자연수 중 가장 큰 수는 5이다.

06 ㉔ ④

$$\textcircled{1} \sqrt[3]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2$$

$$\textcircled{2} \sqrt[5]{(-3)^5} = -3$$

$$\textcircled{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{2}$$

$$\textcircled{4} 27^{\frac{2}{3}} = (3^3)^{\frac{2}{3}} = 3^2 = 9$$

$$\textcircled{5} \left(\frac{1}{16}\right)^{-0.5} = \left[\left(\frac{1}{4}\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-1} = 4$$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

07 ㉔ $\frac{9}{2}$

└ 분모, 분자에 2⁴을 곱한다.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2^{-4}+1} + \cdots + \frac{1}{2^{-1}+1} + \frac{1}{2^0+1} + \frac{1}{2^1+1} + \cdots + \frac{1}{2^4+1} \\ & \quad \text{└ 분모, 분자에 2⁴을 곱한다.} \\ & = \frac{2^4}{1+2^4} + \cdots + \frac{2^1}{1+2^1} + \frac{1}{2^0+1} + \frac{1}{2^1+1} + \cdots + \frac{1}{2^4+1} \\ & = \frac{2^4+1}{2^4+1} + \frac{2^3+1}{2^3+1} + \frac{2^2+1}{2^2+1} + \frac{2^1+1}{2^1+1} + \frac{1}{2^0+1} \\ & = 1+1+1+1+\frac{1}{2} \\ & = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

다른 풀이

자연수 n 에 대하여

$$\frac{1}{2^{-n}+1} + \frac{1}{2^{-n}+1} = \frac{2^{-n}+1+2^{-n}+1}{(2^{-n}+1)(2^{-n}+1)} = \frac{2^{-n}+2^{-n}+2}{1+2^{-n}+2^{-n}+1} = 1$$

이므로

$$\frac{1}{2^{-4}+1} + \frac{1}{2^4+1} = \cdots = \frac{1}{2^{-1}+1} + \frac{1}{2^1+1} = 1$$

∴ (주어진 식)

$$\begin{aligned} & = \left(\frac{1}{2^{-4}+1} + \frac{1}{2^4+1}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{-1}+1} + \frac{1}{2^1+1}\right) + \frac{1}{2^0+1} \\ & = 1+1+1+1+\frac{1}{2} \\ & = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

08 ㉔ ①

$$a^k b^l = 9^k \left(\frac{1}{27}\right)^l = (3^2)^k (3^{-3})^l = 3^{2k-3l}$$

$$k=1, l=1 \text{ 일 때, } 3^{2-3} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

$$k=1, l=2 \text{ 일 때, } 3^{2-6} = 3^{-4} = \frac{1}{3^4}$$

$$k=2, l=1 \text{ 일 때, } 3^{4-3} = 3$$

$$k=2, l=2 \text{ 일 때, } 3^{4-6} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2}$$

$$k=3, l=1 \text{ 일 때, } 3^{6-3} = 3^3$$

$$k=3, l=2 \text{ 일 때, } 3^{6-6} = 3^0 = 1$$

$$\therefore A = \left\{ \frac{1}{3^4}, \frac{1}{3^2}, \frac{1}{3}, 1, 3, 3^3 \right\}$$

따라서 집합 A 의 원소가 아닌 것은 ①이다.

09 ㉔ ⑤

$$\sqrt[4]{2\sqrt[3]{16}} = \sqrt[4]{2 \times 2^{\frac{4}{3}}} = (2^{\frac{7}{3}})^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{7}{12}},$$

$$\sqrt[8]{4 \times \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{4}}} = 2^{\frac{1}{4}} \times 2^{-\frac{3}{4}} = 2^{-\frac{1}{2}} \text{ 이므로}$$

$$\sqrt[4]{2\sqrt[3]{16}} \div \left\{ \sqrt[8]{4 \times \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{4}}} \right\} = 2^{\frac{7}{12}} \div 2^{-\frac{1}{2}} = 2^{\frac{7}{12} - (-\frac{1}{2})} = 2^{\frac{13}{12}}$$

$$\text{즉 } 2^{\frac{13}{12}} = 2^k \text{ 이므로 } k = \frac{13}{12}$$

10 ㉔ ⑤

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2a-3b} = (3^{-1})^{2a-3b} = 3^{-2a+3b} = \frac{3^{3b}}{3^{2a}} = \frac{(3^b)^3}{(3^a)^2} = \frac{y^3}{x^2}$$

11 ㉔ ④

$$\begin{aligned} & (a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}}) - (a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}})^2 \\ & = \{(a^{\frac{1}{2}})^2 - (a^{-\frac{1}{2}})^2\} - \{(a^{\frac{1}{2}})^2 - 2a^{\frac{1}{2}}a^{-\frac{1}{2}} + (a^{-\frac{1}{2}})^2\} \\ & = (a - a^{-1}) - (a - 2 + a^{-1}) \\ & = 2 - 2a^{-1} \\ & = 2 - \frac{2}{a} \end{aligned}$$

$$\text{이때 } a = 2 + \sqrt{2} \text{ 에서 } \frac{2}{a} = \frac{2}{2 + \sqrt{2}} = 2 - \sqrt{2} \text{ 이므로}$$

$$2 - \frac{2}{a} = 2 - (2 - \sqrt{2}) = \sqrt{2}$$

12 ㉔ ②

$x^2 - 8x + 1 = 0$ 에서 $x \neq 0$ 이므로 양변을 x 로 나누면

$$x - 8 + x^{-1} = 0 \quad \therefore x + x^{-1} = 8$$

$$\therefore (x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}})^2 = x + x^{-1} - 2 = 8 - 2 = 6$$

$$\text{이때 } x > 1 \text{ 이므로 } x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{6}$$

13 ㉔ ②

$$(a + a^{-1})^2 = a^2 + a^{-2} + 2 = 119 + 2 = 121 \text{ 이므로}$$

$$a + a^{-1} = 11 \quad (\because a > 1)$$

$$(a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}})^2 = a + a^{-1} - 2 = 11 - 2 = 9 \text{ 이므로}$$

$$a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}} = 3 \quad (\because a > 1)$$

$$\therefore \frac{a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}}}{a + a^{-1}} = \frac{3}{11}$$

참고

$$a > 1 \text{ 에서 } 0 < a^{-1} < 1 \text{ 이므로 } a + a^{-1} > 0$$

$$\text{또 } a > 1 \text{ 에서 } a^{\frac{1}{2}} > 1, 0 < a^{-\frac{1}{2}} < 1 \text{ 이므로 } a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}} > 0$$

14 ㉔ ③

주어진 식의 좌변의 분모, 분자에 각각 a^x 을 곱하면

$$\frac{a^x - 2a^{-x}}{a^x + 2a^{-x}} = \frac{a^x(a^x - 2a^{-x})}{a^x(a^x + 2a^{-x})} = \frac{a^{2x} - 2}{a^{2x} + 2}$$

$$\text{즉 } \frac{a^{2x} - 2}{a^{2x} + 2} = \frac{1}{3} \text{ 이므로 } 3a^{2x} - 6 = a^{2x} + 2$$

$$2a^{2x} = 8 \quad \therefore a^{2x} = 4$$

$$\begin{aligned} \therefore (a^{2x} + a^{-2x})^{\frac{1}{2}} &= \left(a^{2x} + \frac{1}{a^{2x}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(4 + \frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{17}{4}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{17}}{2} \end{aligned}$$

15 ㉮ ㉮

$f(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 의 분모, 분자에 각각 a^x 을 곱하면

$$f(x) = \frac{a^x(a^x - a^{-x})}{a^x(a^x + a^{-x})} = \frac{a^{2x} - 1}{a^{2x} + 1}$$

$$f(p) = \frac{1}{4} \text{에서 } \frac{a^{2p} - 1}{a^{2p} + 1} = \frac{1}{4}, 4a^{2p} - 4 = a^{2p} + 1$$

$$3a^{2p} = 5 \quad \therefore a^{2p} = \frac{5}{3} \quad \dots\dots ㉮$$

$$f(q) = \frac{1}{5} \text{에서 } \frac{a^{2q} - 1}{a^{2q} + 1} = \frac{1}{5}, 5a^{2q} - 5 = a^{2q} + 1$$

$$4a^{2q} = 6 \quad \therefore a^{2q} = \frac{3}{2} \quad \dots\dots ㉮$$

㉮, ㉮에서

$$f(p+q) = \frac{a^{2(p+q)} - 1}{a^{2(p+q)} + 1} = \frac{a^{2p}a^{2q} - 1}{a^{2p}a^{2q} + 1} = \frac{\frac{5}{3} \times \frac{3}{2} - 1}{\frac{5}{3} \times \frac{3}{2} + 1} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{7}{2}} = \frac{3}{7}$$

16 ㉮ ㉮

$$15^x = 25 \text{에서 } 15 = 25^{\frac{1}{x}} = (5^2)^{\frac{1}{x}} = 5^{\frac{2}{x}} \quad \dots\dots ㉮$$

$$375^y = 125 \text{에서 } 375 = 125^{\frac{1}{y}} = (5^3)^{\frac{1}{y}} = 5^{\frac{3}{y}} \quad \dots\dots ㉮$$

$$㉮ \div ㉮ \text{을 하면 } \frac{15}{375} = 5^{\frac{2}{x}} \div 5^{\frac{3}{y}}$$

$$5^{\frac{2}{x} - \frac{3}{y}} = \frac{1}{25} = 5^{-2} \quad \therefore \frac{2}{x} - \frac{3}{y} = -2$$

17 ㉮ $\frac{4}{3}$

$$a^x = 16 \text{에서 } a = 16^{\frac{1}{x}} \quad \dots\dots ㉮$$

$$b^y = 16 \text{에서 } b = 16^{\frac{1}{y}} \quad \dots\dots ㉮$$

$$㉮ \times ㉮ \text{을 하면 } ab = 16^{\frac{1}{x}} \times 16^{\frac{1}{y}} = 16^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}$$

$$\text{이때 } ab = 8 \text{이므로 } 16^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} = 8$$

$$2^{4(\frac{1}{x} + \frac{1}{y})} = 2^3, 4\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = 3$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{3}{4}, \frac{x+y}{xy} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \frac{xy}{x+y} = \frac{4}{3}$$

18 ㉮ 1000

$$R_A = Q \times 10^{-p}, R_B = Q \times 10^{-(p+3)} \text{이므로}$$

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{Q \times 10^{-p}}{Q \times 10^{-(p+3)}} = 10^{-p+p+3} = 10^3 = 1000$$

19 ㉮ ㉮

$$a^5 = 3 \text{에서 } a = 3^{\frac{1}{5}}$$

$$b^{12} = 9 \text{에서 } b = 9^{\frac{1}{12}} = (3^2)^{\frac{1}{12}} = 3^{\frac{1}{6}}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\sqrt[7]{ab^3})^n &= (ab^3)^{\frac{n}{7}} = \{3^{\frac{1}{5}} \times (3^{\frac{1}{6}})^3\}^{\frac{n}{7}} = (3^{\frac{1}{5}} \times 3^{\frac{1}{2}})^{\frac{n}{7}} \\ &= (3^{\frac{7}{10}})^{\frac{n}{7}} = 3^{\frac{n}{10}} \end{aligned}$$

이때 $3^{\frac{n}{10}}$ 이 자연수가 되려면 n 은 100 이하의 10의 배수이어야 하므로 $n = 10, 20, 30, \dots, 100$

따라서 모든 자연수 n 의 값의 합은

$$10 + 20 + 30 + \dots + 100 = 550$$

20 ㉮ ㉮

$a^x = b^y = 2^z = k$ ($k > 0$)라 하면 $xyz \neq 0$ 이므로 $k \neq 1$

$$a^x = k \text{에서 } a = k^{\frac{1}{x}}$$

$$b^y = k \text{에서 } b = k^{\frac{1}{y}}$$

$$2^z = k \text{에서 } 2 = k^{\frac{1}{z}}$$

$$\text{이때 } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{3}{z} \text{이므로}$$

$$ab = k^{\frac{1}{x}} \times k^{\frac{1}{y}} = k^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} = k^{\frac{3}{z}} = (k^{\frac{1}{z}})^3 = 2^3 = 8$$

21 ㉮ 36

$$a^x = 5 \text{에서 } a = 5^{\frac{1}{x}}$$

$$b^{2y} = 5 \text{에서 } b = 5^{\frac{1}{2y}}$$

$$c^{3z} = 5 \text{에서 } c = 5^{\frac{1}{3z}}$$

$$\therefore abc = 5^{\frac{1}{x}} \times 5^{\frac{1}{2y}} \times 5^{\frac{1}{3z}} = 5^{\frac{1}{x} + \frac{1}{2y} + \frac{1}{3z}}$$

$$\text{이때 } abc = 125 \text{이므로 } 5^{\frac{1}{x} + \frac{1}{2y} + \frac{1}{3z}} = 125 = 5^3$$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{2y} + \frac{1}{3z} = 3$$

위 식의 양변에 12를 곱하면

$$\frac{12}{x} + \frac{6}{y} + \frac{4}{z} = 36$$

서술형 1 ㉮ 32

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 6, \alpha\beta = -\frac{1}{2} \text{이므로} \quad \dots\dots ㉮$$

$$\sqrt[3]{2^\alpha} \times \sqrt[3]{2^\beta} = 2^{\frac{\alpha}{3}} \times 2^{\frac{\beta}{3}} = 2^{\frac{\alpha+\beta}{3}} = 2^{\frac{6}{3}} = 2^2 = 4$$

$$(64^\alpha)^\beta = 64^{\alpha\beta} = (2^6)^{\alpha\beta} = 2^{6\alpha\beta} = 2^{6 \times (-\frac{1}{2})} = 2^{-3} = \frac{1}{8} \quad \dots\dots ㉮$$

$$\therefore \frac{\sqrt[3]{2^\alpha} \times \sqrt[3]{2^\beta}}{(64^\alpha)^\beta} = \frac{4}{\frac{1}{8}} = 32 \quad \dots\dots ㉮$$

채점 기준	비율
㉮ $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 의 값을 구할 수 있다.	30%
㉮ $\sqrt[3]{2^\alpha} \times \sqrt[3]{2^\beta}, (64^\alpha)^\beta$ 의 값을 구할 수 있다.	60%
㉮ $\frac{\sqrt[3]{2^\alpha} \times \sqrt[3]{2^\beta}}{(64^\alpha)^\beta}$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

서술형 2 ㉮ (1) $\sqrt{7}$ (2) $4\sqrt{7}$ (3) 23

$$(1) (a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}})^2 = a + a^{-1} + 2 = 5 + 2 = 7$$

$$\text{이때 } a > 0 \text{이므로 } a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{7} \quad \dots\dots ㉮$$

$$\begin{aligned} (2) a^{\frac{3}{2}} + a^{-\frac{3}{2}} &= (a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}})^3 - 3(a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}) \\ &= (\sqrt{7})^3 - 3\sqrt{7} \\ &= 7\sqrt{7} - 3\sqrt{7} \\ &= 4\sqrt{7} \end{aligned} \quad \dots\dots ㉮$$

$$(3) a^2 + a^{-2} = (a + a^{-1})^2 - 2 = 5^2 - 2 = 23 \quad \dots\dots ㉮$$

채점 기준	비율
㉮ $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
㉮ $a^{\frac{3}{2}} + a^{-\frac{3}{2}}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
㉮ $a^2 + a^{-2}$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

서술형 3 답 - 39

$$\left(\frac{1}{2^{18}}\right)^{\frac{1}{n}} = (2^{-18})^{\frac{1}{n}} = 2^{-\frac{18}{n}} \quad \dots\dots ①$$

$2^{-\frac{18}{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 $-n$ 은 18의 양의 약수이므로
 $-n=1, 2, 3, 6, 9, 18$ 거듭제곱의 지수 $-\frac{18}{n}$ 이 자연수이어야 한다.

$$\therefore n = -1, -2, -3, -6, -9, -18 \quad \dots\dots ②$$

따라서 모든 정수 n 의 값의 합은

$$-1 + (-2) + (-3) + (-6) + (-9) + (-18) = -39 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① $\left(\frac{1}{2^{18}}\right)^{\frac{1}{n}}$ 을 2의 거듭제곱으로 나타낼 수 있다.	40%
② $\left(\frac{1}{2^{18}}\right)^{\frac{1}{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 정수 n 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ 정수 n 의 값의 합을 구할 수 있다.	20%

10% 핵심 기출 문제 p. 29~30

01 답 ③

-3 의 제곱근 중 실수인 것은 없으므로

$$f_2(-3) = 0$$

-2 의 세제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[3]{-2}$ 의 1개이므로

$$f_3(-2) = 1$$

5 의 네제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[4]{5}, -\sqrt[4]{5}$ 의 2개이므로

$$f_4(5) = 2$$

$$\therefore f_2(-3) + f_3(-2) + f_4(5) = 0 + 1 + 2 = 3$$

02 답 ②

등식 $t^4 = x^2 - 4$ 를 만족시키는 서로 다른 실수 t 의 개수는 $x^2 - 4$ 의 네제곱근 중 실수인 것의 개수와 같다.

(i) $x^2 - 4 > 0$, 즉 $x < -2$ 또는 $x > 2$ 일 때

$x^2 - 4$ 의 네제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[4]{x^2 - 4}, -\sqrt[4]{x^2 - 4}$ 의 2개이므로
 므로 $f(x) = 2$


(ii) $x^2 - 4 = 0$, 즉 $x = \pm 2$ 일 때

$x^2 - 4$ 의 네제곱근 중 실수인 것은 0의 1개이므로
 $f(x) = 1$

(iii) $x^2 - 4 < 0$, 즉 $-2 < x < 2$ 일 때

$x^2 - 4$ 의 네제곱근 중 실수인 것은 없으므로
 $f(x) = 0$

(i)~(iii)에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



03 답 36

$\sqrt{\frac{3}{2}} \times \sqrt[4]{a} = n$ (n 은 자연수)이라 하고 양변을 네제곱하면

$$\frac{9}{4}a = n^4 \quad \therefore \frac{3^2}{4}a = n^4 \quad \dots\dots ①$$

①의 좌변이 자연수 n 의 네제곱이 되려면

$$a = 4 \times 3^2 \times k^4 \quad (k \text{는 자연수})$$

풀이어야 한다.

따라서 $k=1$ 일 때 자연수 a 의 최솟값은

$$4 \times 3^2 \times 1^4 = 36$$

다른 풀이

$\sqrt{\frac{3}{2}} \times \sqrt[4]{a}$ 가 자연수가 되려면 $\sqrt[4]{a}$ 는

$$\sqrt{2 \times 3 \times n^2} \quad (n \text{은 자연수})$$

풀이어야 한다.

즉 $\sqrt[4]{a}$ 의 최솟값은 $n=1$ 일 때 $\sqrt{2 \times 3 \times 1^2} = \sqrt{6}$

따라서 자연수 a 의 최솟값은 $\sqrt[4]{a} = \sqrt{6}$ 에서

$$a = (\sqrt{6})^4 = 36$$

04 답 11

집합 C 의 원소는 b 의 a 제곱근 중 실수인 것들이다.

(i) $a=5$ 일 때

b 의 다섯제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[5]{-3}, \sqrt[5]{-2}, \sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{3}, \sqrt[5]{4}$

(ii) $a=6$ 일 때

$b > 0$, 즉 $b=2, 3, 4$ 이면

b 의 여섯제곱근 중 실수인 것은 $\pm\sqrt[6]{2}, \pm\sqrt[6]{3}, \pm\sqrt[6]{4}$

$b < 0$, 즉 $b=-3, -2$ 이면

b 의 여섯제곱근 중 실수인 것은 존재하지 않는다.

(i), (ii)에서

$$C = \{\sqrt[5]{-3}, \sqrt[5]{-2}, \sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{3}, \sqrt[5]{4}, \sqrt[6]{2}, -\sqrt[6]{2}, \sqrt[6]{3}, -\sqrt[6]{3}, \sqrt[6]{4}, -\sqrt[6]{4}\}$$

$$\therefore n(C) = 11$$

05 답 2

정사각형의 넓이가 $\sqrt[7]{64}$ 이므로 정사각형의 한 변의 길이 $f(n)$ 은

$$f(n) = \sqrt[7]{64} = \sqrt[7]{2^6} = 2^{\frac{6}{7n}} = 2^{\frac{3}{n}}$$

$$\therefore f(4) \times f(12) = 2^{\frac{3}{4}} \times 2^{\frac{3}{12}} = 2^{\frac{3}{4}} \times 2^{\frac{1}{4}} = 2$$

06 답 72

$\sqrt{2m}$ 이 자연수가 되려면

$$m = 2b^2 \quad (b \text{는 자연수})$$

.....㉠

풀이어야 한다.

또 $\sqrt[3]{3m}$ 이 자연수가 되려면

$$m = 3^2q^3 \quad (q \text{는 자연수})$$

.....㉡

풀이어야 한다.

$\sqrt{2m}, \sqrt[3]{3m}$ 이 모두 자연수가 되려면 ㉠, ㉡에서

$$m = 2^3 \times 3^2 \times r^6 \quad (r \text{는 자연수})$$

풀이어야 한다.

따라서 $r=1$ 일 때 자연수 m 의 최솟값은

$$2^3 \times 3^2 \times 1^6 = 72$$

07 답 ③

A 지역에서는

$$H_1 = 12 \text{ (m)}, H_2 = 36 \text{ (m)}, V_1 = 2 \text{ (m/s)}, V_2 = 8 \text{ (m/s)}$$

이므로

$$8 = 2 \times \left(\frac{36}{12}\right)^{\frac{2}{2-k}} \quad \therefore 4 = 3^{\frac{2}{2-k}} \quad \dots\dots ①$$

B 지역에서는

$$H_1=10 \text{ (m)}, H_2=90 \text{ (m)}, V_1=a \text{ (m/s)}, V_2=b \text{ (m/s)}$$

이므로

$$b=a \times \left(\frac{90}{10}\right)^{\frac{2}{2-k}}$$

$$\therefore \frac{b}{a}=9^{\frac{2}{2-k}}=(3^2)^{\frac{2}{2-k}}=(3^{\frac{2}{2-k}})^2 \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

①을 ㉔에 대입하면

$$\frac{b}{a}=4^2=16$$

08 ㉔ 28

$$\sqrt[4]{n^m}=n^{\frac{m}{4}} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

(i) $m=0$ 일 때

n 의 값에 관계없이 ①은 유리수가 된다.

즉 n 의 값은 1, 2, 3, ..., 16이므로 그 개수는 16이다.

(ii) $m=-1$ 또는 $m=1$ 일 때

n 이 어떤 자연수의 네제곱이어야 한다.

즉 n 의 값은 1, 16이므로 그 개수는 2이다.

(iii) $m=-2$ 또는 $m=2$ 일 때

n 이 어떤 자연수의 제곱이어야 한다.

즉 n 의 값은 1, 4, 9, 16이므로 그 개수는 4이다.

(i)~(iii)에서 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는

$$16+2 \times 2+2 \times 4=28$$

09 ㉔ ⑤

집합 X 의 원소는 b 의 a 제곱근 중 실수인 것들이다.

(i) $a=3$ 일 때

b 의 세제곱근 중 실수인 것은

$$\sqrt[3]{-9}, \sqrt[3]{-3}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{9}$$

(ii) $a=4$ 일 때

b 의 네제곱근 중 실수인 것은

$$\pm \sqrt[4]{3}, \pm \sqrt[4]{9}=\pm \sqrt{3}$$

(i), (ii)에서

$$X=\{\sqrt[3]{-9}, \sqrt[3]{-3}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{9}, \sqrt[4]{3}, -\sqrt[4]{3}, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$$

$$\neg, \sqrt[3]{-9} \in X$$

ㄴ. 집합 X 의 원소의 개수는 8이다.

ㄷ. 집합 X 의 원소 중 양수인 것은 $\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{9}, \sqrt[4]{3}, \sqrt{3}$ 이므로 그 곱은

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{9} \times \sqrt[4]{3} \times \sqrt{3} &= 3^{\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{2}{3}} \times 3^{\frac{1}{4}} \times 3^{\frac{1}{2}} \\ &= 3^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}} \\ &= 3^{\frac{7}{4}} \\ &= \sqrt[4]{3^7} \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

10 ㉔ 12

$$64^{\frac{1}{m}}=k \times 81^{\frac{1}{n}} \text{의 양변을 } 81^{\frac{1}{n}} \text{으로 나누면}$$

$$k=\frac{64^{\frac{1}{m}}}{81^{\frac{1}{n}}}=\frac{(2^6)^{\frac{1}{m}}}{(3^4)^{\frac{1}{n}}}=2^{\frac{6}{m}} \times 3^{-\frac{4}{n}}$$

두 밑 2와 3은 서로소이므로 자연수 k 가 존재하려면 밑 2의 지수

$$\frac{6}{m} \text{과 밑 3의 지수 } -\frac{4}{n} \text{가 모두 자연수가 되어야 한다.}$$

$$\frac{6}{m} \text{이 자연수가 되려면 } m \text{은 6의 양의 약수이어야 한다.}$$

즉 m 의 값은 1, 2, 3, 6이므로 그 개수는 4이다.

$$\text{또 } -\frac{4}{n} \text{가 자연수가 되려면 } -n \text{은 4의 양의 약수이어야 하므로}$$

$$-n=1, 2, 4$$

즉 n 의 값은 $-1, -2, -4$ 이므로 그 개수는 3이다.

따라서 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는

$$4 \times 3=12$$

개념 완성하기

p.33~34

01 답 $4 = \log_2 16$

02 답 $-2 = \log_{10} 0.01$

03 답 $-3 = \log_5 \frac{1}{125}$

04 답 $\frac{1}{2} = \log_{36} 6$

05 답 $10^3 = 1000$

06 답 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-5} = 32$

07 답 $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$

08 답 $(\sqrt{3})^4 = 9$

09 답 $x > -1$

진수의 조건에서 $x+1 > 0 \quad \therefore x > -1$

10 답 $0 < x < 2$

진수의 조건에서 $-x^2 + 2x > 0$

$x^2 - 2x < 0, x(x-2) < 0 \quad \therefore 0 < x < 2$

11 답 $4 < x < 5$ 또는 $x > 5$

밑의 조건에서 $x-4 > 0, x-4 \neq 1$

$x > 4, x \neq 5 \quad \therefore 4 < x < 5$ 또는 $x > 5$

12 답 $1 < x < 2$ 또는 $2 < x < 4$

밑의 조건에서 $x-1 > 0, x-1 \neq 1$

$x > 1, x \neq 2 \quad \therefore 1 < x < 2$ 또는 $x > 2$

진수의 조건에서 $4-x > 0 \quad \therefore x < 4$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$1 < x < 2$ 또는 $2 < x < 4$

13 답 $4 < x < 5$ 또는 $x > 5$

밑의 조건에서 $x-4 > 0, x-4 \neq 1$

$x > 4, x \neq 5 \quad \therefore 4 < x < 5$ 또는 $x > 5$

진수의 조건에서 $x^2 + x - 6 > 0$

$(x+3)(x-2) > 0 \quad \therefore x < -3$ 또는 $x > 2$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$4 < x < 5$ 또는 $x > 5$

14 답 $3 < x < 4$ 또는 $4 < x < 5$

밑의 조건에서 $x-3 > 0, x-3 \neq 1$

$x > 3, x \neq 4 \quad \therefore 3 < x < 4$ 또는 $x > 4$

진수의 조건에서 $-x^2 + 7x - 10 > 0$

$x^2 - 7x + 10 < 0, (x-2)(x-5) < 0$

$\therefore 2 < x < 5$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$3 < x < 4$ 또는 $4 < x < 5$

15 답 3

$\log_4 64 = x$ 라 하면 로그의 정의에 의하여

$4^x = 64 = 4^3 \quad \therefore x = 3$

16 답 2

$\log_5 25 = x$ 라 하면 로그의 정의에 의하여

$5^x = 25 = 5^2 \quad \therefore x = 2$

17 답 -3

$\log_{10} 0.001 = x$ 라 하면 로그의 정의에 의하여

$10^x = 0.001 = 10^{-3} \quad \therefore x = -3$

18 답 -4

$\log_3 \frac{1}{81} = x$ 라 하면 로그의 정의에 의하여

$3^x = \frac{1}{81} = 3^{-4} \quad \therefore x = -4$

19 답 8

$\log_{\sqrt{2}} 16 = x$ 라 하면 로그의 정의에 의하여

$(\sqrt{2})^x = 16, 2^{\frac{x}{2}} = 2^4$

$\frac{x}{2} = 4 \quad \therefore x = 8$

20 답 -5

$\log_{\frac{1}{3}} 243 = x$ 라 하면 로그의 정의에 의하여

$\left(\frac{1}{3}\right)^x = 243, 3^{-x} = 3^5$

$-x = 5 \quad \therefore x = -5$

21 답 -2

$\log_{\frac{1}{100}} 10000 = x$ 라 하면 로그의 정의에 의하여

$\left(\frac{1}{100}\right)^x = 10000, 10^{-2x} = 10^4$

$-2x = 4 \quad \therefore x = -2$

22 답 $\frac{7}{2}$

$\log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{128} = x$ 라 하면 로그의 정의에 의하여

$\left(\frac{1}{4}\right)^x = \frac{1}{128}, 2^{-2x} = 2^{-7}$

$-2x = -7 \quad \therefore x = \frac{7}{2}$

23 답 1

$\log_5 25 = x$ 라 하면 로그의 정의에 의하여

$5^x = 25 = 5^2 \quad \therefore x = 2$

즉 $\log_2 (\log_5 25) = \log_2 2$ 이므로 $\log_2 2 = y$ 라 하면

$2^y = 2 \quad \therefore y = 1$

$\therefore \log_2 (\log_5 25) = 1$

.....㉠

.....㉡

24 ㉔ -3

$\log_{81} \sqrt{3} = x$ 라 하면 로그의 정의에 의하여

$$81^x = \sqrt{3}, 3^{4x} = 3^{\frac{1}{2}}$$

$$4x = \frac{1}{2} \quad \therefore x = \frac{1}{8}$$

즉 $\log_2 (\log_{81} \sqrt{3}) = \log_2 \frac{1}{8}$ 이므로 $\log_2 \frac{1}{8} = y$ 라 하면

$$2^y = \frac{1}{8} = 2^{-3} \quad \therefore y = -3$$

$$\therefore \log_2 (\log_{81} \sqrt{3}) = -3$$

25 ㉔ $\frac{1}{5}$

$$\log_5 x = -1 \text{에서 } 5^{-1} = x \quad \therefore x = \frac{1}{5}$$

26 ㉔ 81

$$\log_{\sqrt{3}} x = 8 \text{에서 } (\sqrt{3})^8 = x \quad \therefore x = 81$$

27 ㉔ 10

$$\log_x 1000 = 3 \text{에서 } x^3 = 1000$$

$$\therefore x = 1000^{\frac{1}{3}} = (10^3)^{\frac{1}{3}} = 10$$

28 ㉔ $\frac{1}{2}$

$$\log_x \frac{1}{32} = 5 \text{에서 } x^5 = \frac{1}{32}$$

$$\therefore x = \left(\frac{1}{32}\right)^{\frac{1}{5}} = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^5\right]^{\frac{1}{5}} = \frac{1}{2}$$

29 ㉔ 1

$$\log_3 3 - \log_6 1 = 1 - 0 = 1$$

30 ㉔ 2

$$\log_2 \frac{1}{3} + \log_2 12 = \log_2 \left(\frac{1}{3} \times 12\right) = \log_2 4 = \log_2 2^2 = 2$$

31 ㉔ $-\frac{9}{2}$

$$\begin{aligned} \log_5 \sqrt{5} + \log_2 \frac{1}{8} - \log_3 \sqrt{81} &= \log_5 5^{\frac{1}{2}} + \log_2 2^{-3} - \log_3 3^2 \\ &= \frac{1}{2} \log_5 5 - 3 \log_2 2 - 2 \log_3 3 \\ &= \frac{1}{2} - 3 - 2 = -\frac{9}{2} \end{aligned}$$

32 ㉔ -1

$$\begin{aligned} \log_3 12 - 2 \log_3 6 &= \log_3 12 - \log_3 6^2 = \log_3 \frac{12}{36} \\ &= \log_3 \frac{1}{3} = \log_3 3^{-1} = -1 \end{aligned}$$

33 ㉔ 2

$$\begin{aligned} \log_5 9 + 2 \log_5 \frac{5}{3} &= \log_5 3^2 + 2(\log_5 5 - \log_5 3) \\ &= 2 \log_5 3 + 2 \log_5 5 - 2 \log_5 3 \\ &= 2 \log_5 5 = 2 \end{aligned}$$

34 ㉔ 0

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \log_2 25 + \log_2 \frac{1}{5} &= \frac{1}{2} \log_2 5^2 + \log_2 5^{-1} \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \log_2 5 - \log_2 5 \\ &= 0 \end{aligned}$$

35 ㉔ 1

$$\begin{aligned} 2 \log_2 \sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{1}{2} \log_2 9 &= \log_2 \left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2 + \log_2 9^{\frac{1}{2}} \\ &= \log_2 \frac{2}{3} + \log_2 3 \\ &= \log_2 \left(\frac{2}{3} \times 3\right) \\ &= \log_2 2 = 1 \end{aligned}$$

36 ㉔ $\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \log_3 9 - \log_3 3\sqrt{3} &= \log_3 \frac{9}{3\sqrt{3}} = \log_3 \sqrt{3} \\ &= \log_3 3^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

37 ㉔ 3

$$\log_2 27 \times \log_3 2 = \log_2 3^3 \times \log_3 2 = 3 \log_2 3 \times \log_3 2 = 3$$

38 ㉔ $\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \log_2 9 \times \log_9 \sqrt{2} &= \log_2 9 \times \log_9 2^{\frac{1}{2}} = \log_2 9 \times \frac{1}{2} \log_9 2 \\ &= \frac{1}{2} \log_2 9 \times \log_9 2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

39 ㉔ 2

$$\begin{aligned} \frac{1}{\log_{28} 2} - \frac{1}{\log_7 2} &= \log_2 28 - \log_2 7 = \log_2 \frac{28}{7} \\ &= \log_2 2^2 = 2 \end{aligned}$$

40 ㉔ 1

$$\begin{aligned} \frac{1}{\log_6 3} - \log_9 4 &= \log_3 6 - \log_3 2^2 = \log_3 6 - \frac{2}{2} \log_3 2 \\ &= \log_3 6 - \log_3 2 = \log_3 \frac{6}{2} \\ &= \log_3 3 = 1 \end{aligned}$$

41 ㉔ 6

$$\begin{aligned} \log_5 3 + \log_5 2 &= \log_5 (3 \times 2) = \log_5 6 \text{이므로} \\ (\text{주어진 식}) &= 5^{\log_5 6} = 6^{\log_5 5} = 6 \end{aligned}$$

42 ㉔ 6

$$\begin{aligned} \log_3 30 - \log_3 5 &= \log_3 \frac{30}{5} = \log_3 6 \text{이므로} \\ (\text{주어진 식}) &= 3^{\log_3 6} = 6^{\log_3 3} = 6 \end{aligned}$$

43 ㉔ $2a+b$

$$\log_{10} 12 = \log_{10} (2^2 \times 3) = 2 \log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 2a + b$$

44 ㉠ $2-a$

$$\log_{10} 50 = \log_{10} \frac{100}{2} = \log_{10} 10^2 - \log_{10} 2 = 2 - a$$

45 ㉠ $2b-1$

$$\begin{aligned} \log_{10} 0.9 &= \log_{10} \frac{9}{10} = \log_{10} 3^2 - \log_{10} 10 \\ &= 2 \log_{10} 3 - 1 = 2b - 1 \end{aligned}$$

46 ㉠ $\frac{1}{2}(-a+b+1)$

$$\begin{aligned} \log_{10} \sqrt{15} &= \log_{10} 15^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log_{10} (3 \times 5) \\ &= \frac{1}{2} (\log_{10} 3 + \log_{10} 5) \\ &= \frac{1}{2} \{ \log_{10} 3 + (1 - \log_{10} 2) \} \\ &= \frac{1}{2} \{ b + (1 - a) \} \\ &= \frac{1}{2} (-a + b + 1) \end{aligned}$$

47 ㉠ $\frac{2a+2b}{1-a}$

$$\begin{aligned} \log_3 36 &= \frac{\log_{10} 36}{\log_{10} 3} = \frac{\log_{10} (2^2 \times 3^2)}{\log_{10} 3} \\ &= \frac{2 \log_{10} 2 + 2 \log_{10} 3}{1 - \log_{10} 2} \\ &= \frac{2a + 2b}{1 - a} \end{aligned}$$

48 ㉠ $\frac{a+2b}{2-2a}$

$$\begin{aligned} \log_3 \sqrt{18} &= \frac{\log_{10} 18^{\frac{1}{2}}}{\log_{10} 3} = \frac{\frac{1}{2} \log_{10} (2 \times 3^2)}{\log_{10} 3} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\log_{10} 2 + 2 \log_{10} 3}{1 - \log_{10} 2} \\ &= \frac{a + 2b}{2 - 2a} \end{aligned}$$

49 ㉠ 0.7404

50 ㉠ 1.7582

$$\begin{aligned} \log 57.3 &= \log (5.73 \times 10) = \log 5.73 + \log 10 \\ &= 0.7582 + 1 = 1.7582 \end{aligned}$$

51 ㉠ 2.7505

$$\begin{aligned} \log 563 &= \log (5.63 \times 10^2) = \log 5.63 + 2 \log 10 \\ &= 0.7505 + 2 = 2.7505 \end{aligned}$$

52 ㉠ 1.88245

$$\begin{aligned} \log \sqrt{5820} &= \frac{1}{2} \log (5.82 \times 10^3) = \frac{1}{2} (\log 5.82 + 3 \log 10) \\ &= \frac{1}{2} (0.7649 + 3) = 1.88245 \end{aligned}$$

53 ㉠ -0.2441

$$\begin{aligned} \log 0.570 &= \log (5.70 \times 10^{-1}) = \log 5.70 + \log 10^{-1} \\ &= 0.7559 - 1 = -0.2441 \end{aligned}$$

54 ㉠ -1.2358

$$\begin{aligned} \log 0.0581 &= \log (5.81 \times 10^{-2}) = \log 5.81 + \log 10^{-2} \\ &= 0.7642 - 2 = -1.2358 \end{aligned}$$

55 ㉠ 3.3766

$$\begin{aligned} \log 2380 &= \log (2.38 \times 10^3) = \log 2.38 + 3 \log 10 \\ &= 0.3766 + 3 = 3.3766 \end{aligned}$$

56 ㉠ 1.3766

$$\begin{aligned} \log 23.8 &= \log (2.38 \times 10) = \log 2.38 + \log 10 \\ &= 0.3766 + 1 = 1.3766 \end{aligned}$$

57 ㉠ -1.6234

$$\begin{aligned} \log 0.0238 &= \log (2.38 \times 10^{-2}) = \log 2.38 + \log 10^{-2} \\ &= 0.3766 - 2 = -1.6234 \end{aligned}$$

58 ㉠ -2.6234

$$\begin{aligned} \log 0.00238 &= \log (2.38 \times 10^{-3}) = \log 2.38 + \log 10^{-3} \\ &= 0.3766 - 3 = -2.6234 \end{aligned}$$

59 ㉠ 0.7922

$$\begin{aligned} \log \sqrt[3]{238} &= \frac{1}{3} \log (2.38 \times 10^2) = \frac{1}{3} (\log 2.38 + 2 \log 10) \\ &= \frac{1}{3} (0.3766 + 2) = 0.7922 \end{aligned}$$

유형 완성하기

p. 35~50

01 ㉠ 1024

$$\begin{aligned} \log_2 a &= 7 \text{에서 } a = 2^7 \\ \log_b \frac{1}{2} &= \frac{1}{3} \text{에서 } b^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} \quad \therefore b = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 2^{-3} \\ \therefore \frac{a}{b} &= \frac{2^7}{2^{-3}} = 2^{10} = 1024 \end{aligned}$$

01-1 ㉠ ④

$$\begin{aligned} \log_a 2 &= \frac{1}{3} \text{에서 } a^{\frac{1}{3}} = 2 \quad \therefore a = 2^3 = 8 \\ \therefore a^2 &= 8^2 = 64 \end{aligned}$$

02 ㉠ ⑤

$$\begin{aligned} \log_4 (\log_3 k) &= 1 \text{에서 } \log_3 k = 4 \\ \therefore k &= 3^4 = 81 \end{aligned}$$

02-1 ㉠ 2

$$\begin{aligned} \log_2 \{ \log_3 (\log_k 8) \} &= 0 \text{에서 } \log_3 (\log_k 8) = 1 \\ \log_k 8 &= 3 \quad \therefore k^3 = 8 = 2^3 \\ \therefore k &= 2 \end{aligned}$$

03 ㉔ 2

$$x = \log_2 (\sqrt{2} + 1) \text{에서 } 2^x = \sqrt{2} + 1 \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore 2^{-x} = \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = \sqrt{2} - 1 \quad \dots\dots ②$$

$$\therefore 2^x - 2^{-x} = \sqrt{2} + 1 - (\sqrt{2} - 1) = 2 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 2^x 의 값을 구할 수 있다.	40%
② 2^{-x} 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $2^x - 2^{-x}$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

03-1 ㉔ ①

$$x = \log_7 (\sqrt{5} - 2) \text{에서 } 7^x = \sqrt{5} - 2$$

$$\therefore 7^{-x} = \frac{1}{\sqrt{5} - 2} = \sqrt{5} + 2$$

$$\therefore \frac{(7^x + 7^{-x})^2}{7^x - 7^{-x}} = \frac{\{\sqrt{5} - 2 + (\sqrt{5} + 2)\}^2}{\sqrt{5} - 2 - (\sqrt{5} + 2)} = \frac{(2\sqrt{5})^2}{-4} = -5$$

04 ㉔ ①

밑의 조건에서 $x - 1 > 0, x - 1 \neq 1$ 이므로 $x > 1, x \neq 2 \quad \therefore 1 < x < 2$ 또는 $x > 2 \quad \dots\dots ①$

진수의 조건에서 $-x^2 + 9x - 8 > 0$ 이므로 $x^2 - 9x + 8 < 0, (x - 1)(x - 8) < 0$

$$\therefore 1 < x < 8 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면 $1 < x < 2$ 또는 $2 < x < 8$

따라서 자연수 x 의 값은 3, 4, 5, 6, 7이므로 그 합은 $3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 25$

04-1 ㉔ 5

밑의 조건에서 $x - 3 > 0, x - 3 \neq 1$ 이므로 $x > 3, x \neq 4 \quad \therefore 3 < x < 4$ 또는 $x > 4 \quad \dots\dots ①$

진수의 조건에서 $9 - x > 0$ 이므로 $x < 9 \quad \dots\dots ②$

①, ②의 공통 범위를 구하면 $3 < x < 4$ 또는 $4 < x < 9$

따라서 정수 x 의 최솟값은 5이다.

05 ㉔ ④

밑의 조건에서 $k - 3 > 0, k - 3 \neq 1$ 이므로 $k > 3, k \neq 4 \quad \therefore 3 < k < 4$ 또는 $k > 4 \quad \dots\dots ①$

진수의 조건에서 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + 2kx + 9k > 0$ 이어야 하므로 이차방정식 $x^2 + 2kx + 9k = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = k^2 - 9k < 0$$

$$k(k - 9) < 0 \quad \therefore 0 < k < 9 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면 $3 < k < 4$ 또는 $4 < k < 9$

따라서 정수 k 의 값은 5, 6, 7, 8이므로 그 개수는 4이다.

Lecture 이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 이 항상 성립할 조건

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 이 항상 성립하려면 $a > 0, b^2 - 4ac < 0$

05-1 ㉔ 22

밑의 조건에서 $a - 2 > 0, a - 2 \neq 1$ 이므로 $a > 2, a \neq 3 \quad \therefore 2 < a < 3$ 또는 $a > 3 \quad \dots\dots ① \quad \dots\dots ①$

진수의 조건에서 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + ax + 2a > 0$ 이어야 하므로 이차방정식 $x^2 + ax + 2a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = a^2 - 4 \times 1 \times 2a < 0$$

$$a^2 - 8a < 0, a(a - 8) < 0$$

$$\therefore 0 < a < 8 \quad \dots\dots ② \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면 $2 < a < 3$ 또는 $3 < a < 8$

따라서 정수 a 의 값은 4, 5, 6, 7이므로 그 합은 $4 + 5 + 6 + 7 = 22 \quad \dots\dots ③$

채점 기준	비율
① 밑의 조건을 이용하여 a 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
② 진수의 조건을 이용하여 a 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
③ 정수 a 의 값의 합을 구할 수 있다.	20%

06 ㉔ ②

밑의 조건에서 $\begin{cases} a+2 \neq 0 \\ \therefore a \neq -2 \end{cases} \begin{cases} a+2 \neq 1 \text{ 또는 } a+2 \neq -1 \\ \therefore a \neq -1 \text{ 또는 } a \neq -3 \end{cases}$

밑의 조건에서 $|a+2| > 0, |a+2| \neq 1$

$$\therefore a = -3, a \neq -2, a \neq -1 \quad \dots\dots ①$$

진수의 조건에서 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + ax + 3 - a > 0$ 이어야 하므로 이차방정식 $x^2 + ax + 3 - a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = a^2 - 4 \times 1 \times (3 - a) < 0$$

$$a^2 + 4a - 12 < 0, (a + 6)(a - 2) < 0$$

$$\therefore -6 < a < 2 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면 $-6 < a < -3$ 또는 $-3 < a < -2$ 또는 $-2 < a < -1$ 또는 $-1 < a < 2$

따라서 정수 a 의 값은 $-5, -4, 0, 1$ 이므로 그 개수는 4이다.

06-1 ㉔ ③

밑의 조건에서 $(k - 2)^2 > 0, (k - 2)^2 \neq 1$

$$\therefore k \neq 1, k \neq 2, k \neq 3 \quad \dots\dots ①$$

진수의 조건에서 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + 2kx + 5 > 0$ 이어야 하므로 이차방정식 $x^2 + 2kx + 5 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = k^2 - 5 < 0, (k + \sqrt{5})(k - \sqrt{5}) < 0$$

$$\therefore -\sqrt{5} < k < \sqrt{5} \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면 $-\sqrt{5} < k < 1$ 또는 $1 < k < 2$ 또는 $2 < k < \sqrt{5}$

따라서 정수 k 의 값은 $-2, -1, 0$ 이므로 그 개수는 3이다.

07 ㉔ ③

$$\log_2 \sqrt{18} + \log_2 \sqrt[3]{3} - \frac{4}{3} \log_2 3 = \log_2 3\sqrt{2} + \log_2 \sqrt[3]{3} - \log_2 3^{\frac{4}{3}}$$

$$= \log_2 3\sqrt{2} + \log_2 \sqrt[3]{3} - \log_2 \sqrt[3]{3^4}$$

$$= \log_2 \frac{3\sqrt{2} \times \sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{3^4}}$$

$$= \log_2 \sqrt{2}$$

$$= \log_2 2^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2}$$

07-1 ㉔ ①

$$\begin{aligned}\log_2 6 + \log_2 4\sqrt{3} - 3\log_2 \sqrt{3} &= \log_2 6 + \log_2 4\sqrt{3} - \log_2 (\sqrt{3})^3 \\ &= \log_2 \frac{6 \times 4\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} = \log_2 8 \\ &= \log_2 2^3 = 3\end{aligned}$$

08 ㉔ ②

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \log_2 3 - \log_2 12 &= \log_2 \frac{3}{12} = \log_2 2^{-2} = -2 \\ \textcircled{2} \log_2 \sqrt[3]{6} - \frac{1}{3} \log_2 \frac{3}{4} &= \frac{1}{3} \log_2 (2 \times 3) - \frac{1}{3} (\log_2 3 - \log_2 4) \\ &= \frac{1}{3} (1 + \log_2 3) - \frac{1}{3} (\log_2 3 - 2) \\ &= 1 \\ \textcircled{3} \log_2 9 \times \log_3 \sqrt{2} &= \log_2 3^2 \times \log_3 2^{\frac{1}{2}} = 2 \log_2 3 \times \frac{1}{2} \log_3 2 \\ &= \log_2 3 \times \log_3 2 = 1 \\ \textcircled{4} \log_2 \frac{2}{3} + 2 \log_2 \sqrt{12} &= (1 - \log_2 3) + 2 \log_2 (2^2 \times 3)^{\frac{1}{2}} \\ &= 1 - \log_2 3 + \log_2 (2^2 \times 3) \\ &= 1 - \log_2 3 + (2 + \log_2 3) \\ &= 3 \\ \textcircled{5} \log_{16} 64 + \log_{0.1} \sqrt[4]{10} &= \log_{2^4} 2^6 + \log_{10^{-1}} 10^{\frac{1}{4}} \\ &= \frac{6}{4} - \frac{1}{4} = \frac{5}{4}\end{aligned}$$

따라서 옳지 않은 것은 ②이다.

08-1 ㉔ ③

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \log_2 5 + \log_2 \frac{16}{5} &= \log_2 \left(5 \times \frac{16}{5} \right) = \log_2 16 = \log_2 2^4 = 4 \\ \textcircled{2} \log_2 \sqrt{6} - \frac{1}{2} \log_2 3 &= \log_2 \sqrt{6} - \log_2 \sqrt{3} = \log_2 \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} \\ &= \log_2 \sqrt{2} = \log_2 2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \\ \textcircled{3} \log_7 (5 - 3\sqrt{2}) + \log_7 (5 + 3\sqrt{2}) &= \log_7 (5 - 3\sqrt{2})(5 + 3\sqrt{2}) \\ &= \log_7 (25 - 18) \\ &= \log_7 7 = 1 \\ \textcircled{4} \log_3 27 \times \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{16} &= \log_3 3^3 \times \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} \right)^4 = 3 \times 4 = 12 \\ \textcircled{5} \log_5 7 - 2 \log_5 \frac{1}{5} - \log_5 35 &= \log_5 7 - 2 \log_5 5^{-1} - \log_5 (5 \times 7) \\ &= \log_5 7 + 2 - \log_5 5 - \log_5 7 \\ &= 2 - 1 = 1\end{aligned}$$

따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

09 ㉔ 2

$$\begin{aligned}\log_{16} 3a + \log_{16} 2b + \log_{16} c &= \frac{1}{2} \text{에서} \\ \log_{16} (3a \times 2b \times c) &= \frac{1}{2}, \log_{16} 6abc = \frac{1}{2} \\ 6abc &= 16^{\frac{1}{2}}, 6abc = 4 \quad \therefore 3abc = 2\end{aligned}$$

09-1 ㉔ 9

$$\begin{aligned}\log_4 2a + 2 \log_4 \sqrt{b} + \frac{1}{3} \log_4 (4c)^3 &= 2 \text{에서} \\ \log_4 2a + 2 \log_4 b^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{3} \log_4 (4c)^3 &= 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\log_4 2a + \log_4 b + \log_4 4c &= 2, \log_4 (2a \times b \times 4c) = 2 \\ \log_4 8abc &= 2, 8abc = 4^2 = 16 \quad \therefore abc = 2 \\ \therefore 3^{abc} &= 3^2 = 9\end{aligned}$$

10 ㉔ ②

$$\begin{aligned}\log_2 (x-1) + \log_2 (x+1) &= \log_2 (x-1)(x+1) \\ &= \log_2 (x^2 - 1) \\ &= \log_2 \{(\sqrt{5})^2 - 1\} \\ &= \log_2 4 \\ &= \log_2 2^2 \\ &= 2\end{aligned}$$

10-1 ㉔ ③

$$\begin{aligned}\log_3 (x-1) + \log_3 (x^2 + x + 1) &= \log_3 (x-1)(x^2 + x + 1) \\ &= \log_3 (x^3 - 1) \\ &= \log_3 \{(\sqrt[3]{28})^3 - 1\} \\ &= \log_3 27 = \log_3 3^3 \\ &= 3\end{aligned}$$

11 ㉔ -2

$$\begin{aligned}\log_{10} \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \log_{10} \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \log_{10} \left(1 - \frac{1}{4} \right) \\ + \dots + \log_{10} \left(1 - \frac{1}{100} \right) \\ = \log_{10} \frac{1}{2} + \log_{10} \frac{2}{3} + \log_{10} \frac{3}{4} + \dots + \log_{10} \frac{99}{100} \\ = \log_{10} \left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{99}{100} \right) \\ = \log_{10} \frac{1}{100} = \log_{10} 10^{-2} \\ = -2\end{aligned}$$

11-1 ㉔ 6

$$\begin{aligned}\log_2 (1+1) + \log_2 \left(1 + \frac{1}{2} \right) + \log_2 \left(1 + \frac{1}{3} \right) \\ + \dots + \log_2 \left(1 + \frac{1}{63} \right) \\ = \log_2 2 + \log_2 \frac{3}{2} + \log_2 \frac{4}{3} + \dots + \log_2 \frac{64}{63} \\ = \log_2 \left(2 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \dots \times \frac{64}{63} \right) \\ = \log_2 64 = \log_2 2^6 \\ = 6\end{aligned}$$

12 ㉔ ⑤

두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{\log_3 b - \log_3 a}{3 - (-1)} = \frac{\log_3 b - \log_3 a}{4}$$

이때 직선 AB가 직선 $y = -2x + 5$ 에 수직이므로 직선 AB의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 이다.

$$\therefore \frac{\log_3 b - \log_3 a}{4} = \frac{1}{2} \text{이므로 } \log_3 b - \log_3 a = 2$$

$$\log_3 \frac{b}{a} = 2 \quad \therefore \frac{b}{a} = 3^2 = 9$$

12-1 ㉮ 125

$\overline{AB}$ 를 2 : 1로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times 5 + 1 \times 2}{2+1}, \frac{2 \times \log_5 b + 1 \times 2 \log_5 a}{2+1} \right)$$

$$\therefore \left(4, \frac{2 \log_5 b + 2 \log_5 a}{3} \right) \quad \dots\dots ①$$

이때 $\overline{AB}$ 를 2 : 1로 내분하는 점의 좌표가 (4, 2)이므로

$$\frac{2 \log_5 b + 2 \log_5 a}{3} = 2, 2 \log_5 b + 2 \log_5 a = 6$$

$$\log_5 b + \log_5 a = 3, \log_5 ab = 3$$

$$\therefore ab = 5^3 = 125 \quad \dots\dots ②$$

채점 기준	비율
① $\overline{AB}$ 를 2 : 1로 내분하는 점의 좌표를 구할 수 있다.	50%
② ab 의 값을 구할 수 있다.	50%

13 ㉮ ②

$$\log_3 3 \times \log_3 5 \times \log_5 b = 12 \text{에서}$$

$$\frac{1}{\log_3 a} \times \log_3 5 \times \frac{\log_3 b}{\log_3 5} = 12$$

$$\frac{\log_3 b}{\log_3 a} = 12 \quad \therefore \log_a b = 12$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_a \sqrt{b} &= \log_a b^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \log_a b \\ &= \frac{1}{4} \times 12 = 3 \end{aligned}$$

13-1 ㉮ ②

$$\log_3 32 \times \log_2 k = 20 \text{에서 } \log_3 2^5 \times \log_2 k = 20$$

$$5 \log_3 2 \times \log_2 k = 20, \log_3 2 \times \log_2 k = 4$$

$$\frac{\log_3 2}{\log_3 3} \times \frac{\log_3 k}{\log_3 2} = 4, \frac{\log_3 k}{\log_3 3} = 4$$

$$\log_3 9 \times \log_3 k = 4, 2 \log_3 k = 4$$

$$\therefore \log_3 k = 2$$

14 ㉮ 2

$$\frac{1}{\log_2 a} + \frac{1}{\log_4 a} + \frac{1}{\log_8 a} = 6 \text{에서}$$

$$\log_a 2 + \log_a 4 + \log_a 8 = 6$$

$$\log_a (2 \times 4 \times 8) = 6, \log_a 64 = 6$$

$$a^6 = 64 = 2^6 \quad \therefore a = 2 \quad (\because a > 0)$$

14-1 ㉮ 3

$$\frac{1}{\log_3 a} - \frac{1}{\log_5 a} + \frac{1}{\log_{15} a} = \frac{2}{\log_a a} \text{에서}$$

$$\log_a 3 - \log_a 5 + \log_a 15 = 2 \log_a a$$

$$\log_a \frac{3 \times 15}{5} = \log_a k^2, \log_a 9 = \log_a k^2$$

$$k^2 = 9 = 3^2 \quad \therefore k = 3 \quad (\because k > 0)$$

15 ㉮ 2

$$\log_a x = 3, \log_b x = 8, \log_c x = 24 \text{에서}$$

$$\log_x a = \frac{1}{3}, \log_x b = \frac{1}{8}, \log_x c = \frac{1}{24} \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_{abc} x &= \frac{1}{\log_x abc} = \frac{1}{\log_x a + \log_x b + \log_x c} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{8} + \frac{1}{24}} \\ &= \frac{1}{\frac{12}{24}} = 2 \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① $\log_x a, \log_x b, \log_x c$ 의 값을 구할 수 있다.	60%
② $\log_{abc} x$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

15-1 ㉮ 7

$$\log_a x = 2, \log_b x = 6, \log_c x = 12 \text{에서}$$

$$\log_x a = \frac{1}{2}, \log_x b = \frac{1}{6}, \log_x c = \frac{1}{12}$$

$$\begin{aligned} \therefore 2 \log_{ab} x + \log_{bc} x &= \frac{2}{\log_x ab} + \frac{1}{\log_x bc} \\ &= \frac{2}{\log_x a + \log_x b} + \frac{1}{\log_x b + \log_x c} \\ &= \frac{2}{\frac{1}{2} + \frac{1}{6}} + \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{12}} \\ &= \frac{2}{\frac{4}{6}} + \frac{1}{\frac{3}{12}} \\ &= 3 + 4 \\ &= 7 \end{aligned}$$

16 ㉮ 164

$$\log_3 1 + \log_4 16 + 3^{\log_3 16} + 16^{\log_3 3}$$

$$= 0 + \log_4 4^2 + 3^{\log_3 16} + 3^{\log_3 16}$$

$$= 2 + 3^{\log_3 2^4} + 3^{\log_3 2^4}$$

$$= 2 + 3^4 + 3^4$$

$$= 164$$

16-1 ㉮ ④

$$A = 3^{\log_3 45 - \log_3 18} = 3^{\log_3 \frac{45}{18}} = 3^{\log_3 \frac{5}{2}} = \frac{5}{2}$$

$$B = \log_2 \{ \log_4 (\log_7 49) \} = \log_2 \{ \log_4 (\log_7 7^2) \}$$

$$= \log_2 (\log_2 2) = \log_2 (\log_2 2)$$

$$= \log_2 \frac{1}{2} = -1$$

$$\therefore 10(A+B) = 10 \left\{ \frac{5}{2} + (-1) \right\} = 15$$

17 ㉮ ③

$$(\log_5 4 + \log_{25} 8)(\log_2 5 + \log_4 125)$$

$$= (\log_5 2^2 + \log_{5^2} 2^3)(\log_2 5 + \log_{2^2} 5^3)$$

$$= \left(2 \log_5 2 + \frac{3}{2} \log_5 2 \right) \left(\log_2 5 + \frac{3}{2} \log_2 5 \right)$$

$$= \frac{7}{2} \log_5 2 \times \frac{5}{2} \log_2 5$$

$$= \frac{7}{2} \times \frac{5}{2} \times 1$$

$$= \frac{35}{4}$$

17-1 ㉔ ②

$$\begin{aligned} & \frac{(\log_3 25 + \log_3 5)(\log_3 3 + \log_{25} 3)}{(\log_3 32 - \log_3 16)(\log_2 9 - \log_4 243)} \\ &= \frac{(\log_3 5^2 + \log_3 5)(\log_3 3 + \log_{5^2} 3)}{(\log_{3^2} 2^5 - \log_3 2^4)(\log_2 3^2 - \log_{2^2} 3^5)} \\ &= \frac{\left(2 \log_3 5 + \frac{1}{2} \log_3 5\right) \left(\log_3 3 + \frac{1}{2} \log_5 3\right)}{\left(\frac{5}{2} \log_3 2 - 4 \log_3 2\right) \left(2 \log_2 3 - \frac{5}{2} \log_2 3\right)} \\ &= \frac{\frac{5}{2} \log_3 5 \times \frac{3}{2} \log_5 3}{-\frac{3}{2} \log_3 2 \times \left(-\frac{1}{2} \log_2 3\right)} \\ &= \frac{\frac{5}{2} \times \frac{3}{2} \times 1}{-\frac{3}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times 1} = \frac{15}{\frac{3}{4}} = 5 \end{aligned}$$

18 ㉔ ④

$$\begin{aligned} \log_3 10 \times \log_5 3 \times \log_2 25 &= \frac{\log_3 10}{\log_3 5} \times \log_2 5^2 \\ &= \log_5 10 \times 2 \log_2 5 \\ &= \frac{2 \log_5 10}{\log_5 2} \\ &= 2 \log_2 10 \\ &= \log_2 100 \\ \therefore 2^{\log_3 10 \times \log_5 3 \times \log_2 25} &= 2^{\log_2 100} = 100 \end{aligned}$$

18-1 ㉔ 81

$$\begin{aligned} A &= \log_3 7 \times 2 \log_5 3 \times \log_7 25 \\ &= \log_3 7 \times \frac{2}{\log_3 5} \times \frac{\log_3 5^2}{\log_3 7} \quad \dots\dots ① \\ &= \log_3 7 \times \frac{2}{\log_3 5} \times \frac{2 \log_3 5}{\log_3 7} \\ &= 4 \quad \dots\dots ② \\ \therefore 3^A &= 3^4 = 81 \quad \dots\dots ③ \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① A를 밑이 3인 로그로 바꿀 수 있다.	40%
② A의 값을 구할 수 있다.	40%
③ 3 ^A 의 값을 구할 수 있다.	20%

19 ㉔ (가) a (나) c^{bq} (다) log_c b

$$\begin{aligned} \log_a b &= p, \log_c a = q \text{라 하면 } a^p = b, c^q = \boxed{\text{(가)} a} \\ \text{지수법칙에 의하여 } b &= a^p = (c^q)^p = \boxed{\text{(나)} c^{pq}} \text{이므로} \\ pq &= \boxed{\text{(다)} \log_c b} \\ \therefore \log_a b \times \log_c a &= \log_c b \quad \dots\dots ㉠ \end{aligned}$$

그런데 $a \neq 1$ 이므로 $\log_c a \neq 0$

$$\textcircled{1} \text{의 양변을 } \log_c a \text{로 나누면 } \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

19-1 ㉔ ③

$x = \log_a b^n$ 이라 하면 로그의 정의에 의하여

$$b^n = \boxed{\text{(가)} (a^x)^n} = (a^x)^{\boxed{\text{(나)} m}} \text{이므로}$$

$$a^x = (b^n)^{\frac{1}{m}} = \boxed{\text{(다)} b^{\frac{n}{m}}}$$

$$\therefore x = \log_a \boxed{\text{(다)} b^{\frac{n}{m}}} = \frac{n}{m} \log_a b$$

20 ㉔ (가) 유리수 (나) 3^m (다) 홀수

$\log_2 3$ 이 $\boxed{\text{(가)} \text{유리수}}$ 라 가정하면 서로소인 두 자연수

$m, n (m < n)$ 에 대하여 $\log_2 3 = \frac{n}{m}$ 으로 나타낼 수 있다.

$$\text{로그의 정의에 의하여 } 2^{\frac{n}{m}} = 3 \quad \therefore 2^n = \boxed{\text{(나)} 3^m}$$

이때 2ⁿ은 짝수이고, $\boxed{\text{(나)} 3^m}$ 은 $\boxed{\text{(다)} \text{홀수}}$ 이므로 2ⁿ과 3^m은 항상 같지 않다.

따라서 $\log_2 3$ 은 무리수이다.

20-1 ㉔ (가) log_a x (나) log_c a (다) log_c b

$x = a^{\log_c c}$ 이라 하면 로그의 정의에 의하여

$$\boxed{\text{(가)} \log_a x} = \log_b c$$

이때 밑의 변환 공식에 의하여

$$\boxed{\text{(가)} \log_a x} = \frac{\log_c x}{\boxed{\text{(나)} \log_c a}}, \log_b c = \frac{1}{\boxed{\text{(다)} \log_c b}} \text{이므로}$$

$$\frac{\log_c x}{\boxed{\text{(나)} \log_c a}} = \frac{1}{\boxed{\text{(다)} \log_c b}}$$

$$\therefore \log_c x = \frac{\boxed{\text{(나)} \log_c a}}{\boxed{\text{(다)} \log_c b}} = \log_b a$$

따라서 $x = c^{\log_b a}$ 이므로

$$a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

21 ㉔ ⑤

$\log_7 2 = a, \log_7 3 = b$ 이므로

$$\begin{aligned} \log_{14} 84 &= \frac{\log_7 84}{\log_7 14} = \frac{\log_7 (2^2 \times 3 \times 7)}{\log_7 (2 \times 7)} \\ &= \frac{2 \log_7 2 + \log_7 3 + 1}{\log_7 2 + 1} \\ &= \frac{2a + b + 1}{a + 1} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \log_7 2 = a, \log_7 3 = b \text{를 대입} \end{array} \right\}$$

21-1 ㉔ ④

$\log_5 6 = \log_5 (2 \times 3) = b$ 이므로 $\log_5 2 + \log_5 3 = b$

이때 $\log_5 3 = a$ 이므로 $\log_5 2 = b - a$

$$\begin{aligned} \therefore \log_{12} 9 &= \frac{\log_5 9}{\log_5 12} = \frac{\log_5 3^2}{\log_5 (2^2 \times 3)} \\ &= \frac{2 \log_5 3}{2 \log_5 2 + \log_5 3} \\ &= \frac{2a}{2(b-a) + a} \\ &= \frac{2a}{2b-a} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \log_5 2 = b-a, \log_5 3 = a \text{를 대입} \end{array} \right\}$$

22 ㉔ $\frac{5a-1}{a-1}$

$\log_3 12 = \log_3 (2^2 \times 3) = 2 \log_3 2 + 1 = a$ 이므로

$$\log_3 2 = \frac{a-1}{2} \quad \therefore \log_2 3 = \frac{2}{a-1}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_2 288 &= \log_2 (2^5 \times 3^2) \\ &= 5 + 2 \log_2 3 \\ &= 5 + 2 \times \frac{2}{a-1} \\ &= \frac{5a-1}{a-1} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \log_2 3 = \frac{2}{a-1} \text{를 대입} \end{array} \right\}$$

22-1 ㉮ $\frac{4a+13}{a+1}$

$$\log_3 \frac{8}{3} = \log_3 \frac{2^3}{3} = 3 \log_3 2 - 1 = a \text{ 이므로}$$

$$\log_3 2 = \frac{a+1}{3} \quad \therefore \log_3 3 = \frac{3}{a+1}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_2 432 &= \log_2 (2^4 \times 3^3) \\ &= 4 + 3 \log_2 3 \\ &= 4 + 3 \times \frac{3}{a+1} \quad \left[\log_2 3 = \frac{3}{a+1} \text{을 대입} \right] \\ &= \frac{4a+13}{a+1} \end{aligned}$$

23 ㉮ $\frac{2-a-2b}{3}$

$$\log_{10} \frac{4}{3} = \log_{10} 4 - \log_{10} 3 = 2 \log_{10} 2 - \log_{10} 3 = a \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\log_{10} \frac{5}{3} = \log_{10} 5 - \log_{10} 3 = 1 - \log_{10} 2 - \log_{10} 3 = b \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \times 2 \text{를 하면 } 2 - 3 \log_{10} 3 = a + 2b$$

$$\therefore \log_{10} 3 = \frac{2-a-2b}{3}$$

23-1 ㉮ $4b-2a+4$

$$\log_3 \frac{5}{2} = \log_3 5 - \log_3 2 = a \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\log_3 \frac{5}{3} = \log_3 5 - 1 = b \text{ 이므로 } \log_3 5 = b + 1$$

$$\log_3 5 = b + 1 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면}$$

$$b + 1 - \log_3 2 = a \quad \therefore \log_3 2 = b - a + 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_3 100 &= \log_3 (2^2 \times 5^2) \\ &= 2 \log_3 2 + 2 \log_3 5 \\ &= 2(b - a + 1) + 2(b + 1) \quad \left[\log_3 2 = b - a + 1, \log_3 5 = b + 1 \text{을 대입} \right] \\ &= 4b - 2a + 4 \end{aligned}$$

24 ㉮ ④

$$5^a = 2 \text{에서 } \log_5 2 = a$$

$$5^b = 3 \text{에서 } \log_5 3 = b$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_2 15 &= \frac{\log_5 15}{\log_5 2} = \frac{\log_5 (3 \times 5)}{\log_5 2} \\ &= \frac{\log_5 3 + 1}{\log_5 2} = \frac{b + 1}{a} \end{aligned}$$

24-1 ㉮ ①

$$2^a = 3 \text{에서 } \log_2 3 = a \quad \therefore \log_3 2 = \frac{1}{a}$$

$$3^b = 5 \text{에서 } \log_3 5 = b$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_{24} 60 &= \frac{\log_3 60}{\log_3 24} = \frac{\log_3 (2^2 \times 3 \times 5)}{\log_3 (2^3 \times 3)} \\ &= \frac{2 \log_3 2 + 1 + \log_3 5}{3 \log_3 2 + 1} \\ &= \frac{\frac{2}{a} + 1 + b}{\frac{3}{a} + 1} = \frac{ab + a + 2}{a + 3} \end{aligned}$$

25 ㉮ ⑤

$$2^a = x \text{에서 } \log_2 x = a$$

$$4^b = 2^{2b} = y \text{에서 } \log_2 y = 2b$$

$$8^c = 2^{3c} = z \text{에서 } \log_2 z = 3c$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_x y^3 z^4 &= \frac{\log_2 y^3 z^4}{\log_2 x} = \frac{3 \log_2 y + 4 \log_2 z}{\log_2 x} \\ &= \frac{3 \times 2b + 4 \times 3c}{a} = \frac{6b + 12c}{a} \end{aligned}$$

25-1 ㉮ $b+3c-2a$

$$10^a = x \text{에서 } \log_{10} x = a$$

$$10^b = y \text{에서 } \log_{10} y = b$$

$$10^c = z \text{에서 } \log_{10} z = c$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_{10} \frac{yz^3}{x^2} &= \log_{10} y + 3 \log_{10} z - 2 \log_{10} x \\ &= b + 3c - 2a \end{aligned}$$

26 ㉮ $-\frac{2n}{m+n}$

$$a^m = b^n = 7 \text{에서 } \log_a 7 = m, \log_b 7 = n \text{ 이므로}$$

$$\log_7 a = \frac{1}{m}, \log_7 b = \frac{1}{n} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_{ab} \frac{1}{a^2} &= \frac{\log_7 a^{-2}}{\log_7 ab} = \frac{-2 \log_7 a}{\log_7 a + \log_7 b} \\ &= \frac{-2}{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} = -\frac{2n}{m+n} \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① $\log_7 a, \log_7 b$ 를 m, n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
② $\log_{ab} \frac{1}{a^2}$ 을 m, n 으로 나타낼 수 있다.	60%

26-1 ㉮ $\frac{2m-n}{m+n}$

$$a^m = b^n = 5 \text{에서 } \log_a 5 = m, \log_b 5 = n \text{ 이므로}$$

$$\log_5 a = \frac{1}{m}, \log_5 b = \frac{1}{n}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_{ab} \frac{b^2}{a} &= \frac{\log_5 \frac{b^2}{a}}{\log_5 ab} = \frac{2 \log_5 b - \log_5 a}{\log_5 a + \log_5 b} \\ &= \frac{\frac{2}{n} - \frac{1}{m}}{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} \\ &= \frac{2m-n}{m+n} \end{aligned}$$

27 ㉮ 5

$$a^6 b^4 = 1 \text{의 양변에 } a \text{를 밑으로 하는 로그를 취하면}$$

$$\log_a a^6 b^4 = \log_a 1, \log_a a^6 + \log_a b^4 = 0$$

$$6 + 4 \log_a b = 0 \quad \therefore \log_a b = -\frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_a a^8 b^2 &= \log_a a^8 + \log_a b^2 = 8 + 2 \log_a b \\ &= 8 + 2 \times \left(-\frac{3}{2}\right) = 5 \end{aligned}$$

다른 풀이

$$a^6 b^4 = 1 \text{에서 } b^4 = a^{-6} \quad \therefore b = a^{-\frac{3}{2}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_a a^8 b^2 &= \log_a \{a^8 \times (a^{-\frac{3}{2}})^2\} = \log_a (a^8 \times a^{-3}) \\ &= \log_a a^5 = 5 \end{aligned}$$

27-1 ㉔ ④

$\frac{a^4}{b^3}=1$ 의 양변에 b 를 밑으로 하는 로그를 취하면

$$\log_b \frac{a^4}{b^3} = \log_b 1, \log_b a^4 - \log_b b^3 = 0$$

$$4 \log_b a - 3 = 0 \quad \therefore \log_b a = \frac{3}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_b \frac{b^{12}}{a^8} &= \log_b b^{12} - \log_b a^8 = 12 - 8 \log_b a \\ &= 12 - 8 \times \frac{3}{4} = 6 \end{aligned}$$

28 ㉔ ③

$\log_2 a = \log_3 b = k$ 라 하면 $a = 2^k, b = 3^k$

$$\therefore ab = 2^k \times 3^k = 6^k$$

이때 $ab = 216$ 이므로 $6^k = 216 = 6^3 \quad \therefore k = 3$

따라서 $a = 2^3 = 8, b = 3^3 = 27$ 이므로

$$a + b = 8 + 27 = 35$$

28-1 ㉔ 75

$\log_3 a + \log_3 b = 1$ 에서 $\log_3 ab = 1$

$$\therefore ab = 3$$

$\log_3 (a+b) = 2$ 에서 $a+b = 3^2 = 9$

$$\begin{aligned} \therefore a^2 + b^2 &= (a+b)^2 - 2ab = 9^2 - 2 \times 3 \\ &= 81 - 6 = 75 \end{aligned}$$

..... ①

..... ②

..... ③

채점 기준	비율
① ab 의 값을 구할 수 있다.	30%
② $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ a^2+b^2 의 값을 구할 수 있다.	40%

29 ㉔ ⑤

$100^x = 5$ 에서 $x = \log_{100} 5$

$4^y = 5$ 에서 $y = \log_4 5$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{x} - \frac{1}{y} &= \frac{1}{\log_{100} 5} - \frac{1}{\log_4 5} = \log_5 100 - \log_5 4 \\ &= \log_5 \frac{100}{4} = \log_5 5^2 = 2 \end{aligned}$$

29-1 ㉔ -1

$15^x = 25$ 에서 $x = \log_{15} 25 = \log_{15} 5^2 = 2 \log_{15} 5$

$75^y = 125$ 에서 $y = \log_{75} 125 = \log_{75} 5^3 = 3 \log_{75} 5$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{2}{x} - \frac{3}{y} &= \frac{2}{2 \log_{15} 5} - \frac{3}{3 \log_{75} 5} = \log_5 15 - \log_5 75 \\ &= \log_5 \frac{15}{75} = \log_5 5^{-1} = -1 \end{aligned}$$

30 ㉔ 0

$9^x = 25^y = 15^z = k$ 라 하면

$x = \log_9 k, y = \log_{25} k, z = \log_{15} k$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z} &= \frac{1}{\log_9 k} + \frac{1}{\log_{25} k} - \frac{2}{\log_{15} k} \\ &= \log_k 9 + \log_k 25 - 2 \log_k 15 \\ &= \log_k 9 + \log_k 25 - \log_k 15^2 \\ &= \log_k \frac{3^2 \times 5^2}{15^2} = \log_k 1 = 0 \end{aligned}$$

30-1 ㉔ 0

$4^x = 9^y = 36^z = k$ 라 하면

$x = \log_4 k, y = \log_9 k, z = \log_{36} k$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{z} &= \frac{1}{\log_4 k} + \frac{1}{\log_9 k} - \frac{1}{\log_{36} k} \\ &= \log_k 4 + \log_k 9 - \log_k 36 \\ &= \log_k \frac{4 \times 9}{36} \\ &= \log_k 1 = 0 \end{aligned}$$

31 ㉔ ③

$\log_3 a + \log_9 b^2 = 3$ 에서 $\log_3 a + \log_3 b^2 = 3$

$\log_3 a + \log_3 b = 3, \log_3 ab = 3$

$$\therefore ab = 3^3$$

$$\begin{aligned} \therefore (\sqrt[3]{3})^{\log_3 a} \times 3^{\log_3 b} &= a^{\log_3 \sqrt[3]{3}} \times b^{\log_3 3} \\ &= a^{\frac{1}{3} \log_3 3} \times b^{\frac{1}{3} \log_3 3} \\ &= a^{\frac{1}{3}} \times b^{\frac{1}{3}} = (ab)^{\frac{1}{3}} \\ &= (3^3)^{\frac{1}{3}} = 3 \end{aligned}$$

31-1 ㉔ ③

$\log_5 x + \log_{25} y^2 = 5$ 에서 $\log_5 x + \log_5 y^2 = 5$

$\log_5 x + \log_5 y = 5, \log_5 xy = 5$

$$\therefore xy = 5^5$$

$$\begin{aligned} \therefore 25^{\log_5 x} \times 5^{\log_5 y} &= x^{\log_5 25} \times y^{\log_5 5} = x^{2 \log_5 5} \times y^{2 \log_5 5} \\ &= x^2 y^2 = (xy)^2 = (5^5)^2 = 5^{10} \end{aligned}$$

즉 $5^k = 5^{10}$ 이므로 $k = 10$

32 ㉔ 4

$$\frac{\log_2 9}{x} = \log_2 15 \text{에서 } x = \frac{\log_2 9}{\log_2 15} = \log_{15} 9$$

$$\frac{\log_2 25}{y} = \log_2 15 \text{에서 } y = \frac{\log_2 25}{\log_2 15} = \log_{15} 25$$

$$\frac{\log_2 225}{z} = \log_2 15 \text{에서 } z = \frac{\log_2 225}{\log_2 15} = \log_{15} 225$$

$$\begin{aligned} \therefore x + y + z &= \log_{15} 9 + \log_{15} 25 + \log_{15} 225 \\ &= \log_{15} (9 \times 25 \times 225) \\ &= \log_{15} (3^2 \times 5^2 \times 15^2) \\ &= \log_{15} 15^4 = 4 \end{aligned}$$

32-1 ㉔ 4

$$\frac{\log_{10} 4}{a} = \log_{10} 6 \text{에서 } a = \frac{\log_{10} 4}{\log_{10} 6} = \log_6 4$$

$$\frac{\log_{10} 9}{b} = \log_{10} 6 \text{에서 } b = \frac{\log_{10} 9}{\log_{10} 6} = \log_6 9$$

$$\frac{\log_{10} 36}{c} = \log_{10} 6 \text{에서 } c = \frac{\log_{10} 36}{\log_{10} 6} = \log_6 36$$

$$\begin{aligned} \therefore a + b + c &= \log_6 4 + \log_6 9 + \log_6 36 \\ &= \log_6 (4 \times 9 \times 36) \\ &= \log_6 (2^2 \times 3^2 \times 6^2) \\ &= \log_6 6^4 = 4 \end{aligned}$$

33 ㉔ 7

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_3 \alpha + \log_3 \beta = 3, \log_3 \alpha \times \log_3 \beta = 1$$

$$\begin{aligned}\therefore \log_a \beta + \log_\beta a &= \frac{\log_3 \beta}{\log_3 a} + \frac{\log_3 a}{\log_3 \beta} \\ &= \frac{(\log_3 a)^2 + (\log_3 \beta)^2}{\log_3 a \times \log_3 \beta} \\ &= \frac{(\log_3 a + \log_3 \beta)^2 - 2 \log_3 a \times \log_3 \beta}{\log_3 a \times \log_3 \beta} \\ &= \frac{3^2 - 2 \times 1}{1} = 7\end{aligned}$$

33-1 ㉮ $\frac{17}{4}$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_3 a + \log_3 \beta = 4, \log_3 a \times \log_3 \beta = 1$$

$$\begin{aligned}\therefore \log_a 3 + \log_\beta 3 + \log_{a\beta} 3 &= \frac{1}{\log_3 a} + \frac{1}{\log_3 \beta} + \frac{1}{\log_3 a\beta} \\ &= \frac{\log_3 a + \log_3 \beta}{\log_3 a \times \log_3 \beta} + \frac{1}{\log_3 a + \log_3 \beta} \\ &= 4 + \frac{1}{4} = \frac{17}{4}\end{aligned}$$

34 ㉮ 2

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 5, \alpha\beta = 3$$

$$\begin{aligned}\therefore \log_3 (\alpha + 1) + \log_3 (\beta + 1) &= \log_3 (\alpha + 1)(\beta + 1) \\ &= \log_3 (\alpha\beta + \alpha + \beta + 1) \\ &= \log_3 (3 + 5 + 1) \\ &= \log_3 9 \\ &= 2\end{aligned}$$

채점 기준	비율
① $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
② $\log_3 (\alpha + 1) + \log_3 (\beta + 1)$ 의 값을 구할 수 있다.	60%

34-1 ㉮ ②

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = 2$$

$$\begin{aligned}\therefore \log_4 \left(\alpha - \frac{1}{\beta} \right) + \log_4 \left(\beta - \frac{1}{\alpha} \right) &= \log_4 \left(\alpha - \frac{1}{\beta} \right) \left(\beta - \frac{1}{\alpha} \right) \\ &= \log_4 \left(\alpha\beta - 2 + \frac{1}{\alpha\beta} \right) \\ &= \log_4 \left(2 - 2 + \frac{1}{2} \right) \\ &= \log_4 \frac{1}{2} \\ &= \log_{2^2} 2^{-1} \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

35 ㉮ ①

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$2 + \log_3 2 = -\frac{a}{2}, 2 \times \log_3 2 = \frac{b}{2} \text{ 이므로}$$

$$a = -(4 + 2 \log_3 2) = -(\log_3 81 + \log_3 4) = -\log_3 324$$

$$b = 4 \log_3 2 = \log_3 16$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{a}{b} &= \frac{-\log_3 324}{\log_3 16} = -\log_{16} 324 \\ &= -\log_{4^2} 18^2 = -\log_4 18\end{aligned}$$

35-1 ㉮ $\log_9 12$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$2 + \log_2 3 = a, 2 \times \log_2 3 = b \text{ 이므로} \dots\dots ①$$

$$a = \log_2 2^2 + \log_2 3 = \log_2 12$$

$$b = 2 \log_2 3 = \log_2 9 \dots\dots ②$$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{\log_2 12}{\log_2 9} = \log_9 12 \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용할 수 있다.	30%
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $\frac{a}{b}$ 의 값을 구할 수 있다.	30%

36 ㉮ ⑤

$$A = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{27} = \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3} \right)^3 = 3$$

$$B = 5 \log_9 3 = 5 \log_{3^2} 3 = \frac{5}{2}$$

$$C = 4^{\log_4 3} = 4^{\log_{2^2} 3} = 4^{\frac{1}{2}} = 2$$

$$\therefore C < B < A$$

36-1 ㉮ ①

$$A = \log_{\frac{1}{2}} 4 = \log_{2^{-1}} 2^2 = -2$$

$$B = 6 \log_4 2 = 6 \log_{2^2} 2 = 3$$

$$C = 16^{\log_2 2} = 2^{\log_2 16} = 2^{\log_2 4^2} = 2^2 = 4$$

$$\therefore A < B < C$$

37 ㉮ ⑤

$$a^6 = b^4 \text{에서 } b = a^{\frac{3}{2}} \text{ 이므로}$$

$$① \log_a b = \log_a a^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \quad ② \log_b a = \frac{1}{\log_a b} = \frac{2}{3}$$

$$⑤ \log_a b^2 = 2 \log_a b = 3$$

$$a^6 = c^3 \text{에서 } c = a^2 \text{ 이므로}$$

$$③ \log_a c = \log_a a^2 = 2 \quad ④ \log_c a = \frac{1}{\log_a c} = \frac{1}{2}$$

따라서 가장 큰 수는 ⑤이다.

37-1 ㉮ ㉮

$$a^4 = b^3 \text{에서 } b = a^{\frac{4}{3}} \text{ 이므로}$$

$$\neg, \log_a b = \log_a a^{\frac{4}{3}} = \frac{4}{3} \quad \neg, \log_b a = \frac{1}{\log_a b} = \frac{3}{4}$$

$$a^4 = c^6 \text{에서 } c = a^{\frac{2}{3}} \text{ 이므로}$$

$$\sqsubset, \log_a c = \log_a a^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \quad \sqsubset, \log_c a = \frac{1}{\log_a c} = \frac{3}{2}$$

$$b^3 = c^6 \text{에서 } c = b^{\frac{1}{2}} \text{ 이므로}$$

$$\sqsupset, \log_b c = \log_b b^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

따라서 가장 작은 수는 ㉮이다.

38 ㉮ ③

$$A = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2} + \log_3 \frac{81}{2} = \log_3 2 + \log_3 \frac{81}{2} = \log_3 81 = 4$$

$$\begin{aligned}
B &= \log_4 \{ \log_{\sqrt{8}} (\log_{\sqrt{2}} 16) \} = \log_4 \{ \log_{\sqrt{8}} (\log_{2^{\frac{1}{2}}} 2^4) \} \\
&= \log_4 (\log_{\sqrt{8}} 8) = \log_4 (\log_{8^{\frac{1}{2}}} 8) \\
&= \log_4 2 = \log_{2^2} 2 = \frac{1}{2} \\
C &= 16^{\log_4 \sqrt{3}} + 27^{\log_4 2} = (\sqrt{3})^{\log_4 16} + 2^{\log_4 27} \\
&= (\sqrt{3})^2 + 2^{\frac{3}{2}} = 3 + 2\sqrt{2} \\
\therefore B < A < C
\end{aligned}$$

38-1 ㉠ $C < A < B$

$$\begin{aligned}
A &= 4^{1-\log_4 2} = 4^{1-\frac{1}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} = 2 \\
B &= \log_3 6 \times \log_6 27 = \log_3 6 \times \frac{\log_3 27}{\log_3 6} = \log_3 27 = 3 \\
C &= \log_9 3 + \log_{16} 4 = \log_{3^2} 3 + \log_{4^2} 4 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \\
\therefore C < A < B
\end{aligned}$$

39 ㉠ $\frac{25}{4}$

$$\begin{aligned}
\log_2 32 < \log_2 40 < \log_2 64 \text{ 이므로 } 5 < \log_2 40 < 6 \\
\therefore a &= 5 \\
b &= \log_2 40 - 5 = \log_2 40 - \log_2 32 = \log_2 \frac{5}{4} \\
\therefore a + 2^b &= 5 + 2^{\log_2 \frac{5}{4}} = 5 + \frac{5}{4} = \frac{25}{4}
\end{aligned}$$

39-1 ㉠ $\frac{1}{3}$

$$\begin{aligned}
\log_3 9 < \log_3 15 < \log_3 27 \text{ 이므로 } 2 < \log_3 15 < 3 \\
\therefore a &= 2 \\
b &= \log_3 15 - 2 = \log_3 15 - \log_3 9 = \log_3 \frac{5}{3} \\
\therefore a - 3^b &= 2 - 3^{\log_3 \frac{5}{3}} = 2 - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

40 ㉠ $\frac{4}{9}$

$$\begin{aligned}
\log_3 3 < \log_3 4 < \log_3 9 \text{ 이므로 } 1 < \log_3 4 < 2 \\
\therefore x &= 1 \\
y &= \log_3 4 - 1 = \log_3 4 - \log_3 3 = \log_3 \frac{4}{3} \\
\therefore \frac{3^{-x} + 3^y}{3^x + 3^{-y}} &= \frac{3^{-1} + 3^{\log_3 \frac{4}{3}}}{3^1 + 3^{-\log_3 \frac{4}{3}}} = \frac{\frac{1}{3} + 3^{\log_3 \frac{4}{3}}}{3 + 3^{\log_3 \frac{3}{4}}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{4}{3}}{3 + \frac{3}{4}} \\
&= \frac{\frac{5}{3}}{\frac{15}{4}} = \frac{4}{9}
\end{aligned}$$

채점 기준	비율
① x 의 값을 구할 수 있다.	30%
② y 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ $\frac{3^{-x} + 3^y}{3^x + 3^{-y}}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

40-1 ㉠ 9

$$\begin{aligned}
\log_5 5 < \log_5 20 < \log_5 25 \text{ 이므로 } 1 < \log_5 20 < 2 \\
\therefore x &= 1 \\
y &= \log_5 20 - 1 = \log_5 20 - \log_5 5 = \log_5 4 \\
\therefore 5^x + 5^y &= 5^1 + 5^{\log_5 4} = 5 + 4 = 9
\end{aligned}$$

41 ㉠ ②

$$\begin{aligned}
\log_4 16 < \log_4 32 < \log_4 64 \text{ 이므로 } 2 < \log_4 32 < 3 \\
\therefore \alpha &= 2 \\
\beta &= \log_4 32 - 2 = \log_4 32 - \log_4 16 = \log_4 2 = \log_{2^2} 2 = \frac{1}{2} \\
\text{이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여} \\
\alpha\beta &= 2 \times \frac{1}{2} = \frac{k}{2} \quad \therefore k = 2
\end{aligned}$$

다른 풀이

$$\begin{aligned}
\log_4 32 &= \log_{2^2} 2^5 = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ 이므로 } \alpha = 2, \beta = 0.5 \\
\text{이때 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여} \\
\frac{k}{2} &= \alpha\beta = 2 \times 0.5 = 1 \quad \therefore k = 2
\end{aligned}$$

41-1 ㉠ -6

$$\begin{aligned}
\text{이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여} \\
n + a &= -\frac{5}{4}, na = \frac{k}{4} \\
\text{이때 } n + a &= -2 + \frac{3}{4} \text{ 이므로 } n = -2, a = \frac{3}{4} \\
\therefore \frac{k}{4} &= na = -2 \times \frac{3}{4} = -\frac{3}{2} \text{ 이므로 } k = -6
\end{aligned}$$

42 ㉠ 1.2552

$$\begin{aligned}
\log 50 &= \log \frac{100}{2} = \log 100 - \log 2 = 2 - \log 2 \\
&= 2 - 0.3010 = 1.699 \\
\log 0.36 &= \log \frac{36}{100} = \log 36 - \log 100 \\
&= \log (2^2 \times 3^2) - \log 100 \\
&= 2 \log 2 + 2 \log 3 - 2 \\
&= 2 \times 0.3010 + 2 \times 0.4771 - 2 \\
&= -0.4438 \\
\therefore \log 50 + \log 0.36 &= 1.699 + (-0.4438) = 1.2552
\end{aligned}$$

42-1 ㉠ ②

$$\begin{aligned}
\log 314 + \log 0.314 &= \log (3.14 \times 100) + \log \left(3.14 \times \frac{1}{10} \right) \\
&= \log 3.14 + \log 100 + \log 3.14 + \log \frac{1}{10} \\
&= 0.4969 + 2 + 0.4969 - 1 \\
&= 1.9938
\end{aligned}$$

43 ㉠ 2.86

$$\begin{aligned}
\log \sqrt[3]{x^2} - \log \frac{1}{x^3} &= \log x^{\frac{2}{3}} - \log x^{-3} \\
&= \frac{2}{3} \log x - (-3 \log x) \\
&= \frac{11}{3} \log x = \frac{11}{3} \times 0.78 \\
&= 2.86
\end{aligned}$$

43-1 ㉠ ⑤

$$\begin{aligned}
\log x^3 + \log \sqrt{x} &= 3 \log x + \frac{1}{2} \log x = \frac{7}{2} \log x \\
&= \frac{7}{2} \times 1.3412 = 4.6942
\end{aligned}$$

44 ㉮ 3.2939

$$\begin{aligned}
 10^{0.7419} &= 5.52 \text{의 양변에 상용로그를 취하면} \\
 \log 5.52 &= 0.7419 \\
 \log x &= -0.2581 = -1 + 0.7419 \\
 &= -1 + \log 5.52 = \log 10^{-1} + \log 5.52 \\
 &= \log (5.52 \times 10^{-1}) = \log 0.552 \\
 \therefore x &= 0.552 \\
 y &= \log 552 = \log (5.52 \times 10^2) \\
 &= \log 5.52 + \log 10^2 = 2 + 0.7419 \\
 &= 2.7419 \\
 \therefore x + y &= 0.552 + 2.7419 = 3.2939
 \end{aligned}$$

44-1 ㉮ ⑤

(가)에서

$$\begin{aligned}
 a &= \log 3560 = \log (3.56 \times 10^3) = \log 3.56 + \log 10^3 \\
 &= 3 + 0.5514 = 3.5514
 \end{aligned}$$

(나)에서

$$\begin{aligned}
 \log b &= -1.4486 = -2 + 0.5514 = -2 + \log 3.56 \\
 &= \log 10^{-2} + \log 3.56 = \log (3.56 \times 10^{-2}) \\
 &= \log 0.0356
 \end{aligned}$$

이므로 $b = 0.0356$

$$\therefore a + b = 3.5514 + 0.0356 = 3.587$$

45 ㉮ ②

$$\begin{aligned}
 \log x^2 + \log \sqrt[3]{x} &= 2 \log x + \frac{1}{3} \log x \\
 &= \frac{7}{3} \log x = \frac{7}{3} \times (-2.7) \\
 &= -6.3 = -7 + 0.7
 \end{aligned}$$

따라서 $\log x^2 + \log \sqrt[3]{x}$ 의 정수 부분은 -7 , 소수 부분은 0.7 이다.

45-1 ㉮ -9

$$\log \sqrt{x} = \frac{1}{2} \log x = -\frac{4}{3} \text{이므로}$$

$$\log x = 2 \times \left(-\frac{4}{3}\right) = -\frac{8}{3} = -3 + \frac{1}{3}$$

$$\text{즉 } n = -3, \alpha = \frac{1}{3} \text{이므로}$$

$$\frac{n}{\alpha} = n \div \alpha = -3 \div \frac{1}{3} = -3 \times 3 = -9$$

46 ㉮ 18

$\log A$ 의 정수 부분을 n , 소수 부분을 α 라 하면

$$\log A = n + \alpha \quad (n \text{은 정수}, 0 \leq \alpha < 1)$$

이때 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$n + \alpha = \frac{27}{4} = 6 + \frac{3}{4}$$

$$\therefore n = 6, \alpha = \frac{3}{4}$$

또 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$n\alpha = \frac{p}{4} \quad \therefore p = 4n\alpha = 4 \times 6 \times \frac{3}{4} = 18$$

46-1 ㉮ ②

$\log 300 = \log (3 \times 10^2) = 2 + \log 3$ 이므로 $\log 300$ 의 정수 부분은 2 , 소수 부분은 $\log 3$ 이다.

즉 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 $2, \log 3$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$2 + \log 3 = -a, \quad 2 \log 3 = b$$

$$\begin{aligned}
 \therefore a + b &= (-2 - \log 3) + 2 \log 3 = -2 + \log 3 \\
 &= \log 10^{-2} + \log 3 = \log (3 \times 10^{-2}) \\
 &= \log 0.03
 \end{aligned}$$

47 ㉮ $\sqrt{10}$

$\log x$ 와 $\log \frac{1}{x}$ 의 소수 부분이 같으므로

$$\log x - \log \frac{1}{x} = \log x - (-\log x) = 2 \log x = (\text{정수}) \quad \dots\dots ①$$

$$1 < x < 10 \text{이므로 } 0 < \log x < 1$$

$$\therefore 0 < 2 \log x < 2 \quad \dots\dots ②$$

이때 $2 \log x$ 는 정수이므로 $2 \log x = 1$

$$\log x = \frac{1}{2} \quad \therefore x = 10^{\frac{1}{2}} = \sqrt{10} \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① $\log x - \log \frac{1}{x}$ 이 정수임을 알 수 있다.	40%
② $2 \log x$ 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
③ x 의 값을 구할 수 있다.	20%

47-1 ㉮ ④

$\log x$ 의 소수 부분과 $\log \sqrt[3]{x}$ 의 소수 부분이 같으려면

$$\log x - \log \sqrt[3]{x} = \log x - \frac{1}{3} \log x = \frac{2}{3} \log x = (\text{정수})$$

$\log x$ 의 정수 부분이 4 이므로

$$4 \leq \log x < 5 \quad \therefore \frac{8}{3} \leq \frac{2}{3} \log x < \frac{10}{3}$$

$$\text{이때 } \frac{2}{3} \log x \text{는 정수이므로 } \frac{2}{3} \log x = 3$$

$$\log x = \frac{9}{2} \quad \therefore x = 10^{\frac{9}{2}}$$

유형

완성하기

p.51

48 ㉮ ④

규모가 7.5 인 지진과 규모가 5.5 인 지진의 에너지를 각각 E_1, E_2 라 하면

$$\log E_1 = 1.5 \times 7.5 + 11.4 = 22.65$$

$$\log E_2 = 1.5 \times 5.5 + 11.4 = 19.65$$

$$\therefore \log \frac{E_1}{E_2} = \log E_1 - \log E_2 = 22.65 - 19.65 = 3$$

따라서 $\frac{E_1}{E_2} = 10^3 = 1000$ 이므로 규모가 7.5 인 지진의 에너지는 규모가 5.5 인 지진의 에너지의 1000 배이다.

49 ㉮ 100배

등급이 1 인 별의 밝기를 I_1 , 등급이 6 인 별의 밝기를 I_2 라 하면

$$1 = -\frac{5}{2} \log I_1 + C \text{이므로 } C = 1 + \frac{5}{2} \log I_1$$

$$6 = -\frac{5}{2} \log I_2 + C \text{이므로 } C = 6 + \frac{5}{2} \log I_2$$

$$\approx 1 + \frac{5}{2} \log I_1 = 6 + \frac{5}{2} \log I_2 \text{이므로}$$

$$\frac{5}{2}(\log I_1 - \log I_2) = 5, \log \frac{I_1}{I_2} = 2$$

$$\therefore \frac{I_1}{I_2} = 10^2 = 100$$

따라서 별의 등급이 1인 별의 밝기는 별의 등급이 6인 별의 밝기의 100배이다.

50 ㉡ 10배

감각 강도가 2일 때의 광원으로부터의 거리를 d_1 m, 감각 강도가 4일 때의 광원으로부터의 거리를 d_2 m라 하면

$$2 = \log \frac{h}{d_1^2} \text{이므로 } \log h - 2 \log d_1 = 2$$

$$\therefore \log d_1 = \frac{1}{2} \log h - 1 \quad \dots\dots ㉠$$

$$4 = \log \frac{h}{d_2^2} \text{이므로 } \log h - 2 \log d_2 = 4$$

$$\therefore \log d_2 = \frac{1}{2} \log h - 2 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡에서

$$\log \frac{d_1}{d_2} = \log d_1 - \log d_2 = \frac{1}{2} \log h - 1 - \left(\frac{1}{2} \log h - 2 \right) = 1$$

$$\therefore \frac{d_1}{d_2} = 10$$

따라서 감각 강도가 2일 때의 광원으로부터의 거리는 감각 강도가 4일 때의 광원으로부터의 거리의 10배이다.

51 ㉡ 53%

4년 전 수출액을 A 라 하고, 수출액의 증가율을 $r\%$ 라 하면

$$A \left(1 + \frac{r}{100} \right)^4 = 5.5A \quad \therefore \left(1 + \frac{r}{100} \right)^4 = 5.5$$

양변에 상용로그를 취하면

$$4 \log \left(1 + \frac{r}{100} \right) = \log 5.5$$

$$\therefore \log \left(1 + \frac{r}{100} \right) = \frac{1}{4} \log 5.5 = \frac{1}{4} \times 0.74 = 0.185$$

$$\text{이때 } \log 1.53 = 0.185 \text{이므로 } 1 + \frac{r}{100} = 1.53$$

$$\frac{r}{100} = 0.53 \quad \therefore r = 53$$

따라서 4년 동안 수출액은 매년 53%씩 증가했다.

52 ㉡ 37.5

처음 빛의 밝기를 A 라 하자.

$$\text{유리판 1장을 통과했을 때의 빛의 밝기는 } A \left(1 - \frac{x}{100} \right)$$

$$\text{유리판 2장을 통과했을 때의 빛의 밝기는 } A \left(1 - \frac{x}{100} \right)^2$$

⋮

$$\text{유리판 7장을 통과했을 때의 빛의 밝기는 } A \left(1 - \frac{x}{100} \right)^7$$

유리판 7장을 통과했을 때, 빛의 밝기는 처음 빛의 밝기의 4%로

$$\text{줄어들므로 } A \left(1 - \frac{x}{100} \right)^7 = \frac{4}{100} A \quad \dots\dots ㉠$$

$$\therefore \left(1 - \frac{x}{100} \right)^7 = \frac{4}{100}$$

양변에 상용로그를 취하면

$$7 \log \left(1 - \frac{x}{100} \right) = \log 4 - 2$$

$$7 \log \left(1 - \frac{x}{100} \right) = 2 \log 2 - 2 = 2 \times 0.3 - 2 = -1.4$$

$$-\log \left(1 - \frac{x}{100} \right) = 0.2, \log \left(1 - \frac{x}{100} \right)^{-1} = 0.2$$

$$\therefore \log \frac{100}{100-x} = 0.2 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{이때 } \log 1.6 = 0.2 \text{이므로 } \frac{100}{100-x} = 1.6$$

$$160 - 1.6x = 100 \quad \therefore x = \frac{60}{1.6} = 37.5 \quad \dots\dots ㉢$$

채점 기준	비율
① 빛이 유리판 7장을 통과했을 때의 관계식을 세울 수 있다.	30%
② $\log \frac{100}{100-x}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ x 의 값을 구할 수 있다.	30%

53 ㉡ 5

현재 국민 총 생산량을 A 라 하면 10년 후의 국민 총 생산량은 현재의 $\sqrt[3]{k^4}$ 배이므로

$$A(1+0.03)^{10} = \sqrt[3]{k^4} A \quad \therefore 1.03^{10} = \sqrt[3]{k^4}$$

양변에 상용로그를 취하면

$$10 \log 1.03 = \frac{4}{3} \log k, 10 \log (10.3 \times 10^{-1}) = \frac{4}{3} \log k$$

$$10(\log 10.3 - 1) = \frac{4}{3} \log k, 10(1.0128 - 1) = \frac{4}{3} \log k$$

$$0.128 = \frac{4}{3} \log k \quad \therefore \log k = 0.096$$

$$\text{이때 } \log 1.25 = 0.096 \text{이므로 } k = 1.25$$

$$\therefore 4k = 4 \times 1.25 = 5$$

학교 시험 대비 문제

p.52~55

01 ㉡ ①

$$\log_a 32 = 5 \text{에서 } a^5 = 32 = 2^5 \text{이므로 } a = 2$$

$$\log_3 \{ \log_2 (\log_5 b) \} = 0 \text{에서 } \log_2 (\log_5 b) = 1$$

$$\log_5 b = 2 \quad \therefore b = 5^2 = 25$$

$$\therefore ab = 2 \times 25 = 50$$

02 ㉡ ③

$$\text{밑의 조건에서 } x-1 > 0, x-1 \neq 1$$

$$x > 1, x \neq 2 \quad \therefore 1 < x < 2 \text{ 또는 } x > 2 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\text{진수의 조건에서 } -x^2 + 5x - 4 > 0$$

$$x^2 - 5x + 4 < 0, (x-1)(x-4) < 0$$

$$\therefore 1 < x < 4 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$$1 < x < 2 \text{ 또는 } 2 < x < 4$$

따라서 정수 x 의 값은 3이다.

03 ㉡ ②

$$\text{밑의 조건에서 } |x-2| > 0, |x-2| \neq 1$$

$$\therefore x \neq 1, x \neq 2, x \neq 3 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\text{진수의 조건에서 } -x^2 + 2x + 8 > 0$$

$$x^2 - 2x - 8 < 0, (x+2)(x-4) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 4 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$$-2 < x < 1 \text{ 또는 } 1 < x < 2 \text{ 또는 } 2 < x < 3 \text{ 또는 } 3 < x < 4$$

따라서 정수 x 의 값은 $-1, 0$ 이므로 그 개수는 2이다.

04 ㉡ -4

$$\begin{aligned} \log_2 6 - \log_2 12 + \log_{\frac{1}{3}} 27 &= \log_2 \frac{1}{2} + \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} \\ &= \log_2 2^{-1} - 3 \\ &= -1 - 3 = -4 \end{aligned}$$

05 ㉡ ①

$$\begin{aligned} \log_3 9 + \log_5 125 - \log_2 25 \times \log_5 \sqrt{8} \\ &= \log_3 3^2 + \log_5 5^3 - \log_2 5^2 \times \log_5 2^{\frac{3}{2}} \\ &= 2 + 3 - 2 \log_2 5 \times \frac{3}{2} \log_5 2 \\ &= 5 - 3 \times \log_2 5 \times \frac{1}{\log_2 5} \\ &= 5 - 3 = 2 \end{aligned}$$

06 ㉡ 4

$$\begin{aligned} \log_k (\log_3 4) + \log_k (\log_4 5) + \log_k (\log_5 6) \\ + \dots + \log_k (\log_{80} 81) \\ &= \log_k (\log_3 4 \times \log_4 5 \times \log_5 6 \times \dots \times \log_{80} 81) \\ &= \log_k \left(\log_3 4 \times \frac{\log_3 5}{\log_3 4} \times \frac{\log_3 6}{\log_3 5} \times \dots \times \frac{\log_3 81}{\log_3 80} \right) \\ &= \log_k (\log_3 81) \\ &= \log_k (\log_3 3^4) \\ &= \log_k 4 \\ \text{즉 } \log_k 4 &= 1 \text{ 이므로 } k = 4 \end{aligned}$$

07 ㉡ ⑤

$$\begin{aligned} (\log_2 3 + \log_4 27)(\log_3 8 - \log_3 32) \\ &= (\log_2 3 + \log_2 3^3)(\log_3 2^3 - \log_3 2^5) \\ &= \left(\log_2 3 + \frac{3}{2} \log_2 3\right) \left(3 \log_3 2 - \frac{5}{2} \log_3 2\right) \\ &= \frac{5}{2} \log_2 3 \times \frac{1}{2} \log_3 2 \\ &= \frac{5}{2} \times \frac{1}{2} \times \log_2 3 \times \frac{1}{\log_2 3} \\ &= \frac{5}{4} \end{aligned}$$

08 ㉡ 64

$$\begin{aligned} \log_3 5 - 2 \log_{\frac{1}{3}} 4 - \log_3 10 &= \log_3 5 - \log_{3^{-1}} 4^2 - \log_3 10 \\ &= \log_3 5 + \log_3 16 - \log_3 10 \\ &= \log_3 \frac{5 \times 16}{10} \\ &= \log_3 8 \\ \therefore (\text{주어진 식}) &= 9^{\log_3 8} = 8^{\log_3 9} = 8^{\log_3 3^2} = 8^2 = 64 \end{aligned}$$

09 ㉡ ③

$$\begin{aligned} \log_a M = m, \log_a N = n \text{ 이라 하면 로그의 정의에 의하여} \\ a^m = \boxed{(\text{㉠}) M}, a^n = N \text{ 이므로} \\ a^{m+n} = a^m \times a^n = \boxed{(\text{㉡}) MN} \end{aligned}$$

따라서 로그의 정의에 의하여

$$\begin{aligned} \log_a \boxed{(\text{㉠}) MN} &= \boxed{(\text{㉡}) m+n} \\ \therefore \log_a MN &= \log_a M + \log_a N \end{aligned}$$

10 ㉡ $\frac{2+ab}{a+ab}$

$$\begin{aligned} \log_2 3 = a \text{ 에서 } \log_3 2 &= \frac{1}{a} \text{ 이고, } \log_3 5 = b \text{ 이므로} \\ \log_{15} 20 &= \frac{\log_3 20}{\log_3 15} = \frac{\log_3 (2^2 \times 5)}{\log_3 (3 \times 5)} = \frac{2 \log_3 2 + \log_3 5}{1 + \log_3 5} \\ &= \frac{\frac{2}{a} + b}{1 + b} = \frac{2 + ab}{a + ab} \end{aligned}$$

11 ㉡ ④

$$\begin{aligned} \log_7 4 = b \text{ 이므로 } \log_4 7 &= \frac{1}{b} \\ \log_{11} 7 &= \frac{\log_4 7}{\log_4 11} \text{ 이므로} \\ \log_4 11 &= \frac{\log_4 7}{\log_{11} 7} = \frac{\frac{1}{b}}{c} = \frac{1}{bc} \\ \therefore \log_{12} 231 &= \frac{\log_4 231}{\log_4 12} = \frac{\log_4 (3 \times 7 \times 11)}{\log_4 (3 \times 4)} \\ &= \frac{\log_4 3 + \log_4 7 + \log_4 11}{\log_4 3 + 1} \\ &= \frac{a + \frac{1}{b} + \frac{1}{bc}}{a + 1} \\ &= \frac{abc + c + 1}{abc + bc} \end{aligned}$$

12 ㉡ ②

$$\begin{aligned} 2^a = 3 \text{ 에서 } \log_2 3 &= a \\ 3^b = 5 \text{ 에서 } \log_3 5 &= b \\ \therefore \log_{24} 30 &= \frac{\log_2 30}{\log_2 24} = \frac{\log_2 (2 \times 3 \times 5)}{\log_2 (2^3 \times 3)} \\ &= \frac{1 + \log_2 3 + \log_2 5}{3 + \log_2 3} \\ &= \frac{1 + \log_2 3 + \frac{\log_3 5}{\log_3 2}}{3 + \log_2 3} \\ &= \frac{1 + \log_2 3 + \log_3 5 \times \log_2 3}{3 + \log_2 3} \\ &= \frac{ab + a + 1}{a + 3} \end{aligned}$$

13 ㉡ ②

$$\begin{aligned} a^2 b^3 = 1 \text{ 의 양변에 밑이 } a \text{ 인 로그를 취하면} \\ \log_a a^2 b^3 &= \log_a 1, \log_a a^2 + \log_a b^3 = 0 \\ 2 + 3 \log_a b &= 0 \quad \therefore \log_a b = -\frac{2}{3} \\ \therefore \log_a a^3 b^6 &= \log_a a^3 + \log_a b^6 = 3 + 6 \log_a b \\ &= 3 + 6 \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -1 \end{aligned}$$

14 ㉡ 0

$$\begin{aligned} 25^x = 4^y = 10^z = k \text{ 라 하면} \\ x = \log_{25} k, y = \log_4 k, z = \log_{10} k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z} &= \frac{1}{\log_{25} k} + \frac{1}{\log_4 k} - \frac{2}{\log_{10} k} \\ &= \log_k 25 + \log_k 4 - 2 \log_k 10 \\ &= \log_k 25 + \log_k 4 - \log_k 10^2 \\ &= \log_k \frac{25 \times 4}{10^2} \\ &= \log_k 1 = 0\end{aligned}$$

15 ㉡ 2

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = \frac{3}{2}$$

이때 $a = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 3^2 - 2 \times \frac{3}{2} = 6$ 이므로

$$\begin{aligned}\log_a 8(\alpha^2\beta + \alpha\beta^2) &= \log_6 8\alpha\beta(\alpha + \beta) \\ &= \log_6 \left(8 \times \frac{3}{2} \times 3 \right) \\ &= \log_6 36 = 2\end{aligned}$$

16 ㉢ ③

$$A = 3^{\log_9 4} = 4^{\log_9 3} = 4^{\frac{1}{2}} = 2$$

$$B = 3^{\log_3 8 - 2} = 3^{\log_3 8} \div 3^2 = 8^{\log_3 3} \div 9 = \frac{8}{9}$$

$$C = \log_9 27 + \log_{\frac{1}{9}} 3 = \log_{3^2} 3^3 + \log_{3^{-2}} 3 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$$

$$\therefore B < C < A$$

17 ㉡ ②

$$\log_3 3^2 < \log_3 20 < \log_3 3^3 \text{이므로 } 2 < \log_3 20 < 3$$

$$\therefore n = 2$$

$$\alpha = \log_3 20 - 2 = \log_3 20 - \log_3 9 = \log_3 \frac{20}{9}$$

$$\therefore 9(2^n + 3^\alpha) = 9(2^2 + 3^{\log_3 \frac{20}{9}}) = 9\left(4 + \frac{20}{9}\right) = 56$$

18 ㉡ ①

$A = 0.393^3$ 이라 하고 양변에 상용로그를 취하면

$$\begin{aligned}\log A &= \log 0.393^3 = 3 \log 0.393 \\ &= 3 \log (3.93 \times 10^{-1}) = 3(\log 3.93 + \log 10^{-1}) \\ &= 3(\log 3.93 - 1) = 3(0.5944 - 1) \\ &= -1.2168 = -2 + 0.7832\end{aligned}$$

이때 $\log 6.07 = 0.7832$ 이므로

$$\begin{aligned}\log A &= -2 + \log 6.07 = \log (6.07 \times 10^{-2}) \\ &= \log 0.0607\end{aligned}$$

$$\text{즉 } A = 0.0607 \text{이므로 } 0.393^3 = 0.0607$$

19 ㉡ $10\sqrt{10}$

$\log x$ 와 $\log \sqrt[3]{x}$ 의 소수 부분이 서로 같으므로

$$\log x - \log \sqrt[3]{x} = \log x - \frac{1}{3} \log x = \frac{2}{3} \log x = (\text{정수})$$

$$1 < x < 100 \text{이므로 } 0 < \log x < 2$$

$$\therefore 0 < \frac{2}{3} \log x < \frac{4}{3}$$

$$\text{이때 } \frac{2}{3} \log x \text{는 정수이므로 } \frac{2}{3} \log x = 1$$

$$\log x = \frac{3}{2} \quad \therefore x = 10^{\frac{3}{2}} = 10\sqrt{10}$$

20 ㉡ 1000배

진도가 8인 지진의 강도를 I_A , 진도가 5인 지진의 강도를 I_B 라 하면

$$8 = \log \frac{I_A}{k} \text{이므로 } 8 = \log I_A - \log k$$

$$\therefore \log I_A = 8 + \log k \quad \dots\dots ㉠$$

$$5 = \log \frac{I_B}{k} \text{이므로 } 5 = \log I_B - \log k$$

$$\therefore \log I_B = 5 + \log k \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡에서

$$\log \frac{I_A}{I_B} = \log I_A - \log I_B = 8 + \log k - (5 + \log k) = 3$$

$$\therefore \frac{I_A}{I_B} = 10^3 = 1000$$

따라서 진도가 8인 지진의 강도는 진도가 5인 지진의 강도의 1000배이다.

21 ㉡ 3%

30년 전 매출액을 A 라 하고, 매출액이 매년 $r\%$ 씩 증가했다고 하면

$$A\left(1 + \frac{r}{100}\right)^{30} = 2A \quad \therefore \left(1 + \frac{r}{100}\right)^{30} = 2$$

양변에 상용로그를 취하면

$$\log \left(1 + \frac{r}{100}\right)^{30} = \log 2$$

$$30 \log \left(1 + \frac{r}{100}\right) = 0.3$$

$$\therefore \log \left(1 + \frac{r}{100}\right) = 0.01$$

이때 $\log 1.03 = 0.01$ 이므로

$$\log \left(1 + \frac{r}{100}\right) = \log 1.03$$

$$1 + \frac{r}{100} = 1.03 \quad \therefore r = 3$$

따라서 이 기업의 매출액은 매년 3%씩 증가했다.

서술형 1 ㉡ 2

$$\begin{aligned}\log_a \left(1 + \frac{1}{4}\right) + \log_a \left(1 + \frac{1}{5}\right) + \log_a \left(1 + \frac{1}{6}\right) \\ + \dots + \log_a \left(1 + \frac{1}{63}\right)\end{aligned}$$

$$= \log_a \frac{5}{4} + \log_a \frac{6}{5} + \log_a \frac{7}{6} + \dots + \log_a \frac{64}{63}$$

$$= \log_a \left(\frac{5}{4} \times \frac{6}{5} \times \frac{7}{6} \times \dots \times \frac{64}{63}\right)$$

$$= \log_a \frac{64}{4}$$

$$= \log_a 16 \quad \dots\dots ①$$

$$\text{즉 } \log_a 16 = 4 \text{이므로 } a^4 = 16$$

$$\therefore a = 2 (\because a > 0) \quad \dots\dots ②$$

채점 기준	비율
① 주어진 등식의 좌변을 간단히 할 수 있다.	60%
② a 의 값을 구할 수 있다.	40%

서술형 2 ㉡ 30

$$\frac{2}{\log_n 2} = k \quad (k \text{는 자연수}) \text{라 하면 } 2 \log_2 n = k$$

$$\log_2 n = \frac{k}{2} \quad \therefore n = 2^{\frac{k}{2}}$$

이때 n 의 값은 $2 \leq n \leq 30$ 인 자연수이므로 $\frac{k}{2}$ 의 값도 자연수이다.

즉 k 의 값은 2의 배수이므로

$$k=2, 4, 6, 8 \quad (\because 2 \leq n \leq 30) \quad \dots\dots ①$$

$$k=2\text{일 때, } n=2^1=2$$

$$k=4\text{일 때, } n=2^2=4$$

$$k=6\text{일 때, } n=2^3=8$$

$$k=8\text{일 때, } n=2^4=16 \quad \dots\dots ②$$

따라서 모든 n 의 값의 합은

$$2+4+8+16=30 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① $\frac{2}{\log_n 2} = k$ 라 하고 k 의 값을 구할 수 있다.	40%
② n 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ 모든 n 의 값의 합을 구할 수 있다.	20%

참고 $n=2^{\frac{k}{2}}$ 이고 $2 \leq n \leq 30$ 이므로 $2 \leq 2^{\frac{k}{2}} \leq 30$

$$\text{이때 } 2^4=16, 2^5=32 \text{이므로 } 1 \leq \frac{k}{2} \leq 4$$

$$\therefore 2 \leq k \leq 8$$

서술형 3 ㉡ $\frac{m+n}{3n}$

$$a^m = b^n = 5 \text{에서 } \log_a 5 = m, \log_b 5 = n$$

$$\therefore \log_5 a = \frac{1}{m}, \log_5 b = \frac{1}{n} \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore \log_a ab = \frac{\log_5 ab}{\log_5 a^3} = \frac{\log_5 a + \log_5 b}{3 \log_5 a}$$

$$= \frac{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}{\frac{3}{m}} = \frac{m+n}{3n} \quad \dots\dots ②$$

채점 기준	비율
① $\log_5 a, \log_5 b$ 를 m, n 으로 나타낼 수 있다.	40%
② $\log_a ab$ 를 m, n 으로 나타낼 수 있다.	60%

1등급

10% 핵심 기출 문제

p. 56-57

01 ㉡ 30

$f(x) = -x^2 + ax + 4$ 라 하면 로그의 진수 조건에 의하여 $f(x) > 0$

$$f(x) = -x^2 + ax + 4$$

$$= -\left(x^2 - ax + \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{4}\right) + 4$$

$$= -\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{a^2}{4} + 4$$

$\log_2(-x^2 + ax + 4)$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 실수 x 의 개수가 6이므로 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 세 직선 $y=2, y=2^2, y=2^3$ 과 각각 2개의 점에서 만나고 직선 $y=2^n$ ($n \geq 4$)과는 만나지 않는다.


$$\text{즉 } 2^3 < \frac{a^2}{4} + 4 < 2^4 \text{이므로}$$

$$4 < \frac{a^2}{4} < 12 \quad \therefore 16 < a^2 < 48$$

이때 a 는 자연수이므로 $a=5, 6$

따라서 모든 자연수 a 의 값의 곱은

$$5 \times 6 = 30$$



02 ㉡ ⑤

$$\log_a \frac{a^3}{b^2} = \log_a a^3 - \log_a b^2 = 3 - 2 \log_a b = 2 \text{이므로}$$

$$2 \log_a b = 1 \quad \therefore \log_a b = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_a b + 3 \log_b a &= \log_a b + \frac{3}{\log_a b} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{3}{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} + 6 = \frac{13}{2} \end{aligned}$$

03 ㉡ ④

두 점 $P(\log_5 3), Q(\log_5 12)$ 에 대하여 $\overline{PQ}$ 를 $m : (1-m)$ 으로 내분하는 점을 C 라 하면

$$C\left(\frac{m \times \log_5 12 + (1-m) \times \log_5 3}{m + (1-m)}\right)$$

$$\therefore C(m \log_5 12 + (1-m) \log_5 3)$$

이때 $\overline{PQ}$ 를 내분하는 점 C 의 좌표가 1이므로

$$m \log_5 12 + (1-m) \log_5 3 = 1$$

$$\log_5 12^m + \log_5 3^{1-m} = 1, \log_5 (12^m \times 3^{1-m}) = 1$$

$$12^m \times 3^{1-m} = 5^1, (4 \times 3)^m \times 3^{1-m} = 5$$

$$4^m \times 3^m \times 3^{1-m} = 5, 4^m \times 3^{m+(1-m)} = 5$$

$$4^m \times 3 = 5 \quad \therefore 4^m = \frac{5}{3}$$

04 ㉡ ①

$5 \log_n 2 = k$ (k 는 자연수)라 하면

$$\log_n 2 = \frac{k}{5}, n^{\frac{k}{5}} = 2 \quad \therefore n = 2^{\frac{5}{k}}$$

n 이 2 이상의 자연수이므로

$$2^{\frac{5}{k}} \geq 2, \frac{5}{k} \geq 1 \quad \therefore k \leq 5$$

이때 $2^{\frac{5}{k}}$ 이 자연수이므로 $k=1, 5$

$$k=1\text{일 때, } n=2^5=32$$

$$k=5\text{일 때, } n=2$$

따라서 모든 n 의 값의 합은

$$32 + 2 = 34$$

05 ㉓ ③

$\log_{\sqrt{3}} a = 2 \log_3 a = \log_3 a^2 = \log_9 a^4$ 이므로
 $\log_9 a^4 = \log_9 ab$
 즉 $a^4 = ab$ 이므로 $a(a^3 - b) = 0$
 이때 a 는 1보다 큰 실수이므로 양변을 a 로 나누면
 $a^3 - b = 0 \quad \therefore b = a^3$
 $\therefore \log_a b = \log_a a^3 = 3$

06 ㉓ ②

$\log_a b^2 + \log_b a^3 = \frac{2}{3} \log_a b + \frac{3}{4} \log_b a \quad \dots\dots ㉠$
 이때 $a > 1, b > 1$ 이므로 $\log_a b > 0, \log_b a > 0$
 ㉠에서 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
 $\frac{2}{3} \log_a b + \frac{3}{4} \log_b a \geq 2 \sqrt{\frac{2}{3} \log_a b \times \frac{3}{4} \log_b a}$
 $\geq 2 \sqrt{\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \log_a b \times \frac{1}{\log_a b}}$
 $= 2 \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$
 (단, 등호는 $\frac{2}{3} \log_a b = \frac{3}{4} \log_b a$ 일 때 성립)
 따라서 $\log_a b^2 + \log_b a^3$ 의 최솟값은 $\sqrt{2}$ 이다.

07 ㉓ ①

$\log_2 ab = \log_2 (2^{\frac{1}{n}} \times 2^{\frac{1}{n+1}}) = \log_2 2^{\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}}$
 $= \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}$
 $(\log_2 a)(\log_2 b) = (\log_2 2^{\frac{1}{n}})(\log_2 2^{\frac{1}{n+1}})$
 $= \frac{1}{n} \times \frac{1}{n+1}$
 $= \frac{1}{n(n+1)}$
 $\therefore \left\{ \frac{3^{\log_2 ab}}{3^{(\log_2 a)(\log_2 b)}} \right\}^5 = \left\{ \frac{3^{\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}}}{3^{\frac{1}{n(n+1)}}} \right\}^5$
 $= \left\{ 3^{\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n(n+1)}} \right\}^5$
 $= 3^{\frac{10}{n+1}}$
 $3^{\frac{10}{n+1}}$ 이 자연수가 되려면 $n+1$ 은 10의 양의 약수이어야 하므로
 $n+1 = 1, 2, 5, 10 \quad \therefore n = 0, 1, 4, 9$
 그런데 n 은 자연수이므로 $n = 1, 4, 9$
 따라서 모든 n 의 값의 합은
 $1 + 4 + 9 = 14$

08 ㉓ 13

$\log_4 2n^2 - \frac{1}{2} \log_2 \sqrt{n} = \log_4 2n^2 - \log_4 n^{\frac{1}{2}}$
 $= \log_4 \frac{2n^2}{n^{\frac{1}{2}}}$
 $= \log_4 2n^{\frac{3}{2}}$
 $= \log_4 2n^{\frac{3}{2}}$
 40 이하의 자연수 k 에 대하여 $\log_4 2n^{\frac{3}{2}} = k$ 라 하면
 $2n^{\frac{3}{2}} = 4^k$ 에서 $4n^3 = 4^{2k}, n^3 = 4^{2k-1}$
 $\therefore n = 4^{\frac{2k-1}{3}}$
 이때 n 이 자연수이므로 $\frac{2k-1}{3}$ 은 자연수이어야 한다.

즉 $2k-1$ 은 3의 배수이어야 하므로 가능한 k 의 값은 2, 5, 8, ..., 38의 13개이다.
 따라서 조건을 만족시키는 자연수 n 의 개수는 자연수 k 의 개수와 같으므로 13이다.

09 ㉓ ②

약물 A의 흡수율과 배설률을 각각 K_A, E_A 라 하고,
 약물 B의 흡수율과 배설률을 각각 K_B, E_B 라 하자.
 주어진 조건에 의하여
 $K_A = K_B, E_A = \frac{1}{2}K_A, E_B = \frac{1}{4}K_B = \frac{1}{4}K_A$
 이므로 약물 A의 혈중농도가 최고치에 도달하는 시간은

$$c \times \frac{\log K_A - \log E_A}{K_A - E_A} = c \times \frac{\log K_A - \log \frac{1}{2}K_A}{K_A - \frac{1}{2}K_A}$$

$$= c \times \frac{\log \frac{K_A}{\frac{1}{2}K_A}}{\frac{1}{2}K_A}$$

$$= c \times \frac{\log 2}{\frac{1}{2}K_A}$$

$$= c \times \frac{2 \log 2}{K_A}$$

즉 $c \times \frac{2 \log 2}{K_A} = 3$ 이므로 $\frac{c}{K_A} = \frac{3}{2 \log 2}$
 약물 B의 혈중농도가 최고치에 도달하는 시간은

$$c \times \frac{\log K_B - \log E_B}{K_B - E_B} = c \times \frac{\log K_A - \log \frac{1}{4}K_A}{K_A - \frac{1}{4}K_A}$$

$$= c \times \frac{\log \frac{K_A}{\frac{1}{4}K_A}}{\frac{3}{4}K_A}$$

$$= c \times \frac{\log 4}{\frac{3}{4}K_A}$$

$$= \frac{c}{K_A} \times \frac{4 \log 2^2}{3}$$

$$= \frac{c}{K_A} \times \frac{8 \log 2}{3}$$

$$= \frac{3}{2 \log 2} \times \frac{8 \log 2}{3}$$

$$= 4$$

$\therefore a = 4$

10 ㉓ 31

$10 < x < 100$ 에서 $\sqrt{10} < \sqrt{x} < 10$ 이므로
 $\frac{1}{2} < \log \sqrt{x} < 1$
 즉 $\log \sqrt{x}$ 의 정수 부분은 0이므로 소수 부분은 $\log \sqrt{x}$ 이다.
 $10 < x < 100$ 에서 $\frac{1}{100} < \frac{1}{x} < \frac{1}{10}$ 이므로
 $-2 < \log \frac{1}{x} < -1$
 즉 $\log \frac{1}{x}$ 의 정수 부분은 -2 이므로 소수 부분은 $\log \frac{1}{x} + 2$ 이다.

이때 $\log \sqrt{x}$ 의 소수 부분이 $\log \frac{1}{x}$ 의 소수 부분의 5배이므로

$$\log \sqrt{x} = 5 \left(\log \frac{1}{x} + 2 \right), \frac{1}{2} \log x = 5(-\log x + 2)$$

$$\frac{11}{2} \log x = 10 \quad \therefore \log x = \frac{20}{11}$$

따라서 $p=11, q=20$ 이므로

$$p+q=11+20=31$$

11 426

$$4 \log_{64} \frac{3}{4n+16} = k \quad (k \text{는 정수}) \text{라 하면}$$

$$4 \log_{2^6} \frac{3}{4n+16} = k, \frac{4}{6} \log_2 \frac{3}{4n+16} = k$$

$$\frac{2}{3} \log_2 \frac{3}{4n+16} = k, \log_2 \frac{3}{4n+16} = \frac{3}{2}k$$

$$\therefore \frac{3}{4n+16} = 2^{\frac{3}{2}k} = (2^3)^{\frac{k}{2}} = 8^{\frac{k}{2}} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 자연수 n 에 대하여 $0 < \frac{3}{4n+16} < 1$ 이므로

$$0 < 8^{\frac{k}{2}} < 1$$

즉 $k < 0$ 이어야 한다.

또 $\frac{3}{4n+16}$ 이 유리수이므로 $8^{\frac{k}{2}}$ 도 유리수이어야 한다.

따라서 자연수 m 에 대하여 $k = -2m$ 이라 하면 $\textcircled{1}$ 에서

$$\frac{3}{4n+16} = 8^{-m}, \frac{4n+16}{3} = 8^m$$

$$\therefore 4n+16 = 3 \times 8^m$$

(i) $m=1$ 일 때

$$4n+16 = 3 \times 8 = 24 \text{이므로 } 4n=8$$

$$\therefore n=2$$

(ii) $m=2$ 일 때

$$4n+16 = 3 \times 8^2 = 192 \text{이므로 } 4n=176$$

$$\therefore n=44$$

(iii) $m=3$ 일 때

$$4n+16 = 3 \times 8^3 = 1536 \text{이므로 } 4n=1520$$

$$\therefore n=380$$

(iv) $m \geq 4$ 일 때, n 의 값은 1000보다 크다.

(i)~(iv)에서 모든 n 의 값의 합은

$$2+44+380=426$$

12 44

(나)에서 $(n+1) \log a = 3n^2 - 4n + 4$ 의 양변을 $n+1$ 로 나누면

$$\begin{aligned} \log a &= \frac{3n^2 - 4n + 4}{n+1} \\ &= \frac{(3n-7)(n+1) + 11}{n+1} \\ &= 3n-7 + \frac{11}{n+1} \quad \dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

(가)에서 $f(a) = f(a^{2^n})$ 이므로 $\log a$ 와 $\log a^{2^n}$ 의 소수 부분이 같다.

즉 $\log a^{2^n} - \log a$ 의 값이 정수이므로

$$2n \log a - \log a = (2n-1) \log a = (\text{정수})$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $(2n-1)$ 을 곱하면

$$\begin{aligned} (2n-1) \log a &= (2n-1)(3n-7) + \frac{11(2n-1)}{n+1} \\ \therefore (2n-1) \log a &= (2n-1)(3n-7) + 22 - \frac{33}{n+1} \quad \dots\dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$\textcircled{2}$ 이 정수이므로 $\frac{33}{n+1}$ 이 정수이어야 한다.

즉 $n+1$ 은 33의 약수이므로

$$n+1=1, 3, 11, 33$$

$$\therefore n=0, 2, 10, 32$$

그런데 n 은 자연수이므로 $n=2, 10, 32$

따라서 모든 자연수 n 의 값의 합은

$$2+10+32=44$$

03 지수함수

I 지수함수와 로그함수

개념 완성하기

p. 61~62

01 답 ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

02 답 1

$$f(0) = 3^0 = 1$$

03 답 $\frac{1}{3}$

$$f(-1) = 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

04 답 $\sqrt[3]{3}$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = 3^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{3}$$

05 답 27

$$f(3) = 3^3 = 27$$

06 답 1

$$f(0) = \left(\frac{1}{5}\right)^0 = 1$$

07 답 $\frac{1}{25}$

$$f(2) = \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{25}$$

08 답 5

$$f(-1) = \left(\frac{1}{5}\right)^{-1} = 5$$

09 답 $\sqrt{5}$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{5}\right)^{-\frac{1}{2}} = 5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$$

10 답 ㄷ, ㄹ, ㅁ

ㄱ, ㄴ. 함수 $f(x) = a^x$ 의 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

ㄷ. 그래프의 점근선의 방정식은 $y=0$ 이다.

ㄹ. $0 < a < 1$ 일 때, $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.

ㅁ. 그래프는 점 $(1, a)$ 를 지난다.

따라서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ, ㅁ이다.

11 답 $2^{3.1} < 8\sqrt{2}$

$$8\sqrt{2} = 2^3 \times 2^{0.5} = 2^{3.5}$$

함수 $y = 2^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로

$$2^{3.1} < 2^{3.5} \quad \therefore 2^{3.1} < 8\sqrt{2}$$

12 답 $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{4}{5}} < \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$

함수 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{4}{5}} < \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$$

13 답 $\sqrt{7} < \sqrt[3]{7^2} < \sqrt[4]{7^3}$

$$\sqrt{7} = 7^{\frac{1}{2}}, \sqrt[4]{7^3} = 7^{\frac{3}{4}}, \sqrt[3]{7^2} = 7^{\frac{2}{3}}$$

함수 $y = 7^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로

$$7^{\frac{1}{2}} < 7^{\frac{2}{3}} < 7^{\frac{3}{4}} \quad \therefore \sqrt{7} < \sqrt[3]{7^2} < \sqrt[4]{7^3}$$

14 답 $\left(\frac{1}{5}\right)^2 < \frac{1}{5} < \left(\frac{1}{5}\right)^{-0.6}$

함수 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로

$$\left(\frac{1}{5}\right)^2 < \frac{1}{5} < \left(\frac{1}{5}\right)^{-0.6}$$

15 답 -1, 3

16 답 x

17 답 y

$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$ 이므로 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프는 함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

18 답 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} - 7$

함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -7만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y + 7 = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} \quad \therefore y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} - 7$$

19 답 $y = -2^x$

함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$-y = \left(\frac{1}{2}\right)^{-x} \quad \therefore y = -2^x$$


20 답 그래프는 풀이 참조

치역: $\{y \mid y > 1\}$, 점근선의 방정식: $y = 1$

함수 $y = 2^{x-1} + 1$ 의 그래프는 함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

$\therefore$ 치역: $\{y \mid y > 1\}$,

점근선의 방정식: $y = 1$




21 [답] 그래프는 풀이 참조

치역: $\{y|y>-1\}$, 점근선의 방정식: $y=-1$

함수 $y=2^{-x}-1$ 의 그래프는 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

$\therefore$ 치역: $\{y|y>-1\}$,

점근선의 방정식: $y=-1$




22 [답] 그래프는 풀이 참조

치역: $\{y|y<2\}$, 점근선의 방정식: $y=2$

함수 $y=-2^x+2$ 의 그래프는 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

$\therefore$ 치역: $\{y|y<2\}$,

점근선의 방정식: $y=2$




23 [답] 그래프는 풀이 참조

치역: $\{y|y>2\}$, 점근선의 방정식: $y=2$

함수 $y=2^{-x+1}+2$ 의 그래프는 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

$\therefore$ 치역: $\{y|y>2\}$,

점근선의 방정식: $y=2$



24 [답] 최댓값: 100, 최솟값: $\frac{1}{10}$

함수 $y=10^x$ 에서 밑 10 이 $10>1$ 이므로

$x=2$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $10^2=100$

$x=-1$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $10^{-1}=\frac{1}{10}$

25 [답] 최댓값: 25, 최솟값: 1

함수 $y=5^{-x}=\left(\frac{1}{5}\right)^x$ 에서 밑 $\frac{1}{5}$ 이 $0<\frac{1}{5}<1$ 이므로

$x=-2$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $5^2=25$

$x=0$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $5^0=1$

26 [답] 최댓값: 83, 최솟값: $\frac{19}{9}$

함수 $y=3^{x+1}+2$ 에서 밑 3 이 $3>1$ 이므로

$x=3$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $3^4+2=83$

$x=-3$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $3^{-2}+2=\frac{19}{9}$

27 [답] 최댓값: 0, 최솟값: $-\frac{15}{16}$

함수 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^{x-1}-1$ 에서 밑 $\frac{1}{4}$ 이 $0<\frac{1}{4}<1$ 이므로

$x=1$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $\left(\frac{1}{4}\right)^0-1=0$

$x=3$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $\left(\frac{1}{4}\right)^2-1=-\frac{15}{16}$

28 [답] $x=\frac{3}{2}$

$25^x=125$ 에서 $5^{2x}=5^3$

$2x=3 \quad \therefore x=\frac{3}{2}$

29 [답] $x=-\frac{1}{2}$

$\left(\frac{1}{4}\right)^x=2\sqrt{2}\times 2^x$ 에서 $2^{-2x}=2^{\frac{3}{2}+x}$

$-2x=\frac{3}{2}+x, 3x=-\frac{3}{2}$

$\therefore x=-\frac{1}{2}$

30 [답] $x=-5$

$\left(\frac{2}{3}\right)^{1-x}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2(x+2)}$ 에서 $\left(\frac{3}{2}\right)^{x-1}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2(x+2)}$

$x-1=2(x+2), x-1=2x+4$

$\therefore x=-5$

31 [답] (가) $t^2-6t-16$ (나) 8 (다) 3

$2^{2x}-6\times 2^x-16=0$ 에서 $(2^x)^2-6\times 2^x-16=0$

$2^x=t$ ($t>0$)라 하면 주어진 방정식은

$(t)^2-6t-16=0, (t+2)(t-8)=0$

$\therefore t=\boxed{(나) 8}$ ($\because t>0$)

즉 $2^x=\boxed{(나) 8}=2^3$ 이므로 $x=\boxed{(다) 3}$

32 [답] $x=0$ 또는 $x=2$

$4^x-5\times 2^x+4=0$ 에서 $(2^x)^2-5\times 2^x+4=0$

$2^x=t$ ($t>0$)라 하면 주어진 방정식은

$t^2-5t+4=0, (t-1)(t-4)=0$

$\therefore t=1$ 또는 $t=4$

즉 $2^x=1$ 또는 $2^x=4$ 이므로

$x=0$ 또는 $x=2$

33 [답] $x=-2$

$\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1}-8\times\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}-27=0$ 에서

$3\times\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^x\right\}^2-24\times\left(\frac{1}{3}\right)^x-27=0$

$\left(\frac{1}{3}\right)^x=t$ ($t>0$)라 하면 주어진 방정식은

$3t^2-24t-27=0, t^2-8t-9=0$

$(t+1)(t-9)=0 \quad \therefore t=9$ ($\because t>0$)

즉 $\left(\frac{1}{3}\right)^x=9$ 이므로 $\left(\frac{1}{3}\right)^x=\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$

$\therefore x=-2$

34 [답] $x=3$

$3^{2x-6}=4^{2x-6}$ 에서 $3\neq 4$ 이므로

$2x-6=0 \quad \therefore x=3$

35 [답] $x<2$

$2^{2x+3}<128$ 에서 $2^{2x+3}<2^7$

이때 밑 2 가 $2>1$ 이므로 $2x+3<7$

$2x<4 \quad \therefore x<2$

36 $x \geq \frac{1}{4}$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} \leq (3\sqrt{3})^{2x} \text{에서 } 3^{-x+1} \leq 3^{3x}$$

이때 밑 3이 $3 > 1$ 이므로 $-x+1 \leq 3x$

$$-4x \leq -1 \quad \therefore x \geq \frac{1}{4}$$

37 $x > -2$

$$5^{3-x} > \left(\frac{1}{5}\right)^{3x+1} \text{에서 } 5^{3-x} > 5^{-3x-1}$$

이때 밑 5가 $5 > 1$ 이므로 $3-x > -3x-1$

$$2x > -4 \quad \therefore x > -2$$

38 $t^2 - 30t + 81$ (㉠) 3 (㉡) 27 (㉢) -3 (㉣) -1

$$\left(\frac{1}{9}\right)^x - 30 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x + 81 < 0 \text{에서}$$

$$\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^x\right\} - 30 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x + 81 < 0$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = t \ (t > 0) \text{라 하면 주어진 부등식은}$$

$$t^2 - 30t + 81 < 0, (t-3)(t-27) < 0$$

$$\therefore \boxed{\text{㉠} 3} < t < \boxed{\text{㉡} 27}$$

$$\text{즉 } \boxed{\text{㉠} 3} < \left(\frac{1}{3}\right)^x < \boxed{\text{㉡} 27} \text{이므로 } \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} < \left(\frac{1}{3}\right)^x < \left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$$

이때 밑 $\frac{1}{3}$ 이 $0 < \frac{1}{3} < 1$ 이므로

$$\boxed{\text{㉢} -3} < x < \boxed{\text{㉣} -1}$$

39 $1 < x < 2$

$$9^x - 4 \times 3^{x+1} + 27 < 0 \text{에서 } (3^x)^2 - 12 \times 3^x + 27 < 0$$

$3^x = t \ (t > 0)$ 라 하면 주어진 부등식은

$$t^2 - 12t + 27 < 0, (t-3)(t-9) < 0$$

$$\therefore 3 < t < 9$$

$$\text{즉 } 3 < 3^x < 9 \text{이므로 } 3 < 3^x < 3^2$$

이때 밑 3이 $3 > 1$ 이므로 $1 < x < 2$

40 $x < -2$

$$\left(\frac{1}{4}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} > 8 \text{에서 } \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^x\right\} - 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x - 8 > 0$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = t \ (t > 0) \text{라 하면 주어진 부등식은}$$

$$t^2 - 2t - 8 > 0, (t+2)(t-4) > 0$$

$$\therefore t > 4 \ (\because t > 0)$$

$$\text{즉 } \left(\frac{1}{2}\right)^x > 4 \text{이므로 } \left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$$

이때 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로

$$x < -2$$

유형 완성하기

p. 63-79

01 8

$$f(1) = 2 \text{에서 } 5^{a+b} = 2$$

.....㉠

$$f(2) = 4 \text{에서 } 5^{2a+b} = 4$$

.....㉡

$$\text{㉠} \div \text{㉡} \text{을 하면 } 5^a = 2$$

$$5^a = 2 \text{를 } \text{㉡} \text{에 대입하면 } 2 \times 5^b = 2 \quad \therefore 5^b = 1$$

$$\therefore f(3) = 5^{3a+b} = (5^a)^3 \times 5^b = 2^3 \times 1 = 8$$

01-1 3

$$f(0) = 3 \text{에서 } a^c = 3$$

.....㉠

$$f(1) = 6 \text{에서 } a^{b+c} = 6$$

.....㉡

$$\text{㉠} \div \text{㉡} \text{을 하면 } a^b = 2$$

$$\therefore f(2) = a^{2b+c} = (a^b)^2 \times a^c = 2^2 \times 3 = 12$$

02 4

$$f(p) = 4 \text{에서 } a^b = 4$$

$$f(q) = \frac{1}{3} \text{에서 } a^q = \frac{1}{3}$$

$$\therefore f\left(\frac{p}{2} - q\right) = a^{\frac{p}{2} - q} = (a^{\frac{p}{2}})^{-1} \times (a^q)^{-1}$$

$$= 4^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$$

$$= 2 \times 3 = 6$$

02-1 3

$$f(2a)f(3b) = 8 \text{에서 } 2^{-2a} \times 2^{-3b} = 8$$

$$2^{-2a-3b} = 2^3 \quad \therefore 2a+3b = -3$$

.....㉠

$$f(a+b) = 2 \text{에서 } 2^{-(a+b)} = 2$$

$$2^{-a-b} = 2 \quad \therefore a+b = -1$$

.....㉡

$$\text{㉠, ㉡을 연립하여 풀면 } a=0, b=-1$$

$$\therefore f(a) + f(b) = f(0) + f(-1) = 2^0 + 2^{-(-1)} = 3$$

03 1

$$\neg. f(p+q) = a^{p+q} = a^p \times a^q = f(p)f(q)$$

$$\neg. f(2p) = a^{2p}, 2f(p) = 2a^p \text{이므로 } f(2p) \neq 2f(p)$$

$$\neg. f(p)f(-p) = a^p \times a^{-p} = a^0 = 1$$

$$\neg. f(pq) = a^{pq}, f(p^q) = a^{p^q} \text{이므로 } f(pq) \neq f(p^q)$$

따라서 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.

참고

지수함수 $f(x) = a^x \ (a > 0, a \neq 1)$ 과 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$(1) f(0) = 1$$

$$(2) f(x+y) = f(x)f(y)$$

$$(3) f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$$

$$(4) f(-x) = \frac{1}{f(x)}$$

$$(5) f(nx) = \{f(x)\}^n \ (n \text{은 자연수})$$

03-1 $\neg, \neg$

$$\neg. f(-p) = 3^{-p} = \frac{1}{3^p} = \frac{1}{f(p)}$$

$$\neg. f(pq) = 3^{pq}, f(p) + f(q) = 3^p + 3^q \text{이므로}$$

$$f(pq) \neq f(p) + f(q)$$

$$\neg. f(3p) = 3^{3p} = (3^p)^3 = \{f(p)\}^3$$


$$\neg. f(p-q) = 3^{p-q} = \frac{3^p}{3^q} = \frac{f(p)}{f(q)} \text{이므로}$$

$$f(p-q) \neq \frac{f(q)}{f(p)}$$

따라서 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.


04 ㉠ ㄱ, ㄴ

$f(3)=27$ 에서 $a^3=27=3^3 \quad \therefore a=3$
 즉 $f(x)=3^x$ 이므로 함수 $f(x)=3^x$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
 ㄱ. 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다.
 ㄴ. 그래프의 점근선의 방정식은 $y=0$ 이므로 x 축과 만나지 않는다.
 ㄷ. 밑 3이 $3>1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ㄹ. 그래프는 제 1, 2사분면을 지난다.
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.



04-1 ㉠ ㄱ, ㄴ

함수 $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
 ㄱ. 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.
 ㄴ. $x_1 \neq x_2$ 이면 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} \neq \left(\frac{1}{2}\right)^{x_2}$ 이므로 일대일함수이다.
 ㄷ. 그래프의 점근선의 방정식은 $y=0$ 이다.
 ㄹ. 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.



Lecture 일대일함수와 일대일대응

- (1) 일대일함수
 $\Rightarrow x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$
 (2) 일대일대응
 ① $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$
 ② (치역)=(공역)

05 ㉠ ③

임의의 실수 a, b 에 대하여 $a < b$ 일 때, $f(a) < f(b)$ 를 만족시키는 함수는 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가하는 함수이다.
 즉 $f(x)=a^x$ 에서 $a>1$ 인 함수를 찾으려 한다.
 ① $f(x)=2^{-x}=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 에서 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소한다.
 ② $f(x)=0.3^x=\left(\frac{3}{10}\right)^x$ 에서 밑 $\frac{3}{10}$ 이 $0 < \frac{3}{10} < 1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소한다.
 ③ $f(x)=\left(\frac{1}{4}\right)^{-x}=4^x$ 에서 밑 4가 $4>1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.
 ④ $f(x)=(\sqrt{2})^{-x}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^x$ 에서 밑 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 가 $0 < \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소한다.
 ⑤ $f(x)=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^x$ 에서 밑 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이 $0 < \frac{\sqrt{3}}{2} < 1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소한다.
 따라서 주어진 조건을 만족시키는 함수는 ③이다.

05-1 ㉠ ③

임의의 실수 a, b 에 대하여 $a < b$ 일 때, $f(a) > f(b)$ 를 만족시키는 함수는 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소하는 함수이다.

즉 $f(x)=a^x$ 에서 $0 < a < 1$ 인 함수를 찾으려 한다.

- ① $f(x)=2^x$ 에서 밑 2가 $2>1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.
 ② $f(x)=1.5^x=\left(\frac{3}{2}\right)^x$ 에서 밑 $\frac{3}{2}$ 이 $\frac{3}{2}>1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.
 ③ $f(x)=\left(\frac{5}{3}\right)^{-x}=\left(\frac{3}{5}\right)^x$ 에서 밑 $\frac{3}{5}$ 이 $0 < \frac{3}{5} < 1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소한다.
 ④ $f(x)=(\sqrt{7})^x$ 에서 밑 $\sqrt{7}$ 이 $\sqrt{7}>1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.
 ⑤ $f(x)=\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^x$ 에서 밑 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 가 $\frac{\sqrt{5}}{2}>1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.
 따라서 주어진 조건을 만족시키는 함수는 ③이다.

06 ㉠ $-\sqrt{2} < a < -1$ 또는 $1 < a < \sqrt{2}$

임의의 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) > f(x_2)$ 를 만족시키는 함수는 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소하는 함수이다. ①
 $f(x)=(a^2-1)^x$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하려면
 $0 < a^2-1 < 1$ ②
 (i) $0 < a^2-1$ 에서 $(a+1)(a-1) > 0$
 $\therefore a < -1$ 또는 $a > 1$
 (ii) $a^2-1 < 1$ 에서 $a^2-2 < 0$
 $(a+\sqrt{2})(a-\sqrt{2}) < 0 \quad \therefore -\sqrt{2} < a < \sqrt{2}$
 (i), (ii)에서 $-\sqrt{2} < a < -1$ 또는 $1 < a < \sqrt{2}$ ③

채점 기준	비율
① 함수 $f(x)$ 가 감소함수임을 알 수 있다.	20%
② a^2-1 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
③ a 의 값의 범위를 구할 수 있다.	50%

06-1 ㉠ $-1 < a < 0$

$y=(a^2+a+1)^x$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하려면
 $0 < a^2+a+1 < 1$
 (i) $0 < a^2+a+1$ 에서
 $a^2+a+1=\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$
 이므로 항상 성립한다.
 (ii) $a^2+a+1 < 1$ 에서 $a^2+a < 0$
 $a(a+1) < 0 \quad \therefore -1 < a < 0$
 (i), (ii)에서 $-1 < a < 0$

07 ㉠ ③

$f(b)=3$ 이므로 $a^b=3$
 $f(c)=6$ 이므로 $a^c=6$
 $\therefore f\left(\frac{b+c}{2}\right)=a^{\frac{b+c}{2}}=(a^b \times a^c)^{\frac{1}{2}}$
 $= (3 \times 6)^{\frac{1}{2}} = 18^{\frac{1}{2}} = 3\sqrt{2}$


07-1 ㉠ ④

$3^a=a, 3^b=b$ 이므로 $a\beta=3^a \times 3^b=3^{a+b}$
 즉 $9=3^{a+b}$ 이므로 $3^{a+b}=3^2$
 $\therefore a+b=2$

08 23

직선 $y=x$ 위의 점은 x 좌표와 y 좌표가 같으므로 오른쪽 그림에서


$$\begin{aligned} a &= 2^0 = 1 \\ b &= 2^a = 2^1 = 2 \\ c &= 2^b = 2^2 = 4 \\ d &= 2^c = 2^4 = 16 \\ \therefore a+b+c+d &= 1+2+4+16 \\ &= 23 \end{aligned}$$



08-1 52

직선 $y=x$ 위의 점은 x 좌표와 y 좌표가 같으므로 오른쪽 그림에서

$$\begin{aligned} a &= 3^0 = 1 \\ \therefore b &= a = 1 \\ c &= 3^b = 3^1 = 3 \\ d &= 3^c = 3^3 = 27 \\ \text{따라서 색칠한 부분의 넓이는} \\ (d-b)(c-a) &= (27-1) \times (3-1) \\ &= 26 \times 2 \\ &= 52 \end{aligned}$$



09 34

$\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 1$ 에서 $\overline{AB} : \overline{AC} = 2 : 3$ 이므로 두 점 B, C의 x 좌표를 각각 $2b, 3b$ ($b > 0$)라 하면

$$\begin{aligned} 2^{2b} &= a^{3b} = k, 4^b = (a^3)^b \\ 4 &= a^3 \quad \therefore a = \sqrt[3]{4} \end{aligned}$$

09-1 1/4

점 A의 좌표를 $(a, 2^a)$ 이라 하면 두 점 A, B의 y 좌표가 같으므로 점 B의 y 좌표는 2^a 이다.

점 B는 함수 $y=4^x$ 의 그래프 위의 점이므로

$$4^x = 2^a \text{에서 } 2^{2x} = 2^a$$

$$2x = a \quad \therefore x = \frac{a}{2}$$

$$\therefore B\left(\frac{a}{2}, 2^a\right)$$

또 두 점 A, C의 y 좌표가 같으므로 점 C의 y 좌표는 2^a 이다.

점 C는 함수 $y=8^x$ 의 그래프 위의 점이므로

$$8^x = 2^a \text{에서 } 2^{3x} = 2^a$$

$$3x = a \quad \therefore x = \frac{a}{3}$$

$$\therefore C\left(\frac{a}{3}, 2^a\right)$$

$$\therefore \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{\frac{a}{2} - \frac{a}{3}}{a - \frac{a}{3}} = \frac{\frac{a}{6}}{\frac{2a}{3}} = \frac{1}{4}$$

10 9

$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$y = -\left(\frac{1}{2}\right)^x$$

$y = -\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y - b = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x-a} \quad \therefore y = -2^{-x+a} + b \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

①의 그래프가 점 $(-1, -1)$ 을 지나므로

$$-1 = -2^{1+a} + b \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

①의 그래프가 점 $(-2, -9)$ 를 지나므로

$$-9 = -2^{2+a} + b \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$$\textcircled{B} - \textcircled{C} \text{을 하면 } 2^{2+a} - 2^{1+a} = 8$$

$$2 \times 2^{a+1} - 2^{a+1} = 8, 2^{a+1} = 2^3$$

$$a+1 = 3 \quad \therefore a = 2$$

$a = 2$ 를 ①에 대입하면

$$-1 = -2^3 + b \quad \therefore b = 7$$

$$\therefore a+b = 2+7 = 9$$

10-1 1

$y = 3^{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y - n = 3^{2(x-m)} \quad \therefore y = 3^{-2m} \times 3^{2x} + n$$

이 식이 $y = 81 \times 3^{2x} + \frac{1}{2}$ 과 일치하므로

$$3^{-2m} = 81, n = \frac{1}{2}$$

$$3^{-2m} = 81 \text{에서 } 3^{-2m} = 3^4$$

$$-2m = 4 \quad \therefore m = -2$$

$$\therefore m+2n = -2+2 \times \frac{1}{2} = -1$$

11 4

① $x=0$ 을 대입하면 $y=5^2-2=23$ 이므로 그래프는 점 $(0, 23)$ 을 지난다.

② $y = 5^{2-x} - 2 = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-2} - 2$ 이므로 함수

$$y = 5^{2-x} - 2 \text{의 그래프는 함수 } y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$$


의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

③ 치역은 $\{y | y > -2\}$ 이다.

④ 그래프의 점근선의 방정식은 $y = -2$ 이다.

⑤ 주어진 함수에서 밑 $\frac{1}{5}$ 이 $0 < \frac{1}{5} < 1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

따라서 옳은 것은 ④이다.




11-1 4

① $x=2$ 를 대입하면 $y=2^0+3=4$ 이므로 그래프는 점 $(2, 4)$ 를 지난다.

② 함수 $y = 2^{x-2} + 3$ 의 그래프는 함수 $y = 2^x$

의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로 주어진 함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 즉 그래프의 점근선의 방정식은 $y = 3$ 이다.



- ③ 정의역은 실수 전체의 집합이다.
 ④ 주어진 함수에서 밑 2가 $2 > 1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ⑤ 그래프는 제3, 4사분면을 지나지 않는다.
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

12 ㉡ 4

$y=3^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$y=3^{-x}$$

$y=3^{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y-b=3^{-(x-a)} \quad \therefore y=3^{-x+a+b} \quad \dots\dots ①$$

이때 주어진 그래프에서 점근선의 방정식이 $y=-3$ 이므로

$$b=-3$$

즉 $y=3^{-x+a}-3$ 의 그래프가 원점을 지나므로

$$0=3^a-3, 3^a=3 \quad \therefore a=1 \quad \dots\dots ②$$

$$\therefore a-b=1-(-3)=4 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 조건을 만족시키는 함수의 식을 구할 수 있다.	40%
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $a-b$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

12-1 ㉡ -3

$y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y-b=2^{x-a} \quad \therefore y=2^{x-a}+b$$

$y=2^{x-a}+b$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y=2^{-x-a}+b$

이때 주어진 그래프에서 점근선의 방정식이 $y=-1$ 이므로

$$b=-1$$

즉 $y=2^{-x-a}-1$ 의 그래프가 점 $(2, 0)$ 을 지나므로

$$0=2^{-2-a}-1, 2^{-2-a}=1$$

$$-2-a=0 \quad \therefore a=-2$$

$$\therefore a+b=-2+(-1)=-3$$

13 ㉡ 5

ㄱ. $y=2(2^x-1)=2^{x+1}-2$ 의 그래프는 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

ㄴ. $y=2^{2x}=4^x$ 의 그래프는 $y=2^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 없다.

ㄷ. $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}=2^{-(x-1)}$ 의 그래프는 $y=2^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이다.

ㄹ. $y=-\frac{2^x}{4}=-2^{x-2}$ 의 그래프는 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $y=2^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.

13-1 ㉡ 5

ㄱ. $y=9^{2x+1}=\left(\frac{1}{9}\right)^{-2\left(x+\frac{1}{2}\right)}=\left(\frac{1}{81}\right)^{-\left(x+\frac{1}{2}\right)}$ 의 그래프는 $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x$

의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 없다.

ㄴ. $y=3^{2x-5}=\left(\frac{1}{3}\right)^{-2\left(x-\frac{5}{2}\right)}=\left(\frac{1}{9}\right)^{-\left(x-\frac{5}{2}\right)}$ 의 그래프는 $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x$

의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 $\frac{5}{2}$ 만큼 평행이동한 것이다.

ㄷ. $y=9^x+1=\left(\frac{1}{9}\right)^{-x}+1$ 의 그래프는 $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이다.

ㄹ. $y=-\left(\frac{1}{9}\right)^{x-2}$ 의 그래프는 $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.


14 ㉡ 5

함수 $y=5^{x-3}+k$ 의 그래프는 $y=5^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이다.

이 그래프가 제2사분면을 지나지 않으려면 오른쪽 그림과 같이 $x=0$ 일 때 y 의 값이 0 보다 작거나 같아야 하므로

$$\frac{1}{125}+k \leq 0 \quad \therefore k \leq -\frac{1}{125}$$

따라서 정수 k 의 최댓값은 -1 이다.




14-1 ㉡ 4

함수 $y=4^{2-x}+k=\left(\frac{1}{4}\right)^{x-2}+k$ 의 그래프는 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이다.

이 그래프가 제1사분면을 지나지 않으려면 오른쪽 그림과 같이 $x=0$ 일 때 y 의 값이 0 보다 작거나 같아야 하므로

$$16+k \leq 0 \quad \therefore k \leq -16$$

따라서 정수 k 의 최댓값은 -16 이다.




15 ㉡ 72

함수 $y=3^{x+3}$ 의 그래프는 $y=3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.

오른쪽 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이가 같으므로 두 함수 $y=3^x, y=3^{x+3}$ 의 그래프와 두 직선 $y=3, y=27$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 직사각형 ABCD의 넓이와 같다.


$$\begin{aligned} \text{따라서 구하는 넓이는} \\ \overline{AB} \times \overline{AD} &= 3 \times (27-3) \\ &= 3 \times 24 \\ &= 72 \end{aligned}$$



15-1 ㉡ 2

함수 $y=2^x+2$ 의 그래프는 $y=2^x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.

오른쪽 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이가 같으므로 두 함수 $y=2^x$, $y=2^x+2$ 의 그래프와 두 직선 $x=0$, $x=1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 직사각형 ABCD의 넓이와 같다. 따라서 구하는 넓이는 $\overline{AB} \times \overline{AD} = 1 \times (3-1) = 2$



16 ㉔ ④

$$\sqrt[5]{4} = 4^{\frac{1}{5}} = 2^{\frac{2}{5}}, 0.5^{-\frac{5}{4}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{5}{4}} = 2^{\frac{5}{4}},$$

$$\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}, 2^{\frac{1}{4}}, \sqrt[4]{8} = 8^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{3}{4}}$$

이때 $\frac{1}{4} < \frac{2}{5} < \frac{1}{2} < \frac{3}{4} < \frac{5}{4}$ 이고, 밑 2가 $2 > 1$ 이므로

$$2^{\frac{1}{4}} < 2^{\frac{2}{5}} < 2^{\frac{1}{2}} < 2^{\frac{3}{4}} < 2^{\frac{5}{4}}$$

따라서 $M = 2^{\frac{5}{4}}$, $m = 2^{\frac{1}{4}}$ 이므로

$$Mm = 2^{\frac{5}{4}} \times 2^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{5}{4} + \frac{1}{4}} = 2^{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{2}$$

16-1 ㉔ ③

$$\sqrt[5]{8} = 8^{\frac{1}{5}} = 2^{\frac{3}{5}}, \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} = 2^{-\frac{1}{3}}, (2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{3}})^{\frac{8}{5}} = (2^{\frac{5}{6}})^{\frac{8}{5}} = 2^{\frac{4}{3}},$$

$$0.25^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} = 2, \sqrt{\sqrt{\sqrt{2^8}}} = (2^8)^{\frac{1}{16}} = 2^{\frac{1}{2}}$$

이때 $-\frac{1}{3} < \frac{1}{2} < \frac{3}{5} < 1 < \frac{4}{3}$ 이고, 밑 2가 $2 > 1$ 이므로

$$2^{-\frac{1}{3}} < 2^{\frac{1}{2}} < 2^{\frac{3}{5}} < 2 < 2^{\frac{4}{3}}$$

따라서 $M = 2^{\frac{4}{3}}$, $m = 2^{-\frac{1}{3}}$ 이므로

$$Mm = 2^{\frac{4}{3}} \times 2^{-\frac{1}{3}} = 2$$

17 ㉔ ②

$$A = \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3, B = 9^{0.75} = (3^2)^{\frac{3}{4}} = 3^{\frac{3}{2}}, C = 3^{\sqrt[3]{3}} = 3 \times 3^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{4}{3}}$$

이때 $1 < \frac{4}{3} < \frac{3}{2}$ 이고, 밑 3이 $3 > 1$ 이므로

$$3 < 3^{\frac{4}{3}} < 3^{\frac{3}{2}} \quad \therefore A < C < B$$

17-1 ㉔ ④

$$A = \left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{1}{3}} = \left\{\left(\frac{1}{3}\right)^3\right\}^{-\frac{1}{3}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}, B = \frac{1}{\sqrt[3]{9}} = \frac{1}{2^{\frac{2}{3}}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$C = \sqrt[3]{\frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{3}}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{3}} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{6}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$$

이때 $-1 < \frac{1}{2} < \frac{2}{3}$ 이고, 밑 $\frac{1}{3}$ 이 $0 < \frac{1}{3} < 1$ 이므로

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} < \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} \quad \therefore B < C < A$$

18 ㉔ ③

$$0 < a < 1 \text{에서 } a^1 < a^a < a^0 \quad \therefore a < a^a < 1$$

$$\text{또 } a < a^a < 1 \text{에서 } a^1 < a^{a^a} < a^a \quad \therefore a < a^{a^a} < a^a$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

18-1 ㉔ ㄷ

주어진 조건에서 $a < 1 < b$

㉔의 각 변을 a 제곱하면 $a^a < 1 < b^a$

.....㉔

$$\text{이때 } 0 < a < 1, a < b \text{이므로 } a^b < a^a$$

$$\text{또 } b > 1, a < b \text{이므로 } b^a < b^b$$

$$\therefore a^b < a^a < 1 < b^a < b^b$$

따라서 가장 작은 수는 ㄷ이다.

19 ㉔ ⑤

$2 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x) = 4^{x+a} - 4$ 는 밑 4가 $4 > 1$ 이므로 $x=3$ 일 때 최댓값 12를 갖는다.

$$\text{즉 } f(3) = 12 \text{이므로 } 4^{3+a} - 4 = 12$$

$$4^{3+a} = 16, 4^{3+a} = 4^2$$

$$3+a=2 \quad \therefore a=-1$$

따라서 함수 $f(x) = 4^{x-1} - 4$ 는 $x=2$ 일 때 최소이고, 최솟값은

$$f(2) = 4^1 - 4 = 0$$

19-1 ㉔ 1

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $f(x) = a^x$ 은 밑 a 가 $0 < a < 1$ 이므로 $x=1$

일 때 최솟값 $\frac{3}{4}$ 을 갖는다.

$$\text{즉 } f(1) = \frac{3}{4} \text{이므로 } a = \frac{3}{4}$$

따라서 함수 $f(x) = \left(\frac{3}{4}\right)^x$ 은 $x=-2$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은

$$M = f(-2) = \left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \frac{16}{9}$$

$$\therefore \frac{3}{4}aM = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{16}{9} = 1$$

20 ㉔ -30

$$y = 2^{2-x} - 1 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x - 1$$

$-2 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $y = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x - 1$ 은 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로

$x=-2$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은

$$M = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} - 1 = 15$$

$x=3$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은

$$m = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{M}{m} = \frac{15}{-\frac{1}{2}} = -30$$

20-1 ㉔ 25

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} + 1 = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x + 1$$

$-1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x) = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x + 1$ 은 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이

므로 $x=-1$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은

$$M = f(-1) = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} + 1 = 17$$

$$g(x) = 3^{2x-4} - 1 = \frac{1}{81} \times 9^x - 1$$

$-1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $g(x) = \frac{1}{81} \times 9^x - 1$ 은 밑 9가 $9 > 1$ 이므로

$x=3$ 일 때 최대이고, 최댓값 M' 은

$$M' = g(3) = \frac{1}{81} \times 9^3 - 1 = 8$$

$$\therefore M + M' = 17 + 8 = 25$$

21 ㉮ ⑤

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x) = a^{x+2}$ 은

(i) $a > 1$ 일 때

최댓값은 $f(2)$, 최솟값은 $f(-1)$ 이므로

$$f(2) = 8f(-1), a^4 = 8a$$

$$a^3 = 8 \quad \therefore a = 2$$

(ii) $0 < a < 1$ 일 때

최댓값은 $f(-1)$, 최솟값은 $f(2)$ 이므로

$$f(-1) = 8f(2), a = 8a^4$$

$$a^3 = \frac{1}{8} \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

(i), (ii)에서 양수 a 의 값의 합은

$$2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

21-1 ㉮ 5

$2 \leq x \leq a$ 에서 함수 $y = 3^{x+a}$ 은 밑 3이 $3 > 1$ 이므로

$x = a$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은 $M = 3^{2a}$

$x = 2$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은 $m = 3^{2+a}$

..... ①

이때 $\frac{m}{M} = \frac{1}{27}$ 이므로

$$\frac{3^{2+a}}{3^{2a}} = \frac{1}{27}, 3^{2-a} = 3^{-3}$$

$$2 - a = -3 \quad \therefore a = 5$$

..... ②

채점 기준	비율
① M, m 을 a 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	60%
② a 의 값을 구할 수 있다.	40%

22 ㉮ ③

$f(x) = -x^2 + 4x - 3$ 이라 하면 $f(x) = -(x-2)^2 + 1$

$1 \leq x \leq 4$ 에서 $f(1) = 0, f(2) = 1, f(4) = -3$

$$\therefore -3 \leq f(x) \leq 1$$

밑 2가 $2 > 1$ 이므로 $y = 2^{f(x)} + 3$ 은

$f(x) = 1$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은

$$M = 2^1 + 3 = 5$$

$f(x) = -3$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은

$$m = 2^{-3} + 3 = \frac{25}{8}$$

$$\therefore M - m = 5 - \frac{25}{8} = \frac{15}{8}$$

22-1 ㉮ ④

$f(x) = x^2 - 2x + 2$ 라 하면 $f(x) = (x-1)^2 + 1$

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 $f(-1) = 5, f(1) = 1, f(2) = 2$

$$\therefore 1 \leq f(x) \leq 5$$

밑 $\frac{1}{3}$ 이 $0 < \frac{1}{3} < 1$ 이므로 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{f(x)}$ 은

$f(x) = 1$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은 $M = \left(\frac{1}{3}\right)^1 = \frac{1}{3}$

$f(x) = 5$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은 $m = \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{1}{243}$

$$\therefore \frac{M}{m} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{243}} = 81$$

23 ㉮ ⑤

$f(x) = x^2 - 2x + a$ 라 하면 $f(x) = (x-1)^2 + a - 1$

$$\therefore f(x) \geq a - 1$$

밑 2가 $2 > 1$ 이므로 $y = 2^{f(x)}$ 은 $f(x) = a - 1$ 일 때 최소이고, 최솟값은 16이다.

$$\text{즉 } 2^{a-1} = 16 \text{이므로 } 2^{a-1} = 2^4$$

$$a - 1 = 4 \quad \therefore a = 5$$

23-1 ㉮ 2¹¹

$f(x) = -x^2 - 4x + a$ 라 하면 $f(x) = -(x+2)^2 + a + 4$

$-4 \leq x \leq 2$ 에서 $f(-4) = a, f(-2) = a + 4, f(2) = a - 12$

$$\therefore a - 12 \leq f(x) \leq a + 4$$

밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)}$ 은 $f(x) = a + 4$ 일 때 최소

이고, 최솟값은 $\frac{1}{32}$ 이다.

$$\text{즉 } \left(\frac{1}{2}\right)^{a+4} = \frac{1}{32} \text{이므로 } \left(\frac{1}{2}\right)^{a+4} = \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$a + 4 = 5 \quad \therefore a = 1$$

따라서 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)}$ 은 $f(x) = a - 12 = 1 - 12 = -11$ 일 때 최대이

고, 최댓값은 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-11} = 2^{11}$

24 ㉮ ⑤

$f(x) = x^2 - 5x + 7$ 이라 하면 $f(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$

$$\therefore f(x) \geq \frac{3}{4}$$

이때 $a > 1$ 이므로 $y = a^{f(x)}$ 은 $f(x) = \frac{3}{4}$ 일 때 최소이고, 최솟값은 8이다.

$$\text{즉 } a^{\frac{3}{4}} = 8 \text{이므로 } a^{\frac{3}{4}} = 2^3 \quad \therefore a = (2^3)^{\frac{4}{3}} = 2^4 = 16$$

24-1 ㉮ $\frac{1}{3}$

$f(x) = x^2 - 4x + b$ 라 하면 $f(x) = (x-2)^2 + b - 4$

$0 \leq x \leq 2$ 에서 $f(0) = b, f(2) = b - 4$

$$\therefore b - 4 \leq f(x) \leq b$$

이때 $0 < a < 1$ 이므로 $y = a^{f(x)}$ 은

$f(x) = b - 4$ 일 때 최대이고, 최댓값은 27이다.

$$\therefore a^{b-4} = 27 \quad \text{..... ㉠}$$

$f(x) = b$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $\frac{1}{3}$ 이다.

$$\therefore a^b = \frac{1}{3} \quad \text{..... ㉡} \quad \text{..... ①}$$

$$\text{㉡} \div \text{㉠} \text{을 하면 } a^{b-(b-4)} = \frac{1}{81}$$

$$a^4 = \left(\frac{1}{3}\right)^4 \quad \therefore a = \frac{1}{3} \quad (\because 0 < a < 1)$$

$$a = \frac{1}{3} \text{을 ㉡에 대입하면 } \left(\frac{1}{3}\right)^b = \frac{1}{3} \quad \therefore b = 1 \quad \text{..... ②}$$

$$\therefore ab = \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{3} \quad \text{..... ③}$$

채점 기준	비율
① a, b 에 대한 식을 세울 수 있다.	40%
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ ab 의 값을 구할 수 있다.	20%

25 ㉔ -7

$$y=3 \times 2^{x+1}-4^x=6 \times 2^x-(2^x)^2$$

$2^x=t$ ($t>0$)라 하면 $1 \leq x \leq 3$ 에서

$$2^1 \leq t \leq 2^3 \quad \therefore 2 \leq t \leq 8$$

이때 주어진 함수는 $y=6t-t^2=-(t-3)^2+9$ 이므로

$t=3$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$$-(3-3)^2+9=9$$

$t=8$ 일 때 최소이고, 최솟값은

$$-(8-3)^2+9=-16$$

따라서 주어진 함수의 최댓값과 최솟값의 합은

$$9+(-16)=-7$$

25-1 ㉔ ②

$$y=4^x-2^{x+3}+9=(2^x)^2-8 \times 2^x+9$$

$2^x=t$ ($t>0$)라 하면 $2 \leq x \leq 3$ 에서

$$2^2 \leq t \leq 2^3 \quad \therefore 4 \leq t \leq 8$$

이때 주어진 함수는 $y=t^2-8t+9=(t-4)^2-7$ 이므로

$t=4$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은

$$m=(4-4)^2-7=-7$$

$t=8$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은

$$M=(8-4)^2-7=9$$

$$\therefore M+m=9+(-7)=2$$

26 ㉔ ③

$$y=9^x-2 \times 3^{x+1}+a=(3^x)^2-6 \times 3^x+a$$

$3^x=t$ ($t>0$)라 하면 주어진 함수는

$$y=t^2-6t+a=(t-3)^2+a-9$$

주어진 함수는 $t=3$, 즉 $x=b=1$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $a-9$ 이므로

$$a-9=-4 \quad \therefore a=5$$

$$\therefore a-b=5-1=4$$

26-1 ㉔ 2

$$f(x)=-4^x+2^{x+a}+1=-(2^x)^2+2^a \times 2^x+1$$

$2^x=t$ ($t>0$)라 하면 주어진 함수는

$$f(x)=-t^2+2^a t+1=-(t-2^{a-1})^2+2^{2a-2}+1$$

주어진 함수는 $t=2^{a-1}$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $2^{2a-2}+1$ 이므로

$$2^{2a-2}+1=5, 2^{2a-2}=4=2^2$$

$$2a-2=2 \quad \therefore a=2$$

$$\text{즉 } t=2^{a-1}=2^{2-1}=2 \text{이므로 } 2^x=2$$

$$\therefore x=1, \text{ 즉 } b=1$$

$$\therefore ab=2 \times 1=2$$

27 ㉔ 2

$$y=\left(\frac{1}{4}\right)^x-\left(\frac{1}{2}\right)^x+a=\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^x\right\}^2-\left(\frac{1}{2}\right)^x+a$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x=t$$
 ($t>0$)라 하면 $0 \leq x \leq 3$ 에서

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \leq t \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 \quad \therefore \frac{1}{8} \leq t \leq 1$$

이때 주어진 함수는

$$y=t^2-t+a=\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+a-\frac{1}{4} \text{이므로}$$

$t=\frac{1}{2}$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은

$$m=\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)^2+a-\frac{1}{4}=a-\frac{1}{4}$$

$t=1$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은

$$M=\left(1-\frac{1}{2}\right)^2+a-\frac{1}{4}=a \quad \dots\dots ②$$

$$\text{이때 } M+m=\frac{15}{4} \text{이므로 } a+a-\frac{1}{4}=\frac{15}{4}$$

$$2a=4 \quad \therefore a=2 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① $\left(\frac{1}{2}\right)^x=t$ 로 치환한 후 t 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
② M, m 을 a 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50%
③ a 의 값을 구할 수 있다.	20%

27-1 ㉔ ⑤

$$y=4^x-2^{x+2}+a=(2^x)^2-4 \times 2^x+a$$

$2^x=t$ ($t>0$)라 하면 $0 \leq x \leq 2$ 에서

$$2^0 \leq t \leq 2^2 \quad \therefore 1 \leq t \leq 4$$

이때 주어진 함수는

$$y=t^2-4t+a=(t-2)^2+a-4 \text{이므로}$$

$t=2$ 일 때 최소이고, 최솟값은

$$(2-2)^2+a-4=a-4$$

$t=4$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은

$$M=(4-2)^2+a-4=a$$

이때 주어진 함수의 최솟값이 -3 이므로

$$a-4=-3 \quad \therefore a=1$$

따라서 $M=a=1$ 이므로

$$a+M=1+1=2$$

28 ㉔ 11

$2^x+2^{-x}=t$ 라 하면

$$4^x+4^{-x}=(2^x+2^{-x})^2-2=t^2-2 \text{이므로}$$

$$y=6(2^x+2^{-x})-(4^x+4^{-x})=6t-(t^2-2)$$

$$=-t^2+6t+2=-(t-3)^2+11$$

이때 $2^x>0, 2^{-x}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$t=2^x+2^{-x} \geq 2\sqrt{2^x \times 2^{-x}}=2 \text{ (단, 등호는 } x=0 \text{일 때 성립)}$$

$$\therefore y=-(t-3)^2+11 \text{ (} t \geq 2 \text{)}$$

따라서 주어진 함수는 $t=3$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$$-(3-3)^2+11=11$$

28-1 ㉔ 22

$3^x+3^{-x}=t$ 라 하면

$$9^x+9^{-x}=(3^x+3^{-x})^2-2=t^2-2 \text{이므로}$$

$$y=9^x+9^{-x}+6(3^x+3^{-x})+8=(t^2-2)+6t+8$$

$$=t^2+6t+6=(t+3)^2-3$$

이때 $3^x>0, 3^{-x}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$t=3^x+3^{-x} \geq 2\sqrt{3^x \times 3^{-x}}=2 \text{ (단, 등호는 } x=0 \text{일 때 성립)}$$

$$\therefore y=(t+3)^2-3 \text{ (} t \geq 2 \text{)}$$

주어진 함수는 $t=2$, 즉 $x=0$ 일 때 최소이고, 최솟값은

$$(2+3)^2-3=22$$

따라서 $a=0, b=22$ 이므로

$$a+b=0+22=22$$

29 ㉔④

$2^x > 0, 2^y > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$2^x + 2^y \geq 2\sqrt{2^x \times 2^y} = 2\sqrt{2^{x+y}}$$

(단, 등호는 $2^x = 2^y$, 즉 $x=y$ 일 때 성립)

이때 $x+y=2$ 이므로

$$2^x + 2^y \geq 2\sqrt{2^2} = 4$$

따라서 $2^x + 2^y$ 의 최솟값은 4이다.

29-1 ㉔ 100

$$x+2y=4 \quad \dots\dots ㉑$$

$5^x > 0, 25^y > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$5^x + 25^y \geq 2\sqrt{5^x \times 25^y} = 2\sqrt{5^{x+2y}} = 2\sqrt{5^4} = 50 \quad (\because ㉑)$$

이때 등호는 $5^x = 25^y$ 일 때 성립하므로

$$5^x = 5^{2y} \quad \therefore x = 2y \quad \dots\dots ㉒$$

㉑을 ㉒에 대입하면 $2y + 2y = 4$

$$4y = 4 \quad \therefore y = 1$$

$y=1$ 을 ㉑에 대입하면 $x=2$

따라서 $5^x + 25^y$ 은 $x=2, y=1$ 일 때 최소이고, 최솟값은 50이므로

$$\alpha = 2, \beta = 1, \gamma = 50$$

$$\therefore \alpha\beta\gamma = 2 \times 1 \times 50 = 100$$

30 ㉔②

$$y = 2^{x+a} + \left(\frac{1}{2}\right)^{x-a} = 2^{x+a} + 2^{-x+a}$$

$2^{x+a} > 0, 2^{-x+a} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$2^{x+a} + 2^{-x+a} \geq 2\sqrt{2^{x+a} \times 2^{-x+a}} \\ = 2\sqrt{2^{2a}} = 2 \times 2^a$$

$= 2^{a+1}$ (단, 등호는 $x=0$ 일 때 성립)

따라서 주어진 함수의 최솟값은 2^{a+1} 이므로

$$2^{a+1} = 4, 2^{a+1} = 2^2$$

$$a+1=2 \quad \therefore a=1$$

등호는 $2^{x+a} = 2^{-x+a}$ 일 때
성립하므로
 $x+a = -x+a$
 $\therefore x=0$

30-1 ㉔ 12

$a^x + a^{-x} = t$ 라 하면

$$a^{2x} + a^{-2x} = (a^x + a^{-x})^2 - 2 = t^2 - 2 \text{이므로}$$

$$y = 4(a^x + a^{-x}) - (a^{2x} + a^{-2x}) + k$$

$$= 4(a^x + a^{-x}) - (a^{2x} + a^{-2x}) + k$$

$$= 4t - (t^2 - 2) + k$$

$$= -t^2 + 4t + k + 2$$

$$= -(t-2)^2 + k + 6 \quad \dots\dots ㉑$$

이때 $a > 0, a \neq 1$ 이므로 $a^x > 0, a^{-x} > 0$

즉 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$t = a^x + a^{-x} \geq 2\sqrt{a^x \times a^{-x}} = 2 \quad (\text{단, 등호는 } x=0 \text{일 때 성립})$$

$\dots\dots ㉒$

$$\therefore y = -(t-2)^2 + k + 6 \quad (t \geq 2)$$

따라서 주어진 함수는 $t=2$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $k+6$ 이므로

$$k+6=18 \quad \therefore k=12 \quad \dots\dots ㉓$$

채점 기준	비율
① $a^x + a^{-x} = t$ 로 치환한 후 주어진 함수를 t 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
② 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 t 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
③ k 의 값을 구할 수 있다.	30%

31 ㉔③

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{2x^2-7} = \left(\frac{3}{2}\right)^{4-x} \text{에서 } \left(\frac{2}{3}\right)^{2x^2-7} = \left(\frac{2}{3}\right)^{x-4}$$

$$2x^2 - 7 = x - 4, 2x^2 - x - 3 = 0$$

$$(x+1)(2x-3)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=\frac{3}{2}$$

따라서 모든 실수 x 의 값의 합은

$$-1 + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

31-1 ㉔②

$$2^x = (\sqrt{2})^{1-x} \text{에서 } 2^x = 2^{\frac{1}{2}(1-x)}$$

$$x^2 = \frac{1}{2}(1-x), 2x^2 + x - 1 = 0$$

$$(x+1)(2x-1)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=\frac{1}{2}$$

따라서 모든 실근의 합은

$$-1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

32 ㉔④

$$8^x = 4^{x-3} \text{에서 } 2^{3x} = 2^{2x-6}$$

$$3x = 2x - 6 \quad \therefore x = -6, \text{ 즉 } a = -6$$

$$9\sqrt{3} = \left(\frac{1}{3}\right)^x \text{에서 } 3^{\frac{5}{2}} = 3^{-x}$$

$$\frac{5}{2} = -x \quad \therefore x = -\frac{5}{2}, \text{ 즉 } b = -\frac{5}{2}$$

$$\therefore ab = -6 \times \left(-\frac{5}{2}\right) = 15$$

32-1 ㉔④

$$(3^{x-2} - 81)(6^{-2x+8} - 36) = 0 \text{에서}$$

$$3^{x-2} = 81 \text{ 또는 } 6^{-2x+8} = 36$$

$$3^{x-2} = 81 \text{에서 } 3^{x-2} = 3^4$$

$$x-2=4 \quad \therefore x=6$$

$$6^{-2x+8} = 36 \text{에서 } 6^{-2x+8} = 6^2$$

$$-2x+8=2 \quad \therefore x=3$$

따라서 주어진 방정식의 두 실근이 6, 3이므로

$$\alpha\beta = 6 \times 3 = 18$$

33 ㉔ 4

$$125^x = 5^{x^2+a} \text{에서 } 5^{3x} = 5^{x^2+a}$$

$$3x = x^2 + a, x^2 - 3x + a = 0$$

한 근이 -1 이므로 $x=-1$ 을 대입하면

$$1+3+a=0 \quad \therefore a=-4$$

$$\text{즉 } x^2 - 3x - 4 = 0 \text{에서 } (x+1)(x-4) = 0 \text{이므로}$$

$$x=-1 \text{ 또는 } x=4$$

따라서 다른 한 근은 4이다.

33-1 ㉔ $-\frac{1}{2}$

$$\left(\frac{1}{9}\right)^{2x^2+a} = \left(\frac{1}{27}\right)^{2x} \text{에서 } \left(\frac{1}{3}\right)^{2(2x^2+a)} = \left(\frac{1}{3}\right)^{6x}$$

$$2(2x^2+a) = 6x, 2x^2 + a = 3x$$

$$2x^2 - 3x + a = 0$$

한 근이 2이므로 $x=2$ 를 대입하면

$$8-6+a=0 \quad \therefore a=-2$$

즉 $2x^2 - 3x - 2 = 0$ 에서 $(2x+1)(x-2) = 0$ 이므로
 $x = -\frac{1}{2}$ 또는 $x = 2$
 따라서 다른 한 근은 $-\frac{1}{2}$ 이다.

34 ㉡ 4

$4^{x+1} - 5 \times 2^x + 1 = 0$ 에서 $4 \times (2^x)^2 - 5 \times 2^x + 1 = 0$
 $2^x = t$ ($t > 0$)라 하면 주어진 방정식은
 $4t^2 - 5t + 1 = 0, (4t-1)(t-1) = 0$
 $\therefore t = \frac{1}{4}$ 또는 $t = 1$
 따라서 $2^x = \frac{1}{4} = 2^{-2}$ 또는 $2^x = 1 = 2^0$ 이므로
 $x = -2$ 또는 $x = 0$
 $\therefore \alpha^2 + \beta^2 = (-2)^2 + 0 = 4$

34-1 ㉡ ①

$9^x - 4 \times 3^{x+1} + 27 = 0$ 에서 $(3^x)^2 - 12 \times 3^x + 27 = 0$
 $3^x = t$ ($t > 0$)라 하면 주어진 방정식은
 $t^2 - 12t + 27 = 0, (t-3)(t-9) = 0$
 $\therefore t = 3$ 또는 $t = 9$
 즉 $3^x = 3$ 또는 $3^x = 9 = 3^2$ 이므로
 $x = 1$ 또는 $x = 2$
 따라서 $\alpha = 1, \beta = 2$ 이므로
 $\beta - \alpha = 2 - 1 = 1$

35 ㉡ ①

$3^x + 3^{3-x} = 12$ 의 양변에 3^x 을 곱하면
 $(3^x)^2 + 3^3 = 12 \times 3^x \quad \therefore (3^x)^2 - 12 \times 3^x + 27 = 0$
 $3^x = t$ ($t > 0$)라 하면 주어진 방정식은
 $t^2 - 12t + 27 = 0, (t-3)(t-9) = 0$
 $\therefore t = 3$ 또는 $t = 9$
 즉 $3^x = 3$ 또는 $3^x = 9 = 3^2$ 이므로
 $x = 1$ 또는 $x = 2$
 따라서 $\alpha = 1, \beta = 2$ 이므로
 $\beta - \alpha = 2 - 1 = 1$

35-1 ㉡ ②

$3 - 2\sqrt{2} = \frac{1}{3+2\sqrt{2}}$ 이므로
 $(3+2\sqrt{2})^x + (3-2\sqrt{2})^x = 6$ 에서
 $(3+2\sqrt{2})^x + (3+2\sqrt{2})^{-x} = 6$
 양변에 $(3+2\sqrt{2})^x$ 을 곱하면
 $\{(3+2\sqrt{2})^x\}^2 + 1 = 6(3+2\sqrt{2})^x$
 $\therefore \{(3+2\sqrt{2})^x\}^2 - 6(3+2\sqrt{2})^x + 1 = 0$
 $(3+2\sqrt{2})^x = t$ ($t > 0$)라 하면 주어진 방정식은
 $t^2 - 6t + 1 = 0$
 $\therefore t = 3 - 2\sqrt{2} = (3+2\sqrt{2})^{-1}$ 또는 $t = 3 + 2\sqrt{2}$
 따라서 $(3+2\sqrt{2})^x = (3+2\sqrt{2})^{-1}$ 또는 $(3+2\sqrt{2})^x = 3 + 2\sqrt{2}$ 이
 므로 $x = -1$ 또는 $x = 1$
 $\therefore \alpha^2 + \beta^2 = (-1)^2 + 1^2 = 2$

36 ㉡ 64

$9^x + 27^x = 8 \times 3^{x+2}$ 에서 $(3^x)^2 + (3^x)^3 = 72 \times 3^x$

$3^x = t$ ($t > 0$)라 하면 주어진 방정식은
 $t^2 + t^3 = 72t, t^3 + t^2 - 72t = 0$ ①
 $t(t^2 + t - 72) = 0, t(t+9)(t-8) = 0$
 $\therefore t = 8$ ($\because t > 0$) ②
 따라서 $3^a = 8$ 이므로
 $9^a = (3^a)^2 = 8^2 = 64$ ③

채점 기준	비율
① $3^x = t$ 로 치환하여 주어진 방정식을 t 에 대한 방정식으로 나타낼 수 있다.	40%
② t 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ 9^a 의 값을 구할 수 있다.	20%

36-1 ㉡ ④

$8^x + 2 \times 4^x = 2^{x+2} + 8$ 에서 $(2^x)^3 + 2 \times (2^x)^2 = 4 \times 2^x + 8$
 $2^x = t$ ($t > 0$)라 하면 주어진 방정식은
 $t^3 + 2t^2 = 4t + 8, t^3 + 2t^2 - 4t - 8 = 0$
 $(t+2)^2(t-2) = 0 \quad \therefore t = 2$ ($\because t > 0$)
 따라서 $2^a = 2$ 이므로 $a = 1 \quad \therefore 4^a = 4$

37 ㉡ $\sqrt{2}$

$4^x - k \times 2^{x+1} + k^2 - 2 = 0$ 에서 $(2^x)^2 - 2k \times 2^x + k^2 - 2 = 0$
 $2^x = t$ ($t > 0$)라 하면 주어진 방정식은
 $t^2 - 2kt + k^2 - 2 = 0$ ㉠
 주어진 방정식이 서로 다른 두 실근을 가지려면 이차방정식 ㉠이
 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 하므로
 (i) 이차방정식 ㉠의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = (-k)^2 - (k^2 - 2) = 2 > 0$
 (ii) (두 근의 합) $= 2k > 0 \quad \therefore k > 0$
 (iii) (두 근의 곱) $= k^2 - 2 > 0$
 $\therefore k < -\sqrt{2}$ 또는 $k > \sqrt{2}$
 (i)~(iii)에서 $k > \sqrt{2} \quad \therefore a = \sqrt{2}$

Lecture 이차방정식의 실근의 부호

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 실근을 α, β , 판별식을 D 라 하면

- (1) 두 근이 모두 양수 $\Rightarrow D \geq 0, \alpha + \beta > 0, \alpha\beta > 0$
- (2) 두 근이 모두 음수 $\Rightarrow D \geq 0, \alpha + \beta < 0, \alpha\beta > 0$
- (3) 두 근이 서로 다른 부호 $\Rightarrow \alpha\beta < 0$

37-1 ㉡ 5

$4^x - k \times 2^{x-1} + 1 = 0$ 에서 $(2^x)^2 - k \times \frac{1}{2} \times 2^x + 1 = 0$
 $\therefore 2 \times (2^x)^2 - k \times 2^x + 2 = 0$
 $2^x = t$ ($t > 0$)라 하면 주어진 방정식은
 $2t^2 - kt + 2 = 0$ ㉠
 주어진 방정식이 서로 다른 두 실근을 가지려면 이차방정식 ㉠이
 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 하므로
 (i) 이차방정식 ㉠의 판별식을 D 라 하면
 $D = (-k)^2 - 4 \times 2 \times 2 > 0$
 $k^2 - 16 > 0, (k+4)(k-4) > 0$
 $\therefore k < -4$ 또는 $k > 4$
 (ii) (두 근의 합) $= \frac{k}{2} > 0 \quad \therefore k > 0$
 (iii) (두 근의 곱) $= \frac{2}{2} = 1 > 0$

따라서 정수 k 의 최솟값은 5이다.

$$k=5^{\alpha} \times 5^{\beta}=5^{\alpha+\beta}=5^2=25$$
$$k=3^{\alpha} \times 3^{\beta}=3^{\alpha+\beta}=3$$
$$\therefore 3^{2\alpha} + 3^{2\beta} = 49 - 2 \times 3^\alpha \times 3^\beta = 49 - 2 \times 5 = 39$$
$$6^{\alpha} \times 6^{\beta} = 3 \quad \therefore 6^{\alpha+\beta} = 3$$
$$\alpha + \beta = 3 + 2 = 5$$
$$\alpha + \beta = 1 + 2 = 3$$

(i), (ii)에서 $\alpha\beta=2$

따라서 X, Y 에 대한 연립방정식을 풀었을 때, X 의 값이 6 이상이 면 이 값을 해에서 제외해야 한다.

$$\alpha\beta = 4 \times 2 = 8 \quad \dots\dots 3$$
03. 지수함수 | 047

42 ㉡ 1

$$\begin{aligned} f(-a)f(2b) &= 49 \text{에서 } 7^a \times 7^{-2b} = 7^2 \\ 7^{a-2b} &= 7^2 \quad \therefore a-2b=2 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ f(b-a) &= 7 \text{에서 } 7^{-(b-a)} = 7 \\ 7^{a-b} &= 7 \quad \therefore a-b=1 & \dots\dots \textcircled{㉡} \\ \textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{을 연립하여 풀면 } a=0, b=-1 \\ \therefore a^2+b^2 &= 0^2 + (-1)^2 = 1 \end{aligned}$$

42-1 ㉡ 3

$$\begin{aligned} f(3a-2b) &= 125 \text{에서 } 5^{3a-2b} = 5^3 \\ \therefore 3a-2b &= 3 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ f(a)f(-2b) &= \frac{1}{5} \text{에서 } 5^a \times 5^{-2b} = \frac{1}{5} \\ 5^{a-2b} &= 5^{-1} \quad \therefore a-2b=-1 & \dots\dots \textcircled{㉡} \\ \textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{을 연립하여 풀면 } a=2, b=\frac{3}{2} \\ \therefore ab &= 2 \times \frac{3}{2} = 3 \end{aligned}$$

43 ㉡ -2

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{4}\right)^{x^2} &\leq \left(\frac{1}{16}\right)^{x^2+x-4} \text{에서 } \left(\frac{1}{4}\right)^{x^2} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{2x^2+2x-8} \\ \text{이때 밑 } \frac{1}{4} \text{이 } 0 < \frac{1}{4} < 1 \text{이므로 } x^2 &\geq 2x^2+2x-8 \\ x^2+2x-8 &\leq 0, (x+4)(x-2) \leq 0 \\ \therefore -4 &\leq x \leq 2 \\ \text{따라서 실수 } x \text{의 최댓값은 } 2, \text{ 최솟값은 } -4 \text{이므로 그 합은} \\ 2+(-4) &= -2 \end{aligned}$$

43-1 ㉡ ②

$$\begin{aligned} 5^{2x} &> 25^{x^2-2} \text{에서 } 5^{2x} > 5^{2x^2-4} \\ \text{이때 밑 } 5 \text{가 } 5 > 1 \text{이므로 } 2x &> 2x^2-4 \\ x^2-x-2 &< 0, (x+1)(x-2) < 0 \\ \therefore -1 &< x < 2 \\ \text{따라서 정수 } x \text{의 값은 } 0, 1 \text{이므로 그 개수는 } 2 \text{이다.} \end{aligned}$$

44 ㉡ ②

$$\begin{aligned} 4^{x^2} &< \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{3x-1} \text{에서 } 2^{2x^2} < 2^{-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}} \\ \text{이때 밑 } 2 \text{가 } 2 > 1 \text{이므로 } 2x^2 &< -\frac{3}{2}x+\frac{1}{2} \\ 4x^2+3x-1 &< 0, (x+1)(4x-1) < 0 \\ \therefore -1 &< x < \frac{1}{4} \end{aligned}$$

44-1 ㉡ ①

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{3}\right)^{9-x^2} &< \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-9x} \text{에서 } \left(\frac{1}{3}\right)^{9-x^2} < \left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{9}{2}x} \\ \text{이때 밑 } \frac{1}{3} \text{이 } 0 < \frac{1}{3} < 1 \text{이므로 } 9-x^2 &> -\frac{9}{2}x \\ 2x^2-9x-18 &< 0, (2x+3)(x-6) < 0 \\ \therefore -\frac{3}{2} &< x < 6 \\ \text{따라서 정수 } x \text{의 값은 } -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 \text{이므로 그 합은} \\ -1+0+1+2+3+4+5 &= 14 \end{aligned}$$

45 ㉡ ④

$$\begin{aligned} 3^{x^2} &< 9 \times 3^x \text{에서 } 3^{x^2} < 3^{x+2} \\ \text{이때 밑 } 3 \text{이 } 3 > 1 \text{이므로 } x^2 &< x+2 \\ x^2-x-2 &< 0, (x+1)(x-2) < 0 \\ \therefore -1 &< x < 2 \\ \text{따라서 } a=-1, b=2 \text{이므로} \\ a+b &= -1+2=1 \end{aligned}$$

45-1 ㉡ ④

$$\begin{aligned} 2^{x^2} &\leq 8 \times \left(\frac{1}{4}\right)^x \text{에서 } 2^{x^2} \leq 2^{3-2x} \\ \text{이때 밑 } 2 \text{가 } 2 > 1 \text{이므로 } x^2 &\leq 3-2x \\ x^2+2x-3 &\leq 0, (x+3)(x-1) \leq 0 \\ \therefore -3 &\leq x \leq 1 \\ \text{따라서 } a=-3, b=1 \text{이므로} \\ \beta-a &= 1-(-3)=4 \end{aligned}$$

46 ㉡ 2

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{4}\right)^x - 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 16 &\leq 0 \text{에서 } \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^x\right\}^2 - 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x + 16 \leq 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^x &= t \ (t > 0) \text{라 하면 주어진 부등식은} \\ t^2 - 10t + 16 &\leq 0, (t-2)(t-8) \leq 0 \\ \therefore 2 &\leq t \leq 8 \\ \text{즉 } \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} &\leq \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \text{이고 밑 } \frac{1}{2} \text{이 } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로} \\ -3 &\leq x \leq -1 \\ \text{따라서 } M=-1, m=-3 \text{이므로} \\ M-m &= -1-(-3)=2 \end{aligned}$$

46-1 ㉡ ④

$$\begin{aligned} 9^x + 2 \times 3^x &\geq 15 \text{에서 } (3^x)^2 + 2 \times 3^x - 15 \geq 0 \\ 3^x = t \ (t > 0) \text{라 하면 주어진 부등식은} \\ t^2 + 2t - 15 &\geq 0, (t+5)(t-3) \geq 0 \\ \therefore t &\leq -5 \text{ 또는 } t \geq 3 \\ \text{그런데 } t > 0 \text{이므로 } t &\geq 3 \\ \text{즉 } 3^x &\geq 3 \text{이고 밑 } 3 \text{이 } 3 > 1 \text{이므로 } x \geq 1 \\ \text{따라서 실수 } x \text{의 최솟값은 } 1 \text{이다.} \end{aligned}$$

47 ㉡ ②

$$\begin{aligned} 3^{2x+1} + a \times 3^x + b &\leq 0 \text{에서 } 3 \times (3^x)^2 + a \times 3^x + b \leq 0 \\ 3^x = t \ (t > 0) \text{라 하면 주어진 부등식은} \\ 3t^2 + at + b &\leq 0 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ \text{이때 } -1 \leq x \leq 2 \text{에서 } 3^{-1} &\leq 3^x \leq 3^2 \\ \therefore \frac{1}{3} &\leq t \leq 9 \\ \text{해가 } \frac{1}{3} \leq t \leq 9 \text{이고 } t^2 \text{의 계수가 } 3 \text{인 이차부등식은} \\ 3\left(t-\frac{1}{3}\right)(t-9) &\leq 0 \quad \therefore 3t^2 - 28t + 9 \leq 0 \\ \text{이 부등식이 } \textcircled{㉠} \text{과 일치해야 하므로} \\ a &= -28, b = 9 \\ \therefore a+b &= -28+9 = -19 \end{aligned}$$

47-1 ㉔ ④

$\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} - a \times \left(\frac{1}{5}\right)^x + b > 0$ 에서
 $\frac{1}{5} \times \left[\left(\frac{1}{5}\right)^x\right]^2 - a \times \left(\frac{1}{5}\right)^x + b > 0$
 $\left(\frac{1}{5}\right)^x = t \ (t > 0)$ 라 하면 주어진 부등식은
 $\frac{1}{5}t^2 - at + b > 0 \quad \therefore t^2 - 5at + 5b > 0 \quad \dots\dots ㉑$
 이때 $x < -1$ 또는 $x > 0$ 에서 $\left(\frac{1}{5}\right)^x > \left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$ 또는 $\left(\frac{1}{5}\right)^x < \left(\frac{1}{5}\right)^0$
 $\therefore t < 1$ 또는 $t > 5$
 해가 $t < 1$ 또는 $t > 5$ 이고 t^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(t-1)(t-5) > 0 \quad \therefore t^2 - 6t + 5 > 0$
 이 부등식이 ㉑과 일치해야 하므로
 $-5a = -6, 5b = 5 \quad \therefore a = \frac{6}{5}, b = 1$
 $\therefore 5ab = 5 \times \frac{6}{5} \times 1 = 6$

48 ㉔ 9

$9^x - 35 \times 3^{x+1} - 500 < 0$ 에서 $(3^x)^2 - 105 \times 3^x - 500 < 0$
 $3^x = t \ (t > 0)$ 라 하면 주어진 부등식은
 $t^2 - 105t - 500 < 0 \quad \dots\dots ①$
 $(t-5)(t-100) < 0 \quad \therefore 5 < t < 100 \quad \dots\dots ②$
 즉 $5 < 3^x < 100$ 이므로 주어진 부등식을 만족시키는 자연수 x 의 값은 2, 3, 4이다.
 따라서 모든 자연수 x 의 값의 합은
 $2+3+4=9 \quad \dots\dots ③$

채점 기준	비율
① $3^x = t$ 로 치환하여 주어진 부등식을 t 에 대한 부등식으로 나타낼 수 있다.	40%
② t 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
③ 자연수 x 의 값의 합을 구할 수 있다.	30%

48-1 ㉔ 26

$4^x - 5 \times 2^{x+6} - 6000 < 0$ 에서 $(2^x)^2 - 320 \times 2^x - 6000 < 0$
 $2^x = t \ (t > 0)$ 라 하면 주어진 부등식은
 $t^2 - 320t - 6000 < 0, (t-20)(t-300) < 0$
 $\therefore 20 < t < 300$
 즉 $20 < 2^x < 300$ 이므로 주어진 부등식을 만족시키는 자연수 x 의 값은 5, 6, 7, 8이다.
 따라서 모든 자연수 x 의 값의 합은
 $5+6+7+8=26$

49 ㉔ 3

$\left(\frac{1}{5}\right)^{3-x} < 5^{x^2-1} < \left(\frac{1}{25}\right)^{x-1}$ 에서 $5^{-3+x} < 5^{x^2-1} < 5^{-2x+2}$
 밑 5가 $5 > 1$ 이므로 $x-3 < x^2-1 < -2x+2$
 (i) $x-3 < x^2-1$ 에서 $x^2-x+2 > 0$
 이때 $x^2-x+2 = \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0$ 이므로 이 부등식은 항상 성립한다.
 (ii) $x^2-1 < -2x+2$ 에서 $x^2+2x-3 < 0$
 $(x+3)(x-1) < 0 \quad \therefore -3 < x < 1$
 (i), (ii)에서 $-3 < x < 1$
 따라서 정수 x 의 값은 -2, -1, 0이므로 그 개수는 3이다.

49-1 ㉔ ③

$\left(\frac{1}{8}\right)^{2x+1} < 32 < \left(\frac{1}{2}\right)^{3x-9}$ 에서 $\left(\frac{1}{2}\right)^{6x+3} < \left(\frac{1}{2}\right)^{-5} < \left(\frac{1}{2}\right)^{3x-9}$
 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 $3x-9 < -5 < 6x+3$
 (i) $3x-9 < -5$ 에서 $3x < 4 \quad \therefore x < \frac{4}{3}$
 (ii) $-5 < 6x+3$ 에서 $6x > -8 \quad \therefore x > -\frac{4}{3}$
 (i), (ii)에서 $-\frac{4}{3} < x < \frac{4}{3}$
 따라서 정수 x 의 값은 -1, 0, 1이므로 그 개수는 3이다.

50 ㉔ -6 ≤ x ≤ 2

$\left(\frac{2}{3}\right)^{3x} \geq \left(\frac{3}{2}\right)^{2(x-5)}$ 에서 $\left(\frac{2}{3}\right)^{3x} \geq \left(\frac{2}{3}\right)^{-2x+10}$
 밑 $\frac{2}{3}$ 가 $0 < \frac{2}{3} < 1$ 이므로 $3x \leq -2x+10$
 $5x \leq 10 \quad \therefore x \leq 2 \quad \dots\dots ㉑$
 $8^{x^2+2x-4} \leq 4^{x^2+x}$ 에서 $2^{3x^2+6x-12} \leq 2^{2x^2+2x}$
 밑 2가 $2 > 1$ 이므로 $3x^2+6x-12 \leq 2x^2+2x$
 $x^2+4x-12 \leq 0, (x+6)(x-2) \leq 0$
 $\therefore -6 \leq x \leq 2 \quad \dots\dots ㉒$
 ㉑, ㉒의 공통 범위는 $-6 \leq x \leq 2$

50-1 ㉔ 1

$\left(\frac{1}{4}\right)^{x+1} < \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 에서 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x+2} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}$
 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 $2x+2 > \frac{3}{2}$
 $2x > -\frac{1}{2} \quad \therefore x > -\frac{1}{4} \quad \dots\dots ㉑$
 $9^{x+1} - 28 \times 3^x + 3 \leq 0$ 에서 $9 \times (3^x)^2 - 28 \times 3^x + 3 \leq 0$
 $3^x = t \ (t > 0)$ 라 하면 $9t^2 - 28t + 3 \leq 0$
 $(9t-1)(t-3) \leq 0 \quad \therefore \frac{1}{9} \leq t \leq 3$
 즉 $3^{-2} \leq 3^x \leq 3$ 이고 밑 3이 $3 > 1$ 이므로
 $-2 \leq x \leq 1 \quad \dots\dots ㉒$
 ㉑, ㉒의 공통 범위는 $-\frac{1}{4} < x \leq 1$
 따라서 정수 x 의 값은 0, 1이므로 그 합은
 $0+1=1$

51 ㉔ 2

$2^{2x+2} + 4 \leq 65 \times 2^{x-1}$ 에서 $4 \times (2^x)^2 + 4 \leq \frac{65}{2} \times 2^x$
 $2^x = t \ (t > 0)$ 라 하면 $4t^2 + 4 \leq \frac{65}{2}t$
 $8t^2 - 65t + 8 \leq 0, (8t-1)(t-8) \leq 0$
 $\therefore \frac{1}{8} \leq t \leq 8$
 즉 $2^{-3} \leq 2^x \leq 2^3$ 이고 밑 2가 $2 > 1$ 이므로
 $-3 \leq x \leq 3 \quad \dots\dots ㉑$
 $9^x - 3^x > 6$ 에서 $(3^x)^2 - 3^x > 6$
 $3^x = s \ (s > 0)$ 라 하면 $s^2 - s > 6$
 $s^2 - s - 6 > 0, (s+2)(s-3) > 0$
 $\therefore s < -2$ 또는 $s > 3$

그런데 $s > 0$ 이므로 $s > 3$
 즉 $3^x > 3$ 이고 밑 3이 $3 > 1$ 이므로
 $x > 1$ ㉔
 ㉑, ㉔의 공통 범위는 $1 < x \leq 3$
 따라서 $\alpha = 1, \beta = 3$ 이므로
 $\beta - \alpha = 3 - 1 = 2$

51-1 ㉔ ㉔

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{3x} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1} \text{에서 } \left(\frac{1}{2}\right)^{6x} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1}$$

$$\text{밑 } \frac{1}{2} \text{이 } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로 } 6x \geq 2x - 1$$

$$4x \geq -1 \quad \therefore x \geq -\frac{1}{4} \quad \text{.....㉑}$$

$$125^x > 0.2^{4-x^2} \text{에서 } 5^{3x} > 5^{x^2-4}$$

$$\text{밑 } 5 \text{가 } 5 > 1 \text{이므로 } 3x > x^2 - 4$$

$$x^2 - 3x - 4 < 0, (x+1)(x-4) < 0$$

$$\therefore -1 < x < 4 \quad \text{.....㉒}$$

$$\text{㉑, ㉒의 공통 범위는 } -\frac{1}{4} \leq x < 4$$

$$\text{따라서 } \alpha = -\frac{1}{4}, \beta = 4 \text{이므로}$$

$$\alpha\beta = -\frac{1}{4} \times 4 = -1$$

유형 완성하기

p.80

52 ㉔ ㉑

$$9^x - 2 \times 3^{x+1} + 2k - 1 > 0 \text{에서 } (3^x)^2 - 6 \times 3^x + 2k - 1 > 0$$

$$3^x = t \ (t > 0) \text{라 하면 주어진 부등식은}$$

$$t^2 - 6t + 2k - 1 > 0 \quad \therefore (t-3)^2 + 2k - 10 > 0$$

$$\text{이 부등식이 } t > 0 \text{인 모든 실수 } t \text{에 대하여 항상 성립하려면}$$

$$2k - 10 > 0 \quad \therefore k > 5$$

$$\text{따라서 정수 } k \text{의 최솟값은 } 6 \text{이다.}$$

53 ㉔ ㉓

$$\left(\frac{1}{36}\right)^x - 2 \times \left(\frac{1}{6}\right)^x + k + 3 \geq 0 \text{에서}$$

$$\left\{\left(\frac{1}{6}\right)^x\right\} - 2 \times \left(\frac{1}{6}\right)^x + k + 3 \geq 0$$

$$\left(\frac{1}{6}\right)^x = t \ (t > 0) \text{라 하면 주어진 부등식은}$$

$$t^2 - 2t + k + 3 \geq 0 \quad \therefore (t-1)^2 + k + 2 \geq 0$$

$$\text{이 부등식이 } t > 0 \text{인 모든 실수 } t \text{에 대하여 항상 성립하려면}$$

$$k + 2 \geq 0 \quad \therefore k \geq -2$$

$$\text{따라서 실수 } k \text{의 최솟값은 } -2 \text{이다.}$$

54 ㉔ $k \leq 3$

$$4^x - k \times 2^{x+1} + 9 \geq 0 \text{에서 } (2^x)^2 - 2k \times 2^x + 9 \geq 0$$

$$2^x = t \ (t > 0) \text{라 하면 주어진 부등식은}$$

$$t^2 - 2kt + 9 \geq 0 \quad \therefore (t-k)^2 - k^2 + 9 \geq 0 \quad \text{.....㉑} \quad \text{.....㉑}$$

부등식 ㉑이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 항상 성립하려면

(i) $k > 0$ 일 때

$$-k^2 + 9 \geq 0 \text{에서 } k^2 - 9 \leq 0$$

$$(k+3)(k-3) \leq 0 \quad \therefore -3 \leq k \leq 3$$

$$\text{그런데 } k > 0 \text{이므로 } 0 < k \leq 3 \quad \text{.....㉒}$$

(ii) $k \leq 0$ 일 때

$$t = 0 \text{이면 ㉑에서 } 9 \geq 0 \text{이므로 } t > 0 \text{인 모든 실수 } t \text{에 대하여 부}$$

$$\text{등식 ㉑이 항상 성립한다.} \quad \text{.....㉓}$$

(i), (ii)에서 $k \leq 3$ ㉔

채점 기준	비율
① $2^x = t$ 로 치환하여 주어진 부등식을 t 에 대한 부등식으로 나타낼 수 있다.	30%
② $k > 0$ 일 때, k 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
③ $k \leq 0$ 일 때, k 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
④ 조건을 만족시키는 k 의 값의 범위를 구할 수 있다.	10%

55 ㉔ 8m

호수에서 빛의 세기가 수면에서의 빛의 세기의 $\frac{1}{4}$ 인 곳의 수심을 d m라 하자.

이때 수심이 d m인 곳에서의 빛의 세기는 $\frac{1}{4}I_0$ 이므로

$$\frac{1}{4}I_0 = I_0 \times 2^{-0.25d}, 2^{-2} = 2^{-0.25d}$$

$$-2 = -0.25d \quad \therefore d = \frac{2}{0.25} = 8$$

따라서 호수에서 빛의 세기가 수면에서의 빛의 세기의 $\frac{1}{4}$ 인 곳의 수심은 8 m이다.

56 ㉔ ㉓

100마리의 박테리아가 12시간 후에 1600마리가 되므로

$$100a^{12} = 1600, a^{12} = 16$$

$$a^{12} = 2^4 \quad \therefore a = 2^{\frac{1}{3}}$$

100마리의 박테리아가 t 시간 후에 6400마리가 된다고 하면

$$100 \times (2^{\frac{1}{3}})^t = 6400, 2^{\frac{1}{3}t} = 64$$

$$2^{\frac{1}{3}t} = 2^6, \frac{1}{3}t = 6 \quad \therefore t = 18$$

따라서 100마리의 박테리아가 6400마리가 되는 것은 처음으로부터 18시간 후이다.

57 ㉔ 12시간

4시간 후에 해충의 수가 처음의 $\frac{3}{5}$ 이 되므로 $4n$ (n 은 자연수)시간

후에 해충의 수는 처음의 $\left(\frac{3}{5}\right)^n$ 이다.

$$21.6\% = \frac{216}{10^3} = \frac{2^3 \times 3^3}{2^3 \times 5^3} = \left(\frac{3}{5}\right)^3 \text{이고 해충의 수가 처음의 } 21.6\%$$

이하가 되어야 하므로

$$\left(\frac{3}{5}\right)^n \leq \left(\frac{3}{5}\right)^3$$

$$\text{이때 밑 } \frac{3}{5} \text{이 } 0 < \frac{3}{5} < 1 \text{이므로 } n \geq 3$$

따라서 해충의 수가 처음의 21.6% 이하가 되려면 최소

$$4 \times 3 = 12 \text{(시간)이 걸린다.}$$

01 ㉔ ④

$g(f(x))=x$ 이므로 $g(x)$ 는 함수 $f(x)$ 의 역함수이다.

$g(27)=k$ 라 하면 $f(k)=27$ 이므로

$$3^{k+1}=27, 3^{k+1}=3^3$$

$$k+1=3 \quad \therefore k=2$$

$$\therefore g(27)=2$$

Lecture 함수의 역함수와 합성값

함수 $y=f(x)$ 의 역함수를 $y=g(x)$ 라 할 때

$$(1) f(g(x))=x$$

$$(2) f(a)=b \iff g(b)=a$$

02 ㉔ 1 < a < 2 또는 2 < a < 3

$f(x)=(a^2-4a+4)^x$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하려면 $0 < a^2-4a+4 < 1$

(i) $0 < a^2-4a+4$ 에서

$$a^2-4a+4=(a-2)^2 > 0 \quad (\because a \neq 2)$$

이므로 항상 성립한다.

(ii) $a^2-4a+4 < 1$ 에서 $a^2-4a+3 < 0$

$$(a-1)(a-3) < 0 \quad \therefore 1 < a < 3$$

(i), (ii)에서 $1 < a < 2$ 또는 $2 < a < 3$

03 ㉔ $\frac{71}{9}$

점 A의 좌표를 (α, β) 라 하면

$$\triangle AOB = \frac{1}{2} \times 4 \times \beta = 16$$

$$\therefore \beta = 8$$

즉 $y=2^x-1$ 의 그래프가 점 $(\alpha, 8)$ 을 지나므로

$$8=2^\alpha-1 \quad \therefore 2^\alpha=9 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또 $y=2^{-x}+a$ 의 그래프가 점 $(\alpha, 8)$ 을 지나므로

$$8=2^{-\alpha}+a \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①을 ②에 대입하면


$$8=\frac{1}{9}+a \quad \therefore a=\frac{71}{9}$$

04 ㉔ ③

ㄱ. 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $-y=2^x \quad \therefore y=-2^x$

ㄴ. 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=2^{x-1}$

즉 두 함수 $y=2^x, y=2^{x-1}$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 $y=2^{x-1}$ 의 그래프가 $y=2^x$ 의 그래프보다 아래에 위치한다.



ㄷ. $y=\sqrt{2} \times 2^x=2^{\frac{1}{2}} \times 2^x=2^{x+\frac{1}{2}}$ 이므로 $y=2^{x+\frac{1}{2}}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y=2^{(x-\frac{1}{2})+\frac{1}{2}} \quad \therefore y=2^x$$

즉 $y=\sqrt{2} \times 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 평행이동하면 $y=2^x$ 의 그래프와 겹쳐질 수 있다.

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

05 ㉔ ①

$$\sqrt[4]{8\sqrt[3]{4}}=(2^3 \times 2^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{4}}=(2^{\frac{11}{3}})^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{11}{12}}$$

$$\left(\frac{1}{32}\right)^{-\frac{1}{6}}=(2^{-5})^{-\frac{1}{6}}=2^{\frac{5}{6}}$$

$$(2^{\frac{9}{2}} \times 4^{\frac{1}{8}})^{\frac{3}{19}}=(2^{\frac{9}{2}} \times 2^{\frac{1}{4}})^{\frac{3}{19}}=(2^{\frac{19}{4}})^{\frac{3}{19}}=2^{\frac{3}{4}}$$

$$\sqrt{\sqrt{2^8}}=(2^8)^{\frac{1}{8}}=2$$

이때 $\frac{3}{4} < \frac{5}{6} < \frac{11}{12} < 1$ 이고 밑 2가 $2 > 1$ 이므로

$$2^{\frac{3}{4}} < 2^{\frac{5}{6}} < 2^{\frac{11}{12}} < 2$$

따라서 $M=2, m=2^{\frac{3}{4}}$ 이므로

$$\frac{M}{m}=\frac{2}{2^{\frac{3}{4}}}=2^{1-\frac{3}{4}}=2^{\frac{1}{4}}$$

06 ㉔ ④

$$f(x)=3^{-2x} \times 4^x=\left(\frac{4}{9}\right)^x$$

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $f(x)=\left(\frac{4}{9}\right)^x$ 은 밑 $\frac{4}{9}$ 가 $0 < \frac{4}{9} < 1$ 이므로

$x=-2$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$$f(-2)=\left(\frac{4}{9}\right)^{-2}=\frac{81}{16}$$

$x=1$ 일 때 최소이고, 최솟값은

$$f(1)=\left(\frac{4}{9}\right)^1=\frac{4}{9}$$

따라서 주어진 함수의 최댓값과 최솟값의 곱은

$$\frac{81}{16} \times \frac{4}{9}=\frac{9}{4}$$

07 ㉔ ①

$f(x)=x^2-4x+1$ 이라 하면 $f(x)=(x-2)^2-3$

$0 \leq x \leq 3$ 에서 $f(0)=1, f(2)=-3, f(3)=-2$

$$\therefore -3 \leq f(x) \leq 1$$

밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)}$ 은

$f(x)=-3$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은 $M=\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}=8$

$f(x)=1$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은 $m=\left(\frac{1}{2}\right)^1=\frac{1}{2}$

$$\therefore Mm=8 \times \frac{1}{2}=4$$

08 ㉔ ③

$$f(x)=x^2-6x+3=(x-3)^2-6$$

$1 \leq x \leq 4$ 에서 $f(1)=-2, f(3)=-6, f(4)=-5$

$$\therefore -6 \leq f(x) \leq -2$$

$(g \circ f)(x)=g(f(x))=a^{f(x)}$ 이고 밑 a 가 $0 < a < 1$ 이므로

함수 $y=a^{f(x)}$ 은 $f(x)=-6$ 일 때 최댓값 27을 갖는다.

$$\text{즉 } a^{-6}=27 \text{이므로 } (a^{-2})^3=3^3 \quad \therefore a^{-2}=3$$

따라서 함수 $(g \circ f)(x)=a^{f(x)}$ 은 $f(x)=-2$ 일 때 최솟값 m 을 가지므로

$$m=a^{-2}=3$$

09 ㉔ ④

$$y=4^x-\left(\frac{1}{2}\right)^{-x-3}+a=4^x-2^{x+3}+a=(2^x)^2-8\times 2^x+a$$

$2^x=t$ ($t>0$)라 하면 주어진 함수는

$$y=t^2-8t+a=(t-4)^2+a-16$$

주어진 함수는 $t=4$, 즉 $x=b=2$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $a-16$ 이므로

$$a-16=-10 \quad \therefore a=6$$

$$\therefore b-a=2-6=-4$$

10 ㉔ 1

$$x+4y-2=0 \text{에서 } x+4y=2 \quad \dots\dots ㉔$$

$2^x>0, 2^{4y}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$2^x+2^{4y}\geq 2\sqrt{2^x\times 2^{4y}}=2\sqrt{2^{x+4y}}=2\sqrt{2^2}=4$$

이때 등호는 $2^x=2^{4y}$ 일 때 성립하므로

$$x=4y \quad \dots\dots ㉔$$

$$㉔, ㉔을 \text{연립하여 풀면 } x=1, y=\frac{1}{4}$$

따라서 2^x+2^{4y} 은 $x=1, y=\frac{1}{4}$ 일 때 최소이고, 최솟값은 4이므로

$$a=1, b=\frac{1}{4}, m=4$$

$$\therefore abm=1\times \frac{1}{4}\times 4=1$$

11 ㉔ ②

$$8^{|x|}=\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-4} \text{에서 } 2^{3|x|}=2^{-x^2+4}$$

$$3|x|=-x^2+4, x^2+3|x|-4=0$$

이때 $x^2=|x|^2$ 이므로

$$|x|^2+3|x|-4=0, (|x|+4)(|x|-1)=0$$

$$\therefore |x|=1 (\because |x|\geq 0)$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=1$$

따라서 모든 실근의 곱은

$$-1\times 1=-1$$

12 ㉔ 1

$$4^x-9\times 2^{x-1}+2=0 \text{에서 } (2^x)^2-\frac{9}{2}\times 2^x+2=0$$

$$\therefore 2\times (2^x)^2-9\times 2^x+4=0$$

$2^x=t$ ($t>0$)라 하면 주어진 방정식은

$$2t^2-9t+4=0, (2t-1)(t-4)=0$$

$$\therefore t=\frac{1}{2} \text{ 또는 } t=4$$

$$\text{즉 } 2^x=\frac{1}{2} \text{ 또는 } 2^x=4 \text{이므로 } x=-1 \text{ 또는 } x=2$$

따라서 $\alpha=-1, \beta=2$ 이므로

$$(\sqrt{2})^{2\alpha+\beta}=(\sqrt{2})^{2\times (-1)+2}=(\sqrt{2})^0=1$$

13 ㉔ ③

$2^x>0, 2^{-x}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
 $t=2^x+2^{-x}\geq 2\sqrt{2^x\times 2^{-x}}=2$ (단, 등호는 $x=0$ 일 때 성립)

$2^x+2^{-x}=t$ ($t\geq 2$)라 하면

$$4^x+4^{-x}=(2^x+2^{-x})^2-2=t^2-2$$

이므로 주어진 방정식은

$$2(t^2-2)-3t-1=0, 2t^2-3t-5=0$$

$$(t+1)(2t-5)=0 \quad \therefore t=\frac{5}{2} (\because t\geq 2)$$

$$\text{즉 } 2^x+2^{-x}=\frac{5}{2} \text{이므로 } 2^x=a \text{ } (a>0) \text{라 하면}$$

$$a+\frac{1}{a}=\frac{5}{2}, 2a^2-5a+2=0$$

$$(2a-1)(a-2)=0 \quad \therefore a=\frac{1}{2} \text{ 또는 } a=2$$

$$\text{즉 } 2^x=\frac{1}{2} \text{ 또는 } 2^x=2 \text{이므로}$$

$$x=-1 \text{ 또는 } x=1$$

따라서 모든 실근의 합은

$$-1+1=0$$

14 ㉔ ②

$$4^{2x}+a\times 4^{x+1}+8=0 \text{에서 } (4^x)^2+4a\times 4^x+8=0$$

$4^x=t$ ($t>0$)라 하면 주어진 방정식은

$$t^2+4at+8=0 \quad \dots\dots ㉔$$

주어진 방정식의 두 근을 $\alpha, 2\alpha$ ($\alpha\neq 0$)라 하면 이차방정식 ㉔의 두

근은 $4^a, 4^{2a}$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$4^a+4^{2a}=-4a, 4^a\times 4^{2a}=8$$

$$4^a\times 4^{2a}=8 \text{에서 } 2^{2a}\times 2^{4a}=2^3$$

$$2^{6a}=2^3, 6a=3 \quad \therefore a=\frac{1}{2}$$

$$a=\frac{1}{2} \text{을 } 4^a+4^{2a}=-4a \text{에 대입하면}$$

$$4^{\frac{1}{2}}+4=-4a, -4a=6 \quad \therefore a=-\frac{3}{2}$$

15 ㉔ ②

$$f(2a)f(b)=4 \text{에서 } 2^{-2a}\times 2^{-b}=4$$

$$2^{-2a-b}=2^2 \quad \therefore 2a+b=-2 \quad \dots\dots ㉔$$

$$f(a-b)=2 \text{에서 } 2^{-(a-b)}=2$$

$$2^{-a+b}=2^1 \quad \therefore a-b=-1 \quad \dots\dots ㉔$$

㉔, ㉔을 연립하여 풀면 $a=-1, b=0$

$$\therefore a+b=-1+0=-1$$

16 ㉔ ③

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{2x-3}<\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2} \text{에서 } \left(\frac{3}{2}\right)^{2x-3}<\left(\frac{3}{2}\right)^{-x^2}$$

$$\text{이때 밑 } \frac{3}{2} \text{이 } \frac{3}{2}>1 \text{이므로 } 2x-3<-x^2$$

$$x^2+2x-3<0, (x+3)(x-1)<0$$

$$\therefore -3<x<1$$

따라서 정수 x 의 값은 $-2, -1, 0$ 이므로 그 개수는 3이다.

17 ㉔ ①

$$5^{2x+1}-6\times 5^x+1<0 \text{에서 } 5\times (5^x)^2-6\times 5^x+1<0$$

$5^x=t$ ($t>0$)라 하면 주어진 부등식은

$$5t^2-6t+1<0, (5t-1)(t-1)<0$$

$$\therefore \frac{1}{5}<t<1$$

$$\text{즉 } 5^{-1}<5^x<5^0 \text{이고 밑 } 5 \text{가 } 5>1 \text{이므로}$$

$$-1<x<0$$

따라서 $\alpha=-1, \beta=0$ 이므로

$$\beta-\alpha=0-(-1)=1$$

18 ㉔ 3

주어진 이차부등식이 모든 실수 x 에 대하여 항상 성립하려면 이차 방정식 $x^2-2(3^a+1)x+10(3^a+1)=0$ 의 판별식을 D 라 할 때,

$D \leq 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = \{-(3^a+1)\}^2 - 10(3^a+1) \leq 0$$

$$(3^a)^2 + 2 \times 3^a + 1 - 10 \times 3^a - 10 \leq 0$$

$$\therefore (3^a)^2 - 8 \times 3^a - 9 \leq 0$$

$$3^a = t \ (t > 0) \text{라 하면 } t^2 - 8t - 9 \leq 0$$

$$(t+1)(t-9) \leq 0 \quad \therefore -1 \leq t \leq 9$$

그런데 $t > 0$ 이므로 $0 < t \leq 9$

즉 $3^a \leq 3^2$ 이고 밑 3이 $3 > 1$ 이므로 $a \leq 2$

따라서 자연수 a 의 값은 1, 2이므로 그 합은

$$1+2=3$$

19 ㉮ ③

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{2x+8} < 2^{-x^2} \text{에서 } 2^{-2x-8} < 2^{-x^2}$$

이때 밑 2가 $2 > 1$ 이므로 $-2x-8 < -x^2$

$$x^2 - 2x - 8 < 0, (x+2)(x-4) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 4 \quad \dots\dots ㉮$$

$$9^{x^2-3} \leq 27^{-x+1} \text{에서 } 3^{2x^2-6} \leq 3^{-3x+3}$$

이때 밑 3이 $3 > 1$ 이므로 $2x^2-6 \leq -3x+3$

$$2x^2 + 3x - 9 \leq 0, (x+3)(2x-3) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq x \leq \frac{3}{2} \quad \dots\dots ㉮$$

$$㉮, ㉮의 \text{공통 범위}는 -2 < x \leq \frac{3}{2}$$

$$\therefore A \cap B = \left\{x \mid -2 < x \leq \frac{3}{2}, x \text{는 정수}\right\} = \{-1, 0, 1\}$$

따라서 집합 $A \cap B$ 의 원소의 개수는 3이다.

참고 $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}, B = \{-3, -2, -1, 0, 1\}$ 이므로
 $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$

20 ㉮ -3

$$9^x - 2 \times 3^x + k + 4 \geq 0 \text{에서 } (3^x)^2 - 2 \times 3^x + k + 4 \geq 0$$

$3^x = t \ (t > 0)$ 라 하면 주어진 부등식은

$$t^2 - 2t + k + 4 \geq 0 \quad \therefore (t-1)^2 + k + 3 \geq 0$$

이 부등식이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 항상 성립하려면

$$k + 3 \geq 0 \quad \therefore k \geq -3$$

따라서 실수 k 의 최솟값은 -3이다.

21 ㉮ 18시간

처음 주사한 양을 A 라 하자.

t 시간 후에 혈액 속에 남은 양이 처음 주사한 양의 $\frac{1}{64}$ 이하가 되려

$$\text{면 } \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^t A \leq \frac{1}{64} A \quad \therefore \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{3}} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^6$$

이때 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로

$$\frac{1}{3}t \geq 6 \quad \therefore t \geq 18$$

따라서 약효의 지속 시간은 18시간이다.

서술형 1 ㉮ 22

점 P_k 의 좌표를 $(a, 2^a)$ 이라 하면 두 점 P_k, Q_k 는 y 좌표가 같으므로

점 Q_k 의 y 좌표는 2^a 이다.

점 Q_k 는 함수 $y = 2^{x-2}$ 의 그래프 위의 점이므로

$$2^a = 2^{x-2} \text{에서 } a = x - 2$$

$$\therefore x = a + 2$$

즉 점 Q_k 의 좌표가 $(a+2, 2^a)$ 이므로

$$\overline{P_k Q_k} = (a+2) - a = 2 \quad \dots\dots ㉮$$

따라서 $\overline{P_k Q_k}$ 의 길이는 k 의 값에 관계없이 항상 2이므로

$$S_k = \frac{1}{2} \times \overline{P_k Q_k} \times k = \frac{1}{2} \times 2 \times k = k \quad \dots\dots ㉮$$

$$\therefore S_1 + S_4 + S_7 + S_{10} = 1 + 4 + 7 + 10 = 22 \quad \dots\dots ㉮$$

채점 기준	비율
㉮ $\overline{P_k Q_k}$ 의 길이를 구할 수 있다.	50%
㉮ S_k 를 k 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30%
㉮ $S_1 + S_4 + S_7 + S_{10}$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

서술형 2 ㉮ 6

$$2^x - 2^{-x} = t \text{라 하면}$$

$$4^x + 4^{-x} = (2^x - 2^{-x})^2 + 2 = t^2 + 2$$

이므로 주어진 방정식은 $t^2 + 2 - kt + 7 = 0$

$$\therefore t^2 - kt + 9 = 0 \quad \dots\dots ㉮ \quad \dots\dots ㉮$$

주어진 방정식이 실근을 가지려면 이차방정식 ㉮이 실근을 가져야

하므로 이차방정식 ㉮의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-k)^2 - 4 \times 1 \times 9 \geq 0, k^2 - 36 \geq 0$$

$$(k+6)(k-6) \geq 0 \quad \therefore k \leq -6 \text{ 또는 } k \geq 6 \quad \dots\dots ㉮$$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 6이다. ㉮

채점 기준	비율
㉮ $2^x - 2^{-x} = t$ 로 치환하여 주어진 방정식을 t 에 대한 이차방정식으로 나타낼 수 있다.	40%
㉮ k 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
㉮ 자연수 k 의 최솟값을 구할 수 있다.	20%

서술형 3 ㉮ $a < 1$

$$2^{2x} - a \times 2^{x+1} + 4 - 3a > 0 \text{에서}$$

$$(2^x)^2 - 2a \times 2^x + 4 - 3a > 0$$

$2^x = t \ (t > 0)$ 라 하면 주어진 부등식은

$$t^2 - 2at + 4 - 3a > 0$$

$$\therefore (t-a)^2 - a^2 - 3a + 4 > 0 \quad \dots\dots ㉮ \quad \dots\dots ㉮$$

부등식 ㉮이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 항상 성립하려면

(i) $a > 0$ 일 때

$$-a^2 - 3a + 4 > 0 \text{에서 } a^2 + 3a - 4 < 0$$

$$(a+4)(a-1) < 0 \quad \therefore -4 < a < 1$$

$$\text{그런데 } a > 0 \text{이므로 } 0 < a < 1 \quad \dots\dots ㉮$$

(ii) $a \leq 0$ 일 때

$$t=0 \text{이면 } ㉮ \text{에서 } -3a + 4 \geq 0$$

$$\therefore a \leq \frac{4}{3}$$

$$\text{그런데 } a \leq 0 \text{이므로 } a \leq 0 \quad \dots\dots ㉮$$

$$(i), (ii) \text{에서 } a < 1 \quad \dots\dots ㉮$$

채점 기준	비율
㉮ $2^x = t$ 로 치환하여 주어진 부등식을 t 에 대한 부등식으로 나타낼 수 있다.	30%
㉮ $a > 0$ 일 때, a 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
㉮ $a \leq 0$ 일 때, a 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
㉮ 조건을 만족시키는 a 의 값의 범위를 구할 수 있다.	10%

01 답 ③

$$4^x - 2^{x+3} + 15 = 0 \text{에서 } (2^x)^2 - 8 \times 2^x + 15 = 0$$

$$2^x = t \ (t > 0) \text{라 하면 주어진 방정식은}$$

$$t^2 - 8t + 15 = 0, \ (t-3)(t-5) = 0$$

$$\therefore t = 3 \text{ 또는 } t = 5$$

$$\text{즉 } 2^x = 3 \text{ 또는 } 2^x = 5 \text{이고 } \alpha < \beta \text{이므로}$$

$$2^\alpha = 3, \ 2^\beta = 5$$

$$\text{따라서 } \beta = \log_2 5 \text{이므로}$$

$$2^\alpha \times \beta = 3 \log_2 5$$

02 답 ③

$y = \frac{1}{16} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-m}$ 에서 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

또 $y = 2^x + 1$ 에서 밑 2가 $2 > 1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$$\text{곡선 } y = 2^x + 1 \text{은 점 } (0, 2) \text{를 지나므로 곡선 } y = \frac{1}{16} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-m} \text{이}$$

$$\text{곡선 } y = 2^x + 1 \text{과 제1사분면에서 만나려면 곡선 } y = \frac{1}{16} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-m}$$

이 y 축과 만나는 점의 y 좌표가 2보다 커야 한다.

$$\text{즉 } \frac{1}{16} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-m} > 2 \text{이므로 } 2^{-4} \times 2^m > 2 \quad \therefore 2^{m-4} > 2$$

$$\text{이때 밑 2가 } 2 > 1 \text{이므로 } m-4 > 1 \quad \therefore m > 5$$

따라서 자연수 m 의 최솟값은 6이다.

03 답 ②

함수 $y = a^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y = a^{-x}$

이 함수의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y = a^{-(x-m)} \quad \therefore g(x) = a^{-(x-m)}$

(가)에서 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 $x = 1$ 에 대하여 대칭이므로 $f(1) = g(1)$

$$\text{즉 } a = a^{-(1-m)} \text{이므로 } 1 = -(1-m)$$

$$m-1=1 \quad \therefore m=2, \text{ 즉 } g(x) = a^{-(x-2)}$$

이때 함수 $f(x) = a^x$ 은 지수함수이므로

$$a > 0, a \neq 1$$

.....㉠


$$\text{(나)에서 } f(3) = 16g(3) \text{이므로 } a^3 = 16a^{-1}$$

$$a^4 = 16 \quad \therefore a = 2 \ (\because \text{㉠})$$

$$\therefore a + m = 2 + 2 = 4$$

04 답 ③

$\overline{BP} : \overline{PE} = 1 : 3$ 이므로 두 점 A, C의 좌표를 각각 A(a, 0), C(4a, 0)이라 하면 점 P의 좌표는 (a, 2^a)이다.



$$\therefore \square PFDB = \overline{BP} \times \overline{PF} = a \times 3\sqrt{2} = 3\sqrt{2}a$$

$$\square PACE = \overline{AC} \times \overline{AP} = 3a \times 2^a$$

이때 직사각형 PACE의 넓이는 직사각형 PFDB의 넓이의 2배이므로 $3a \times 2^a = 2 \times 3\sqrt{2}a$

$$2^a = 2\sqrt{2}, \ 2^a = 2^{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore a = \frac{3}{2}$$

따라서 점 E의 x 좌표는

$$4a = 4 \times \frac{3}{2} = 6$$

05 답 16

점 A의 x 좌표를 $-a$ ($a > 0$)라 하면

$\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 5$ 이므로 점 B의 x 좌표는 $5a$ 이다.

이때 두 점 A, B의 y 좌표가 같으므로

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-a-1} = 4^{5a-1}, \ 2^{a+1} = 2^{10a-2}$$


$$a+1 = 10a-2, \ 9a = 3$$

$$\therefore a = \frac{1}{3}$$

즉 점 B의 좌표는 $\left(\frac{5}{3}, k\right)$ 이고 점 B가 함수 $y = g(x)$ 의 그래프 위에 있으므로

$$k = 4^{\frac{5}{3}-1} = 4^{\frac{2}{3}}$$

$$\therefore k^3 = \left(4^{\frac{2}{3}}\right)^3 = 4^2 = 16$$



06 답 ④

$(\sqrt{2}-1)^2 = 3-2\sqrt{2}$ 이므로 $\sqrt{2}-1=t$ 라 하면 주어진 부등식은

$$t^m \geq (t^2)^{5-n} \quad \therefore t^m \geq t^{10-2n}$$

이때 밑 t 가 $0 < t < 1$ 이므로 $m \leq 10-2n$

(i) $n=1$ 일 때

$1 \leq m \leq 8$ 이므로 순서쌍 (m, n) 의 개수는 8이다.

(ii) $n=2$ 일 때

$1 \leq m \leq 6$ 이므로 순서쌍 (m, n) 의 개수는 6이다.

(iii) $n=3$ 일 때

$1 \leq m \leq 4$ 이므로 순서쌍 (m, n) 의 개수는 4이다.

(iv) $n=4$ 일 때

$1 \leq m \leq 2$ 이므로 순서쌍 (m, n) 의 개수는 2이다.

(v) $n \geq 5$ 일 때

부등식을 만족시키는 자연수 m 은 존재하지 않는다.

(i)~(v)에서 구하는 순서쌍 (m, n) 의 개수는

$$8+6+4+2=20$$

07 답 12

$$\left(\frac{1}{4}\right)^x - (3n+16) \times \left(\frac{1}{2}\right)^x + 48n \leq 0 \text{에서}$$

$$\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^x\right\}^2 - (3n+16) \times \left(\frac{1}{2}\right)^x + 48n \leq 0$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = t \ (t > 0) \text{라 하면 주어진 부등식은}$$

$$t^2 - (3n+16)t + 48n \leq 0$$

$$(t-3n)(t-16) \leq 0$$

$$\therefore \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^x - 3n\right\} \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}\right\} \leq 0$$

.....㉡

(i) $3n < \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$ 일 때

$$\textcircled{1} \text{에서 } 3n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$$

부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가 2가 되려면

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = 16, \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8, \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4 \text{이므로}$$

$$4 < 3n \leq 8 \quad \therefore \frac{4}{3} < n \leq \frac{8}{3}$$

즉 자연수 n 의 값은 2이므로 그 개수는 1이다.

(ii) $3n > \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$ 일 때

$$\textcircled{1} \text{에서 } \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 3n$$

부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가 2가 되려면

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = 16, \left(\frac{1}{2}\right)^{-5} = 32, \left(\frac{1}{2}\right)^{-6} = 64 \text{이므로}$$

$$32 \leq 3n < 64 \quad \therefore \frac{32}{3} \leq n < \frac{64}{3}$$

즉 자연수 n 의 값은 11, 12, 13, ..., 21이므로 그 개수는 11이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 의 개수는

$$1 + 11 = 12$$

참고 $3n = \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은 존재하지 않으므로 위의 풀이와 같이

$$(i) 3n < \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} \quad (ii) 3n > \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$$

인 경우만 생각하면 된다.

08 ㉮ ⑤

오른쪽 그림에서 직사각형의 가로
의 길이는 $b-a=4$, 세로의 길이는
 $2^a - (-2^{-b}) = 2^a + 2^{-b}$ 이므로 직사
각형의 넓이는

$$(b-a)(2^a + 2^{-b}) = 4(2^a + 2^{-b})$$

$$2^a > 0, 2^{-b} > 0 \text{이므로 산술평균과 기}$$


하평균의 관계에 의하여

$$4(2^a + 2^{-b}) \geq 4 \times 2\sqrt{2^a \times 2^{-b}}$$

$$= 8\sqrt{2^{a-b}} = 8\sqrt{2^{-4}}$$

$$= 2 \text{ (단, 등호는 } 2^a = 2^{-b} \text{일 때 성립)}$$

따라서 직사각형의 넓이의 최솟값은 2이다.



09 ㉮ ③

두 곡선 $y=2^{x-3}+1$ 과 $y=2^{x-1}-2$ 가 만나는 점 A의 x 좌표는

$$2^{x-3}+1=2^{x-1}-2 \text{에서 } 2^{x-3}+1=4 \times 2^{x-3}-2$$

$$3 \times 2^{x-3}=3, 2^{x-3}=1$$

$$x-3=0 \quad \therefore x=3$$

즉 점 A의 좌표는 (3, 2)이다.

점 B의 x 좌표를 a 라 하면 점 B의 좌표는 $(a, 2^{a-3}+1)$

두 점 B, C는 기울기가 -1인 직선 위의 점이고 $\overline{BC}=\sqrt{2}$ 이므로 점 C의 좌표는 $(a-1, 2^{a-3}+2)$ 이다.

이때 점 C는 곡선 $y=2^{x-1}-2$ 위의 점이므로

$$2^{a-3}+2=2^{a-2}-2 \text{에서 } 2^{a-3}+2=2 \times 2^{a-3}-2$$

$$2^{a-3}=4=2^2, a-3=2$$

$$\therefore a=5$$

즉 점 B의 좌표는 (5, 5)이다.

이때 점 B가 직선 $y=-x+k$ 위의 점이므로

$$5=-5+k \quad \therefore k=10$$

점 A(3, 2)와 직선 $y=-x+10$, 즉 $x+y-10=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|3+2-10|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5}{2}$$

10 ㉮ ②

$$9^x - 2(a-4)3^x + 2a = 0 \text{에서}$$

$$(3^x)^2 - 2(a-4)3^x + 2a = 0$$

$3^x=t$ ($t>0$)라 하면 주어진 방정식은

$$t^2 - 2(a-4)t + 2a = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

주어진 방정식의 두 근이 모두 1보다 크므로

$$x>1 \text{에서 } 3^x>3^1 \quad \therefore t>3$$

즉 방정식 ①의 두 근은 모두 3보다 크면 된다.

$f(t)=t^2-2(a-4)t+2a$ 라 하면

(i) 이차방정식 ①의 판별식을 D 라 할 때

$$\frac{D}{4} = \{-(a-4)\}^2 - 2a \geq 0$$

$$a^2 - 10a + 16 \geq 0, (a-2)(a-8) \geq 0$$

$$\therefore a \leq 2 \text{ 또는 } a \geq 8$$

(ii) 이차함수 $y=f(t)$ 의 그래프의 축의 방

정식이 $t=a-4$ 이므로

$$a-4>3 \quad \therefore a>7$$


(iii) $f(3)>0$ 이어야 하므로

$$9-6(a-4)+2a>0$$

$$-4a+33>0 \quad \therefore a<\frac{33}{4}$$

(i)~(iii)에서 $8 \leq a < \frac{33}{4}$

따라서 정수 a 의 값은 8이다.



개념 완성하기

p.89~90

01 답 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$

주어진 함수는 $\{x|x \text{는 실수}\}$ 에서 $\{y|y > 0\}$ 으로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

$$y = \left(\frac{1}{3}\right)^x \text{에서 로그의 정의에 의하여 } x = \log_{\frac{1}{3}} y$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$

02 답 $y = \log_{\sqrt{2}} x$

주어진 함수는 $\{x|x \text{는 실수}\}$ 에서 $\{y|y > 0\}$ 으로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

$$y = (\sqrt{2})^x \text{에서 로그의 정의에 의하여 } x = \log_{\sqrt{2}} y$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는 $y = \log_{\sqrt{2}} x$

03 답 0

$$f(1) = \log_4 1 = 0$$

04 답 1

$$f(4) = \log_4 4 = 1$$

05 답 -2

$$f\left(\frac{1}{16}\right) = \log_4 \frac{1}{16} = \log_4 4^{-2} = -2$$

06 답 $-\frac{1}{3}$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt[3]{4}}\right) = \log_4 \frac{1}{\sqrt[3]{4}} = \log_4 4^{-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{3}$$

07 답 0

$$f(1) = \log_{\frac{1}{3}} 1 = 0$$

08 답 1

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3} = 1$$

09 답 -2

$$f(9) = \log_{\frac{1}{3}} 9 = \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = -2$$

10 답 $-\frac{1}{2}$

$$f(\sqrt{3}) = \log_{\frac{1}{3}} \sqrt{3} = \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2}$$

11 답 ㄴ, ㄹ

ㄱ. 그래프는 점 (1, 0)을 지난다.

ㄴ. 정의역은 양의 실수 전체의 집합이다.

ㄷ. 치역은 실수 전체의 집합이다.

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ이다.

12 답 $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} > \log_{\frac{1}{2}} 4$

함수 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로

$$\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} > \log_{\frac{1}{2}} 4$$

13 답 $\log_4 7 < \log_2 7$

$$\log_4 7 = \log_{2^2} 7 = \frac{1}{2} \log_2 7 = \log_2 7^{\frac{1}{2}} = \log_2 \sqrt{7}$$

함수 $y = \log_2 x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로

$$\log_2 \sqrt{7} < \log_2 7 \quad \therefore \log_4 7 < \log_2 7$$

14 답 2, 1

15 답 x

16 답 y

17 답 $y = \log_{\frac{1}{5}}(x+1) + 2$

함수 $y = \log_{\frac{1}{5}} x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y - 2 = \log_{\frac{1}{5}}(x+1) \quad \therefore y = \log_{\frac{1}{5}}(x+1) + 2$$

18 답 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$

함수 $y = \log_{\frac{1}{5}} x$ 의 그래프를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $x = \log_{\frac{1}{5}} y$

$$\therefore y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$$

19 답 $y = -\log_{\frac{1}{5}}(-x)$

함수 $y = \log_{\frac{1}{5}} x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $-y = \log_{\frac{1}{5}}(-x)$

$$\therefore y = -\log_{\frac{1}{5}}(-x)$$

20 답 그래프는 풀이 참조


정의역: $\{x|x > -1\}$, 점근선의 방정식: $x = -1$

함수 $y = \log_3(x+1)$ 의 그래프는

함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

$\therefore$ 정의역: $\{x|x > -1\}$

점근선의 방정식: $x = -1$



21 답 그래프는 풀이 참조

정의역: $\{x|x > 0\}$, 점근선의 방정식: $x = 0$

$$y = \log_3 9x = \log_3 9 + \log_3 x$$


$$= \log_3 x + 2$$

즉 함수 $y = \log_3 9x$ 의 그래프는 함수

$y = \log_3 x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

$\therefore$ 정의역: $\{x|x > 0\}$

점근선의 방정식: $x = 0$



22 **답** 그래프는 풀이 참조

정의역: $\{x|x>0\}$, 점근선의 방정식: $x=0$

$$y=\log_{\frac{1}{3}}x=\log_{3^{-1}}x=-\log_3x$$


즉 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}x$ 의 그래프는 함수

$y=\log_3x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭

이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

$\therefore$ 정의역: $\{x|x>0\}$

점근선의 방정식: $x=0$



23 **답** 그래프는 풀이 참조

정의역: $\{x|x<0\}$, 점근선의 방정식: $x=0$

함수 $y=\log_3(-x)$ 의 그래프는


함수 $y=\log_3x$ 의 그래프를 y 축에

대하여 대칭이동한 것이므로 오른쪽

그림과 같다.

$\therefore$ 정의역: $\{x|x<0\}$

점근선의 방정식: $x=0$



24 **답** 최댓값: 3, 최솟값: 0

함수 $y=\log_2(x+2)$ 에서 밑 2가 $2>1$ 이므로

$x=6$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $\log_2(6+2)=\log_2 2^3=3$

$x=-1$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $\log_2(-1+2)=\log_2 1=0$

25 **답** 최댓값: 4, 최솟값: 2

함수 $y=\log_2 2x$ 에서 밑 2가 $2>1$ 이므로

$x=8$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $\log_2(2 \times 8)=\log_2 2^4=4$

$x=2$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $\log_2(2 \times 2)=\log_2 2^2=2$

26 **답** 최댓값: 2, 최솟값: 1

함수 $y=\log_3(3x+3)$ 에서 밑 3이 $3>1$ 이므로

$x=2$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $\log_3(3 \times 2+3)=\log_3 3^2=2$

$x=0$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $\log_3 3=1$

27 **답** 최댓값: 0, 최솟값: -3

함수 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x-1)$ 에서 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0<\frac{1}{2}<1$ 이므로

$x=2$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $\log_{\frac{1}{2}}(2-1)=\log_{\frac{1}{2}} 1=0$

$x=9$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $\log_{\frac{1}{2}}(9-1)=\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}=-3$

28 **답** 최댓값: -1, 최솟값: -4

함수 $y=\log_{\frac{1}{2}} 4x$ 에서 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0<\frac{1}{2}<1$ 이므로

$x=\frac{1}{2}$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$$\log_{\frac{1}{2}}\left(4 \times \frac{1}{2}\right)=\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}=-1$$

$x=4$ 일 때 최소이고, 최솟값은

$$\log_{\frac{1}{2}}(4 \times 4)=\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}=-4$$

29 **답** 최댓값: -1, 최솟값: -2

함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(2x+1)$ 에서 밑 $\frac{1}{3}$ 이 $0<\frac{1}{3}<1$ 이므로

$x=1$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$$\log_{\frac{1}{3}}(2 \times 1+1)=\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}=-1$$

$x=4$ 일 때 최소이고, 최솟값은

$$\log_{\frac{1}{3}}(2 \times 4+1)=\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}=-2$$

30 **답** $x=3$

진수의 조건에서 $x+1>0 \quad \therefore x>-1$

.....㉠

$$\log_{\frac{1}{4}}(x+1)=-1 \text{에서 } x+1=\left(\frac{1}{4}\right)^{-1}=4 \quad \therefore x=3$$

$x=3$ 은 ㉠을 만족시키므로 주어진 방정식의 해는

$x=3$

31 **답** $x=\frac{1}{4}$

밑의 조건에서 $x>0, x \neq 1$

.....㉠

$$\log_x 4=-1 \text{에서 } 4=x^{-1} \quad \therefore x=\frac{1}{4}$$

$x=\frac{1}{4}$ 은 ㉠을 만족시키므로 주어진 방정식의 해는

$$x=\frac{1}{4}$$

32 **답** $x=6$

밑의 조건에서 $x-3>0, x-3 \neq 1$

$\therefore x>3, x \neq 4$

.....㉠

$$\log_{x-3} 9=2 \text{에서 } 9=(x-3)^2, x-3=\pm 3$$

$\therefore x=0$ 또는 $x=6$

이때 ㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는

$x=6$

33 **답** $x=-5$

진수의 조건에서 $x^2-4>0, -4x+1>0$

$\therefore x<-2$

.....㉠

$$\log_2(x^2-4)=\log_2(-4x+1) \text{에서 } x^2-4=-4x+1$$

$$x^2+4x-5=0, (x+5)(x-1)=0$$

$\therefore x=-5$ 또는 $x=1$

이때 ㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는

$x=-5$

34 **답** $x=4$

진수의 조건에서 $x>0, 3x+4>0$

$\therefore x>0$

.....㉠

$$2 \log_3 x=\log_3(3x+4) \text{에서 } \log_3 x^2=\log_3(3x+4)$$

$$\text{즉 } x^2=3x+4 \text{이므로 } x^2-3x-4=0$$

$$(x+1)(x-4)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=4$$

이때 ㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는

$x=4$

35 **답** $x=9$

진수의 조건에서 $x+3>0, x+7>0$

$\therefore x>-3$

.....㉠

$$\log_3(x+3)=\log_9(x+7)+1 \text{에서}$$

$$\log_9(x+3)^2=\log_9 9(x+7)$$

$$\text{즉 } (x+3)^2=9(x+7) \text{이므로 } x^2-3x-54=0$$

$$(x+6)(x-9)=0 \quad \therefore x=-6 \text{ 또는 } x=9$$

이때 ㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는

$x=9$

36 ㉠ $x=1$ 또는 $x=2$ 진수의 조건에서 $x>0, 3-x>0$

$$\therefore 0<x<3$$

.....㉠

$$\log_2 x + \log_2 (3-x) = 1 \text{에서 } \log_2 x(3-x) = \log_2 2$$

$$\text{즉 } x(3-x)=2 \text{이므로 } -x^2+3x=2$$

$$x^2-3x+2=0, (x-1)(x-2)=0$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=2$$

이때 ㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는

$$x=1 \text{ 또는 } x=2$$

37 ㉠ $x=9$ 진수의 조건에서 $x>0, x-6>0$

$$\therefore x>6$$

.....㉠

$$\log_3 x + \log_3 (x-6) = 3 \text{에서 } \log_3 x(x-6) = \log_3 27$$

$$\text{즉 } x(x-6)=27 \text{이므로 } x^2-6x-27=0$$

$$(x+3)(x-9)=0 \quad \therefore x=-3 \text{ 또는 } x=9$$

이때 ㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는

$$x=9$$

38 ㉠ $x=5$ 진수의 조건에서 $x>0, x-3>0$

$$\therefore x>3$$

.....㉠

$$\log x + \log (x-3) = 1 \text{에서 } \log x(x-3) = \log 10$$

$$\text{즉 } x(x-3)=10 \text{이므로 } x^2-3x-10=0$$

$$(x+2)(x-5)=0 \quad \therefore x=-2 \text{ 또는 } x=5$$

이때 ㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는

$$x=5$$

39 ㉠ $\frac{1}{2} < x < 5$

$$\text{진수의 조건에서 } 2x-1>0 \quad \therefore x>\frac{1}{2}$$

.....㉠

$$\log_3 (2x-1) < 2 \text{에서 } \log_3 (2x-1) < \log_3 9$$

$$\text{밑 } 3 \text{이 } 3>1 \text{이므로 } 2x-1 < 9 \quad \therefore x < 5$$

.....㉡

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } \frac{1}{2} < x < 5$$

40 ㉠ $3 < x < 4$

$$\text{진수의 조건에서 } 4-x>0 \quad \therefore x<4$$

.....㉠

$$\log_{\frac{1}{3}} (4-x) > 0 \text{에서 } \log_{\frac{1}{3}} (4-x) > \log_{\frac{1}{3}} 1$$

$$\text{밑 } \frac{1}{3} \text{이 } 0 < \frac{1}{3} < 1 \text{이므로 } 4-x < 1 \quad \therefore x > 3$$

.....㉡

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } 3 < x < 4$$

41 ㉠ $5 < x \leq 25$ 진수의 조건에서 $x>0$

.....㉠

$$1 < \log_5 x \leq 2 \text{에서 } \log_5 5 < \log_5 x \leq \log_5 25$$

$$\text{밑 } 5 \text{가 } 5>1 \text{이므로 } 5 < x \leq 25$$

.....㉡

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } 5 < x \leq 25$$

42 ㉠ $x \geq 3$ 진수의 조건에서 $x+3>0, 2x>0$

$$\therefore x>0$$

.....㉠

$$\log_3 (x+3) \leq \log_3 2x \text{에서 밑 } 3 \text{이 } 3>1 \text{이므로}$$

$$x+3 \leq 2x \quad \therefore x \geq 3$$

.....㉡

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } x \geq 3$$

43 ㉠ $\frac{1}{4} < x < 1$ 진수의 조건에서 $x+2>0, 4x-1>0$

$$\therefore x > \frac{1}{4}$$

.....㉠

$$\log_{\frac{1}{2}} (x+2) < \log_{\frac{1}{2}} (4x-1) \text{에서 밑 } \frac{1}{2} \text{이 } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로}$$

$$x+2 > 4x-1 \quad \therefore x < 1$$

.....㉡

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } \frac{1}{4} < x < 1$$

44 ㉠ $-1 < x < 0$ 또는 $3 < x < 4$ 진수의 조건에서 $x^2-3x>0$ 이므로 $x(x-3)>0$

$$\therefore x < 0 \text{ 또는 } x > 3$$

.....㉠

$$\log_{\frac{1}{3}} (x^2-3x) > \log_{\frac{1}{3}} 4 \text{에서 밑 } \frac{1}{3} \text{이 } 0 < \frac{1}{3} < 1 \text{이므로}$$

$$x^2-3x < 4, x^2-3x-4 < 0$$

$$(x+1)(x-4) < 0 \quad \therefore -1 < x < 4$$

.....㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$$-1 < x < 0 \text{ 또는 } 3 < x < 4$$

45 ㉠ $\frac{5}{3} < x < 2$ 또는 $x > 3$ 진수의 조건에서 $x-1>0, 3x-5>0$

$$\therefore x > \frac{5}{3}$$

.....㉠

$$2 \log_{\frac{1}{2}} (x-1) < \log_{\frac{1}{2}} (3x-5) \text{에서}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} (x-1)^2 < \log_{\frac{1}{2}} (3x-5)$$

$$\text{밑 } \frac{1}{2} \text{이 } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로 } (x-1)^2 > 3x-5$$

$$x^2-5x+6 > 0, (x-2)(x-3) > 0$$

$$\therefore x < 2 \text{ 또는 } x > 3$$

.....㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$$\frac{5}{3} < x < 2 \text{ 또는 } x > 3$$

46 ㉠ $5 < x \leq 8$ 진수의 조건에서 $x-5>0, x+1>0$

$$\therefore x > 5$$

.....㉠

$$\log_3 (x-5) + \log_3 (x+1) \leq 3 \text{에서}$$

$$\log_3 (x-5)(x+1) \leq \log_3 27$$

$$\text{밑 } 3 \text{이 } 3>1 \text{이므로 } (x-5)(x+1) \leq 27$$

$$x^2-4x-32 \leq 0, (x+4)(x-8) \leq 0$$

$$\therefore -4 \leq x \leq 8$$

.....㉡

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } 5 < x \leq 8$$

47 ㉠ $1 < x < 2$ 진수의 조건에서 $x-1>0, x+2>0$

$$\therefore x > 1$$

.....㉠

$$\log_{\frac{1}{2}} (x-1) + \log_{\frac{1}{2}} (x+2) > -2 \text{에서}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} (x-1)(x+2) > \log_{\frac{1}{2}} 4$$

$$\text{밑 } \frac{1}{2} \text{이 } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로 } (x-1)(x+2) < 4$$

$$x^2+x-6 < 0, (x+3)(x-2) < 0$$

$$\therefore -3 < x < 2$$

.....㉡

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } 1 < x < 2$$

01 ㉔ -2

$$f\left(\frac{7}{3}\right) = \log_a\left(\frac{7}{3} - 2\right) - 4 = \log_a\frac{1}{3} - 4 = -5 \text{이므로}$$

$$\log_a\frac{1}{3} = -1, a^{-1} = \frac{1}{3} \quad \therefore a = 3$$

$$\text{따라서 } f(x) = \log_3(x-2) - 4 \text{이므로}$$

$$f(11) = \log_3 9 - 4 = \log_3 3^2 - 4 = 2 - 4 = -2$$

01-1 ㉔ ⑤

$$f(9) = \log_3 9 + k \log_{81} 9 = \log_3 3^2 + k \log_{3^4} 3 = 2 + \frac{k}{2} = 3 \text{이므로}$$

$$\frac{k}{2} = 1 \quad \therefore k = 2$$

02 ㉔ 46

$$f(-23) = \left(\frac{1}{4}\right)^{-23} = (2^{-2})^{-23} = 2^{46} \text{이므로}$$

$$(g \circ f)(-23) = g(f(-23)) = g(2^{46}) = \log_2 2^{46} = 46$$

02-1 ㉔ ①

$$f(27) = \log_{\frac{1}{3}} 27 = \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} = -3 \text{이므로}$$

$$(g \circ f)(27) = g(f(27)) = g(-3) = \left(\frac{1}{9}\right)^{-3} = 729$$

$$h(27) = 27^2 = \left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}\right\}^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-6} \text{이므로}$$

$$(f \circ h)(27) = f(h(27)) = f\left(\left(\frac{1}{3}\right)^{-6}\right) = \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^{-6} = -6$$

$$\therefore (g \circ f)(27) + (f \circ h)(27) = 729 + (-6) = 723$$

03 ㉔ -1

$$f(2) + f(4) = -3 \text{에서 } \log_a 2 + \log_a 4 = -3$$

$$\log_a 8 = -3, 3 \log_a 2 = -3$$

$$\log_a 2 = -1, 2 = a^{-1} \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x \text{이므로}$$

$$f(10) - f(5) = \log_{\frac{1}{2}} 10 - \log_{\frac{1}{2}} 5 = \log_{\frac{1}{2}} 2 = -1$$

03-1 ㉔ ②

$$f(x) = \log_a \left(1 + \frac{1}{x+1}\right) = \log_a \frac{x+2}{x+1} \text{이므로}$$

$$f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(160)$$

$$= \log_a \frac{3}{2} + \log_a \frac{4}{3} + \log_a \frac{5}{4} + \cdots + \log_a \frac{162}{161}$$

$$= \log_a \left(\frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{5}{4} \times \cdots \times \frac{162}{161}\right)$$

$$= \log_a \frac{162}{2} = \log_a 81$$

$$\text{즉 } \log_a 81 = -4 \text{이므로 } a^{-4} = 81$$

$$a^{-4} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-4} \quad \therefore a = \frac{1}{3} (\because a > 0)$$

04 ㉔ ④

④ 밑 3이 $3 > 1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

04-1 ㉔ ③


$y = \log_{\frac{1}{a}}(-x) = -\log_a(-x)$ 이므로 함

수 $y = \log_{\frac{1}{a}}(-x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림

과 같다.

③ $x < 0$ 에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

따라서 옳지 않은 것은 ③이다.



05 ㉔ 58

함수 $y = \log_2(x+3)$ 의 그래프가 점 $(a, 6)$ 을 지나므로

$$6 = \log_2(a+3), a+3 = 2^6 = 64$$

$$\therefore a = 61$$

점근선의 방정식이 $x = -3$ 이므로 $b = -3$

$$\therefore a+b = 61 + (-3) = 58$$

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	50%
② b 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

05-1 ㉔ $x = -5$

함수 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x+k)$ 의 그래프가 점 $(11, -4)$ 를 지나므로

$$-4 = \log_{\frac{1}{2}}(11+k), 11+k = \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = 16$$

$$\therefore k = 5$$

따라서 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x+5)$ 이므로 점근선의 방정식은

$$x = -5$$

06 ㉔ ㄷ

ㄱ. 함수 $y = \log_3 x^2$ 은 $x \neq 0$ 에서 정의되고, 함수 $y = 2 \log_3 x$ 은 $x > 0$ 에서 정의되므로 다른 함수이다.

ㄴ. 함수 $y = \log_3 x^2$ 의 정의역은 $\{x | x \neq 0 \text{인 실수}\}$ 이다.

ㄷ. 그래프는 y 축을 점근선으로 한다.

따라서 옳은 것은 ㄷ이다.

참고

로그의 성질에 의하여 $\log_3 x^2 = 2 \log_3 x$ 이므로 두 함수

$y = \log_3 x^2, y = 2 \log_3 x$ 가 서로 같은 함수라고 생각할 수 있다.

하지만 두 함수의 정의역이 다음과 같이 서로 다르므로 두 함수

$y = \log_3 x^2, y = 2 \log_3 x$ 는 다른 함수이다.


함수 $y = \log_3 x^2$ 의 정의역은 진수의 조건에서

$x^2 > 0$ 이므로 $\{x | x \neq 0 \text{인 실수}\}$

함수 $y = 2 \log_3 x$ 의 정의역은 진수의 조건에서

$x > 0$ 이므로 $\{x | x > 0 \text{인 실수}\}$

실제로 두 함수 $y = \log_3 x^2, y = 2 \log_3 x$ 의 그래프를 그려 보면 아래 그림과 같다.



06-1 ㉡ ㄱ, ㄴ

ㄱ. 일대일함수이므로 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다.
 ㄴ. 밑 4가 $4 > 1$ 이므로 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$ 이다.
 ㄷ. $y = \log_{\frac{1}{4}} x = -\log_4 x$ 이므로 함수 $y = \log_4 x$ 의 그래프는 함수 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

07 ㉡ ④


$a = \log_7 5, b = \log_7 10$ 이므로
 $f(20) = \log_7 20 = \log_7 \frac{100}{5}$
 $= 2 \log_7 10 - \log_7 5$
 $= 2b - a$

07-1 ㉡ 9

$\overline{OA} = \log_3 a, \overline{OB} = \log_3 b$ 이므로
 $\overline{AB} = \overline{OB} - \overline{OA} = \log_3 b - \log_3 a$
 이때 $\overline{AB} = 2$ 이므로
 $\log_3 b - \log_3 a = 2, \log_3 \frac{b}{a} = 2$
 $\therefore \frac{b}{a} = 3^2 = 9$


08 ㉡ 12

직선 $y = x$ 위의 점의 x 좌표와 y 좌표가 같으므로 오른쪽 그림에서
 $\log_2 a = 1 \quad \therefore a = 2^1 = 2$
 $\log_2 b = a \quad \therefore b = 2^a = 2^2 = 4$
 $\log_2 c = b \quad \therefore c = 2^b = 2^4 = 16$
 $\therefore c - b = 16 - 4 = 12$



08-1 ㉡ 13자리

직선 $y = x$ 위의 점의 x 좌표와 y 좌표가 같으므로 오른쪽 그림에서
 $\log_3 a = 1 \quad \therefore a = 3^1 = 3 \quad \dots\dots ①$
 $\log_3 b = a \quad \therefore b = 3^a = 3^3 = 27 \quad \dots\dots ②$
 $\log_3 c = b \quad \therefore c = 3^b = 3^{27} \quad \dots\dots ③$
 $\therefore \log c = \log 3^{27} = 27 \log 3$
 $= 27 \times 0.477$
 $= 12.879$
 따라서 c 는 13자리 자연수이다. $\dots\dots ④$



채점 기준	비율
① a의 값을 구할 수 있다.	20%
② b의 값을 구할 수 있다.	20%
③ c의 값을 구할 수 있다.	20%
④ c가 몇 자리 자연수인지 구할 수 있다.	40%

09 ㉡ 1

점 C의 좌표를 $(k, 0)$ 이라 하면 $\overline{CD} = 2$ 이므로 점 D의 좌표는 $(k, 2)$ 이다.
 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프가 점 D를 지나므로
 $2 = \log_2 k \quad \therefore k = 2^2 = 4$

$\overline{BC} = 2$ 이므로 점 B의 x 좌표는
 $k - 2 = 4 - 2 = 2 \quad \therefore A(2, 2)$
 점 E의 x 좌표가 2이므로 점 E의 y 좌표는
 $\log_2 2 = 1 \quad \therefore E(2, 1)$
 $\therefore \overline{AE} = 2 - 1 = 1$

09-1 ㉡ 9/4

두 점 C, D의 x 좌표를 k 라 하면 $\overline{AD} = 2$ 이므로 두 점 A, B의 x 좌표는 $k - 2$ 이다.
 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프가 두 점 B, D를 지나므로 두 점 B, D의 y 좌표는 각각 $\log_3 (k - 2), \log_3 k$ 이다.
 이때 정사각형 ABCD의 한 변의 길이가 2이므로
 $\log_3 k - \log_3 (k - 2) = 2, \log_3 \frac{k}{k - 2} = 2$
 $\frac{k}{k - 2} = 3^2 = 9, k = 9k - 18 \quad \therefore k = \frac{9}{4}$
 따라서 점 D의 x 좌표는 $\frac{9}{4}$ 이다.

10 ㉡ 5

$y = a \log_2 x - 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프의 식은
 $y = a \log_2 (x - b) - 1$
 $y = a \log_2 (x - b) - 1$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은
 $y = -a \log_2 (x - b) + 1$
 이때
 $y = 2 \log_{\frac{1}{2}} \frac{(x+1)^3}{\sqrt{2}} = -2 \log_2 \frac{(x+1)^3}{\sqrt{2}}$
 $= -2 \{ \log_2 (x+1)^3 - \log_2 \sqrt{2} \}$
 $= -2 \left\{ 3 \log_2 (x+1) - \frac{1}{2} \log_2 2 \right\}$
 $= -6 \log_2 (x+1) + 1$
 이므로 $a = 6, b = -1$
 $\therefore a + b = 6 + (-1) = 5$


10-1 ㉡ 2

$y = 2^{x-a} - b$ 의 그래프를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은
 $x = 2^{y-a} - b, x + b = 2^{y-a}$
 로그의 정의에 의하여 $y - a = \log_2 (x + b)$
 $\therefore y = \log_2 (x + b) + a$
 $y = \log_2 (x + b) + a$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 식은
 $y = \log_2 (x + b) + a + 2$
 즉 $y = \log_2 (x + b) + a + 2$ 가 $y = \log_2 x$ 와 일치해야 하므로
 $a + 2 = 0, b = 0 \quad \therefore a = -2, b = 0$
 $\therefore b - a = 0 - (-2) = 2$

11 ㉡ ②

① $x = 5$ 를 $y = -\log_3 (x - 4) + 7$ 에 대입하면
 $-\log_3 (5 - 4) + 7 = -\log_3 1 + 7 = 7$
 즉 주어진 함수의 그래프는 점 $(5, 7)$ 을 지난다.


- ② 함수 $y = -\log_3(x-4) + 7$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 7만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



- ③ 정의역은 $\{x | x > 4\}$ 이고 치역은 실수 전체의 집합이다.
 ④ 그래프의 점근선의 방정식은 $x=4$ 이다.
 ⑤ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 따라서 옳지 않은 것은 ②이다.

11-1 ㉡ ④

- ① $f(1) = \log_2(2-1) + 3 = 3$ 이므로 주어진 함수의 그래프는 점 $(1, 3)$ 을 지난다.
 ② $f(x) = \log_2(2-x) + 3 = \log_2\{-(x-2)\} + 3$
 즉 $f(x) = \log_2(2-x) + 3$ 의 그래프는 $y = \log_2(-x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.
 ③ 정의역은 $\{x | x < 2\}$ 이고 치역은 실수 전체의 집합이다.
 ④ 그래프의 점근선의 방정식은 $x=2$ 이다.
 ⑤ $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.
 따라서 옳은 것은 ④이다.



12 ㉡ 2

그래프의 점근선의 방정식이 $x=1$ 이므로 $a=1$
 즉 $y = \log_3(x-1) + b$ 의 그래프가 점 $(4, 0)$ 을 지나므로
 $0 = \log_3(4-1) + b, 0 = 1 + b \quad \therefore b = -1$
 $\therefore a - b = 1 - (-1) = 2$

12-1 ㉡ -3

그래프의 점근선의 방정식이 $x = -2$ 이므로 $a = -2$ ①
 즉 $y = \log_4(x+2) + b$ 의 그래프가 점 $(0, -\frac{1}{2})$ 을 지나므로
 $-\frac{1}{2} = \log_4 2 + b, -\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + b \quad \therefore b = -1$ ②
 $\therefore a + b = -2 + (-1) = -3$ ③

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	30%
② b 의 값을 구할 수 있다.	50%
③ $a + b$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

13 ㉡ ⑤

- ㄱ. $y = \log_2(4x-3) = \log_2 4 \left(x - \frac{3}{4}\right) = \log_2 \left(x - \frac{3}{4}\right) + 2$
 즉 $y = \log_2(4x-3)$ 의 그래프는 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{3}{4}$ 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.
 ㄴ. $y = \log_4 x^2 = \log_{2^2} x^2 = \log_2 |x|$
 즉 $y = \log_4 x^2$ 의 그래프는 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 없다.
 ㄷ. $y = \log_{0.5}(-x+1) = \log_{\frac{1}{2}}\{-(x-1)\} = -\log_2\{-(x-1)\}$

즉 $y = \log_{0.5}(-x+1)$ 의 그래프는 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

$$\text{ㄹ. } y = \log_2 \frac{16}{x} = \log_2 16 - \log_2 x = 4 - \log_2 x$$

즉 $y = \log_2 \frac{16}{x}$ 의 그래프는 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.


따라서 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.

13-1 ㉡ ②

- ① $y = \log_3(9x-3) = \log_3 9 \left(x - \frac{1}{3}\right) = \log_3 \left(x - \frac{1}{3}\right) + 2$
 즉 $y = \log_3(9x-3)$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{3}$ 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.
 ② $y = \log_9 x^2 = \log_{3^2} x^2 = \log_3 |x|$
 즉 $y = \log_9 x^2$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 없다.
 ③ $y = \log_{\frac{1}{3}}(-x+1) = \log_{\frac{1}{3}}\{-(x-1)\} = -\log_3\{-(x-1)\}$
 즉 $y = \log_{\frac{1}{3}}(-x+1)$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.
 ④ $y = \log_3 \frac{9}{x} = \log_3 9 - \log_3 x = 2 - \log_3 x$
 즉 $y = \log_3 \frac{9}{x}$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.
 ⑤ $y = \log_3 \left(3x - \frac{1}{9}\right) = \log_3 3 \left(x - \frac{1}{27}\right) = \log_3 \left(x - \frac{1}{27}\right) + 1$
 즉 $y = \log_3 \left(3x - \frac{1}{9}\right)$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{27}$ 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.
 따라서 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식이 아닌 것은 ②이다.

14 ㉡ $\frac{3}{2}$

함수 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x + \sqrt{8}) + k$ 의 그래프는 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\sqrt{8}$ 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이다.
 이 그래프가 제3사분면을 지나지 않으려면 오른쪽 그림과 같이 $x=0$ 일 때 y 의 값이 0보다 크거나 같아야 하므로



$$\log_{\frac{1}{2}} \sqrt{8} + k \geq 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{3}{2}} + k \geq 0$$


$$-\frac{3}{2} + k \geq 0 \quad \therefore k \geq \frac{3}{2}$$

따라서 실수 k 의 최솟값은 $\frac{3}{2}$ 이다.

14-1 ㉡ $-\frac{3}{2}$

함수 $y = \log_3(x + \sqrt{27}) + k$ 의 그래프는 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\sqrt{27}$ 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이다.

이 그래프가 제2사분면을 지나지 않으려면 오른쪽 그림과 같이 $x=0$ 일 때 y 의 값이 0보다 작거나 같아야 하므로



$$\log_3 \sqrt{27} + k \leq 0, \log_3 3^{\frac{3}{2}} + k \leq 0$$

$$\frac{3}{2} + k \leq 0 \quad \therefore k \leq -\frac{3}{2}$$

따라서 실수 k 의 최댓값은 $-\frac{3}{2}$ 이다.


채점 기준	비율
① 주어진 함수의 그래프가 제2사분면을 지나지 않도록 하는 조건을 알 수 있다.	40%
② k 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
③ 실수 k 의 최댓값을 구할 수 있다.	20%

15 ㉡ 3

$y = \log_2 2x = \log_2 x + 1$ 이므로 $y = \log_2 2x$ 의 그래프는 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

오른쪽 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이가 같으므로 구하는 부분의 넓이는 직사각형 ABCD의 넓이와 같다.

따라서 구하는 부분의 넓이는 $(6-3) \times 1 = 3$




15-1 ㉡ 6

$y = \log_2 4x = \log_2 x + 2$ 이므로 $y = \log_2 4x$ 의 그래프는 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

오른쪽 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이가 같으므로 구하는 부분의 넓이는 직사각형 ABCD의 넓이와 같다.

따라서 구하는 부분의 넓이는 $(4-1) \times 2 = 6$



16 ㉡ ③

$y = \log_4(x-3) + 1$ 에서 $y-1 = \log_4(x-3)$

로그의 정의에 의하여 $x-3 = 4^{y-1}$

$$\therefore x = 4^{y-1} + 3$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는

$$y = 4^{x-1} + 3 = (2^2)^{x-1} + 3 = 2^{2x-2} + 3$$

따라서 $p = -2, q = 3$ 이므로

$$p+q = -2+3 = 1$$

16-1 ㉡ 12

$y = \log_{\frac{1}{9}}(x-2) + 3$ 에서 $y-3 = \log_{\frac{1}{9}}(x-2)$

로그의 정의에 의하여 $x-2 = \left(\frac{1}{9}\right)^{y-3}$

$$\therefore x = \left(\frac{1}{9}\right)^{y-3} + 2$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는

$$y = \left(\frac{1}{9}\right)^{x-3} + 2 = (3^{-2})^{x-3} + 2 = 3^{-2x+6} + 2$$

따라서 $p = 6, q = 2$ 이므로

$$pq = 6 \times 2 = 12$$

17 ㉡ 2

$f^{-1}(2) = k$ ($k > 1$)라 하면 $f(k) = 2$ 이므로

$$f(k) = \log_3(3k^2 - 3) = 2, 3k^2 - 3 = 3^2 = 9$$

$$3k^2 = 12, k^2 = 4 \quad \therefore k = 2 \quad (\because k > 1)$$

즉 $f^{-1}(2) = 2$ 이므로

$$(f^{-1} \circ f^{-1})(2) = f^{-1}(f^{-1}(2)) \\ = f^{-1}(2) = 2$$

17-1 ㉡ 31

$f^{-1}(0) = a$ 라 하면 $f(a) = 0$ 이므로

$$f(a) = \log_2(a+1) - 2 = 0, \log_2(a+1) = 2$$

$$a+1 = 2^2 = 4 \quad \therefore a = 3$$

즉 $f^{-1}(0) = 3$ 이므로 $f^{-1}(f^{-1}(0)) = f^{-1}(3)$

$f^{-1}(3) = b$ 라 하면 $f(b) = 3$ 이므로

$$f(b) = \log_2(b+1) - 2 = 3, \log_2(b+1) = 5$$

$$b+1 = 2^5 = 32 \quad \therefore b = 31$$

즉 $f^{-1}(3) = 31$ 이므로

$$(f \circ f)^{-1}(0) = f^{-1}(f^{-1}(0)) \\ = f^{-1}(3) = 31$$

18 ㉡ 6√2

함수 $f(x) = \log_a(x-2)$ 의 그래프가 점 $(4, 2)$ 를 지나므로

$$2 = \log_a 2, a^2 = 2 \quad \therefore a = \sqrt{2} \quad (\because a > 0)$$

$$\therefore f(x) = \log_{\sqrt{2}}(x-2)$$

함수 $y = f(x)$ 의 역함수의 그래프가 점 $(4, b)$ 를 지나므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(b, 4)$ 를 지난다.

즉 $4 = \log_{\sqrt{2}}(b-2)$ 이므로

$$b-2 = (\sqrt{2})^4 = 4 \quad \therefore b = 6$$

$$\therefore ab = \sqrt{2} \times 6 = 6\sqrt{2}$$

18-1 ㉡ 11

$f(5) = 2$ 이므로 $f(5) = \log_a 4 = 2$

$$a^2 = 4 \quad \therefore a = 2 \quad (\because a > 0)$$

$$\therefore f(x) = \log_2(x-1)$$

$f(g(x)) = x$ 이므로 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 서로 역함수 관계이다.

$$g(3) = b \text{이므로 } f(b) = 3$$

즉 $f(b) = \log_2(b-1) = 3$ 이므로

$$b-1 = 2^3 = 8 \quad \therefore b = 9$$

$$\therefore a+b = 2+9 = 11$$

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40%
② b 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

19 ㉡ 4

$y = 3^x$ 의 역함수는 $f^{-1}(x) = \log_3 x$

$y = f^{-1}(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점은 점 $A(1, 0)$ 이므로 점 B 의 좌표를 $(1, b)$ 라 하면

$$b = 3$$

점 C 의 좌표를 $(a, 3)$ 이라 하면 $f^{-1}(a) = 3$ 이므로

$$\log_3 a = 3 \quad \therefore a = 3^3$$

$$\therefore \log_3 ab = \log_3 3^4 = 4$$

채점 기준	비율
① b 의 값을 구할 수 있다.	40%
② a 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $\log_3 ab$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

19-1 ㉔ ④

함수 $y=2^x$ 의 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나므로 $a=1$


오른쪽 그림에서

$$\log_2 b = a = 1 \text{ 이므로 } b = 2$$

$$2^b = c \text{ 이므로 } c = 2^2$$

$$\log_2 d = c = 2^2 \text{ 이므로 } d = 2^4$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_2 abcd &= \log_2 (1 \times 2 \times 2^2 \times 2^4) \\ &= \log_2 2^7 = 7 \end{aligned}$$



20 ㉔ 21

$g(x)$ 는 $y=\log_2 x$ 의 역함수이므로 $g(x)=2^x$

점 A는 $y=g(x)$ 의 그래프와 y 축의 교점이므로 $A(0, 1)$

점 B의 y 좌표가 1이므로 $1=\log_2 x$ 에서 $x=2$

$$\therefore B(2, 1)$$

점 C의 x 좌표가 2이므로 $C(2, 2^2)$, 즉 $C(2, 4)$

점 D의 y 좌표가 4이므로 $4=\log_2 x$ 에서 $x=2^4=16$

$$\therefore D(16, 4)$$

따라서 $\overline{BC}=4-1=3$, $\overline{CD}=16-2=14$ 이므로

$$\triangle BDC = \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{CD} = \frac{1}{2} \times 3 \times 14 = 21$$

20-1 ㉔ 40

두 함수 $y=\log_3 x$, $y=3^x$ 은 서로 역함수이므로 두 함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

점 A의 좌표는 $(9, 2)$ 이므로 점 B의 좌표는 $(2, 9)$ 이다.

점 C의 좌표는 $(0, 1)$

점 D의 좌표는 $(1, 0)$

$$\therefore \overline{AB} = \sqrt{(2-9)^2 + (9-2)^2} = 7\sqrt{2}$$

$$\overline{CD} = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

직선 AB는 점 A(9, 2)를 지나고 기울기가 -1 인 직선이므로

$$y-2 = -(x-9) \quad \therefore x+y-11=0$$

이때 점 D와 직선 AB 사이의 거리를 d 라 하면

$$d = \frac{|1+0-11|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}$$

따라서 사각형 ABCD의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (\overline{AB} + \overline{CD}) \times d = \frac{1}{2} \times (7\sqrt{2} + \sqrt{2}) \times 5\sqrt{2} = 40$

직선 CD의 기울기는 $\frac{0-1}{1-0} = -1$ 이므로 직선 AB와 직선 CD는 평행하다. 즉 사각형 ABCD는 사다리꼴이다.

Lecture 점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

21 ㉔ $-\frac{3}{2}$

함수 $y=\log_a bx$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점은

$y=\log_a bx$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.

두 교점의 y 좌표가 $-1, -2$ 이므로 $y=\log_a bx$ 의 그래프는 두 점 $(-1, -1), (-2, -2)$ 를 지난다.

$$-1 = \log_a (-b) \text{에서 } -b = \frac{1}{a} \quad \therefore b = -\frac{1}{a} \quad \dots\dots ㉠$$

$$-2 = \log_a (-2b) \text{에서 } -2b = \frac{1}{a^2} \quad \dots\dots ㉡$$

$$㉠을 ㉡에 대입하면 \frac{2}{a} = \frac{1}{a^2}, 2a^2 - a = 0$$

$$a(2a-1)=0 \quad \therefore a = \frac{1}{2} (\because a > 0)$$

$$a = \frac{1}{2} \text{을 } ㉠에 대입하면 } b = -2$$

$$\therefore a+b = \frac{1}{2} + (-2) = -\frac{3}{2}$$

21-1 ㉔ $a=\sqrt{2}, b=0$

함수 $y=\log_a (x-b)$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점은 $y=\log_a (x-b)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.

두 교점의 y 좌표가 2, 4이므로 $y=\log_a (x-b)$ 의 그래프는 두 점 $(2, 2), (4, 4)$ 를 지난다.

$$2 = \log_a (2-b) \text{에서 } a^2 = 2-b \quad \therefore b = 2-a^2 \quad \dots\dots ㉠$$

$$4 = \log_a (4-b) \text{에서 } a^4 = 4-b \quad \dots\dots ㉡$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$a^4 = a^2 + 2, a^4 - a^2 - 2 = 0$$

$$\therefore (a^2+1)(a^2-2) = 0$$

이때 $a^2+1 > 0$ 이므로 $a^2-2=0$

$$a^2 = 2 \quad \therefore a = \sqrt{2} (\because a > 0)$$

$a=\sqrt{2}$ 를 ㉠에 대입하면

$$b = 2 - (\sqrt{2})^2 = 0$$

22 ㉔ ②

$$A = \log_3 \sqrt{10}$$

$$B = \log_{\frac{1}{3}} 4 = \log_3 4^{-1} = \log_3 \frac{1}{4}$$

$$C = \log_{\frac{1}{3}} \sqrt{14} = \log_3 (\sqrt{14})^{-1} = \log_3 \frac{1}{\sqrt{14}}$$

이때 $\frac{1}{4} < \frac{1}{\sqrt{14}} < \sqrt{10}$ 이고, 밑 3이 $3 > 1$ 이므로

$$\log_3 \frac{1}{4} < \log_3 \frac{1}{\sqrt{14}} < \log_3 \sqrt{10}$$

$$\therefore B < C < A$$

22-1 ㉔ ④

$$A = \log_4 10 = \log_2 10^{\frac{1}{2}} = \log_2 \sqrt{10}$$

$$B = \log_{\frac{1}{4}} 15 = \log_2 15^{-\frac{1}{2}} = \log_2 \frac{1}{\sqrt{15}}$$

$$C = \log_2 \sqrt{11}$$

이때 $\frac{1}{\sqrt{15}} < \sqrt{10} < \sqrt{11}$ 이고, 밑 2가 $2 > 1$ 이므로

$$\log_2 \frac{1}{\sqrt{15}} < \log_2 \sqrt{10} < \log_2 \sqrt{11}$$

$$\therefore B < A < C$$

23 ㉔ $C < B < A$

$$A = 3 \log_{0.1} 2\sqrt{3} = \log_{0.1} (2\sqrt{3})^3 = \log_{0.1} 24\sqrt{3}$$

$$B = \log \frac{1}{81} = -\log 81 = \log_{0.1} 81$$

$$C = \log_{0.1} 4 - 2 = \log_{0.1} 4 - \log_{0.1} 0.01 = \log_{0.1} \frac{4}{0.01} = \log_{0.1} 400$$

이때 $24\sqrt{3} < 81 < 400$ 이고, 밑 0.1이 $0 < 0.1 < 1$ 이므로
 $\log_{0.1} 400 < \log_{0.1} 81 < \log_{0.1} 24\sqrt{3}$
 $\therefore C < B < A$

23-1 ㉮ $B < A < C$

$1 < x < 3$ 의 각 변에 밑이 3인 로그를 취하면
 $\log_3 1 < \log_3 x < \log_3 3 \quad \therefore 0 < \log_3 x < 1$
 $A - B = \log_3 x - (\log_3 x)^2 = (1 - \log_3 x) \log_3 x$
 이때 $0 < \log_3 x < 1$ 이므로 $1 - \log_3 x > 0$
 $\therefore A - B > 0 \quad \therefore A > B$ ㉮

$$C = \log_x 3 = \frac{1}{\log_3 x}$$

이때 $0 < \log_3 x < 1$ 이므로 $\frac{1}{\log_3 x} > 1$, 즉 $C > 1$

$$\therefore A < C$$
㉮

㉮, ㉮에서 $B < A < C$

Lecture 두 수의 대소 비교

- (1) $A - B > 0$ 이면 $A > B$
 $A - B < 0$ 이면 $A < B$
 (2) $A > 0, B > 0$ 일 때
 ① $A^2 - B^2 > 0$ 이면 $A > B$
 $A^2 - B^2 < 0$ 이면 $A < B$
 ② $\frac{A}{B} > 1$ 이면 $A > B$
 $\frac{A}{B} < 1$ 이면 $A < B$

24 ㉮ C, B

$1 < a < b$ 의 각 변에 밑이 a 인 로그를 취하면
 $\log_a 1 < \log_a a < \log_a b \quad \therefore 0 < 1 < \log_a b$
 이때 $C = \log_a b^2 = 2 \log_a b$ 이므로 $0 < 1 < A < C$ ㉮
 또 $1 < a < b$ 의 각 변에 밑이 b 인 로그를 취하면
 $\log_b 1 < \log_b a < \log_b b \quad \therefore 0 < \log_b a < 1$

이때 $B = \log_b a = \frac{1}{2} \log_b a$ 이므로 $0 < B < D < 1$ ㉮

따라서 가장 큰 수는 C , 가장 작은 수는 B 이다.㉮

채점 기준	비율
① 두 수 A, C 의 대소 관계를 구할 수 있다.	40%
② 두 수 B, D 의 대소 관계를 구할 수 있다.	40%
③ 가장 큰 수와 가장 작은 수를 구할 수 있다.	20%

24-1 ㉮ $\log_a \frac{a}{b}$

$b < a < 1$ 의 각 변에 밑이 a 인 로그를 취하면
 $\log_a 1 < \log_a a < \log_a b \quad \therefore 0 < 1 < \log_a b$ ㉮
 또 $b < a < 1$ 의 각 변에 밑이 b 인 로그를 취하면
 $\log_b 1 < \log_b a < \log_b b \quad \therefore 0 < \log_b a < 1$

$\log_a \frac{b}{a} = \log_a b - \log_a a = \log_a b - 1$ 이고 ㉮에서
 $\log_a b - 1 > 0$

$\log_a \frac{a}{b} = \log_a a - \log_a b = 1 - \log_a b$ 이고 ㉮에서
 $1 - \log_a b < 0$

따라서 가장 작은 수는 $\log_a \frac{a}{b}$ 이다.

25 ㉮ ①

$f(x) = -x^2 + 4x + 4$ 라 하면 $f(x) = -(x-2)^2 + 8$ 이므로
 $1 \leq x \leq 4$ 에서 $f(1) = 7, f(2) = 8, f(4) = 4$
 $\therefore 4 \leq f(x) \leq 8$

밑 2가 $2 > 1$ 이므로 $y = \log_2 f(x)$ 는
 $f(x) = 8$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은
 $M = \log_2 8 = 3$

$f(x) = 4$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은
 $m = \log_2 4 = 2$

따라서 $M = 3, m = 2$ 이므로

$$\therefore M + m = 3 + 2 = 5$$

25-1 ㉮ -2

$f(x) = x^2 - 4x + 8$ 이라 하면 $f(x) = (x-2)^2 + 4$ 이므로
 $-1 \leq x \leq 3$ 에서 $f(-1) = 13, f(2) = 4, f(3) = 5$

$$\therefore 4 \leq f(x) \leq 13$$

밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 $y = \log_{\frac{1}{2}} f(x)$ 는 $f(x) = 4$ 일 때 최대이
 고, 최댓값은 $\log_{\frac{1}{2}} 4 = -2$

26 ㉮ ②

$f(x) = x^2 - 4x + a$ 라 하면 $f(x) = (x-2)^2 + a - 4$
 $\therefore f(x) \geq a - 4$

밑 2가 $2 > 1$ 이므로 $y = \log_2 f(x)$ 는 $f(x) = a - 4$ 일 때 최소이고,
 최솟값은 1이다.

즉 $\log_2 (a - 4) = 1$ 이므로

$$a - 4 = 2 \quad \therefore a = 6$$

26-1 ㉮ 6

함수 $y = \log_{\frac{1}{3}} (x+2) + k$ 는 밑 $\frac{1}{3}$ 이 $0 < \frac{1}{3} < 1$ 이므로 x 의 값이 증
 가하면 y 의 값은 감소한다.

즉 $x = 7$ 일 때 최소이고, 최솟값이 5이므로

$$\log_{\frac{1}{3}} 9 + k = 5, -2 + k = 5 \quad \therefore k = 7$$
㉮

따라서 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}} (x+2) + 7$ 은 $x = 1$ 일 때 최대이고, 최댓값은
 $\log_{\frac{1}{3}} 3 + 7 = -1 + 7 = 6$ ㉮

채점 기준	비율
① k 의 값을 구할 수 있다.	60%
② 주어진 함수의 최댓값을 구할 수 있다.	40%

27 ㉮ ①

$f(x) = x^2 - 6x + 34$ 라 하면 $f(x) = (x-3)^2 + 25$

(i) $a > 1$ 일 때

밑이 1보다 크므로 $f(x)$ 가 최댓값을 가질 때, 주어진 함수는 최
 대값을 갖는다.

그런데 $f(x)$ 는 최댓값이 없으므로 주어진 함수는 최댓값을 갖
 지 않는다.

(ii) $0 < a < 1$ 일 때

밑이 1보다 작은 양수이므로 $f(x)$ 가 최솟값을 가질 때, 주어진
 함수는 최솟값을 갖는다.

$f(x)$ 는 $x = 3$ 일 때, 최솟값이 25이므로 주어진 함수의 최댓값은
 $\log_a 25$

(i), (ii)에서 $\log_a 25 = -2$ 이므로 $a^{-2} = 25$

$$a^2 = \frac{1}{25} \quad \therefore a = \frac{1}{5} \quad (\because 0 < a < 1)$$

27-1 ㉔ ②

진수의 조건에서 $x+1 > 0, 3-x > 0 \quad \therefore -1 < x < 3$

$$f(x) = \log_a(x+1) + \log_a(3-x) = \log_a(x+1)(3-x) \\ = \log_a(-x^2+2x+3)$$

$$g(x) = -x^2+2x+3 \text{이라 하면 } g(x) = -(x-1)^2+4$$

(i) $a > 1$ 일 때

밑이 1보다 크므로 $g(x)$ 가 최솟값을 가질 때, $f(x)$ 는 최솟값을 갖는다.

그런데 $-1 < x < 3$ 에서 $g(x)$ 의 최솟값은 없으므로 $f(x)$ 는 최솟값을 갖지 않는다.

(ii) $0 < a < 1$ 일 때

밑이 1보다 작은 양수이므로 $g(x)$ 가 최댓값을 가질 때, $f(x)$ 는 최솟값을 갖는다.

$-1 < x < 3$ 에서 $g(x)$ 는 $x=1$ 일 때, 최댓값이 4이므로 $f(x)$ 의 최솟값은 $\log_a 4$

(i), (ii)에서 $\log_a 4 = -2$ 이므로 $a^{-2} = 4$

$$a^2 = \frac{1}{4} \quad \therefore a = \frac{1}{2} \quad (\because 0 < a < 1)$$

28 ㉔ -6

$$y = (\log_3 x)^2 - \log_3 81x^2 = (\log_3 x)^2 - 2\log_3 x - 4$$

$\log_3 x = t$ 라 하면 $3 \leq x \leq 27$ 에서

$$\log_3 3 \leq \log_3 x \leq \log_3 27 \quad \therefore 1 \leq t \leq 3$$

이때 주어진 함수는

$$y = t^2 - 2t - 4 = (t-1)^2 - 5 \text{이므로}$$

$$t=3 \text{일 때 최대이고, 최댓값 } M \text{은 } M = (3-1)^2 - 5 = -1$$

$$t=1 \text{일 때 최소이고, 최솟값 } m \text{은 } m = -5$$

$$\therefore M+m = -1 + (-5) = -6$$

28-1 ㉔ ①

$$y = (\log_2 x)^2 + \log_{\frac{1}{2}} x^6 + 1 = (\log_2 x)^2 - 6\log_2 x + 1$$

$\log_2 x = t$ 라 하면

$$y = t^2 - 6t + 1 = (t-3)^2 - 8$$

따라서 $t=3$ 일 때 최소이고, 최솟값은 -8 이다.

29 ㉔ -12

$$\log_{\frac{1}{2}} x = t \text{라 하면 } y = (\log_{\frac{1}{2}} x)^2 + p \log_{\frac{1}{2}} x + q \text{에서}$$

$$y = t^2 + pt + q \quad \dots\dots ㉔$$

이 함수가 $x = \frac{1}{4}$, 즉 $t = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} = 2$ 에서 최솟값 -1 을 가지므로

$$y = (t-2)^2 - 1 = t^2 - 4t + 3 \quad \dots\dots ㉕$$

이때 ㉔과 ㉕의 식이 같아야 하므로

$$p = -4, q = 3$$

$$\therefore pq = -4 \times 3 = -12$$

29-1 ㉔ 5

$$y = (\log_3 x)^2 + a \log_{27} x^2 + b$$

$$= (\log_3 x)^2 + a \log_{3^3} x^2 + b$$

$$= (\log_3 x)^2 + \frac{2}{3}a \log_3 x + b$$

$\log_3 x = t$ 라 하면

$$y = t^2 + \frac{2}{3}at + b \quad \dots\dots ㉔ \quad \dots\dots ㉕$$

이 함수가 $x = \frac{1}{3}$, 즉 $t = \log_3 \frac{1}{3} = -1$ 에서 최솟값 1을 가지므로

$$y = (t+1)^2 + 1 = t^2 + 2t + 2 \quad \dots\dots ㉕$$

이때 ㉔과 ㉕의 식이 같아야 하므로

$$\frac{2}{3}a = 2, b = 2 \quad \therefore a = 3, b = 2 \quad \dots\dots ㉔$$

$$\therefore a+b = 3+2=5 \quad \dots\dots ㉕$$

채점 기준	비율
㉕ $\log_3 x$ 를 t 로 치환하고 주어진 함수를 t 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
㉔ a, b 의 값을 구할 수 있다.	50%
㉕ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

30 ㉔ 9

$$y = (\log_2 2x) \left(\log_2 \frac{8}{x} \right) = (1 + \log_2 x)(3 - \log_2 x)$$

$\log_2 x = t$ 라 하면 $\frac{1}{4} \leq x \leq 2$ 에서

$$\log_2 \frac{1}{4} \leq \log_2 x \leq \log_2 2 \quad \therefore -2 \leq t \leq 1$$

이때 주어진 함수는

$$y = (1+t)(3-t) = -t^2 + 2t + 3 = -(t-1)^2 + 4 \text{이므로}$$

$t=1$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은 $M=4$

$t=-2$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은 $m = -(-2-1)^2 + 4 = -5$

$$\therefore M-m = 4 - (-5) = 9$$

30-1 ㉔ 13

$$y = (\log_3 x)(\log_{\frac{1}{3}} x) + 2\log_3 x + 10$$

$$= -(\log_3 x)^2 + 2\log_3 x + 10$$

$\log_3 x = t$ 라 하면 $1 \leq x \leq 81$ 에서

$$\log_3 1 \leq \log_3 x \leq \log_3 81 \quad \therefore 0 \leq t \leq 4$$

이때 주어진 함수는

$$y = -t^2 + 2t + 10 = -(t-1)^2 + 11 \text{이므로}$$

$t=1$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은 $M=11$

$t=4$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은 $m = -(4-1)^2 + 11 = 2$

$$\therefore M+m = 11+2=13$$

31 ㉔ ③

$y = 27x^{-4+\log_3 x}$ 의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면

$$\log_3 y = \log_3 27x^{-4+\log_3 x} \\ = \log_3 27 + \log_3 x^{-4+\log_3 x} \\ = 3 + (-4 + \log_3 x) \log_3 x \\ = (\log_3 x)^2 - 4\log_3 x + 3$$

$\log_3 x = t$ 라 하면 $\frac{1}{3} \leq x \leq 27$ 에서

$$\log_3 \frac{1}{3} \leq \log_3 x \leq \log_3 27 \quad \therefore -1 \leq t \leq 3$$

이때 $\log_3 y = t^2 - 4t + 3 = (t-2)^2 - 1$ 이므로 $\log_3 y$ 는

$t=-1$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $(-1-2)^2 - 1 = 8$

$t=2$ 일 때 최소이고, 최솟값은 -1

$$\log_3 y = 8 \text{에서 } y = 3^8 \quad \therefore M = 3^8$$

$$\log_3 y = -1 \text{에서 } y = 3^{-1} \quad \therefore m = 3^{-1}$$

$$\therefore Mm = 3^8 \times 3^{-1} = 3^7$$

31-1 ㉮ 11

$y = x^{2-\log x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\begin{aligned}\log y &= \log x^{2-\log x} \\ &= (2-\log x) \log x \\ &= -(\log x)^2 + 2 \log x\end{aligned}$$

$\log x = t$ 라 하면 $1 \leq x \leq 100$ 에서

$$\log 1 \leq \log x \leq \log 100 \quad \therefore 0 \leq t \leq 2$$

이때 $\log y = -t^2 + 2t = -(t-1)^2 + 1$ 이므로 $\log y$ 는

$t=1$ 일 때 최대이고, 최댓값은 1

$t=0$ 또는 $t=2$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $-(0-1)^2 + 1 = 0$

$$\log y = 1 \text{에서 } y = 10 \quad \therefore M = 10$$

$$\log y = 0 \text{에서 } y = 1 \quad \therefore m = 1$$

$$\therefore M + m = 10 + 1 = 11$$

32 ㉮ 최댓값: 48, 최솟값: 9

$2^{\log x} = x^{\log 2}$ 이므로

$$\begin{aligned}y &= 2^{\log x} \times x^{\log 2} + 2 \times 2^{\log 100x} \\ &= 2^{\log x} \times 2^{\log x} + 2 \times 2^{2+\log x} \\ &= 2^{\log x} \times 2^{\log x} + 2 \times 2^2 \times 2^{\log x} \\ &= (2^{\log x})^2 + 8 \times 2^{\log x}\end{aligned}$$

$2^{\log x} = t$ 라 하면 $1 \leq x \leq 100$ 에서

$$\log 1 \leq \log x \leq \log 100 \text{이므로 } 0 \leq \log x \leq 2$$

$$2^0 \leq 2^{\log x} \leq 2^2 \quad \therefore 1 \leq t \leq 4$$

이때 주어진 함수는

$$y = t^2 + 8t = (t+4)^2 - 16 \text{이므로}$$

$t=4$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $(4+4)^2 - 16 = 48$

$t=1$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $(1+4)^2 - 16 = 9$

32-1 ㉮ ④

$3^{\log x} = x^{\log 3}$ 이므로

$$\begin{aligned}y &= 3^{\log x} \times x^{\log 3} - 3(3^{\log x} + x^{\log 3}) + 2 \\ &= 3^{\log x} \times 3^{\log x} - 3(3^{\log x} + 3^{\log x}) + 2 \\ &= (3^{\log x})^2 - 6 \times 3^{\log x} + 2\end{aligned}$$

$3^{\log x} = t$ 라 하면 $x > 1$ 에서

$$\log x > \log 1 \text{이므로 } \log x > 0$$

$$3^{\log x} > 3^0 \quad \therefore t > 1$$

이때 주어진 함수는

$$y = t^2 - 6t + 2 = (t-3)^2 - 7 \text{이므로}$$

$t=3$ 일 때 최소이고, 최솟값은 -7

$t=3$ 에서 $3^{\log x} = 3$ 이므로

$$\log x = 1 \quad \therefore x = 10$$

따라서 $a = 10, b = -7$ 이므로

$$a + b = 10 + (-7) = 3$$

33 ㉮ ④

$y = \frac{x^2}{x^{\log_3 x}}$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\begin{aligned}\log_2 y &= \log_2 \frac{x^2}{x^{\log_3 x}} \\ &= \log_2 x^2 - \log_2 x^{\log_3 x} \\ &= 2 \log_2 x - (\log_2 x)^2\end{aligned}$$

$\log_2 x = t$ 라 하면

$\log_2 y = -t^2 + 2t = -(t-1)^2 + 1$ 이므로 $\log_2 y$ 는

$t=1$, 즉 $x=2$ 일 때 최대이고, 최댓값은 1

$\log_2 y = 1$ 에서 $y = 2$

따라서 $a = 2, b = 2$ 이므로

$$a + b = 2 + 2 = 4$$

33-1 ㉮ 80

$y = \frac{27x^2}{x^{\log_3 x}}$ 의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면

$$\begin{aligned}\log_3 y &= \log_3 \frac{27x^2}{x^{\log_3 x}} \\ &= \log_3 27x^2 - \log_3 x^{\log_3 x} \\ &= 3 + 2 \log_3 x - (\log_3 x)^2\end{aligned}$$

$\log_3 x = t$ 라 하면 $\frac{1}{3} \leq x \leq 9$ 에서

$$\log_3 \frac{1}{3} \leq \log_3 x \leq \log_3 9 \quad \therefore -1 \leq t \leq 2$$

$$\text{이때 } \log_3 y = -t^2 + 2t + 3 = -(t-1)^2 + 4 \quad \dots\dots ①$$

이므로 $\log_3 y$ 는

$t=1$ 일 때 최대이고, 최댓값은 4

$t=-1$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $-(-1-1)^2 + 4 = 0$

$$\log_3 y = 4 \text{에서 } y = 3^4 = 81 \quad \therefore M = 81$$

$$\log_3 y = 0 \text{에서 } y = 1 \quad \therefore m = 1 \quad \dots\dots ②$$

$$\therefore M - m = 81 - 1 = 80 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 주어진 함수의 양변에 밑이 3인 로그를 취한 후 $\log_3 x$ 를 t 로 치환하여 나타낼 수 있다.	40%
② M, m 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $M - m$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

34 ㉮ 4

$$y = \log_3 x + \log_x 81 = \log_3 x + \frac{\log_3 81}{\log_3 x} = \log_3 x + \frac{4}{\log_3 x}$$

이때 $x > 1$ 에서 $\log_3 x > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned}\log_3 x + \frac{4}{\log_3 x} &\geq 2\sqrt{\log_3 x \times \frac{4}{\log_3 x}} \\ &= 4 \text{ (단, 등호는 } \log_3 x = 2 \text{일 때 성립)}\end{aligned}$$

따라서 구하는 최솟값은 4이다. $\left[\log_3 x = \frac{4}{\log_3 x} \text{에서 } (\log_3 x)^2 = 4 \right.$
 $\therefore \log_3 x = 2 \text{ (} \because \log_3 x > 0 \text{)}$

34-1 ㉮ $2\sqrt{3}$

$$y = \log_2 x + \log_x 8 = \log_2 x + \frac{\log_2 8}{\log_2 x} = \log_2 x + \frac{3}{\log_2 x}$$

이때 $x > 1$ 에서 $\log_2 x > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned}\log_2 x + \frac{3}{\log_2 x} &\geq 2\sqrt{\log_2 x \times \frac{3}{\log_2 x}} \\ &= 2\sqrt{3} \text{ (단, 등호는 } \log_2 x = \sqrt{3} \text{일 때 성립)}\end{aligned}$$

따라서 구하는 최솟값은 $2\sqrt{3}$ 이다.

35 ㉮ 2

$$\log_4 x + \log_4 y = \log_4 xy \quad \dots\dots ①$$

①에서 밑 4가 $4 > 1$ 이므로 xy 가 최대일 때, $\log_4 xy$ 는 최대이다.

이때 $x > 0, y > 0$ 이므로 $x + y = 8$ 에서 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$x+y \geq 2\sqrt{xy}, 8 \geq 2\sqrt{xy}$$

∴ $xy \leq 16$ (단, 등호는 $x=y=4$ 일 때 성립)

즉 xy 의 최댓값이 16이므로 ㉠의 최댓값은

$$\log_4 16 = 2$$

채점 기준	비율
① 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 xy 에 대한 부등식을 세울 수 있다.	60%
② $\log_4 x + \log_4 y$ 의 최댓값을 구할 수 있다.	40%

35-1 ㉡ -2

$$\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{2}} y = \log_{\frac{1}{2}} xy \quad \dots\dots ㉠$$

㉠에서 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 xy 가 최대일 때, $\log_{\frac{1}{2}} xy$ 는 최소이다.

이때 $x > 0, y > 0$ 이므로 $9x+y=12$ 에서 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$9x+y \geq 2\sqrt{9xy}, 12 \geq 6\sqrt{xy}$$

∴ $xy \leq 4$ (단, 등호는 $9x=y=6$ 일 때 성립)

즉 xy 의 최댓값이 4이므로 ㉠의 최솟값은

$$\log_{\frac{1}{2}} 4 = -2$$

36 ㉢ ㉢

$$\begin{aligned} \log_3 (x+3y) + \log_3 \left(\frac{3}{x} + \frac{4}{y} \right) &= \log_3 (x+3y) \left(\frac{3}{x} + \frac{4}{y} \right) \\ &= \log_3 \left(\frac{9y}{x} + \frac{4x}{y} + 15 \right) \end{aligned}$$

이때 $\frac{y}{x} > 0, \frac{x}{y} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} \frac{9y}{x} + \frac{4x}{y} + 15 &\geq 2\sqrt{\frac{9y}{x} \times \frac{4x}{y}} + 15 \\ &= 27 \text{ (단, 등호는 } 2x=3y \text{일 때 성립)} \end{aligned}$$

따라서 구하는 최솟값은 $\log_3 27 = 3$

36-1 ㉤ ㉤

$$\begin{aligned} \log_2 \left(x + \frac{9}{y} \right) + \log_2 \left(2y + \frac{2}{x} \right) &= \log_2 \left(x + \frac{9}{y} \right) \left(2y + \frac{2}{x} \right) \\ &= \log_2 \left(2xy + \frac{18}{xy} + 20 \right) \end{aligned}$$

이때 $xy > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} 2xy + \frac{18}{xy} + 20 &\geq 2\sqrt{2xy \times \frac{18}{xy}} + 20 \\ &= 32 \text{ (단, 등호는 } xy=3 \text{일 때 성립)} \end{aligned}$$

따라서 구하는 최솟값은 $\log_2 32 = 5$

37 ㉥ 10

진수의 조건에서 $x-1 > 0, 3(2x+7) > 0$

$$\therefore x > 1 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_3 (x-1) = \log_3 3(2x+7) \text{에서}$$

$$\log_3 (x-1)^2 = \log_3 3(2x+7)$$

$$\text{즉 } (x-1)^2 = 3(2x+7) \text{이므로 } x^2 - 8x - 20 = 0$$

$$(x+2)(x-10) = 0 \quad \therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 10$$

이때 ㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는

$$x = 10 \quad \therefore k = 10$$

37-1 ㉥ ㉥

진수의 조건에서 $x+1 > 0, 3x+13 > 0$

$$\therefore x > -1 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_{\frac{1}{3}} (x+1) = \log_{\frac{1}{9}} (3x+13) \text{에서}$$

$$\log_{\frac{1}{9}} (x+1)^2 = \log_{\frac{1}{9}} (3x+13)$$

$$\text{즉 } (x+1)^2 = 3x+13 \text{이므로 } x^2 - x - 12 = 0$$

$$(x+3)(x-4) = 0 \quad \therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 4$$

이때 ㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는 $x = 4$

38 ㉦ 7

$$(가) \text{ 진수의 조건에서 } 5x+6 > 0 \quad \therefore x > -\frac{6}{5} \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_4 (5x+6) = 2 \text{에서 } 5x+6 = 4^2$$

$$5x = 10 \quad \therefore x = 2$$

$x = 2$ 는 ㉠을 만족시키므로 방정식 (가)의 해는

$$x = 2 \quad \therefore a = 2$$

$$(나) \text{ 진수의 조건에서 } x-2 > 0, x-4 > 0$$

$$\therefore x > 4 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\log_9 (x-2) + \log_{\frac{1}{9}} (x-4) = \frac{1}{2} \text{에서}$$

$$\log_9 (x-2) - \log_9 (x-4) = \log_9 9^{\frac{1}{2}}$$

$$\log_9 \frac{x-2}{x-4} = \log_9 3$$

$$\text{즉 } \frac{x-2}{x-4} = 3 \text{이므로 } x-2 = 3x-12$$

$$2x = 10 \quad \therefore x = 5$$

$x = 5$ 는 ㉡을 만족시키므로 방정식 (나)의 해는

$$x = 5 \quad \therefore b = 5$$

$$\therefore a+b = 2+5 = 7$$

38-1 ㉦ $x=5$

진수의 조건에서 $x+1 > 0, x+4 > 0$

$$\therefore x > -1 \quad \dots\dots ㉠ \quad \dots\dots ㉡$$

$$2 \log_2 (x+1) = 2 + \log_2 (x+4) \text{에서}$$

$$\log_2 (x+1)^2 = \log_2 4(x+4)$$

$$\text{즉 } (x+1)^2 = 4(x+4) \text{이므로 } x^2 - 2x - 15 = 0$$

$$(x+3)(x-5) = 0 \quad \therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 5$$

이때 ㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는

$$x = 5 \quad \dots\dots ㉡$$

채점 기준	비율
① 진수의 조건을 이용하여 x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
② 방정식의 해를 구할 수 있다.	70%

39 ㉧ ㉧

밑과 진수의 조건에서

$$x^2 - 8x + 16 > 0, x^2 - 8x + 16 \neq 1, 5 - x > 0$$

$$(x-4)^2 > 0, (x-4)^2 \neq 1, x < 5 \text{이므로}$$

$$x \neq 3, x \neq 4, x \neq 5, x < 5$$

$$\therefore x < 3 \text{ 또는 } 3 < x < 4 \text{ 또는 } 4 < x < 5 \quad \dots\dots ㉠$$

$$(i) x^2 - 8x + 16 = 4 \text{일 때}$$

$$x^2 - 8x + 12 = 0, (x-2)(x-6) = 0$$

$$\therefore x = 2 \text{ 또는 } x = 6$$

이때 ㉠에 의하여 $x = 2$

(ii) $5-x=1$ 일 때

$$x=4$$

그런데 $x=4$ 는 ㉠을 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 해는

$$x=2$$

39-1 ㉡ 3

밑과 진수의 조건에서

$$4x > 0, 4x \neq 1, x^2 + 2x - 2 > 0$$

$$\therefore x > -1 + \sqrt{3}$$

.....㉠

(i) $x^2 + 4 = 4x$ 일 때

$$x^2 - 4x + 4 = 0, (x-2)^2 = 0$$

$$\therefore x = 2$$

이때 ㉠에 의하여 $x=2$

(ii) $x^2 + 2x - 2 = 1$ 일 때

$$x^2 + 2x - 3 = 0, (x+3)(x-1) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 1$$

이때 ㉠에 의하여 $x=1$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 해는

$$x=1 \text{ 또는 } x=2$$

따라서 주어진 방정식의 모든 근의 합은

$$1+2=3$$

참고 밑의 조건에서 $x^2 + 4 > 0$, $x^2 + 4 \neq 1$ 은 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로 생각하지 않아도 된다.

40 ㉡ 5

$$\log_2 x = t \text{라 하면 } t^2 + 2t - 35 = 0$$

$$(t+7)(t-5) = 0 \quad \therefore t = -7 \text{ 또는 } t = 5$$

$$\text{즉 } \log_2 x = -7 \text{ 또는 } \log_2 x = 5 \text{이므로}$$

$$x = 2^{-7} \text{ 또는 } x = 2^5 \quad \therefore \alpha = 2^{-7}, \beta = 2^5 (\because \alpha < \beta)$$

$$\therefore \alpha\beta^2 = 2^{-7} \times (2^5)^2 = 2^3 = 8$$

40-1 ㉡ -3

$$\log_5 x = 8 \log_x 5 + 2 \text{에서 } \log_5 x = \frac{8}{\log_5 x} + 2$$

$$\log_5 x = t \text{라 하면 } t = \frac{8}{t} + 2$$

$$t^2 - 2t - 8 = 0, (t+2)(t-4) = 0$$

$$\therefore t = -2 \text{ 또는 } t = 4$$

$$\text{즉 } \log_5 x = -2 \text{ 또는 } \log_5 x = 4 \text{이므로}$$

$$x = 5^{-2} \text{ 또는 } x = 5^4 \quad \therefore \alpha = 5^{-2}, \beta = 5^4 (\because \alpha < \beta)$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_\alpha \beta^2 + \log_\beta \alpha &= 2 \log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha \\ &= 2 \log_{5^{-2}} 5^4 + \log_{5^4} 5^{-2} \\ &= 2 \times \frac{-2}{4} + \frac{4}{-2} = -3 \end{aligned}$$

41 ㉡ $x=8$

주어진 방정식의 한 근이 $x=2$ 이므로

$$(\log_2 2)^2 - \log_2 2^4 + a = 0, 1 - 4 + a = 0 \quad \therefore a = 3$$

$$\text{즉 } (\log_2 x)^2 - \log_2 x^4 + 3 = 0 \text{이므로}$$

$$(\log_2 x)^2 - 4 \log_2 x + 3 = 0$$

$$\log_2 x = t \text{라 하면 } t^2 - 4t + 3 = 0$$

$$(t-1)(t-3) = 0 \quad \therefore t = 1 \text{ 또는 } t = 3$$

$$\text{즉 } \log_2 x = 1 \text{ 또는 } \log_2 x = 3 \text{이므로}$$

$$x = 2 \text{ 또는 } x = 2^3 = 8$$

따라서 다른 한 근은 $x=8$ 이다.

41-1 ㉡ 6

$$x=16 \text{을 } (\log_2 x)^2 - \log_2 x^5 + a = 0 \text{에 대입하면}$$

$$(\log_2 16)^2 - \log_2 16^5 + a = 0$$

$$16 - 20 + a = 0 \quad \therefore a = 4$$

.....㉠

$$\text{즉 } (\log_2 x)^2 - \log_2 x^5 + 4 = 0 \text{이므로}$$

$$(\log_2 x)^2 - 5 \log_2 x + 4 = 0$$

$$\log_2 x = t \text{라 하면 } t^2 - 5t + 4 = 0$$

$$(t-1)(t-4) = 0 \quad \therefore t = 1 \text{ 또는 } t = 4$$

$$\text{즉 } \log_2 x = 1 \text{ 또는 } \log_2 x = 4 \text{이므로}$$

$$x = 2 \text{ 또는 } x = 2^4 = 16$$

따라서 다른 한 근은 $x=2$ 이므로

$$\alpha = 2$$

.....㉡

$$\therefore \alpha + \alpha = 4 + 2 = 6$$

.....㉢

채점 기준	비율
㉠ α 의 값을 구할 수 있다.	40%
㉡ α 의 값을 구할 수 있다.	50%
㉢ $\alpha + \alpha$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

42 ㉡ 3

$$\left(\log_2 \frac{4}{x}\right) \left(\log_2 \frac{x}{2}\right) + 6 = 0 \text{에서}$$

$$(\log_2 4 - \log_2 x)(\log_2 x - \log_2 2) + 6 = 0$$

$$\therefore (2 - \log_2 x)(\log_2 x - 1) + 6 = 0$$

$$\log_2 x = t \text{라 하면 } (2-t)(t-1) + 6 = 0$$

$$t^2 - 3t - 4 = 0, (t+1)(t-4) = 0$$

$$\therefore t = -1 \text{ 또는 } t = 4$$

$$\text{즉 } \log_2 x = -1 \text{ 또는 } \log_2 x = 4 \text{이므로}$$

$$x = 2^{-1} = \frac{1}{2} \text{ 또는 } x = 2^4 = 16 \quad \therefore \alpha = \frac{1}{2}, \beta = 16 (\because \alpha < \beta)$$

$$\therefore 2\alpha + \beta = 2 \times \frac{1}{2} + 16 = 17$$

42-1 ㉡ -5

$$(\log_3 3x)(\log_3 27x) = 8 \text{에서}$$

$$(\log_3 3 + \log_3 x)(\log_3 27 + \log_3 x) = 8$$

$$\therefore (1 + \log_3 x)(3 + \log_3 x) = 8$$

$$\log_3 x = t \text{라 하면 } (1+t)(3+t) = 8$$

$$t^2 + 4t - 5 = 0, (t+5)(t-1) = 0$$

$$\therefore t = -5 \text{ 또는 } t = 1$$

$$\text{즉 } \log_3 x = -5 \text{ 또는 } \log_3 x = 1 \text{이므로}$$

$$x = 3^{-5} \text{ 또는 } x = 3 \quad \therefore \alpha = 3, \beta = 3^{-5} (\because \alpha > \beta)$$

$$\therefore \log_\alpha \beta = \log_3 3^{-5} = -5$$

43 ㉡ $\frac{1}{9}$

$$(\log_3 x)^2 + \log_3 x^2 - 1 = 0 \text{에서}$$

$$(\log_3 x)^2 + 2 \log_3 x - 1 = 0$$

$$\log_3 x = t \text{라 하면 } t^2 + 2t - 1 = 0$$

.....㉠

이차방정식 ㉠의 두 근이 $\log_3 \alpha, \log_3 \beta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $\log_3 \alpha + \log_3 \beta = -2$

$$\log_3 \alpha \beta = -2 \quad \therefore \alpha \beta = 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

43-1 ㉡ ①

$$(\log_2 x)^2 - \log_2 x^2 - 1 = 0 \text{에서}$$

$$(\log_2 x)^2 - 2 \log_2 x - 1 = 0$$

$$\log_2 x = t \text{라 하면 } t^2 - 2t - 1 = 0 \quad \dots\dots ㉠$$

이차방정식 ㉠의 두 근이 $\log_2 \alpha, \log_2 \beta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_2 \alpha + \log_2 \beta = 2, \log_2 \alpha \times \log_2 \beta = -1$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha &= \frac{\log_2 \beta}{\log_2 \alpha} + \frac{\log_2 \alpha}{\log_2 \beta} \\ &= \frac{(\log_2 \beta)^2 + (\log_2 \alpha)^2}{\log_2 \alpha \times \log_2 \beta} \\ &= \frac{(\log_2 \alpha + \log_2 \beta)^2 - 2 \log_2 \alpha \times \log_2 \beta}{\log_2 \alpha \times \log_2 \beta} \\ &= \frac{2^2 - 2 \times (-1)}{-1} \\ &= -6 \end{aligned}$$

44 ㉡ 16

$$\log x \times \log \frac{x}{16} = k \text{에서}$$

$$\log x (\log x - \log 16) = k$$

$$\log x = t \text{라 하면 } t(t - \log 16) = k$$

$$\therefore t^2 - (\log 16)t - k = 0 \quad \dots\dots ㉠$$

이차방정식 ㉠의 두 근이 $\log \alpha, \log \beta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $\log \alpha + \log \beta = \log 16$

$$\log \alpha \beta = \log 16 \quad \therefore \alpha \beta = 16$$

44-1 ㉡ $\frac{1}{6}$

$$\log 2x \times \log 3x = 1 \text{에서}$$

$$(\log 2 + \log x)(\log 3 + \log x) = 1$$

$$\log x = t \text{라 하면 } (\log 2 + t)(\log 3 + t) = 1$$

$$t^2 + (\log 2 + \log 3)t + \log 2 \times \log 3 - 1 = 0$$

$$\therefore t^2 + (\log 6)t + \log 2 \times \log 3 - 1 = 0 \quad \dots\dots ㉠$$

이차방정식 ㉠의 두 근이 $\log \alpha, \log \beta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $\log \alpha + \log \beta = -\log 6$

$$\log \alpha \beta = \log \frac{1}{6} \quad \therefore \alpha \beta = \frac{1}{6}$$

45 ㉡ 3

$$(\log_2 x)^2 - \log_2 x^{2k} + k + 2 = 0 \text{에서}$$

$$(\log_2 x)^2 - 2k \log_2 x + k + 2 = 0$$

$$\log_2 x = t \text{라 하면 } t^2 - 2kt + k + 2 = 0 \quad \dots\dots ㉠$$

주어진 방정식의 두 근을 α, β 라 하면 이차방정식 ㉠의 두 근은

$\log_2 \alpha, \log_2 \beta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_2 \alpha + \log_2 \beta = 2k, \log_2 \alpha \beta = 2k$$

$$\therefore \alpha \beta = 2^{2k}$$

$$\text{이때 } \alpha \beta = 64 \text{이므로 } 2^{2k} = 64 = 2^6$$

$$2k = 6 \quad \therefore k = 3$$

45-1 ㉡ 5

$$(\log_3 x)^2 - \log_3 x^k + 6 = 0 \text{에서}$$

$$(\log_3 x)^2 - k \log_3 x + 6 = 0$$

$$\log_3 x = t \text{라 하면 } t^2 - kt + 6 = 0 \quad \dots\dots ㉠ \quad \dots\dots ①$$

이차방정식 ㉠의 두 근이 $\log_3 \alpha, \log_3 \beta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $\log_3 \alpha + \log_3 \beta = k$

$$\log_3 \alpha \beta = k \quad \therefore \alpha \beta = 3^k \quad \dots\dots ②$$

$$\text{이때 } \alpha \beta = 243 \text{이므로 } 3^k = 243 = 3^5$$

$$\therefore k = 5 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① $\log_3 x$ 를 t 로 치환하고 주어진 방정식을 t 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30%
② α, β, k 의 관계식을 구할 수 있다.	40%
③ 실수 k 의 값을 구할 수 있다.	30%

46 ㉡ ⑤

$$x^{\log x} = \frac{1}{4} x^2 \text{의 양변에 상용로그를 취하면}$$

$$\log x^{\log x} = \log \frac{1}{4} x^2, \log x \times \log x = \log \frac{1}{4} + \log x^2$$

$$(\log x)^2 = -2 \log 2 + 2 \log x$$

$$\therefore (\log x)^2 - 2 \log x + 2 \log 2 = 0$$

$$\log x = t \text{라 하면 } t^2 - 2t + 2 \log 2 = 0 \quad \dots\dots ㉠$$

이차방정식 ㉠의 두 근이 $\log \alpha, \log \beta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $\log \alpha + \log \beta = 2$

$$\log \alpha \beta = 2 \quad \therefore \alpha \beta = 10^2 = 100$$

46-1 ㉡ ①

주어진 방정식의 두 근을 α, β 라 하면 $\alpha \beta = 8$

$$x^{\log_2 x} = 16x^k \text{의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면}$$

$$\log_2 x^{\log_2 x} = \log_2 16x^k, \log_2 x \times \log_2 x = \log_2 16 + \log_2 x^k$$

$$(\log_2 x)^2 = 4 + k \log_2 x$$

$$\therefore (\log_2 x)^2 - k \log_2 x - 4 = 0$$

$$\log_2 x = t \text{라 하면 } t^2 - kt - 4 = 0 \quad \dots\dots ㉠$$

이차방정식 ㉠의 두 근이 $\log_2 \alpha, \log_2 \beta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $\log_2 \alpha + \log_2 \beta = k$

$$\log_2 \alpha \beta = k \quad \therefore k = \log_2 8 = 3$$

47 ㉡ 8

$$x^{\log_4 x} - \frac{64}{x^2} = 0 \text{에서 } x^{\log_4 x} = \frac{64}{x^2}$$

양변에 밑이 4인 로그를 취하면

$$\log_4 x^{\log_4 x} = \log_4 \frac{64}{x^2}, \log_4 x \times \log_4 x = \log_4 64 - \log_4 x^2$$

$$(\log_4 x)^2 = 3 - 2 \log_4 x$$

$$\therefore (\log_4 x)^2 + 2 \log_4 x - 3 = 0$$

$$\log_4 x = t \text{라 하면 } t^2 + 2t - 3 = 0 \quad \dots\dots ①$$

$$(t+3)(t-1) = 0 \quad \therefore t = -3 \text{ 또는 } t = 1 \quad \dots\dots ②$$

즉 $\log_4 x = -3$ 또는 $\log_4 x = 1$ 이므로

$$x = 4^{-3} \text{ 또는 } x = 4 \quad \therefore \alpha = 4, \beta = 4^{-3} (\because \alpha > \beta) \quad \dots\dots ③$$

$$\therefore \log_2 \frac{\alpha}{\beta} = \log_2 \alpha - \log_2 \beta = \log_2 4 - \log_2 4^{-3}$$

$$= \log_2 2^2 - \log_2 2^{-6} = 2 - (-6) = 8 \quad \dots\dots ④$$

채점 기준	비율
① $\log_4 x$ 를 t 로 치환하고 주어진 방정식을 t 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
② t 의 값을 구할 수 있다.	20%
③ α, β 의 값을 구할 수 있다.	20%
④ $\log_2 \frac{\alpha}{\beta}$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

47-1 ㉔ ⑤

$x^{\log x} = \frac{10^4}{x^3}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\log x^{\log x} = \log \frac{10^4}{x^3}, \log x \times \log x = \log 10^4 - \log x^3$$

$$(\log x)^2 = 4 - 3 \log x$$

$$\therefore (\log x)^2 + 3 \log x - 4 = 0$$

$$\log x = t \text{라 하면 } t^2 + 3t - 4 = 0$$

$$(t+4)(t-1) = 0 \quad \therefore t = -4 \text{ 또는 } t = 1$$

$$\text{즉 } \log x = -4 \text{ 또는 } \log x = 1 \text{이므로}$$

$$x = 10^{-4} = \frac{1}{10000} \text{ 또는 } x = 10$$

따라서 모든 실수 x 의 값의 곱은

$$\frac{1}{10000} \times 10 = \frac{1}{1000}$$

48 ㉔ $x = \frac{1}{6}$

$(2x)^{\log 2} = (3x)^{\log 3}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\log (2x)^{\log 2} = \log (3x)^{\log 3}$$

$$\log 2 \times \log 2x = \log 3 \times \log 3x$$

$$\log 2 (\log 2 + \log x) = \log 3 (\log 3 + \log x)$$

$$(\log 2)^2 + \log 2 \times \log x = (\log 3)^2 + \log 3 \times \log x$$

$$(\log 2 - \log 3) \log x = (\log 3)^2 - (\log 2)^2$$

$$(\log 2 - \log 3) \log x = (\log 3 + \log 2)(\log 3 - \log 2)$$

$$\log x = -(\log 3 + \log 2), \log x = -\log 6$$

$$\log x = \log 6^{-1} \quad \therefore x = 6^{-1} = \frac{1}{6}$$

48-1 ㉔ $x = \frac{1}{400}$

$$(25x)^{\log 5} - (16x)^{\log 4} = 0 \text{에서 } (25x)^{\log 5} = (16x)^{\log 4}$$

양변에 상용로그를 취하면

$$\log (25x)^{\log 5} = \log (16x)^{\log 4}$$

$$\log 5 \times \log 25x = \log 4 \times \log 16x$$

$$\log 5 (\log 25 + \log x) = \log 4 (\log 16 + \log x)$$

$$\log 5 (2 \log 5 + \log x) = \log 4 (2 \log 4 + \log x)$$

$$2 \times (\log 5)^2 + \log 5 \times \log x = 2 \times (\log 4)^2 + \log 4 \times \log x$$

$$(\log 5 - \log 4) \log x = 2 \times (\log 4)^2 - 2 \times (\log 5)^2$$

$$(\log 5 - \log 4) \log x = 2(\log 4 + \log 5)(\log 4 - \log 5)$$

$$\log x = -2(\log 4 + \log 5), \log x = -2 \log 20$$

$$\log x = \log 20^{-2} \quad \therefore x = 20^{-2} = \frac{1}{400}$$

49 ㉔ 3

밑의 조건에서 $x > 0, x \neq 1, y > 0, y \neq 1$

$$\begin{cases} \log_x 27 - \log_y 9 = -4 \\ \log_x 3 + \log_y 81 = 1 \end{cases} \text{에서 } \begin{cases} 3 \log_x 3 - 2 \log_y 3 = -4 \\ \log_x 3 + 4 \log_y 3 = 1 \end{cases}$$

$$\log_x 3 = X, \log_y 3 = Y \text{라 하면}$$

$$\begin{cases} 3X - 2Y = -4 \\ X + 4Y = 1 \end{cases}$$

$$\text{연립방정식을 풀면 } X = -1, Y = \frac{1}{2}$$

$$\text{즉 } \log_x 3 = -1, \log_y 3 = \frac{1}{2} \text{이므로 } x^{-1} = 3, y^{\frac{1}{2}} = 3$$

$$\therefore x = \frac{1}{3}, y = 9$$

이 값은 ㉔을 만족시키므로 $\alpha = \frac{1}{3}, \beta = 9$

$$\therefore \alpha\beta = \frac{1}{3} \times 9 = 3$$

49-1 ㉔ $x = \frac{1}{2}, y = 4$

밑의 조건에서 $x > 0, x \neq 1, y > 0, y \neq 1$

.....㉔

$$\begin{cases} \log_x 2 - \log_y 16 = -3 \\ \log_x 8 + \log_y 4 = -2 \end{cases} \text{에서 } \begin{cases} \log_x 2 - 4 \log_y 2 = -3 \\ 3 \log_x 2 + 2 \log_y 2 = -2 \end{cases}$$

$$\log_x 2 = X, \log_y 2 = Y \text{라 하면}$$

$$\begin{cases} X - 4Y = -3 \\ 3X + 2Y = -2 \end{cases}$$

$$\text{연립방정식을 풀면 } X = -1, Y = \frac{1}{2}$$

$$\text{즉 } \log_x 2 = -1, \log_y 2 = \frac{1}{2} \text{이므로 } x^{-1} = 2, y^{\frac{1}{2}} = 2$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}, y = 4$$

이 값은 ㉔을 만족시키므로 주어진 연립방정식의 해는

$$x = \frac{1}{2}, y = 4$$

50 ㉔ ③

진수의 조건에서 $x > 0, y > 0$

$$2^x \times 2^y = 16 \text{에서 } 2^{x+y} = 2^4 \quad \therefore x + y = 4$$

$$\log_5 x + \log_5 y = 0 \text{에서 } \log_5 xy = 0 \quad \therefore xy = 1$$

이때 연립방정식의 해가 $x = \alpha, y = \beta$ 이므로

$$\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = 1$$

$$\therefore \alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 4^3 - 3 \times 1 \times 4 = 52$$

50-1 ㉔ 60

진수의 조건에서 $x + y > 0, x > 0, y > 0$

$$\therefore x > 0, y > 0$$

$$\log_2 (x + y) = 3 \text{에서 } x + y = 2^3 = 8$$

$$\log_2 x + \log_2 y = 1 \text{에서 } \log_2 xy = 1 \quad \therefore xy = 2$$

이때 연립방정식의 해가 $x = \alpha, y = \beta$ 이므로

$$\alpha + \beta = 8, \alpha\beta = 2$$

$$\therefore \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 8^2 - 2 \times 2 = 60$$

51 ㉔ 7

진수의 조건에서 $x > 0, y > 0$

.....㉔

$$\log_2 x = X, \log_5 y = Y \text{라 하면}$$

$$\begin{cases} X + Y = 7 \\ XY = 10 \end{cases}$$

.....㉔

.....㉔

㉔에서 $Y = 7 - X$ 이므로 ㉔에 대입하면

$$X(7 - X) = 10, X^2 - 7X + 10 = 0$$

$$(X - 2)(X - 5) = 0 \quad \therefore X = 2 \text{ 또는 } X = 5$$

이 값을 ㉔에 대입하면 $Y = 5$ 또는 $Y = 2$

$$\text{즉 } \begin{cases} X = 2 \\ Y = 5 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} X = 5 \\ Y = 2 \end{cases} \text{이므로 } \begin{cases} \log_2 x = 2 \\ \log_5 y = 5 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} \log_2 x = 5 \\ \log_5 y = 2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x = 4 \\ y = 5^5 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = 32 \\ y = 25 \end{cases}$$

따라서 ㉔을 만족시키고 $\alpha > \beta$ 이므로

$$\alpha = 32, \beta = 25$$

$$\therefore \alpha - \beta = 32 - 25 = 7$$

51-1 ㉔ ②

진수의 조건에서 $xy > 0, x > 0, y > 0$

$$\therefore x > 0, y > 0$$

$$\begin{cases} \log_2 xy = 2 \\ \log_2 x \times \log_2 y = -3 \end{cases} \text{에서 } \begin{cases} \log_2 x + \log_2 y = 2 \\ \log_2 x \times \log_2 y = -3 \end{cases}$$

$\log_2 x = X, \log_2 y = Y$ 라 하면

$$\begin{cases} X + Y = 2 \\ XY = -3 \end{cases}$$

㉔에서 $Y = 2 - X$ 이므로 ㉔에 대입하면

$$X(2 - X) = -3, X^2 - 2X - 3 = 0$$

$$(X + 1)(X - 3) = 0 \quad \therefore X = -1 \text{ 또는 } X = 3$$

이 값을 ㉔에 대입하면 $Y = 3$ 또는 $Y = -1$

$$\therefore \begin{cases} X = -1 \\ Y = 3 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} X = 3 \\ Y = -1 \end{cases} \text{이므로}$$

$$\begin{cases} \log_2 x = -1 \\ \log_2 y = 3 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} \log_2 x = 3 \\ \log_2 y = -1 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = 8 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = 8 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

따라서 ㉔을 만족시키고 $a > 1$ 이므로

$$a = 8, b = \frac{1}{2} \quad \therefore \frac{a}{b} = \frac{8}{\frac{1}{2}} = 16$$

.....㉔

$$\text{이때 밑 } 9 > 1 \text{이므로 } (x-2)^2 < 2x-1$$

$$x^2 - 6x + 5 < 0, (x-1)(x-5) < 0$$

$$\therefore 1 < x < 5$$

㉔, ㉔의 공통 범위를 구하면 $2 < x < 5$

따라서 정수 x 의 값은 3, 4이므로 그 합은

$$3 + 4 = 7$$

.....㉔

.....㉔

.....㉔

채점 기준	비율
① 진수의 조건을 만족시키는 x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
② 주어진 부등식을 만족시키는 x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	50%
③ 정수 x 의 값의 합을 구할 수 있다.	20%

53-1 ㉔ ②

진수의 조건에서 $x-4 > 0, x+2 > 0$

$$\therefore x > 4$$

$$2 \log_{\frac{1}{2}}(x-4) > \log_{\frac{1}{2}}(x+2) \text{에서}$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-4)^2 > \log_{\frac{1}{2}}(x+2)$$

$$\text{이때 밑 } \frac{1}{2} \text{이 } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로 } (x-4)^2 < x+2$$

$$x^2 - 9x + 14 < 0, (x-2)(x-7) < 0$$

$$\therefore 2 < x < 7$$

㉔, ㉔의 공통 범위를 구하면 $4 < x < 7$

따라서 정수 x 의 값은 5, 6이므로 그 개수는 2이다.

.....㉔

.....㉔

52 ㉔ ③

진수의 조건에서 $x^2 - 9 > 0, x - 1 > 0$

$$\therefore x > 3$$

$$\log_2(x^2 - 9) - \log_2(x - 1) < 2 \text{에서}$$

$$\log_2(x^2 - 9) < \log_2(x - 1) + \log_2 4$$

$$\therefore \log_2(x^2 - 9) < \log_2 4(x - 1)$$

이때 밑 2가 $2 > 1$ 이므로 $x^2 - 9 < 4(x - 1)$

$$x^2 - 4x - 5 < 0, (x + 1)(x - 5) < 0$$

$$\therefore -1 < x < 5$$

㉔, ㉔의 공통 범위를 구하면 $3 < x < 5$

.....㉔

.....㉔

52-1 ㉔ 18

진수의 조건에서 $x-3 > 0, x-2 > 0$

$$\therefore x > 3$$

$$\log_{\frac{1}{3}}(x-3) + \log_{\frac{1}{3}}(x-2) > -1 + \log_{\frac{1}{3}} 4 \text{에서}$$

$$\log_{\frac{1}{3}}(x-3) + \log_{\frac{1}{3}}(x-2) > \log_{\frac{1}{3}} 3 + \log_{\frac{1}{3}} 4$$

$$\therefore \log_{\frac{1}{3}}(x-3)(x-2) > \log_{\frac{1}{3}} 12$$

$$\text{이때 밑 } \frac{1}{3} \text{이 } 0 < \frac{1}{3} < 1 \text{이므로 } (x-3)(x-2) < 12$$

$$x^2 - 5x - 6 < 0, (x+1)(x-6) < 0$$

$$\therefore -1 < x < 6$$

㉔, ㉔의 공통 범위를 구하면 $3 < x < 6$

따라서 $a = 3, b = 6$ 이므로

$$ab = 3 \times 6 = 18$$

.....㉔

.....㉔

53 ㉔ 7

진수의 조건에서 $x-2 > 0, 2x-1 > 0$

$$\therefore x > 2$$

$$\log_3(x-2) < \log_9(2x-1) \text{에서}$$

$$\log_9(x-2)^2 < \log_9(2x-1)$$

.....㉔

.....㉔

54 ㉔ 1

진수의 조건에서 $2x-1 > 0, x-\frac{1}{2} > 0$

$$\therefore x > \frac{1}{2}$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(2x-1) + 1 > \log_{\frac{1}{4}}\left(x-\frac{1}{2}\right) \text{에서}$$

$$\log_{\frac{1}{4}}(2x-1)^2 + \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{4} > \log_{\frac{1}{4}}\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

$$\therefore \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{4} (2x-1)^2 > \log_{\frac{1}{4}}\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

$$\text{이때 밑 } \frac{1}{4} \text{이 } 0 < \frac{1}{4} < 1 \text{이므로 } \frac{1}{4} (2x-1)^2 < x - \frac{1}{2}$$

$$4x^2 - 8x + 3 < 0, (2x-1)(2x-3) < 0$$

$$\therefore \frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$$

㉔, ㉔의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$

따라서 정수 x 의 값은 1이다.

.....㉔

.....㉔

54-1 ㉔ 10

진수의 조건에서 $x > 0, 3x-5 > 0$

$$\therefore x > \frac{5}{3}$$

$$\log_2 x - \log_4(3x-5) \leq 1 \text{에서}$$

$$\log_2 x \leq 1 + \log_4(3x-5)$$

$$\log_4 x^2 \leq \log_4 4 + \log_4(3x-5)$$

$$\therefore \log_4 x^2 \leq \log_4 4(3x-5)$$

$$\text{이때 밑 } 4 > 1 \text{이므로 } x^2 \leq 4(3x-5)$$

$$x^2 - 12x + 20 \leq 0, (x-2)(x-10) \leq 0$$

$$\therefore 2 \leq x \leq 10$$

㉔, ㉔의 공통 범위를 구하면 $2 \leq x \leq 10$

따라서 정수 x 의 최댓값은 10이다.

.....㉔

55 ㉔ ④

진수의 조건에서 $\log_{\frac{1}{3}} x > 0, x > 0$

$$\therefore 0 < x < 1$$

.....㉔

$$\log_{\frac{1}{2}} (\log_{\frac{1}{3}} x) \geq 1 \text{에서 } \log_{\frac{1}{2}} (\log_{\frac{1}{3}} x) \geq \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}$$

$$\text{및 } \frac{1}{2} \text{이 } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로 } \log_{\frac{1}{3}} x \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{즉 } \log_{\frac{1}{3}} x \leq \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \text{에서 및 } \frac{1}{3} \text{이 } 0 < \frac{1}{3} < 1 \text{이므로}$$

$$x \geq \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \therefore x \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$$

.....㉕

$$\text{㉔, ㉕의 공통 범위를 구하면 } \frac{\sqrt{3}}{3} \leq x < 1$$

55-1 ㉔ 1 < x ≤ 9

진수의 조건에서 $\log_3 x > 0, x > 0$

$$\therefore x > 1$$

.....㉔

$$\log_2 (\log_3 x) \leq 1 \text{에서 } \log_2 (\log_3 x) \leq \log_2 2$$

$$\text{및 } 2 \text{가 } 2 > 1 \text{이므로 } \log_3 x \leq 2$$

$$\text{즉 } \log_3 x \leq \log_3 3^2 \text{에서 및 } 3 \text{이 } 3 > 1 \text{이므로 } x \leq 9$$

.....㉕

$$\text{㉔, ㉕의 공통 범위를 구하면 } 1 < x \leq 9$$

56 ㉔ ④

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \log_3 (\log_3 x) \text{이므로}$$

$$\log_3 (\log_3 x) \leq 1$$

진수의 조건에서 $\log_3 x > 0, x > 0$

$$\therefore x > 1$$

.....㉔

$$\log_3 (\log_3 x) \leq 1 \text{에서 } \log_3 (\log_3 x) \leq \log_3 3$$

$$\text{및 } 3 \text{이 } 3 > 1 \text{이므로 } \log_3 x \leq 3$$

$$\text{즉 } \log_3 x \leq \log_3 3^3 \text{에서 및 } 3 \text{이 } 3 > 1 \text{이므로 } x \leq 27$$

.....㉕

$$\text{㉔, ㉕의 공통 범위를 구하면 } 1 < x \leq 27$$

따라서 자연수 x 의 값은 2, 3, 4, ..., 27이므로 그 개수는 26이다.

56-1 ㉔ 3

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \log_{\frac{1}{2}} (\log_9 x) \text{이므로}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} (\log_9 x) \geq 1$$

진수의 조건에서 $\log_9 x > 0, x > 0$

$$\therefore x > 1$$

.....㉔

.....㉕

$$\log_{\frac{1}{2}} (\log_9 x) \geq 1 \text{에서 } \log_{\frac{1}{2}} (\log_9 x) \geq \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}$$

$$\text{및 } \frac{1}{2} \text{이 } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로 } \log_9 x \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{즉 } \log_9 x \leq \log_9 9^{\frac{1}{2}} \text{에서 및 } 9 \text{가 } 9 > 1 \text{이므로}$$

$$x \leq 9^{\frac{1}{2}} \therefore x \leq 3$$

.....㉕

$$\text{㉔, ㉕의 공통 범위를 구하면 } 1 < x \leq 3$$

.....㉔

따라서 자연수 x 의 최댓값은 3이다.

.....㉕

채점 기준	비율
① 진수의 조건을 만족시키는 x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
② 주어진 부등식을 만족시키는 x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	50%
③ 자연수 x 의 최댓값을 구할 수 있다.	20%

57 ㉔ ③

진수의 조건에서 $\log_3 x > 0, x > 0$

$$\therefore x > 1$$

.....㉔

$$\log_4 (\log_3 x) + \log_4 (\log_7 9) < 1 \text{에서}$$

$$\log_4 (\log_3 x \times \log_7 9) < \log_4 4$$

$$\text{및 } 4 \text{가 } 4 > 1 \text{이므로 } \log_3 x \times \log_7 9 < 4$$

$$\frac{\log_7 x}{\log_7 3} \times 2 \log_7 3 < 4, 2 \log_7 x < 4 \therefore \log_7 x < 2$$

$$\text{및 } 7 \text{이 } 7 > 1 \text{이므로 } x < 49$$

.....㉕

$$\text{㉔, ㉕의 공통 범위를 구하면 } 1 < x < 49$$

$$\text{따라서 } \alpha = 1, \beta = 49 \text{이므로}$$

$$\alpha + \beta = 1 + 49 = 50$$

57-1 ㉔ ②

진수의 조건에서 $\log_5 x > 0, x > 0$

$$\therefore x > 1$$

.....㉔

$$\log_2 (\log_5 x) + \log_2 (\log_3 25) \leq 1 \text{에서}$$

$$\log_2 (\log_5 x \times \log_3 25) \leq \log_2 2$$

$$\text{및 } 2 \text{가 } 2 > 1 \text{이므로 } \log_5 x \times \log_3 25 \leq 2$$

$$\frac{\log_3 x}{\log_3 5} \times 2 \log_3 5 \leq 2, 2 \log_3 x \leq 2 \therefore \log_3 x \leq 1$$

$$\text{및 } 3 \text{이 } 3 > 1 \text{이므로 } x \leq 3$$

.....㉕

$$\text{㉔, ㉕의 공통 범위를 구하면 } 1 < x \leq 3$$

따라서 정수 x 의 값은 2, 3이므로 그 개수는 2이다.

58 ㉔ ③

$$\text{진수의 조건에서 } 8x > 0, \frac{x}{4} > 0$$

$$\therefore x > 0$$

.....㉔

$$(\log_{\frac{1}{2}} 8x) \left(\log_2 \frac{x}{4} \right) > 0 \text{에서 } -(\log_2 8x) \left(\log_2 \frac{x}{4} \right) > 0$$

$$\therefore (\log_2 x + 3)(\log_2 x - 2) < 0$$

$$\log_2 x = t \text{라 하면}$$

$$(t+3)(t-2) < 0 \therefore -3 < t < 2$$

$$\text{즉 } -3 < \log_2 x < 2 \text{이므로 } \log_2 2^{-3} < \log_2 x < \log_2 2^2$$

$$\text{및 } 2 \text{가 } 2 > 1 \text{이므로 } \frac{1}{8} < x < 4$$

.....㉕

$$\text{㉔, ㉕의 공통 범위를 구하면 } \frac{1}{8} < x < 4$$

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{1}{8}, \beta = 4 \text{이므로}$$

$$\alpha\beta = \frac{1}{8} \times 4 = \frac{1}{2}$$

58-1 ㉔ 8

진수의 조건에서 $x > 0, 4x > 0$

$$\therefore x > 0$$

.....㉔

$$(\log_2 x)(\log_2 4x) \leq 15 \text{에서 } \log_2 x (\log_2 x + 2) \leq 15$$

$$\log_2 x = t \text{라 하면 } t(t+2) \leq 15$$

$$t^2 + 2t - 15 \leq 0, (t+5)(t-3) \leq 0$$

$$\therefore -5 \leq t \leq 3$$

$$\text{즉 } -5 \leq \log_2 x \leq 3 \text{이므로 } \log_2 2^{-5} \leq \log_2 x \leq \log_2 2^3$$

$$\text{및 } 2 \text{가 } 2 > 1 \text{이므로 } \frac{1}{32} \leq x \leq 8$$

.....㉕

$$\text{㉔, ㉕의 공통 범위를 구하면 } \frac{1}{32} \leq x \leq 8$$

따라서 자연수 x 의 최댓값은 8이다.

59 ㉔ ④

진수의 조건에서 $x > 0$

.....㉔

$$(\log_2 x)^2 \geq 4 + 3 \log_2 x \text{에서 } (\log_2 x)^2 - 3 \log_2 x - 4 \geq 0$$

$\log_2 x = t$ 라 하면 $t^2 - 3t - 4 \geq 0$
 $(t+1)(t-4) \geq 0 \quad \therefore t \leq -1$ 또는 $t \geq 4$
 즉 $\log_2 x \leq -1$ 또는 $\log_2 x \geq 4$ 이므로
 $\log_2 x \leq \log_2 2^{-1}$ 또는 $\log_2 x \geq \log_2 2^4$
 밑 2가 2 > 1이므로 $x \leq \frac{1}{2}$ 또는 $x \geq 16$ ㉠

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 또는 $x \geq 16$
 따라서 자연수 x 의 최솟값은 16이다.

59-1 ㉡ 2

진수의 조건에서 $2x > 0, x > 0$
 $\therefore x > 0$ ㉠①
 $(\log_{\frac{1}{2}} 2x)^2 + 3 \log_{\frac{1}{2}} x \leq 7$ 에서 $(\log_{\frac{1}{2}} x - 1)^2 + 3 \log_{\frac{1}{2}} x - 7 \leq 0$
 $\log_{\frac{1}{2}} x = t$ 라 하면 $(t-1)^2 + 3t - 7 \leq 0$
 $t^2 + t - 6 \leq 0, (t+3)(t-2) \leq 0$
 $\therefore -3 \leq t \leq 2$
 즉 $-3 \leq \log_{\frac{1}{2}} x \leq 2$ 이므로 $\log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \leq \log_{\frac{1}{2}} x \leq \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^2$
 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 $\frac{1}{4} \leq x \leq 8$ ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{4} \leq x \leq 8$ ②
 따라서 실수 x 의 최댓값은 8, 최솟값은 $\frac{1}{4}$ 이므로
 $a = 8, b = \frac{1}{4} \quad \therefore ab = 8 \times \frac{1}{4} = 2$ ③

채점 기준	비율
① 진수의 조건을 만족시키는 x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
② 주어진 부등식을 만족시키는 x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	50%
③ ab 의 값을 구할 수 있다.	20%

60 ㉡ 6

$\log_{\frac{1}{5}} x = t$ 라 하면 $\frac{1}{125} \leq x \leq 25$ 에서 밑 $\frac{1}{5}$ 이 $0 < \frac{1}{5} < 1$ 이므로
 $\log_{\frac{1}{5}} 25 \leq \log_{\frac{1}{5}} x \leq \log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{125}, -2 \leq \log_{\frac{1}{5}} x \leq 3$
 $\therefore -2 \leq t \leq 3$
 이때 주어진 부등식은 $t^2 + at + b \leq 0$ ㉠
 해가 $-2 \leq t \leq 3$ 이고 t^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(t+2)(t-3) \leq 0 \quad \therefore t^2 - t - 6 \leq 0$
 이 부등식과 ㉠이 일치해야 하므로 $a = -1, b = -6$
 $\therefore ab = -1 \times (-6) = 6$

Lecture 이차부등식의 작성

- 해가 $a \leq x \leq \beta$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(x-a)(x-\beta) \leq 0$, 즉 $x^2 - (a+\beta)x + a\beta \leq 0$
- 해가 $x \leq a$ 또는 $x \geq \beta$ ($a < \beta$)이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(x-a)(x-\beta) \geq 0$, 즉 $x^2 - (a+\beta)x + a\beta \geq 0$

60-1 ㉡ ③

$(\log_3 x)^2 + \log_3 x^a + b < 0$ 에서 $(\log_3 x)^2 + a \log_3 x + b < 0$
 $\log_3 x = t$ 라 하면 $\frac{1}{3} < x < 9$ 에서 밑 3이 3 > 1이므로
 $\log_3 \frac{1}{3} < \log_3 x < \log_3 9, -1 < \log_3 x < 2$
 $\therefore -1 < t < 2$

이때 주어진 부등식은 $t^2 + at + b < 0$ ㉠
 해가 $-1 < t < 2$ 이고 t^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(t+1)(t-2) < 0 \quad \therefore t^2 - t - 2 < 0$
 이 부등식과 ㉠이 일치해야 하므로 $a = -1, b = -2$
 $\therefore a + b = -1 + (-2) = -3$

61 ㉡ 10

진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠
 $8x^{\log_3 x} < x^4$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면
 $\log_2 8x^{\log_3 x} < \log_2 x^4, \log_2 8 + \log_2 x \times \log_2 x < 4 \log_2 x$
 $\therefore (\log_2 x)^2 - 4 \log_2 x + 3 < 0$
 $\log_2 x = t$ 라 하면 $t^2 - 4t + 3 < 0$
 $(t-1)(t-3) < 0 \quad \therefore 1 < t < 3$
 즉 $1 < \log_2 x < 3$ 이므로 $\log_2 2 < \log_2 x < \log_2 2^3$
 밑 2가 2 > 1이므로 $2 < x < 8$ ㉡
 ㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $2 < x < 8$
 따라서 $a = 2, \beta = 8$ 이므로
 $a + \beta = 2 + 8 = 10$

61-1 ㉡ ④

진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠
 $x^{\log x} \leq 100x$ 의 양변에 상용로그를 취하면
 $\log x^{\log x} \leq \log 100x, (\log x)^2 \leq \log 100 + \log x$
 $\therefore (\log x)^2 - \log x - 2 \leq 0$
 $\log x = t$ 라 하면 $t^2 - t - 2 \leq 0$
 $(t+1)(t-2) \leq 0 \quad \therefore -1 \leq t \leq 2$
 즉 $-1 \leq \log x \leq 2$ 이므로 $\log 10^{-1} \leq \log x \leq \log 10^2$
 밑 10이 10 > 1이므로 $\frac{1}{10} \leq x \leq 100$ ㉡
 ㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{10} \leq x \leq 100$

따라서 실수 x 의 최댓값은 100, 최솟값은 $\frac{1}{10}$ 이므로
 $a = 100, b = \frac{1}{10} \quad \therefore ab = 100 \times \frac{1}{10} = 10$

62 ㉡ ⑤

진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠
 $x^{\log_{\frac{1}{2}} x} > 8 \times \left(\frac{1}{x}\right)^4$ 의 양변에 밑이 $\frac{1}{2}$ 인 로그를 취하면
 $\log_{\frac{1}{2}} x^{\log_{\frac{1}{2}} x} < \log_{\frac{1}{2}} \left\{ 8 \times \left(\frac{1}{x}\right)^4 \right\}, (\log_{\frac{1}{2}} x)^2 < \log_{\frac{1}{2}} 8 - 4 \log_{\frac{1}{2}} x$
 $\therefore (\log_{\frac{1}{2}} x)^2 + 4 \log_{\frac{1}{2}} x + 3 < 0$
 $\log_{\frac{1}{2}} x = t$ 라 하면 $t^2 + 4t + 3 < 0$
 $(t+3)(t+1) < 0 \quad \therefore -3 < t < -1$
 즉 $-3 < \log_{\frac{1}{2}} x < -1$ 이므로
 $\log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} < \log_{\frac{1}{2}} x < \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$
 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 $2 < x < 8$ ㉡
 ㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $2 < x < 8$

62-1 ㉡ $\frac{1}{81} < x < \frac{1}{3}$

진수의 조건에서 $x > 0$ ㉠

$$x^{\log_4 x} > 81x^5 \text{의 양변에 밑이 } \frac{1}{3} \text{인 로그를 취하면}$$

$$\log_{\frac{1}{3}} x^{\log_4 x} < \log_{\frac{1}{3}} 81x^5, (\log_{\frac{1}{3}} x)^2 < \log_{\frac{1}{3}} 81 + 5 \log_{\frac{1}{3}} x$$

$$\therefore (\log_{\frac{1}{3}} x)^2 - 5 \log_{\frac{1}{3}} x + 4 < 0$$

$$\log_{\frac{1}{3}} x = t \text{라 하면 } t^2 - 5t + 4 < 0$$

$$(t-1)(t-4) < 0 \quad \therefore 1 < t < 4$$

$$\text{즉 } 1 < \log_{\frac{1}{3}} x < 4 \text{이므로 } \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3} < \log_{\frac{1}{3}} x < \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^4$$

$$\text{밑 } \frac{1}{3} \text{이 } 0 < \frac{1}{3} < 1 \text{이므로 } \frac{1}{81} < x < \frac{1}{3} \quad \dots\dots ㉠$$

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } \frac{1}{81} < x < \frac{1}{3}$$

63 ㉡

$$4^{x+1} > 5^{3-x} \text{의 양변에 상용로그를 취하면}$$

$$(x+1) \log 4 > (3-x) \log 5$$

$$\therefore (\log 4 + \log 5)x > 3 \log 5 - \log 4$$

$$\text{이때}$$

$$\log 4 = 2 \log 2 = 2 \times 0.3 = 0.6$$

$$\log 5 = \log \frac{10}{2} = 1 - \log 2 = 1 - 0.3 = 0.7$$

$$\text{이므로 } (0.6 + 0.7)x > 3 \times 0.7 - 0.6$$

$$1.3x > 1.5 \quad \therefore x > 1.153 \dots$$

$$\text{따라서 정수 } x \text{의 최솟값은 2이다.}$$

63-1 ㉡

$$2^{2x-5} \geq 5^{x-3} \text{의 양변에 상용로그를 취하면}$$

$$(2x-5) \log 2 \geq (x-3) \log 5$$

$$\therefore (2 \log 2 - \log 5)x \geq 5 \log 2 - 3 \log 5 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log 5 = \log \frac{10}{2} = 1 - \log 2 = 1 - 0.3 = 0.7 \text{이므로}$$

$$(2 \times 0.3 - 0.7)x \geq 5 \times 0.3 - 3 \times 0.7$$

$$-0.1x \geq -0.6 \quad \therefore x \leq 6 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{따라서 정수 } x \text{의 최댓값은 6이다.} \quad \dots\dots ㉢$$

채점 기준	비율
① 주어진 부등식의 양변에 상용로그를 취하여 정리할 수 있다.	40%
② 주어진 부등식의 해를 구할 수 있다.	40%
③ 정수 x 의 최댓값을 구할 수 있다.	20%

64 ㉠

$$(i) \log_9 (x+3)^2 \geq \log_3 2x \text{의 진수의 조건에서}$$

$$(x+3)^2 > 0, 2x > 0 \quad \therefore x > 0 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_9 (x+3)^2 \geq \log_3 2x \text{에서 } \log_9 (x+3)^2 \geq \log_9 (2x)^2$$

$$\text{밑 } 9 \text{가 } 9 > 1 \text{이므로 } (x+3)^2 \geq (2x)^2$$

$$3x^2 - 6x - 9 \leq 0, x^2 - 2x - 3 \leq 0$$

$$(x+1)(x-3) \leq 0 \quad \therefore -1 \leq x \leq 3 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } 0 < x \leq 3$$

$$(ii) \log_{\frac{1}{2}} (x+1) \geq -1 \text{의 진수의 조건에서}$$

$$x+1 > 0 \quad \therefore x > -1 \quad \dots\dots ㉢$$

$$\log_{\frac{1}{2}} (x+1) \geq -1 \text{에서 } \log_{\frac{1}{2}} (x+1) \geq \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$$

$$\text{밑 } \frac{1}{2} \text{이 } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로 } x+1 \leq 2 \quad \therefore x \leq 1 \quad \dots\dots ㉣$$

$$\text{㉢, ㉣의 공통 범위를 구하면 } -1 < x \leq 1$$

(i), (ii)에서 연립부등식의 해는 $0 < x \leq 1$
따라서 자연수 x 의 값은 1이다.

64-1 ㉡

$$(i) \log_4 (x+1)^2 \geq \log_2 3x \text{의 진수의 조건에서}$$

$$(x+1)^2 > 0, 3x > 0 \quad \therefore x > 0 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_4 (x+1)^2 \geq \log_2 3x \text{에서 } \log_4 (x+1)^2 \geq \log_4 (3x)^2$$

$$\text{밑 } 4 \text{가 } 4 > 1 \text{이므로 } (x+1)^2 \geq (3x)^2$$

$$8x^2 - 2x - 1 \leq 0, (4x+1)(2x-1) \leq 0$$

$$\therefore -\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{1}{2} \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } 0 < x \leq \frac{1}{2}$$

$$(ii) \log_{\frac{1}{3}} (x+2) \geq -1 \text{의 진수의 조건에서}$$

$$x+2 > 0 \quad \therefore x > -2 \quad \dots\dots ㉢$$

$$\log_{\frac{1}{3}} (x+2) \geq -1 \text{에서 } \log_{\frac{1}{3}} (x+2) \geq \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$$

$$\text{밑 } \frac{1}{3} \text{이 } 0 < \frac{1}{3} < 1 \text{이므로 } x+2 \leq 3 \quad \therefore x \leq 1 \quad \dots\dots ㉣$$

$$\text{㉢, ㉣의 공통 범위를 구하면 } -2 < x \leq 1$$

$$(i), (ii) \text{에서 연립부등식의 해는 } 0 < x \leq \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\alpha = 0, \beta = \frac{1}{2} \quad \therefore \alpha + \beta = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

65 ㉡

$$(i) \left(\frac{2}{3}\right)^{x-3} \leq \left(\frac{3}{2}\right)^{2x-3} \text{에서 } \left(\frac{2}{3}\right)^{x-3} \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{3-2x}$$

$$\text{밑 } \frac{2}{3} \text{가 } 0 < \frac{2}{3} < 1 \text{이므로 } x-3 \geq 3-2x$$

$$3x \geq 6 \quad \therefore x \geq 2 \quad \dots\dots ㉠$$

$$(ii) \log_3 (x^2 - 2x + 6) > 2 \text{에서 } \log_3 (x^2 - 2x + 6) > \log_3 3^2$$

$$\therefore \log_3 (x^2 - 2x + 6) > \log_3 9$$

$$\text{이때 } x^2 - 2x + 6 = (x-1)^2 + 5 > 0 \text{이므로 모든 실수 } x \text{에 대하여 진수의 조건을 만족시킨다.}$$

$$\log_3 (x^2 - 2x + 6) > \log_3 9 \text{에서 밑 } 3 \text{이 } 3 > 1 \text{이므로}$$

$$x^2 - 2x + 6 > 9, x^2 - 2x - 3 > 0$$

$$(x+1)(x-3) > 0$$

$$\therefore x < -1 \text{ 또는 } x > 3 \quad \dots\dots ㉡$$

$$(i), (ii) \text{에서 연립부등식의 해는 } x > 3 \quad \dots\dots ㉢$$

채점 기준	비율
① 지수부등식의 해를 구할 수 있다.	40%
② 로그부등식의 해를 구할 수 있다.	40%
③ 연립부등식의 해를 구할 수 있다.	20%

65-1 ㉡

$$(i) \frac{1}{8} < 2 \times 4^{x-1} \leq 32 \text{에서 } 2^{-3} < 2^{2x-1} \leq 2^5$$

$$\text{밑 } 2 \text{가 } 2 > 1 \text{이므로 } -3 < 2x-1 \leq 5 \quad \therefore -1 < x \leq 3$$

$$(ii) (\log_3 x)^2 - 2 \log_3 x < 8 \text{의 진수의 조건에서 } x > 0 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\log_3 x = t \text{라 하면 } t^2 - 2t < 8, t^2 - 2t - 8 < 0$$

$$(t+2)(t-4) < 0 \quad \therefore -2 < t < 4$$

$$\text{즉 } -2 < \log_3 x < 4 \text{이므로 } \log_3 3^{-2} < \log_3 x < \log_3 3^4$$

$$\text{밑 } 3 \text{이 } 3 > 1 \text{이므로 } \frac{1}{9} < x < 81 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 } \frac{1}{9} < x < 81$$

(i), (ii)에서 연립부등식의 해는 $\frac{1}{9} < x \leq 3$
따라서 정수 x 의 값은 1, 2, 3이므로 그 개수는 3이다.

유형+ 완성하기

p.113

66 ㉡ $0 < a \leq 1$ 또는 $a \geq 10$

진수의 조건에서 $a > 0$

주어진 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (1 - \log a)^2 - \{1 - (\log a)^2\} \geq 0$$

$$\log a = t \text{라 하면 } (1-t)^2 - (1-t^2) \geq 0$$

$$2t^2 - 2t \geq 0, 2t(t-1) \geq 0$$

$$\therefore t \leq 0 \text{ 또는 } t \geq 1$$

$$\text{즉 } \log a \leq 0 \text{ 또는 } \log a \geq 1 \text{ 이므로}$$

$$\log a \leq \log 1 \text{ 또는 } \log a \geq \log 10$$

$$\therefore a \leq 1 \text{ 또는 } a \geq 10$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$$0 < a \leq 1 \text{ 또는 } a \geq 10$$

67 ㉡ 2

진수의 조건에서 $k > 0$

주어진 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (1 + \log_{\frac{1}{3}} k)^2 - 2(1 + \log_{\frac{1}{3}} k) < 0$$

$$\log_{\frac{1}{3}} k = t \text{라 하면 } (1+t)^2 - 2(1+t) < 0$$

$$t^2 - 1 < 0, (t+1)(t-1) < 0$$

$$\therefore -1 < t < 1$$

$$\text{즉 } -1 < \log_{\frac{1}{3}} k < 1 \text{ 이므로 } \log_{\frac{1}{3}} 3 < \log_{\frac{1}{3}} k < \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3}$$

$$\therefore \frac{1}{3} < k < 3$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{3} < k < 3$

따라서 정수 k 의 최댓값은 2이다.

68 ㉡ ⑤

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식

$x^2 - 2(\log_3 3a)x + 3(1 + \log_3 a) > 0$ 이 성립해야 하므로 이차방정식 $x^2 - 2(\log_3 3a)x + 3(1 + \log_3 a) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다. 즉

$$\frac{D}{4} = (\log_3 3a)^2 - 3(1 + \log_3 a) < 0$$

$$(1 + \log_3 a)^2 - 3 - 3 \log_3 a < 0$$

$$\therefore (\log_3 a)^2 - \log_3 a - 2 < 0$$

진수의 조건에서 $a > 0$

$$\log_3 a = t \text{라 하면 } t^2 - t - 2 < 0$$

$$(t+1)(t-2) < 0 \quad \therefore -1 < t < 2$$

$$\text{즉 } -1 < \log_3 a < 2 \text{ 이므로 } \log_3 3^{-1} < \log_3 a < \log_3 3^2$$

$$\therefore \frac{1}{3} < a < 9$$

.....㉠

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{3} < a < 9$

따라서 정수 a 의 값은 1, 2, 3, ..., 8이므로 그 개수는 8이다.

Lecture 이차부등식이 항상 성립할 조건

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

(1) 이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 이 항상 성립한다.

$$\Rightarrow a > 0, D < 0$$

(2) 이차부등식 $ax^2 + bx + c < 0$ 이 항상 성립한다.

$$\Rightarrow a < 0, D < 0$$

69 ㉡ $\frac{7}{3}$ cm

$$k = 0.69, I = \frac{I_0}{5} \text{ 이므로 } \log I = \log I_0 - \frac{k}{2.3} d \text{ 에서}$$

$$\log \frac{I_0}{5} = \log I_0 - \frac{0.69}{2.3} d$$

$$\log I_0 - \log 5 = \log I_0 - 0.3d, 0.3d = \log 5$$

$$\text{이때 } \log 5 = 1 - \log 2 = 1 - 0.3 = 0.7 \text{ 이므로}$$

$$d = \frac{\log 5}{0.3} = \frac{0.7}{0.3} = \frac{7}{3}$$

따라서 구하는 물질의 두께는 $\frac{7}{3}$ cm이다.

70 ㉡ 10장

유리를 1장 설치하면 들어오는 빛의 양의 $\frac{4}{5}$ 가 유리를 통과하므로

n 장 설치하면 빛의 양의 $\left(\frac{4}{5}\right)^n$ 이 유리를 통과한다.

$$\text{즉 } \left(\frac{4}{5}\right)^n = \frac{1}{10} \text{ 이므로 양변에 상용로그를 취하면}$$

$$n \log \frac{4}{5} = \log \frac{1}{10}$$

이때

$$\begin{aligned} \log \frac{4}{5} &= 2 \log 2 - (1 - \log 2) = 3 \log 2 - 1 \\ &= 3 \times 0.3 - 1 = -0.1 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } -0.1n = -1 \quad \therefore n = \frac{1}{0.1} = 10$$

따라서 필요한 유리는 10장이다.

71 ㉡ 17일

현재의 저수량을 A , 정보가 발령되는 것을 n 일 후라 하면

$$A(1 - 0.04)^n \leq \frac{1}{2}A, 0.96^n \leq \frac{1}{2}$$

.....㉠

㉠의 양변에 상용로그를 취하면

$$n \log 0.96 \leq \log \frac{1}{2}, n \log \frac{96}{100} \leq \log \frac{1}{2}$$

$$n(\log 96 - \log 100) \leq -\log 2$$

$$n(5 \log 2 + \log 3 - 2) \leq -\log 2$$

$$n(5 \times 0.3010 + 0.4771 - 2) \leq -0.3010$$

$$-0.0179n \leq -0.3010$$

$$\therefore n \geq 16.815 \dots$$

따라서 17일 후에 처음으로 정보가 발령된다.

01 ㉔ ②

① $f(1) = \log_a 1 = 0$

② $f(x+y) = \log_a (x+y)$,

$f(x) + f(y) = \log_a x + \log_a y = \log_a xy$ 이므로
 $f(x+y) \neq f(x) + f(y)$

③ $f(x^2) = \log_a x^2 = 2 \log_a x = 2f(x)$

④ $f\left(\frac{1}{x}\right) = \log_a \frac{1}{x} = \log_a x^{-1} = -\log_a x = -f(x)$

⑤ $f\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y = f(x) - f(y)$

따라서 옳지 않은 것은 ②이다.

02 ㉔ 14

$y = \log_2 x$ 에서

$x=8$ 일 때, $y = \log_2 8 = 3$ 이므로 $A(8, 3)$

$x=16$ 일 때, $y = \log_2 16 = 4$ 이므로 $D(16, 4)$

$y = \log_4 x$ 에서

$x=8$ 일 때, $y = \log_4 8 = \frac{3}{2}$ 이므로 $B\left(8, \frac{3}{2}\right)$


$x=16$ 일 때, $y = \log_4 16 = 2$ 이므로 $C(16, 2)$

이때 사각형 ABCD는 사다리꼴이므로 구하는 넓이는

$\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{2} + 2\right) \times 8 = 14$

03 ㉔ ④

함수 $y = \log_2 (x+4) - 1$ 의 그래프는 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



① 정의역은 $\{x | x > -4\}$ 이고,

치역은 실수 전체의 집합이다.

② $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$ 이다.

③ 그래프의 점근선의 방정식은 $x = -4$ 이다.

④ $x = -3$ 을 $y = \log_2 (x+4) - 1$ 에 대입하면

$\log_2 (-3+4) - 1 = \log_2 1 - 1 = -1$

즉 주어진 함수의 그래프는 점 $(-3, -1)$ 을 지난다.

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

04 ㉔ ①

밑의 조건에서 $a > 0, a \neq 1$

함수 $y = \log_a x$ 의 그래프가 점 $(4, 2)$ 를 지나므로

$2 = \log_a 4, a^2 = 4 \quad \therefore a = 2 (\because a > 0)$

함수 $y = \log_a (4x+b)$ 의 그래프가 점 $(4, 2)$ 를 지나므로

$2 = \log_a (16+b), 16+b = a^2$

$16+b = 4 \quad \therefore b = -12$

즉 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y = \log_2 (x-m) + n$ ㉔

이때 ㉔의 그래프가 함수 $y = \log_2 (4x-12)$, 즉

$y = \log_2 4(x-3) = \log_2 (x-3) + 2$ 의 그래프와 겹쳐지므로

$m=3, n=2$

$\therefore a+b+m+n = 2+(-12)+3+2 = -5$

05 ㉔ 15

함수 $y = \log_5 (x-3)$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $-y = \log_5 (x-3)$

함수 $-y = \log_5 (x-3)$ 의 그래프를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$-x = \log_5 (y-3), 5^{-x} = y-3$

$\therefore y = \left(\frac{1}{5}\right)^x + 3$

따라서 $a = \frac{1}{5}, b = 3$ 이므로

$\frac{b}{a} = \frac{3}{\frac{1}{5}} = 15$

06 ㉔ ①

$f(x) = x^2 + 2x + a$ 라 하면 $f(x) = (x+1)^2 + a - 1$

$-3 \leq x \leq 0$ 에서 $f(-3) = a+3, f(-1) = a-1, f(0) = a$

$\therefore a-1 \leq f(x) \leq a+3$

밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 $y = \log_{\frac{1}{2}} f(x)$ 는 $f(x) = a+3$ 일 때 최소이고, 최솟값은 -3 이다.

즉 $\log_{\frac{1}{2}} (a+3) = -3$ 이므로 $a+3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$

$\therefore a = 5$

따라서 $y = \log_{\frac{1}{2}} f(x)$ 는 $f(x) = a-1 = 5-1 = 4$ 일 때 최대이고,

최댓값은 $\log_{\frac{1}{2}} 4 = -2$

07 ㉔ ②

$y = (\log_2 x)^2 - \log_2 x^2 - 1 = (\log_2 x)^2 - 2 \log_2 x - 1$

$\log_2 x = t$ 라 하면

$y = t^2 - 2t - 1 = (t-1)^2 - 2$

따라서 $t=1$, 즉 $x=2$ 일 때 최솟값 -2 를 가지므로

$a=2, b=-2$

$\therefore a+b = 2+(-2) = 0$

08 ㉔ ④

$y = x^{4-\log x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$\log y = \log x^{4-\log x} = (4-\log x) \log x$

$= -(\log x)^2 + 4 \log x$

$\log x = t$ 라 하면

$\log y = -t^2 + 4t = -(t-2)^2 + 4$ 이므로 $\log y$ 는

$t=2$, 즉 $x=100$ 일 때 최대이고, 최댓값은 4

$\log y = 4$ 에서 $y = 10^4 = 10000$

따라서 $a=100, M=10000$ 이므로

$\frac{M}{a} = \frac{10000}{100} = 100$

09 ㉔ ④

$y = \log_4 x + \log_x 16 + k = \log_4 x + \log_x 4^2 + k$

$= \log_4 x + \log_x 4 + k = \log_4 x + \frac{1}{\log_4 x} + k$

이때 $x > 1$ 에서 $\log_4 x > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\log_4 x + \frac{1}{\log_4 x} + k \geq 2\sqrt{\log_4 x \times \frac{1}{\log_4 x}} + k = 2 + k$$

이때 등호는 $\log_4 x = 1$ 일 때 성립하므로

$$x = 4 \quad \therefore a = 4$$

즉 주어진 함수는 $x = 4$ 일 때 최솟값 $k + 2$ 를 가지므로

$$k + 2 = 10 \quad \therefore k = 8$$

$$\therefore k + a = 8 + 4 = 12$$

10 ㉡①

진수의 조건에서 $x + 3 > 0$, $3x + 1 > 0$

$$\therefore x > -\frac{1}{3}$$

.....㉠

$$\log_4 (x+3) - \log_2 (3x+1) = -1 \text{에서}$$

$$\log_4 (x+3) + \log_4 4 = \log_4 (3x+1)^2$$

$$\therefore \log_4 4(x+3) = \log_4 (3x+1)^2$$

$$\text{즉 } 4(x+3) = (3x+1)^2 \text{이므로 } 9x^2 + 2x - 11 = 0$$

$$(9x+11)(x-1) = 0 \quad \therefore x = -\frac{11}{9} \text{ 또는 } x = 1$$

이때 ㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는 $x = 1$

11 ㉡①

$$(\log_3 9x)(\log_3 3x) = 6 \text{에서}$$

$$(\log_3 9 + \log_3 x)(\log_3 3 + \log_3 x) = 6$$

$$(2 + \log_3 x)(1 + \log_3 x) = 6$$

$$\log_3 x = t \text{라 하면 } (2+t)(1+t) = 6$$

$$t^2 + 3t - 4 = 0, (t+4)(t-1) = 0$$

$$\therefore t = -4 \text{ 또는 } t = 1$$

$$\text{즉 } \log_3 x = -4 \text{ 또는 } \log_3 x = 1 \text{이므로}$$

$$x = 3^{-4} = \frac{1}{81} \text{ 또는 } x = 3$$

따라서 모든 실수 x 의 값의 곱은

$$\frac{1}{81} \times 3 = \frac{1}{27}$$

12 ㉡ $\frac{1}{18}$

$$(2 \log 3x)(\log 6x) = 1 \text{에서}$$

$$(2 \log 3 + 2 \log x)(\log 6 + \log x) = 1$$

$$\log x = t \text{라 하면 } (2 \log 3 + 2t)(\log 6 + t) = 1$$

$$2t^2 + (2 \log 3 + 2 \log 6)t + 2 \log 3 \times \log 6 - 1 = 0$$

$$\therefore 2t^2 + (2 \log 18)t + 2 \log 3 \times \log 6 - 1 = 0 \quad \text{.....㉠}$$

이차방정식 ㉠의 두 근이 $\log \alpha$, $\log \beta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $\log \alpha + \log \beta = -\log 18$

$$\log \alpha \beta = \log \frac{1}{18} \quad \therefore \alpha \beta = \frac{1}{18}$$

13 ㉡④

$$x^{2 \log_3 x} - 9x^3 = 0 \text{에서 } x^{2 \log_3 x} = 9x^3$$

양변에 밑이 3인 로그를 취하면

$$\log_3 x^{2 \log_3 x} = \log_3 9x^3, 2(\log_3 x)^2 = \log_3 9 + \log_3 x^3$$

$$2(\log_3 x)^2 = 2 + 3 \log_3 x$$

$$\therefore 2(\log_3 x)^2 - 3 \log_3 x - 2 = 0$$

$$\log_3 x = t \text{라 하면 } 2t^2 - 3t - 2 = 0$$

$$(2t+1)(t-2) = 0 \quad \therefore t = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } t = 2$$

$$\text{즉 } \log_3 x = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } \log_3 x = 2 \text{이므로}$$

$$x = 3^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 또는 } x = 3^2 = 9$$

$$\therefore \alpha \beta = 3\sqrt{3}$$

참고 13에서 α, β 에 대한 조건이 없으므로

$$\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}, \beta = 9 \text{ 또는 } \alpha = 9, \beta = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore \alpha \beta = \frac{\sqrt{3}}{3} \times 9 = 3\sqrt{3}$$

14 ㉡④

$xy = 16$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 xy = \log_2 16 \quad \therefore \log_2 x + \log_2 y = 4$$

$y^{\log_2 x} = 8$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 y^{\log_2 x} = \log_2 8 \quad \therefore \log_2 x \times \log_2 y = 3$$

즉 주어진 연립방정식은 $\begin{cases} \log_2 x + \log_2 y = 4 \\ \log_2 x \times \log_2 y = 3 \end{cases}$ 이므로

$\log_2 x = X, \log_2 y = Y$ 라 하면

$$\begin{cases} X + Y = 4 \\ XY = 3 \end{cases} \quad \text{.....㉠}$$

㉠에서 $Y = 4 - X$ 이므로 ㉡에 대입하면

$$X(4 - X) = 3, X^2 - 4X + 3 = 0$$

$$(X - 1)(X - 3) = 0 \quad \therefore X = 1 \text{ 또는 } X = 3$$

이 값을 ㉠에 대입하면 $Y = 3$ 또는 $Y = 1$

$$\text{따라서 } \begin{cases} X = 1 \\ Y = 3 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} X = 3 \\ Y = 1 \end{cases} \text{이므로}$$

$$\begin{cases} \log_2 x = 1 \\ \log_2 y = 3 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} \log_2 x = 3 \\ \log_2 y = 1 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x = 2 \\ y = 8 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = 8 \\ y = 2 \end{cases}$$

$$\therefore x + y = 10$$

15 ㉡④

진수의 조건에서 $x^2 + x - 2 > 0, -2x + 2 > 0$

$$x^2 + x - 2 > 0 \text{에서 } (x+2)(x-1) > 0$$

$$\therefore x < -2 \text{ 또는 } x > 1$$

$$-2x + 2 > 0 \text{에서 } x < 1$$

$$\therefore x < -2 \quad \text{.....㉠}$$

$\log_2 (x^2 + x - 2) < \log_2 (-2x + 2)$ 에서 밑 2가 $2 > 1$ 이므로

$$x^2 + x - 2 < -2x + 2, x^2 + 3x - 4 < 0$$

$$(x+4)(x-1) < 0 \quad \therefore -4 < x < 1 \quad \text{.....㉡}$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$$-4 < x < -2$$

따라서 $\alpha = -4, \beta = -2$ 이므로

$$\alpha \beta = -4 \times (-2) = 8$$

16 ㉡①

$\log_3 x > 1$ 이므로 $x > 3$ $\log_3 x > 1$

진수의 조건에서 $\log_2 (\log_3 x) > 0, \log_3 x > 0, x > 0$

$$\therefore x > 3 \quad \text{.....㉠}$$

$$\log_{\frac{1}{3}} \{\log_2 (\log_3 x)\} > 0 \text{에서 } \log_{\frac{1}{3}} \{\log_2 (\log_3 x)\} > \log_{\frac{1}{3}} 1$$

$$\text{밑 } \frac{1}{3} \text{이 } 0 < \frac{1}{3} < 1 \text{이므로 } \log_2 (\log_3 x) < 1$$

$$\log_2 (\log_3 x) < \log_2 2 \text{에서 밑 } 2 \text{가 } 2 > 1 \text{이므로 } \log_3 x < 2$$

$$\log_3 x < \log_3 3^2 \text{에서 밑 } 3 \text{이 } 3 > 1 \text{이므로 } x < 9 \quad \dots\dots ㉔$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{4} \text{의 공통 범위를 구하면 } 3 < x < 9$$

따라서 정수 x 의 값은 4, 5, 6, 7, 8이므로 그 합은

$$4+5+6+7+8=30$$

17 ㉔ ㉓

진수의 조건에서 $x > 0, x^2 > 0$

$$\therefore x > 0 \quad \dots\dots ㉔$$

$$(\log x)^2 - \log x^2 < 0 \text{에서 } (\log x)^2 - 2 \log x < 0$$

$$\log x = t \text{라 하면 } t^2 - 2t < 0$$

$$t(t-2) < 0 \quad \therefore 0 < t < 2$$

$$\text{즉 } 0 < \log x < 2 \text{이므로 } \log 1 < \log x < \log 10^2$$

$$\text{밑 } 10 \text{이 } 10 > 1 \text{이므로 } 1 < x < 100 \quad \dots\dots ㉔$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{4} \text{의 공통 범위를 구하면 } 1 < x < 100$$

따라서 정수 x 의 값은 2, 3, 4, ..., 99이므로 그 개수는 98이다.

18 ㉔ 80

(i) $\log_3 |x-3| < 4$ 의 진수의 조건에서

$$|x-3| > 0 \quad \therefore x \neq 3 \quad \dots\dots ㉔$$

$$\log_3 |x-3| < 4 \text{에서 } \log_3 |x-3| < \log_3 3^4$$

$$\text{밑 } 3 \text{이 } 3 > 1 \text{이므로 } |x-3| < 81$$

$$-81 < x-3 < 81 \quad \therefore -78 < x < 84 \quad \dots\dots ㉔$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{4} \text{의 공통 범위를 구하면}$$

$$-78 < x < 3 \text{ 또는 } 3 < x < 84$$

(ii) $\log_2 x + \log_2 (x-2) \geq 3$ 의 진수의 조건에서

$$x > 0, x-2 > 0 \quad \therefore x > 2 \quad \dots\dots ㉔$$

$$\log_2 x + \log_2 (x-2) \geq 3 \text{에서 } \log_2 x(x-2) \geq \log_2 2^3$$

$$\text{밑 } 2 \text{가 } 2 > 1 \text{이므로 } x(x-2) \geq 8$$

$$x^2 - 2x - 8 \geq 0, (x+2)(x-4) \geq 0$$

$$\therefore x \leq -2 \text{ 또는 } x \geq 4 \quad \dots\dots ㉔$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{의 공통 범위를 구하면 } x \geq 4$$

(i), (ii)에서 연립부등식의 해는

$$4 \leq x < 84$$

따라서 정수 x 의 값은 4, 5, 6, ..., 83이므로 그 개수는 80이다.

19 ㉔ ㉓

$x^{\log_3 x} \geq ax^2$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 x^{\log_3 x} \geq \log_2 ax^2$$

$$(\log_2 x)^2 \geq \log_2 a + 2 \log_2 x$$

$$\therefore (\log_2 x)^2 - 2 \log_2 x - \log_2 a \geq 0$$

$$\log_2 x = t \text{라 하면 } t^2 - 2t - \log_2 a \geq 0 \quad \dots\dots ㉔$$

모든 양수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 모든 실수 t 에 대하여 부등식 ㉔이 성립해야 한다.

즉 이차방정식 $t^2 - 2t - \log_2 a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$ 이

$$\text{어야 하므로 } \frac{D}{4} = 1 + \log_2 a \leq 0$$

$$\log_2 a \leq -1, \log_2 a \leq \log_2 2^{-1}$$

$$\therefore 0 < a \leq \frac{1}{2} \quad (\because a > 0)$$

20 ㉔ 4

이차방정식 $x^2 - (1 - \log_2 a)x + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (1 - \log_2 a)^2 - 4 < 0$$

$$\therefore (\log_2 a)^2 - 2 \log_2 a - 3 < 0$$

$$\log_2 a = t \text{라 하면 } t^2 - 2t - 3 < 0$$

$$(t+1)(t-3) < 0 \quad \therefore -1 < t < 3$$

$$\text{즉 } -1 < \log_2 a < 3 \text{이므로 } \log_2 2^{-1} < \log_2 a < \log_2 2^3$$

$$\text{밑 } 2 \text{가 } 2 > 1 \text{이므로 } \frac{1}{2} < a < 8$$

$$\text{따라서 } a = \frac{1}{2}, \beta = 8 \text{이므로}$$

$$a\beta = \frac{1}{2} \times 8 = 4$$

Lecture 이차방정식의 근의 판별

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

(1) 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 갖는다. $\Rightarrow D > 0$

(2) 이차방정식이 중근을 갖는다. $\Rightarrow D = 0$

(3) 이차방정식이 허근을 갖는다. $\Rightarrow D < 0$

21 ㉔ ㉓

10년 후에 처음 질량의 $\frac{1}{2}$ 로 감소하였으므로

$$2^{10k} A = \frac{1}{2} A \text{에서 } 2^{10k} = 2^{-1}$$

$$10k = -1 \quad \therefore k = -\frac{1}{10}$$

n 년 후에 처음 질량의 $\frac{1}{5}$ 이하로 감소한다고 하면

$$2^{-\frac{1}{10}n} A \leq \frac{1}{5} A \quad \therefore 2^{-\frac{1}{10}n} \leq \frac{1}{5}$$

$$\text{양변에 상용로그를 취하면 } \log 2^{-\frac{1}{10}n} \leq \log \frac{1}{5}$$

$$-\frac{1}{10}n \log 2 \leq -\log 5, \frac{1}{10}n \log 2 \geq 1 - \log 2$$

$$\frac{1}{10}n \times 0.3010 \geq 1 - 0.3010, 0.0301n \geq 0.699$$

$$\therefore n \geq 23.222 \dots$$

따라서 최소 24년이 걸린다.

서술형 1 ㉔ 6

$A(1, 0)$ 이므로 선분 AB 를 이등분하는 점 C 의 좌표는 $(3, 0)$

$x=3$ 을 $y=k \log_3 x$ 에 대입하면 $y=k$

$$\therefore D(3, k) \quad \dots\dots ㉔$$

즉 $\overline{BC}=2, \overline{CD}=k$ 이므로 직사각형 $BEDC$ 의 넓이는

$$\overline{BC} \times \overline{CD} = 2k \quad \dots\dots ㉔$$

이때 직사각형 $BEDC$ 의 넓이가 12이므로

$$2k=12 \quad \therefore k=6 \quad \dots\dots ㉔$$

채점 기준	비율
㉔ 두 점 C, D 의 좌표를 구할 수 있다.	40%
㉔ 직사각형 $BEDC$ 의 넓이를 k 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
㉔ k 의 값을 구할 수 있다.	20%

서술형 2 ㉔ $\log_{\frac{1}{3}} 12$

$$f(x) = x^2 - 10x + 28 \text{이라 하면 } f(x) = (x-5)^2 + 3$$

$$2 \leq x \leq 7 \text{에서 } f(2)=12, f(5)=3, f(7)=7$$

$\therefore 3 \leq f(x) \leq 12$ ①
 밑 a 가 $0 < a < 1$ 이므로 $y = \log_a f(x)$ 는 $f(x) = 3$ 일 때 최대이고, 최댓값은 -1 이다.
 즉 $\log_a 3 = -1$ 이므로 $a^{-1} = 3$
 $\frac{1}{a} = 3 \quad \therefore a = \frac{1}{3}$ ②
 따라서 $y = \log_{\frac{1}{3}} f(x)$ 는 $f(x) = 12$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $\log_{\frac{1}{3}} 12$ ③

채점 기준	비율
① $f(x) = x^2 - 10x + 28$ 이라 하고 $f(x)$ 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
② a 의 값을 구할 수 있다.	50%
③ 주어진 함수의 최솟값을 구할 수 있다.	20%

서술형 3 ④ 20

$\log_{\frac{1}{2}} f(x) > \log_{\frac{1}{2}} g(x)$ 의 진수의 조건에서 $f(x) > 0, g(x) > 0$
 $f(x) > 0$ 에서 $x < 2$ 또는 $x > 4$
 $g(x) > 0$ 에서 $x > 2$
 $\therefore x > 4$ ㉠ ①
 $\log_{\frac{1}{2}} f(x) > \log_{\frac{1}{2}} g(x)$ 에서 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로
 $f(x) < g(x)$ ㉡
 부등식 ㉡의 해는 직선 $y = g(x)$ 가 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로 부등식 ㉡의 해는
 $2 < x < 5$ ㉢
 ㉠, ㉢의 공통 범위를 구하면
 $4 < x < 5$ ②
 따라서 $\alpha = 4, \beta = 5$ 이므로
 $\alpha\beta = 4 \times 5 = 20$ ③

채점 기준	비율
① 주어진 부등식의 진수의 조건을 구할 수 있다.	30%
② 주어진 부등식의 해를 구할 수 있다.	60%
③ $\alpha\beta$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

10% 핵심 기출 문제

p. 118~119

01 ④ 65

점 B는 선분 OA를 1 : 3으로 내분하는 점이므로 점 B의 좌표는
 $\left(\frac{1 \times \sqrt{23} + 3 \times 0}{1+3}, \frac{1 \times \log_2 k + 3 \times 0}{1+3} \right)$
 $\therefore \left(\frac{\sqrt{23}}{4}, \frac{\log_2 k}{4} \right)$
 이때 $\overline{OB} = \sqrt{2}$ 에서 $\overline{OB}^2 = 2$ 이므로
 $\overline{OB}^2 = \left(\frac{\sqrt{23}}{4} \right)^2 + \left(\frac{\log_2 k}{4} \right)^2 = \frac{23 + (\log_2 k)^2}{16} = 2$
 $23 + (\log_2 k)^2 = 32, (\log_2 k)^2 = 9$
 $\log_2 k = 3$ 또는 $\log_2 k = -3$
 $\therefore k = 2^3 = 8$ 또는 $k = 2^{-3} = \frac{1}{8}$

따라서 $S = 8 + \frac{1}{8} = \frac{65}{8}$ 이므로
 $8S = 8 \times \frac{65}{8} = 65$

Lecture 선분의 내분점

두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 에 대하여 선분 AB를 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점의 좌표는
 $\left(\frac{m \times x_2 + n \times x_1}{m+n}, \frac{m \times y_2 + n \times y_1}{m+n} \right)$

02 ④ ②

$\log_2 (x+4) = 0$ 에서 $x+4 = 1$ 이므로
 $x = -3 \quad \therefore A(-3, 0)$
 $\log_2 x + 1 = 0$ 에서 $\log_2 x = -1$ 이므로
 $x = 2^{-1} = \frac{1}{2} \quad \therefore B\left(\frac{1}{2}, 0\right)$
 $\log_2 (x+4) = \log_2 x + 1$ 에서
 $\log_2 (x+4) = \log_2 x + \log_2 2$
 $\log_2 (x+4) = \log_2 2x, x+4 = 2x$
 $\therefore x = 4$, 즉 $C(4, 3)$
 따라서 삼각형 ABC의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times \left\{ \frac{1}{2} - (-3) \right\} \times 3 = \frac{21}{4}$

03 ④ 9

(나)에서 $\frac{\log_n (m+1) - \log_n m}{m+1-m} < \frac{1}{3}$ 이므로
 $\log_n \frac{m+1}{m} < \frac{1}{3}, \log_n \frac{m+1}{m} < \log_n n^{\frac{1}{3}}$
 이때 $n > 2$ 이므로 $\frac{m+1}{m} < n^{\frac{1}{3}}$
 $\therefore (m+1)^3 < n \times m^3$
 (i) $n = 3$ 일 때, $(m+1)^3 < 3m^3$
 $m = 2$ 이면 $(2+1)^3 > 3 \times 2^3$ 이므로 성립하지 않는다.
 $m = 3$ 이면 $(3+1)^3 < 3 \times 3^3$ 이므로 $f(3) = 3$
 (ii) $n = 4$ 일 때, $(m+1)^3 < 4m^3$
 $m = 2$ 이면 $(2+1)^3 < 4 \times 2^3$ 이므로 $f(4) = 2$
 (iii) $n = 5$ 일 때, $(m+1)^3 < 5m^3$
 $m = 2$ 이면 $(2+1)^3 < 5 \times 2^3$ 이므로 $f(5) = 2$
 (iv) $n = 6$ 일 때, $(m+1)^3 < 6m^3$
 $m = 2$ 이면 $(2+1)^3 < 6 \times 2^3$ 이므로 $f(6) = 2$
 (i)~(iv)에서
 $f(3) + f(4) + f(5) + f(6) = 3 + 2 + 2 + 2 = 9$

다른 풀이

(나)에서 $n > 2$ 이므로 $\frac{m+1}{m} < n^{\frac{1}{3}}$
 $\therefore \left(\frac{m+1}{m} \right)^3 < n$
 (i) $m = 2$ 일 때
 $\left(\frac{2+1}{2} \right)^3 = \frac{27}{8} < n$ 이므로 $n > 3.375$
 $\therefore n = 4, 5, 6, \dots$
 $\therefore f(4) = f(5) = f(6) = 2$
 (ii) $m = 3$ 일 때
 $\left(\frac{3+1}{3} \right)^3 = \frac{64}{27} < n$ 이므로 $n > 2.370\dots$

$$\therefore n=3, 4, 5, \dots$$

$$\therefore f(3)=3$$

(i), (ii)에서

$$f(3)+f(4)+f(5)+f(6)=3+2+2+2=9$$

04 ㉓ ③

로켓의 질량과 속력을 표로 나타내면 다음과 같다.

로켓의 질량(ton)	200	160	a
로켓의 속력(km/s)	2	2.5	3

$$2.5 = k\alpha \log \frac{200}{160} + 2 \text{에서 } 0.5 = k\alpha \log \frac{5}{4} \quad \dots\dots ㉑$$

$$3 = k\alpha \log \frac{200}{a} + 2 \text{에서 } 1 = k\alpha \log \frac{200}{a} \quad \dots\dots ㉒$$

$$㉑, ㉒ \text{에서 } 2k\alpha \log \frac{5}{4} = k\alpha \log \frac{200}{a}$$

$$2 \log \frac{5}{4} = \log \frac{200}{a}, \log \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \log \frac{200}{a}$$

$$\frac{200}{a} = \left(\frac{5}{4}\right)^2, \frac{200}{a} = \frac{25}{16}$$

$$25a = 3200 \quad \therefore a = 128$$

05 ㉓ 6

$\log_2 x = 0$ 에서 $x=1$ 이므로 $A(1, 0)$

$x-p=0$ 에서 $x=p$ 이므로 $B(p, 0)$

점 D의 좌표를 $(a, 0)$ 이라 하면 $C(a, a-p)$

이때 점 C는 곡선 $y=\log_2 x$ 위의 점이므로

$$a-p=\log_2 a \quad \dots\dots ㉑$$

$$\triangle BDC = \frac{1}{2}(a-p)^2 = \frac{9}{2} \text{이므로 } (a-p)^2 = 9$$

$$\therefore a-p=3 (\because a>p) \quad \dots\dots ㉒$$

$$㉑ \text{을 } ㉒ \text{에 대입하면 } 3=\log_2 a \quad \therefore a=8$$


$$a=8 \text{을 } ㉑ \text{에 대입하면 } 8-p=3 \quad \therefore p=5$$

즉 $A(1, 0), B(5, 0), C(8, 3)$ 이므로

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times (5-1) \times 3 = 6$$

06 ㉓ ②

$g(x)=\log_2 3x=\log_2 x+\log_2 3$ 이므로 함수 $g(x)=\log_2 3x$ 의 그래프는 함수 $f(x)=\log_2 x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $\log_2 3$ 만큼 평행이동한 것과 같다.



점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 E라 하면 점 E의 좌표는 $E(3, 0)$


이때 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 선분 DB, 선분 BC로 둘러싸인 부분의 넓이는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 선분 AE, 선분 EB로 둘러싸인 부분의 넓이와 같으므로 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프와 선분 AD, 선분 BC로 둘러싸인 부분의 넓이는 사각형 AEBC의 넓이와 같다.

$$\overline{AD}=\log_2 3, \overline{AE}=2 \text{이므로 구하는 넓이는}$$

$$2 \times \log_2 3 = 2 \log_2 3$$

07 ㉓ 11

다음 그림과 같이 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A', B' 이라 하자.



$\triangle OAA' \sim \triangle OBB'$ 이므로

$$\overline{OA'} : \overline{OB'} = \overline{AA'} : \overline{BB'} = \overline{OA} : \overline{OB} = 1 : 2$$

점 A의 좌표를 $(a, \log_3(5a-3))$ ($a > \frac{3}{5}$)이라 하면

점 B의 좌표는 $(2a, \log_3(10a-3))$

이때 $\overline{AA'} : \overline{BB'} = 1 : 2$ 이므로 $2\overline{AA'} = \overline{BB'}$

$$2 \log_3(5a-3) = \log_3(10a-3)$$

$$\log_3(5a-3)^2 = \log_3(10a-3)$$

$$(5a-3)^2 = 10a-3, 25a^2-40a+12=0$$

$$(5a-2)(5a-6)=0 \quad \therefore a=\frac{2}{5} \text{ 또는 } a=\frac{6}{5}$$

$$\text{그런데 } a > \frac{3}{5} \text{이므로 } a=\frac{6}{5} \quad \therefore A\left(\frac{6}{5}, 1\right)$$

이때 직선 AB의 기울기는 직선 OA의 기울기와 같으므로

$$\frac{1-0}{\frac{6}{5}-0} = \frac{5}{6}$$

따라서 $p=6, q=5$ 이므로

$$p+q=6+5=11$$

참고

$\triangle OAA'$ 과 $\triangle OBB'$ 에서

$\angle OAA' = \angle OBB', \angle AA'O = \angle BB'O = 90^\circ$ 이므로

$\triangle OAA' \sim \triangle OBB'$ (AA 닮음)

08 ㉓ ①

$$(가) \text{에서 } |\log_3 a - \log_3 b| \leq 1 \text{이므로 } -1 \leq \log_3 \frac{a}{b} \leq 1$$

$$\log_3 3^{-1} \leq \log_3 \frac{a}{b} \leq \log_3 3 \quad \therefore \frac{1}{3} \leq \frac{a}{b} \leq 3$$

$$\text{이때 } b > 0 \text{이므로 } \frac{1}{3}b \leq a \leq 3b \quad \dots\dots ㉑$$

(나)에서 $f(a+b)=\log_3(a+b)=1$ 이므로

$$a+b=3 \quad \therefore a=3-b \quad \dots\dots ㉒$$

$$㉑, ㉒ \text{에서 } \frac{1}{3}b \leq 3-b \leq 3b$$

$$\text{이 부등식을 풀면 } \frac{3}{4} \leq b \leq \frac{9}{4}$$

$$ab = (3-b)b = -\left(b-\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{4} \left(\frac{3}{4} \leq b \leq \frac{9}{4}\right) \text{이므로 } ab \text{는}$$

$$b=\frac{3}{4} \text{ 또는 } b=\frac{9}{4} \text{일 때 최소이고, 최댓값 } m \text{은 } m=\frac{27}{16}$$

$$\text{따라서 } f(m)=f\left(\frac{27}{16}\right)=\log_3 \frac{27}{16}=3-\log_3 16 \text{이므로}$$

$$k=16$$

참고

$$ab = -\left(b - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{4} \left(\frac{3}{4} \leq b \leq \frac{9}{4}\right) \text{에서}$$

$$b = \frac{3}{2} \text{과 } b = \frac{3}{4}, b = \frac{9}{4} \text{와의 차이가 } \frac{3}{4} \text{으로 같으므로}$$

$$ab \text{는 } b = \frac{3}{4} \text{ 또는 } b = \frac{9}{4} \text{일 때 최솟값을 갖는다.}$$

09 답 ⑤

$$\neg. f(1) = 2^0 + a - 1 = a, h(1) = a + \log_2 1 = a \text{이므로}$$


$$f(1) = h(1) = a$$

즉 점 B의 좌표는 $(1, a)$ 이다.

$$\neg. \text{점 A는 두 함수 } y=f(x), y=g(x) \text{의 그래프의 교점이므로 점 A의 } x \text{좌표가 4이면}$$

$$\log_2 4 = 2^{1-4} + a - 1, 2 = \frac{1}{8} + a - 1$$

$$\therefore a = \frac{23}{8}$$



이때 $\overline{BD} \parallel \overline{CA}$ 이고, $\overline{BD} = \overline{CA} = a$ 이므로 사각형 ACBD는 평행사변형이다.

즉 사각형 ACBD의 넓이는

$$(4-1) \times \frac{23}{8} = \frac{69}{8}$$

$$\neg. \overline{CA} : \overline{AH} = 3 : 2 \text{에서 } 2\overline{CA} = 3\overline{AH}$$

점 A의 x 좌표를 k 라 하면 $\overline{CA} = a, \overline{AH} = \log_2 k$ 이므로

$$2a = 3 \log_2 k \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또 점 A는 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프의 교점이므로 $\log_2 k = 2^{1-k} + a - 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$

$$\textcircled{2} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } 2a = 3(2^{1-k} + a - 1)$$

$$2a = 3 \times 2^{1-k} + 3a - 3, 3 \times 2^{1-k} = 3 - a$$

$$\therefore 2^{1-k} = 1 - \frac{a}{3}$$

이때 $a > 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에서 $2a = 3 \log_2 k > 0$

$$\log_2 k > 0 \quad \therefore k > 1$$

$$k > 1 \text{에서 } -k < -1 \text{이므로 } 1 - k < 0$$

$$2^{1-k} < 2^0 \quad \therefore 2^{1-k} < 1$$

그런데 $2^{1-k} > 0$ 이므로 $0 < 2^{1-k} < 1$

$$\text{즉 } 0 < 1 - \frac{a}{3} < 1 \text{이므로 } -1 < -\frac{a}{3} < 0$$

$$\therefore 0 < a < 3$$





따라서 옳은 것은 $\neg, \neg, \neg$ 이다.

05 삼각함수

II 삼각함수

개념 완성하기

p.123~124



05 답 $360^\circ \times n + 120^\circ$ (n 은 정수)

06 답 $360^\circ \times n + 290^\circ$ (n 은 정수)

07 답 $360^\circ \times n + 40^\circ$ (n 은 정수)

08 답 $360^\circ \times n + 80^\circ$ (n 은 정수)

09 답 $360^\circ \times n + 160^\circ$ (n 은 정수)

10 답 $360^\circ \times n + 220^\circ$ (n 은 정수)

11 답 제2사분면
 $500^\circ = 360^\circ \times 1 + 140^\circ$ 이므로 500° 는 제2사분면의 각이다.

12 답 제1사분면
 $790^\circ = 360^\circ \times 2 + 70^\circ$ 이므로 790° 는 제1사분면의 각이다.

13 답 제3사분면
 $-160^\circ = 360^\circ \times (-1) + 200^\circ$ 이므로 -160° 는 제3사분면의 각이다.

14 답 제4사분면
 $-780^\circ = 360^\circ \times (-3) + 300^\circ$ 이므로 -780° 는 제4사분면의 각이다.

15 답 $\frac{5}{4}\pi$
 $225^\circ = 225 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5}{4}\pi$

16 답 $-\frac{7}{3}\pi$
 $-420^\circ = -420 \times \frac{\pi}{180} = -\frac{7}{3}\pi$

17 답 $\frac{17}{4}\pi$
 $765^\circ = 765 \times \frac{\pi}{180} = \frac{17}{4}\pi$

18 답 150°
 $\frac{5}{6}\pi = \frac{5}{6}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 150^\circ$

19 답 -120°
 $-\frac{2}{3}\pi = -\frac{2}{3}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = -120^\circ$

20 답 690°
 $\frac{23}{6}\pi = \frac{23}{6}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 690^\circ$

21 답 $l = \pi, S = \frac{3}{2}\pi$
 $l = 3 \times \frac{\pi}{3} = \pi, S = \frac{1}{2} \times 3^2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}\pi$

22 답 $l = \frac{15}{2}\pi, S = \frac{75}{2}\pi$
 $l = 10 \times \frac{3}{4}\pi = \frac{15}{2}\pi, S = \frac{1}{2} \times 10^2 \times \frac{3}{4}\pi = \frac{75}{2}\pi$

23 답 $r = 24, S = 72\pi$
 $6\pi = r \times \frac{\pi}{4}$ 에서 $r = 24$
 $S = \frac{1}{2} \times 24 \times 6\pi = 72\pi$

24 답 $\theta = \frac{\pi}{4}, l = \pi$
 $2\pi = \frac{1}{2} \times 4^2 \times \theta$ 에서 $\theta = \frac{\pi}{4}$
 $l = 4 \times \frac{\pi}{4} = \pi$

25 답 $\sin \theta = \frac{4\sqrt{17}}{17}, \cos \theta = \frac{\sqrt{17}}{17}, \tan \theta = 4$
 $\overline{OP} = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17}$ 이므로
 $\sin \theta = \frac{4}{\sqrt{17}} = \frac{4\sqrt{17}}{17}, \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{17}} = \frac{\sqrt{17}}{17}, \tan \theta = 4$

26 답 $\sin \theta = \frac{4}{5}, \cos \theta = -\frac{3}{5}, \tan \theta = -\frac{4}{3}$
 $\overline{OP} = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$ 이므로

$$\sin \theta = \frac{4}{5}, \cos \theta = -\frac{3}{5}, \tan \theta = -\frac{4}{3}$$

$$27 \text{ ㉠ } \sin \theta = -\frac{3}{5}, \cos \theta = -\frac{4}{5}, \tan \theta = \frac{3}{4}$$

$$\overline{OP} = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = 5 \text{ 이므로}$$

$$\sin \theta = -\frac{3}{5}, \cos \theta = -\frac{4}{5}, \tan \theta = \frac{3}{4}$$

$$28 \text{ ㉠ } \sin \frac{5}{4}\pi = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \frac{5}{4}\pi = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \tan \frac{5}{4}\pi = 1$$


오른쪽 그림과 같이 각 $\frac{5}{4}\pi$ 를 나타내는

동경과 단위원의 교점을 P라 하고, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\overline{OP} = 1$ 이고, $\angle POH = \frac{\pi}{4}$ 이므로 점 P의

좌표는 $P\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$$\therefore \sin \frac{5}{4}\pi = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \frac{5}{4}\pi = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \tan \frac{5}{4}\pi = 1$$



$$29 \text{ ㉠ } \sin \frac{5}{3}\pi = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \frac{5}{3}\pi = \frac{1}{2}, \tan \frac{5}{3}\pi = -\sqrt{3}$$


오른쪽 그림과 같이 각 $\frac{5}{3}\pi$ 를 나타내는

동경과 단위원의 교점을 P라 하고, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\overline{OP} = 1$ 이고, $\angle POH = \frac{\pi}{3}$ 이므로 점 P

의 좌표는 $P\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$$\therefore \sin \frac{5}{3}\pi = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \frac{5}{3}\pi = \frac{1}{2}, \tan \frac{5}{3}\pi = -\sqrt{3}$$



$$30 \text{ ㉠ } \sin 300^\circ < 0, \cos 300^\circ > 0, \tan 300^\circ < 0$$

300° 는 제4사분면의 각이므로

$$\sin 300^\circ < 0, \cos 300^\circ > 0, \tan 300^\circ < 0$$

$$31 \text{ ㉠ } \sin 460^\circ > 0, \cos 460^\circ < 0, \tan 460^\circ < 0$$

$460^\circ = 360^\circ \times 1 + 100^\circ$ 이므로 460° 는 제2사분면의 각이다.

$$\therefore \sin 460^\circ > 0, \cos 460^\circ < 0, \tan 460^\circ < 0$$

$$32 \text{ ㉠ } \sin(-320^\circ) > 0, \cos(-320^\circ) > 0, \tan(-320^\circ) > 0$$

$-320^\circ = 360^\circ \times (-1) + 40^\circ$ 이므로 -320° 는 제1사분면의 각이다.

$$\therefore \sin(-320^\circ) > 0, \cos(-320^\circ) > 0, \tan(-320^\circ) > 0$$

$$33 \text{ ㉠ } \sin \frac{13}{3}\pi > 0, \cos \frac{13}{3}\pi > 0, \tan \frac{13}{3}\pi > 0$$

$\frac{13}{3}\pi = 2\pi \times 2 + \frac{\pi}{3}$ 이므로 $\frac{13}{3}\pi$ 는 제1사분면의 각이다.

$$\therefore \sin \frac{13}{3}\pi > 0, \cos \frac{13}{3}\pi > 0, \tan \frac{13}{3}\pi > 0$$

$$34 \text{ ㉠ } \sin \frac{19}{6}\pi < 0, \cos \frac{19}{6}\pi < 0, \tan \frac{19}{6}\pi > 0$$

$\frac{19}{6}\pi = 2\pi \times 1 + \frac{7}{6}\pi$ 이므로 $\frac{19}{6}\pi$ 는 제3사분면의 각이다.

$$\therefore \sin \frac{19}{6}\pi < 0, \cos \frac{19}{6}\pi < 0, \tan \frac{19}{6}\pi > 0$$

$$35 \text{ ㉠ } \sin\left(-\frac{11}{5}\pi\right) < 0, \cos\left(-\frac{11}{5}\pi\right) > 0, \tan\left(-\frac{11}{5}\pi\right) < 0$$

$-\frac{11}{5}\pi = 2\pi \times (-2) + \frac{9}{5}\pi$ 이므로 $-\frac{11}{5}\pi$ 는 제4사분면의 각이다.

$$\therefore \sin\left(-\frac{11}{5}\pi\right) < 0, \cos\left(-\frac{11}{5}\pi\right) > 0, \tan\left(-\frac{11}{5}\pi\right) < 0$$

$$36 \text{ ㉠ } \text{제3사분면}$$

$\sin \theta < 0$ 이면 제3사분면 또는 제4사분면의 각이고,

$\cos \theta < 0$ 이면 제2사분면 또는 제3사분면의 각이므로 동시에 만족시키는 각 θ 는 제3사분면의 각이다.

$$37 \text{ ㉠ } \text{제2사분면}$$

$\sin \theta > 0$ 이면 제1사분면 또는 제2사분면의 각이고,

$\tan \theta < 0$ 이면 제2사분면 또는 제4사분면의 각이므로 동시에 만족시키는 각 θ 는 제2사분면의 각이다.

$$38 \text{ ㉠ } \text{제4사분면}$$

$\cos \theta > 0$ 이면 제1사분면 또는 제4사분면의 각이고,

$\tan \theta < 0$ 이면 제2사분면 또는 제4사분면의 각이므로 동시에 만족시키는 각 θ 는 제4사분면의 각이다.

$$39 \text{ ㉠ } \text{제1사분면 또는 제3사분면}$$

$\sin \theta \cos \theta > 0$ 에서

$\sin \theta > 0, \cos \theta > 0$ 또는 $\sin \theta < 0, \cos \theta < 0$ 이므로

각 θ 는 제1사분면 또는 제3사분면의 각이다.

$$40 \text{ ㉠ } \cos \theta = -\frac{3}{5}, \tan \theta = -\frac{4}{3}$$

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

θ 가 제2사분면의 각이므로 $\cos \theta < 0$

$$\therefore \cos \theta = -\frac{3}{5}, \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = -\frac{4}{3}$$

$$41 \text{ ㉠ } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \tan \theta = -1$$

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

θ 가 제2사분면의 각이므로 $\sin \theta > 0$

$$\therefore \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{-\frac{\sqrt{2}}{2}} = -1$$

$$42 \text{ ㉠ } \sin \theta = \frac{12}{13}, \cos \theta = -\frac{5}{13}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -\frac{12}{5} \text{ 에서 } \cos \theta = -\frac{5}{12} \sin \theta$$

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$\sin^2 \theta + \left(-\frac{5}{12} \sin \theta\right)^2 = 1, \frac{169}{144} \sin^2 \theta = 1$$

$$\therefore \sin^2 \theta = \frac{144}{169}$$

θ 가 제2사분면의 각이므로 $\sin \theta > 0$

$$\therefore \sin \theta = \frac{12}{13}, \cos \theta = -\frac{5}{12} \times \frac{12}{13} = -\frac{5}{13}$$

43 $\frac{3}{8}$

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 의 양변을 제곱하면

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{3}{8}$$

44 $-\frac{4}{3}$

$$\frac{1}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta} = \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{3}{8}} = -\frac{4}{3}$$

45 $\frac{64}{9}$

$$\frac{1}{\sin^2 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta} = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \frac{1}{\left(-\frac{3}{8}\right)^2} = \frac{64}{9}$$

46 $-\frac{8}{3}$

$$\begin{aligned} \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos \theta \sin \theta} \\ &= \frac{1}{-\frac{3}{8}} = -\frac{8}{3} \end{aligned}$$

47 $\frac{11}{16}$

$$\begin{aligned} \sin^3 \theta + \cos^3 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta)(\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta) \\ &= \frac{1}{2} \times \left\{ 1 - \left(-\frac{3}{8}\right) \right\} = \frac{11}{16} \end{aligned}$$

유형 완성하기

p. 125~136

01 ㉮ ⑤

① $-660^\circ = 360^\circ \times (-2) + 60^\circ$

② $-300^\circ = 360^\circ \times (-1) + 60^\circ$

③ $420^\circ = 360^\circ \times 1 + 60^\circ$

④ $780^\circ = 360^\circ \times 2 + 60^\circ$

⑤ $1110^\circ = 360^\circ \times 3 + 30^\circ$

따라서 동경 OP가 나타내는 각이 될 수 없는 것은 ⑤이다.

01-1 ㉮ ⑤

① $-390^\circ = 360^\circ \times (-2) + 330^\circ$

② $-30^\circ = 360^\circ \times (-1) + 330^\circ$

③ $330^\circ = 360^\circ \times 0 + 330^\circ$

④ $690^\circ = 360^\circ \times 1 + 330^\circ$

⑤ $1020^\circ = 360^\circ \times 2 + 300^\circ$

따라서 동경 OP가 나타내는 각이 될 수 없는 것은 ⑤이다.

02 ㉮ ⑤

① $-490^\circ = 360^\circ \times (-2) + 230^\circ$

② $-130^\circ = 360^\circ \times (-1) + 230^\circ$

③ $230^\circ = 360^\circ \times 0 + 230^\circ$

④ $590^\circ = 360^\circ \times 1 + 230^\circ$

⑤ $930^\circ = 360^\circ \times 2 + 210^\circ$

따라서 각을 나타내는 동경이 나머지 넷과 다른 하나는 ⑤이다.

02-1 ㉮ ㄱ, ㄷ

ㄱ. $-290^\circ = 360^\circ \times (-1) + 70^\circ$

ㄴ. $-70^\circ = 360^\circ \times (-1) + 290^\circ$

ㄷ. $430^\circ = 360^\circ \times 1 + 70^\circ$

ㄹ. $1070^\circ = 360^\circ \times 2 + 350^\circ$

따라서 70° 를 나타내는 동경과 일치하는 것은 ㄱ, ㄷ이다.

03 ㉮ 330

-120° 를 나타내는 동경 OP가 주어진 조건을 만족시키며 회전한 후 나타내는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\theta = -120^\circ + 540^\circ - 450^\circ = -30^\circ$$

$$-30^\circ = 360^\circ \times (-1) + 330^\circ \text{이므로 } \alpha = 330$$

03-1 ㉮ 30

400° 를 나타내는 동경 OP가 주어진 조건을 만족시키며 회전한 후 나타내는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\theta = 400^\circ - 210^\circ + 920^\circ = 1110^\circ$$

$$1110^\circ = 360^\circ \times 3 + 30^\circ \text{이므로 } \alpha = 30$$

04 ㉮ 제1사분면 또는 제3사분면

θ 가 제1사분면의 각이므로

$$360^\circ \times n < \theta < 360^\circ \times n + 90^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore 180^\circ \times n < \frac{\theta}{2} < 180^\circ \times n + 45^\circ$$

(i) $n = 2k$ (k 는 정수)일 때

$$360^\circ \times k < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 45^\circ \text{이므로 각 } \frac{\theta}{2} \text{는 제1사분면의 각이다.}$$

(ii) $n = 2k+1$ (k 는 정수)일 때

$$360^\circ \times k + 180^\circ < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 225^\circ \text{이므로 각 } \frac{\theta}{2} \text{는 제3사분면의 각이다.}$$

(i), (ii)에서 각 $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면은 제1사분면 또는 제3사분면이다.

04-1 ㉮ 제3사분면

θ 가 제2사분면의 각이므로

$$360^\circ \times n + 90^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 180^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore 120^\circ \times n + 30^\circ < \frac{\theta}{3} < 120^\circ \times n + 60^\circ$$

(i) $n=3k$ (k 는 정수)일 때

$$360^\circ \times k + 30^\circ < \frac{\theta}{3} < 360^\circ \times k + 60^\circ \text{이므로 각 } \frac{\theta}{3} \text{는 제1사분면의 각이다.}$$

(ii) $n=3k+1$ (k 는 정수)일 때

$$360^\circ \times k + 150^\circ < \frac{\theta}{3} < 360^\circ \times k + 180^\circ \text{이므로 각 } \frac{\theta}{3} \text{는 제2사분면의 각이다.}$$

(iii) $n=3k+2$ (k 는 정수)일 때

$$360^\circ \times k + 270^\circ < \frac{\theta}{3} < 360^\circ \times k + 300^\circ \text{이므로 각 } \frac{\theta}{3} \text{는 제4사분면의 각이다.}$$

(i)~(iii)에서 $\frac{\theta}{3}$ 는 제1사분면 또는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이므로 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면은 제3사분면이다.

05 ㉡ ㄱ, ㄴ

$$\text{ㄱ. } -510^\circ = 360^\circ \times (-2) + 210^\circ$$

$$\text{ㄴ. } -290^\circ = 360^\circ \times (-1) + 70^\circ$$

$$\text{ㄷ. } -210^\circ = 360^\circ \times (-1) + 150^\circ$$

$$\text{ㄹ. } 100^\circ = 360^\circ \times 0 + 100^\circ$$

$$\text{ㅁ. } 240^\circ = 360^\circ \times 0 + 240^\circ$$

$$\text{ㅂ. } 780^\circ = 360^\circ \times 2 + 60^\circ$$

따라서 제3사분면의 각은 ㄱ, ㄴ이다.

05-1 ㉡ ㄴ, ㄷ, ㅂ

$$\text{ㄱ. } -500^\circ = 360^\circ \times (-2) + 220^\circ$$

$$\text{ㄴ. } -390^\circ = 360^\circ \times (-2) + 330^\circ$$

$$\text{ㄷ. } -45^\circ = 360^\circ \times (-1) + 315^\circ$$

$$\text{ㄹ. } 150^\circ = 360^\circ \times 0 + 150^\circ$$

$$\text{ㅁ. } 225^\circ = 360^\circ \times 0 + 225^\circ$$

$$\text{ㅂ. } 640^\circ = 360^\circ \times 1 + 280^\circ$$

따라서 제4사분면의 각은 ㄴ, ㄷ, ㅂ이다.

06 ㉡ ⑤

θ 가 제2사분면의 각이므로

$$360^\circ \times n + 90^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 180^\circ \text{ (} n \text{는 정수)}$$

$$\therefore 180^\circ \times n + 45^\circ < \frac{\theta}{2} < 180^\circ \times n + 90^\circ$$

(i) $n=2k$ (k 는 정수)일 때

$$360^\circ \times k + 45^\circ < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 90^\circ$$

(ii) $n=2k+1$ (k 는 정수)일 때

$$360^\circ \times k + 225^\circ < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 270^\circ$$

(i), (ii)에서 각 $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경이 존재하는 모든 영역을 좌표평면 위에 나타내면 ⑤와 같다.

06-1 ㉡ ③

θ 가 제3사분면의 각이므로

$$360^\circ \times n + 180^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 270^\circ \text{ (} n \text{는 정수)}$$

$$\therefore 120^\circ \times n + 60^\circ < \frac{\theta}{3} < 120^\circ \times n + 90^\circ$$

(i) $n=3k$ (k 는 정수)일 때

$$360^\circ \times k + 60^\circ < \frac{\theta}{3} < 360^\circ \times k + 90^\circ$$

(ii) $n=3k+1$ (k 는 정수)일 때

$$360^\circ \times k + 180^\circ < \frac{\theta}{3} < 360^\circ \times k + 210^\circ$$

(iii) $n=3k+2$ (k 는 정수)일 때

$$360^\circ \times k + 300^\circ < \frac{\theta}{3} < 360^\circ \times k + 330^\circ$$

(i)~(iii)에서 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재하는 모든 영역을 좌표평면 위에 나타내면 ③과 같다.

07 ㉡ ④

$$\text{① } 25^\circ = 25 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5}{36}\pi$$

$$\text{② } 160^\circ = 160 \times \frac{\pi}{180} = \frac{8}{9}\pi$$

$$\text{③ } 300^\circ = 300 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5}{3}\pi$$

$$\text{④ } \frac{\pi}{5} = \frac{\pi}{5} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 36^\circ$$

$$\text{⑤ } -\frac{5}{12}\pi = -\frac{5}{12}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = -75^\circ$$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

07-1 ㉡ ⑤

$$\text{① } \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{12} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 15^\circ$$

$$\text{② } \frac{9}{10}\pi = \frac{9}{10}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 162^\circ$$

$$\text{③ } \frac{13}{6}\pi = \frac{13}{6}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 390^\circ$$

$$\text{④ } 84^\circ = 84 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7}{15}\pi$$

$$\text{⑤ } 150^\circ = 150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5}{6}\pi$$

따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

08 ㉡ ⑤

$$\text{① } \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 30^\circ \Rightarrow \text{제1사분면}$$

$$\text{② } -\frac{11}{6}\pi = -\frac{11}{6}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = -330^\circ$$

$$\therefore -330^\circ = 360^\circ \times (-1) + 30^\circ \Rightarrow \text{제1사분면}$$

$$\text{③ } \frac{7}{3}\pi = \frac{7}{3}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 420^\circ$$

$$\therefore 420^\circ = 360^\circ \times 1 + 60^\circ \Rightarrow \text{제1사분면}$$

$$\text{④ } -680^\circ = 360^\circ \times (-2) + 40^\circ \Rightarrow \text{제1사분면}$$

$$\text{⑤ } \frac{17}{3}\pi = \frac{17}{3}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 1020^\circ$$

$$\therefore 1020^\circ = 360^\circ \times 2 + 300^\circ \Rightarrow \text{제4사분면}$$

따라서 각을 나타내는 동경이 존재하는 사분면이 나머지 넷과 다른 하나는 ⑤이다.

08-1 ㉡ ④

$$\text{① } -\frac{8}{3}\pi = -\frac{8}{3}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = -480^\circ$$

$$\therefore -480^\circ = 360^\circ \times (-2) + 240^\circ \Rightarrow \text{제3사분면}$$

$$\textcircled{2} \quad -\frac{3}{4}\pi = -\frac{3}{4}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = -135^\circ$$

$$\therefore -135^\circ = 360^\circ \times (-1) + 225^\circ \Rightarrow \text{제3사분면}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{4}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 240^\circ \Rightarrow \text{제3사분면}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{14}{5}\pi = \frac{14}{5}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 504^\circ$$

$$\therefore 504^\circ = 360^\circ \times 1 + 144^\circ \Rightarrow \text{제2사분면}$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{46}{9}\pi = \frac{46}{9}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 920^\circ$$

$$\therefore 920^\circ = 360^\circ \times 2 + 200^\circ \Rightarrow \text{제3사분면}$$

따라서 각을 나타내는 동경이 존재하는 사분면이 나머지 넷과 다른 하나는 ④이다.

09 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

$$\text{ㄱ. } \frac{360^\circ}{\pi} = \frac{360}{\pi} \times \frac{\pi}{180} = 2 \text{라디안}$$

$$\text{ㄴ. } -\frac{5}{6}\pi = -\frac{5}{6}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = -150^\circ$$

이때 $-150^\circ = 360^\circ \times (-1) + 210^\circ$ 이므로 $-\frac{5}{6}\pi$ 는 제3사분면의 각이다.

$$\text{ㄷ. } 300^\circ - \frac{5}{6}\pi + 45^\circ = 300 \times \frac{\pi}{180} - \frac{5}{6}\pi + 45 \times \frac{\pi}{180} = \frac{13}{12}\pi$$

$$\therefore a = \frac{13}{12}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

09-1 답 ㄱ, ㄴ

$$\text{ㄱ. } \frac{900^\circ}{\pi} = \frac{900}{\pi} \times \frac{\pi}{180} = 5 \text{라디안}$$

$$\text{ㄴ. } \frac{40}{9}\pi = \frac{40}{9}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 800^\circ$$

이때 $800^\circ = 360^\circ \times 2 + 80^\circ$ 이므로 $\frac{40}{9}\pi$ 는 제1사분면의 각이다.

$$\begin{aligned} \text{ㄷ. } -200^\circ + \frac{2}{3}\pi + 150^\circ &= -200 \times \frac{\pi}{180} + \frac{2}{3}\pi + 150 \times \frac{\pi}{180} \\ &= \frac{7}{18}\pi \end{aligned}$$

$$\therefore a = \frac{7}{18}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

10 답 $\frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{3}{4}\pi$

각 2θ 를 나타내는 동경과 각 6θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭이므로

$$6\theta - 2\theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$4\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{4}\pi$$

$$0 < \theta < \pi \text{에서 } 0 < \frac{2n+1}{4}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$0 < 2n+1 < 4 \quad \therefore -\frac{1}{2} < n < \frac{3}{2}$$

이때 n 은 정수이므로 $n=0, 1$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } \theta = \frac{3}{4}\pi$$

10-1 답 $\frac{\pi}{2}$

각 θ 를 나타내는 동경과 각 9θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭이므로

$$9\theta - \theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$8\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{8}\pi$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{에서 } 0 < \frac{2n+1}{8}\pi < \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

$$0 < 2n+1 < 4 \quad \therefore -\frac{1}{2} < n < \frac{3}{2}$$

이때 n 은 정수이므로 $n=0, 1$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{8} \text{ 또는 } \theta = \frac{3}{8}\pi$$

따라서 모든 θ 의 값의 합은

$$\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8}\pi = \frac{\pi}{2}$$

11 답 0

각 -3θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 일치하므로

$$5\theta - (-3\theta) = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$8\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{n}{4}\pi$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{에서 } 0 < \frac{n}{4}\pi < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } 0 < n < 2$$

$$\text{이때 } n \text{은 정수이므로 } n=1 \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \cos 2\theta = \cos \left(2 \times \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

11-1 답 $\frac{6}{11}\pi$ 또는 $\frac{8}{11}\pi$ 또는 $\frac{10}{11}\pi$

각 -2θ 를 나타내는 동경과 각 9θ 를 나타내는 동경이 일치하므로

$$9\theta - (-2\theta) = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$11\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n}{11}\pi$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{에서 } \frac{\pi}{2} < \frac{2n}{11}\pi < \pi \text{이므로 } \frac{11}{4} < n < \frac{11}{2}$$

이때 n 은 정수이므로 $n=3, 4, 5$

$$\therefore \theta = \frac{6}{11}\pi \text{ 또는 } \theta = \frac{8}{11}\pi \text{ 또는 } \theta = \frac{10}{11}\pi$$

12 답 1

각 θ 를 나타내는 동경과 각 7θ 를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대이므로 원점에 대하여 대칭이다.

즉 $7\theta - \theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$ 이므로

$$6\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{6}\pi$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{에서 } \frac{\pi}{2} < \frac{2n+1}{6}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$3 < 2n+1 < 6 \quad \therefore 1 < n < \frac{5}{2}$$

$$\text{이때 } n \text{은 정수이므로 } n=2 \quad \therefore \theta = \frac{5}{6}\pi$$

$$\therefore \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) = \sin \left(\frac{5}{6}\pi - \frac{\pi}{3} \right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

12-1 답 4π

각 -4θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대이므로 원점에 대하여 대칭이다.

즉 $4\theta - (-4\theta) = (2n+1)\pi$ (n 은 정수)이므로

$$8\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{8}\pi \quad \dots\dots ①$$

$\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 에서 $\frac{\pi}{2} < \frac{2n+1}{8}\pi < \frac{3}{2}\pi$ 이므로

$$4 < 2n+1 < 12 \quad \therefore \frac{3}{2} < n < \frac{11}{2}$$

이때 n 은 정수이므로 $n=2, 3, 4, 5$

$$\therefore \theta = \frac{5}{8}\pi \text{ 또는 } \theta = \frac{7}{8}\pi \text{ 또는 } \theta = \frac{9}{8}\pi \text{ 또는 } \theta = \frac{11}{8}\pi \quad \dots\dots ②$$

따라서 모든 θ 의 값의 합은

$$\frac{5}{8}\pi + \frac{7}{8}\pi + \frac{9}{8}\pi + \frac{11}{8}\pi = 4\pi \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① θ 를 정수 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
② θ 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ 모든 θ 의 값의 합을 구할 수 있다.	20%

13 ㉡ ③

각 θ 를 나타내는 동경과 각 8θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 8\theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$9\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n}{9}\pi$$

$$0 < \theta < 2\pi \text{에서 } 0 < \frac{2n}{9}\pi < 2\pi \text{이므로}$$

$$0 < n < 9$$

이때 n 은 정수이므로 $n=1, 2, 3, \dots, 8$

따라서 $n=1$ 일 때 θ 의 최솟값은 $\frac{2}{9}\pi$, $n=8$ 일 때 θ 의 최댓값은

$$\frac{16}{9}\pi \text{이므로 } \alpha = \frac{2}{9}\pi, \beta = \frac{16}{9}\pi$$

$$\therefore \beta - \alpha = \frac{16}{9}\pi - \frac{2}{9}\pi = \frac{14}{9}\pi$$

13-1 ㉡ ③

각 2θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭이므로

$$2\theta + 5\theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$7\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n}{7}\pi$$

$$0 < \theta < \pi \text{에서 } 0 < \frac{2n}{7}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$0 < n < \frac{7}{2}$$

이때 n 은 정수이므로 $n=1, 2, 3$

$$\therefore \theta = \frac{2}{7}\pi \text{ 또는 } \theta = \frac{4}{7}\pi \text{ 또는 } \theta = \frac{6}{7}\pi$$

따라서 각 θ 의 개수는 3이다.

14 ㉡ $\frac{5}{4}\pi$ 또는 $\frac{7}{4}\pi$

각 -2θ 를 나타내는 동경과 각 6θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭이므로

$$-2\theta + 6\theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$4\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{4}\pi$$

$$\pi < \theta < 2\pi \text{에서 } \pi < \frac{2n+1}{4}\pi < 2\pi \text{이므로}$$

$$4 < 2n+1 < 8 \quad \therefore \frac{3}{2} < n < \frac{7}{2}$$

이때 n 은 정수이므로 $n=2, 3$

$$\therefore \theta = \frac{5}{4}\pi \text{ 또는 } \theta = \frac{7}{4}\pi$$

14-1 ㉡ $\frac{16}{9}\pi$

각 θ 를 나타내는 동경과 각 8θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 8\theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$9\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{9}\pi$$

$$0 < \theta < \pi \text{에서 } 0 < \frac{2n+1}{9}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$0 < 2n+1 < 9 \quad \therefore -\frac{1}{2} < n < 4$$

이때 n 은 정수이므로 $n=0, 1, 2, 3$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{9} \text{ 또는 } \theta = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \theta = \frac{5}{9}\pi \text{ 또는 } \theta = \frac{7}{9}\pi$$

따라서 모든 θ 의 값의 합은

$$\frac{\pi}{9} + \frac{\pi}{3} + \frac{5}{9}\pi + \frac{7}{9}\pi = \frac{16}{9}\pi$$

15 ㉡ ③

각 θ 를 나타내는 동경과 각 2θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 2\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수})$$

$$3\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad \therefore \theta = \frac{2n}{3}\pi + \frac{\pi}{6}$$

$$0 < \theta < \frac{3}{2}\pi \text{에서 } 0 < \frac{2n}{3}\pi + \frac{\pi}{6} < \frac{3}{2}\pi \text{이므로}$$

$$-\frac{\pi}{6} < \frac{2n}{3}\pi < \frac{4}{3}\pi \quad \therefore -\frac{1}{4} < n < 2$$

이때 n 은 정수이므로 $n=0, 1$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \theta = \frac{5}{6}\pi$$

따라서 모든 θ 의 값의 합은

$$\frac{\pi}{6} + \frac{5}{6}\pi = \pi$$

15-1 ㉡ ⑤

각 θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 4\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수})$$

$$5\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad \therefore \theta = \frac{2n}{5}\pi + \frac{\pi}{10}$$

$$0 < \theta < \pi \text{에서 } 0 < \frac{2n}{5}\pi + \frac{\pi}{10} < \pi \text{이므로}$$

$$-\frac{\pi}{10} < \frac{2n}{5}\pi < \frac{9}{10}\pi \quad \therefore -\frac{1}{4} < n < \frac{9}{4}$$

이때 n 은 정수이므로 $n=0, 1, 2$

따라서 $n=0$ 일 때 θ 의 최솟값은 $\frac{\pi}{10}$, $n=2$ 일 때 θ 의 최댓값은

$$\frac{9}{10}\pi \text{이므로 } \alpha = \frac{\pi}{10}, \beta = \frac{9}{10}\pi$$

$$\therefore \alpha + \beta = \frac{\pi}{10} + \frac{9}{10}\pi = \pi$$

16 ㉓ ③

반지름의 길이가 6, 중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$ 인 부채꼴의

호의 길이는 $6 \times \frac{2}{3}\pi = 4\pi$

넓이는 $\frac{1}{2} \times 6^2 \times \frac{2}{3}\pi = 12\pi$

따라서 $a=4\pi, b=12\pi$ 이므로

$$a+b=4\pi+12\pi=16\pi$$

16-1 ㉓ ②

반지름의 길이가 a , 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 인 부채꼴의 넓이가 $\frac{3}{2}\pi$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times a^2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}\pi, a^2=9$$

$$\therefore a=3 (\because a>0)$$

따라서 부채꼴의 호의 길이는 $3 \times \frac{\pi}{3} = \pi$ 이므로 $b=\pi$

$$\therefore ab=3 \times \pi = 3\pi$$

17 ㉓ ④

부채꼴의 반지름의 길이를 r , 중심각의 크기를 θ 라 하면

넓이가 2π 이므로 $\frac{1}{2} \times r \times \pi = 2\pi$

$$\therefore r=4$$

호의 길이가 π 이므로 $4\theta=\pi$

$$\therefore \theta=\frac{\pi}{4}$$

다른 풀이

부채꼴의 반지름의 길이를 r , 중심각의 크기를 θ 라 하면

호의 길이가 π , 넓이가 2π 이므로

$$r\theta=\pi$$

$$\frac{1}{2}r^2\theta=2\pi$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{을 하면 } \frac{1}{2}r=2 \quad \therefore r=4$$

$r=4$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $4\theta=\pi$

$$\therefore \theta=\frac{\pi}{4}$$

17-1 ㉓ 18+6 π

부채꼴의 호의 길이가 2π , 넓이가 3π 이므로

$$\frac{1}{2} \times r \times 2\pi = 3\pi \quad \therefore r=3$$

따라서 부채꼴의 둘레의 길이는

$$2 \times 3 + 2\pi = 6 + 2\pi \quad \therefore a=6+2\pi$$

$$\therefore ar=(6+2\pi) \times 3=18+6\pi$$

18 ㉓ 2

$\angle AOB=\theta$ 라 하면 $\overline{OA} \times \theta = 2\pi, \overline{OC} \times \theta = \frac{4}{3}\pi$ 이므로

$$\overline{OC} = \frac{2}{3}\overline{OA}$$

이때 색칠한 부분의 넓이가 $\frac{10}{3}\pi$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{OA} \times 2\pi - \frac{1}{2} \times \overline{OC} \times \frac{4}{3}\pi = \frac{10}{3}\pi$$

$\textcircled{1}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$\pi \times \overline{OA} - \frac{4}{9}\pi \times \overline{OA} = \frac{10}{3}\pi$$

$$\frac{5}{9}\pi \times \overline{OA} = \frac{10}{3}\pi \quad \therefore \overline{OA}=6$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \overline{OC} = \frac{2}{3}\overline{OA} = \frac{2}{3} \times 6 = 4$$

$$\therefore \overline{AC} = \overline{OA} - \overline{OC} = 6 - 4 = 2$$

18-1 ㉓ 108 π

반지름의 길이가 18, 중심각의 크기가 $\frac{8}{9}\pi$ 인 부채꼴 COD의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 18^2 \times \frac{8}{9}\pi = 144\pi \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

반지름의 길이가 9, 중심각의 크기가 $\frac{8}{9}\pi$ 인 부채꼴 AOB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 9^2 \times \frac{8}{9}\pi = 36\pi \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

따라서 종이의 넓이는

$$144\pi - 36\pi = 108\pi \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

채점 기준	비율
① 부채꼴 COD의 넓이를 구할 수 있다.	40%
② 부채꼴 AOB의 넓이를 구할 수 있다.	40%
③ 종이의 넓이를 구할 수 있다.	20%

19 ㉓ $\pi-2$

원과 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 부채꼴의 중심각의 크기를 θ 라 하면 원의 둘레의 길이가 부채꼴의 둘레의 길이의 2배이므로

$$2\pi r = 2(2r + r\theta), \pi = 2 + \theta$$

$$\therefore \theta = \pi - 2$$

19-1 ㉓ ④

반지름의 길이가 r 인 원의 넓이는 πr^2

반지름의 길이가 $2r$, 호의 길이가 6π 인 부채꼴의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2r \times 6\pi = 6\pi r$$

이때 원의 넓이와 부채꼴의 넓이가 서로 같으므로

$$\pi r^2 = 6\pi r \quad \therefore r=6$$

20 ㉓ ④

오른쪽 그림과 같이 반원의 중심을 O라 하면

$$\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = 6$$


$\angle AOC = \theta$ 라 하면 호 AC의 길이가

4 π 이므로

$$6\theta = 4\pi \quad \therefore \theta = \frac{2}{3}\pi$$

이때 $\angle COH = \pi - \frac{2}{3}\pi = \frac{\pi}{3}$ 이므로 $\triangle COH$ 에서

$$\frac{\overline{CH}}{\overline{OC}} = \sin \frac{\pi}{3}, \frac{\overline{CH}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore \overline{CH} = 3\sqrt{3}$$



20-1 ㉓ $2\pi-4$

부채꼴 AOP의 중심각의 크기를 θ 라 하면 호 AP의 길이와 지름 AB의 길이가 같으므로

$$2\theta = 4 \quad \therefore \theta = 2$$

따라서 부채꼴 POB의 중심각의 크기는 $\pi - 2$ 이므로

부채꼴 POB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2^2 \times (\pi - 2) = 2\pi - 4$$

다른 풀이

반지름의 길이가 2인 반원의 호의 길이는 2π 이고, 호 AP의 길이는
지름 AB의 길이와 같은 4이므로 호 PB의 길이는 $2\pi - 4$

따라서 부채꼴 POB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2 \times (2\pi - 4) = 2\pi - 4$$


21 ㉡ 2√5

오른쪽 그림과 같이 만들어진 원뿔의 밑면의
반지름의 길이를 r 라 하면 부채꼴의 호
의 길이와 밑면인 원의 둘레의 길이가 같으

$$\text{므로 } 6 \times \frac{4}{3} \pi = 2\pi r \quad \therefore r = 4$$

따라서 원뿔의 높이는

$$\sqrt{6^2 - 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$




21-1 ㉡ ⑤

오른쪽 그림과 같이 만들어진 원뿔의 밑면의
반지름의 길이를 r 라 하면 부채꼴의 호의 길이
와 밑면인 원의 둘레의 길이가 같으므로

$$4 \times \frac{5}{6} \pi = 2\pi r \quad \therefore r = \frac{5}{3}$$

따라서 원뿔의 밑면의 넓이는

$$\pi \times \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9} \pi$$



22 ㉡ ⑤

부채꼴의 반지름의 길이가 a cm, 둘레의 길이가 16 cm이므로
호의 길이는 $(16 - 2a)$ cm

이때 $a > 0$, $16 - 2a > 0$ 이므로 $0 < a < 8$

부채꼴의 넓이를 S cm²라 하면

$$S = \frac{1}{2} a(16 - 2a) = -a^2 + 8a$$

$$= -(a - 4)^2 + 16 \quad (0 < a < 8)$$

즉 $a = 4$ 일 때 S 의 최댓값은 16이다.

이때 부채꼴의 중심각의 크기는 b 라디안이므로

$$\frac{1}{2} \times 4^2 \times b = 16 \quad \therefore b = 2$$

$$\therefore a + b = 4 + 2 = 6$$

22-1 ㉡ ④

부채꼴의 반지름의 길이를 r 라 하면 둘레의 길이가 20이므로
호의 길이는 $20 - 2r$

이때 $r > 0$, $20 - 2r > 0$ 이므로 $0 < r < 10$

부채꼴의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} r(20 - 2r) = -r^2 + 10r$$

$$= -(r - 5)^2 + 25 \quad (0 < r < 10)$$

즉 $r = 5$ 일 때 S 의 최댓값은 25이다.

이때 부채꼴의 중심각의 크기를 θ 라 하면

$$\frac{1}{2} \times 5^2 \times \theta = 25 \quad \therefore \theta = 2$$

23 ㉡ 81

부채꼴의 반지름의 길이를 r 라 하면 둘레의 길이가 36이므로
호의 길이는 $36 - 2r$

이때 $r > 0$, $36 - 2r > 0$ 이므로 $0 < r < 18$

부채꼴의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} r(36 - 2r) = -r^2 + 18r$$

$$= -(r - 9)^2 + 81 \quad (0 < r < 18)$$

따라서 $r = 9$ 일 때 S 의 최댓값은 81이다.

23-1 ㉡ ⑤

부채꼴의 반지름의 길이를 r 라 하면 둘레의 길이가 40이므로
호의 길이는 $40 - 2r$

이때 $r > 0$, $40 - 2r > 0$ 이므로 $0 < r < 20$

부채꼴의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} r(40 - 2r) = -r^2 + 20r$$

$$= -(r - 10)^2 + 100 \quad (0 < r < 20)$$

따라서 $r = 10$ 일 때 S 가 최대이므로 넓이가 최대인 부채꼴의 반지
름의 길이는 10이다.

24 ㉡ 25

부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l 이라 하면 부채꼴의 넓
이가 k 이므로

$$\frac{1}{2} r l = k \quad \therefore l = \frac{2k}{r}$$

부채꼴의 둘레의 길이는

$$2r + l = 2r + \frac{2k}{r}$$

이때 $2r > 0$, $\frac{2k}{r} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의
하여

$$2r + \frac{2k}{r} \geq 2\sqrt{2r \times \frac{2k}{r}} = 4\sqrt{k} \quad (\text{단, 등호는 } r = \sqrt{k} \text{일 때 성립})$$

$$\text{즉 } 4\sqrt{k} = 20 \text{이므로 } \sqrt{k} = 5 \quad \therefore k = 25$$

24-1 ㉡ 8√2

부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l 이라 하면 부채꼴의 넓
이가 8이므로

$$\frac{1}{2} r l = 8 \quad \therefore l = \frac{16}{r}$$

부채꼴의 둘레의 길이는

$$2r + l = 2r + \frac{16}{r}$$

..... ①

이때 $2r > 0$, $\frac{16}{r} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의
하여

$$2r + \frac{16}{r} \geq 2\sqrt{2r \times \frac{16}{r}} = 8\sqrt{2} \quad (\text{단, 등호는 } r = 2\sqrt{2} \text{일 때 성립})$$

따라서 부채꼴의 둘레의 길이의 최솟값은 $8\sqrt{2}$ 이다.

..... ②

채점 기준	비율
① 부채꼴의 반지름의 길이를 r 라 하고 둘레의 길이를 r 에 대한 식으로 나 타낼 수 있다.	40%
② 부채꼴의 둘레의 길이의 최솟값을 구할 수 있다.	60%

25 ㉔ ④

$$\overline{OP} = \sqrt{(-5)^2 + (-12)^2} = 13 \text{이므로}$$

$$\sin \theta = -\frac{12}{13}, \cos \theta = -\frac{5}{13}$$

$$\therefore \cos \theta - \sin \theta = -\frac{5}{13} - \left(-\frac{12}{13}\right) = \frac{7}{13}$$

25-1 ㉔ $\frac{1}{10}$

$$\overline{OP} = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5} \text{이므로}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \theta = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \tan \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin \theta \cos \theta - \tan \theta &= \frac{1}{\sqrt{5}} \times \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{2}{5} + \frac{1}{2} = \frac{1}{10} \end{aligned}$$

26 ㉔ 18

$$\text{점 } P(a, 3\sqrt{3}) \text{에서 } \tan \theta = \frac{3\sqrt{3}}{a} \text{이므로}$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{a} = \sqrt{3} \quad \therefore a = 3$$

$$\text{즉 점 } P \text{의 좌표가 } (3, 3\sqrt{3}) \text{이므로}$$

$$r = \sqrt{3^2 + (3\sqrt{3})^2} = 6$$

$$\therefore ar = 3 \times 6 = 18$$

26-1 ㉔ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

$$\theta \text{가 제4사분면의 각이고 } \tan \theta = -\frac{1}{3} \text{이므로 점 } P \text{의 좌표를}$$

$$(3a, -a) \ (a > 0) \text{라 하면}$$

$$\overline{OP} = \sqrt{(3a)^2 + (-a)^2} = \sqrt{10}a \text{이므로}$$

$$\sin \theta = \frac{-a}{\sqrt{10}a} = -\frac{1}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$$

$$\cos \theta = \frac{3a}{\sqrt{10}a} = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

$$\therefore \cos \theta - \sin \theta = \frac{3\sqrt{10}}{10} - \left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right) = \frac{2\sqrt{10}}{5}$$

27 ㉔ $\frac{7}{15}$

오른쪽 그림과 같이 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 5인 원이 직선

$$4x + 3y = 0, \text{ 즉 } y = -\frac{4}{3}x \text{와 만나는 점}$$


중에서 제2사분면 위의 점을 P라 하면

$$P(-3, 4)$$

$$\text{이때 } \overline{OP} = 5 \text{이므로}$$

$$\sin \theta = \frac{4}{5}, \cos \theta = -\frac{3}{5}, \tan \theta = -\frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \cos \theta - \sin \theta \tan \theta &= -\frac{3}{5} - \frac{4}{5} \times \left(-\frac{4}{3}\right) \\ &= -\frac{3}{5} + \frac{16}{15} = \frac{7}{15} \end{aligned}$$



27-1 ㉔ $-\frac{1}{2}$

두 점 P, Q는 원점에 대하여 대칭이므로 Q(-5, -12)

$$\text{이때 } \overline{OQ} = \sqrt{(-5)^2 + (-12)^2} = 13 \text{이므로}$$

$$\sin \theta = -\frac{12}{13}, \cos \theta = -\frac{5}{13}, \tan \theta = \frac{12}{5} \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{13 \cos \theta + 5 \tan \theta}{13 \sin \theta - 2} &= \frac{13 \times \left(-\frac{5}{13}\right) + 5 \times \frac{12}{5}}{13 \times \left(-\frac{12}{13}\right) - 2} \\ &= \frac{-5 + 12}{-12 - 2} = -\frac{1}{2} \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	60%
② $\frac{13 \cos \theta + 5 \tan \theta}{13 \sin \theta - 2}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

28 ㉔ $2 \sin \theta - 2 \cos \theta$

θ 가 제2사분면의 각이므로

$$\sin \theta > 0, \cos \theta < 0, \tan \theta < 0$$

따라서 $\sin \theta - \cos \theta > 0, \tan \theta - \sin \theta < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} |\cos \theta| - |\tan \theta| + \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2} + \sqrt{(\tan \theta - \sin \theta)^2} \\ = -\cos \theta - (-\tan \theta) + |\sin \theta - \cos \theta| + |\tan \theta - \sin \theta| \\ = -\cos \theta + \tan \theta + \sin \theta - \cos \theta - (\tan \theta - \sin \theta) \\ = 2 \sin \theta - 2 \cos \theta \end{aligned}$$

28-1 ㉔ ②

θ 가 제4사분면의 각이므로

$$\sin \theta < 0, \cos \theta > 0, \tan \theta < 0$$

- ① $\sin \theta \cos \theta < 0$ ② $\sin \theta \tan \theta > 0$
- ③ $\cos \theta \tan \theta < 0$ ④ $\sin \theta - \cos \theta < 0$
- ⑤ $\cos \theta - \tan \theta > 0$

따라서 옳은 것은 ②이다.

29 ㉔ 제2사분면

(i) $\sin \theta \cos \theta < 0$ 에서

$\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$ 또는 $\sin \theta < 0, \cos \theta > 0$ 이므로
각 θ 는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다.

(ii) $\sin \theta \tan \theta < 0$ 에서

$\sin \theta > 0, \tan \theta < 0$ 또는 $\sin \theta < 0, \tan \theta > 0$ 이므로
각 θ 는 제2사분면 또는 제3사분면의 각이다.

(i), (ii)에서 각 θ 는 제2사분면의 각이다.

29-1 ㉔ $-\sin \theta - \cos \theta + \tan \theta$

(i) $\sin \theta \cos \theta > 0$ 에서

$\sin \theta < 0, \cos \theta < 0$ 또는 $\sin \theta > 0, \cos \theta > 0$ 이므로
각 θ 는 제1사분면 또는 제3사분면의 각이다.

(ii) $\cos \theta \tan \theta < 0$ 에서

$\cos \theta < 0, \tan \theta > 0$ 또는 $\cos \theta > 0, \tan \theta < 0$ 이므로
각 θ 는 제3사분면 또는 제4사분면의 각이다.

(i), (ii)에서 각 θ 는 제3사분면의 각이므로

$$\sin \theta < 0, \cos \theta < 0, \tan \theta > 0 \quad \dots\dots ①$$

따라서 $\sin \theta + \cos \theta < 0, \cos \theta - \tan \theta < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} |\sin \theta + \cos \theta| - \sqrt{\cos^2 \theta} + |\cos \theta - \tan \theta| \\ = -(\sin \theta + \cos \theta) - |\cos \theta| - (\cos \theta - \tan \theta) \\ = -\sin \theta - \cos \theta - (-\cos \theta) - \cos \theta + \tan \theta \\ = -\sin \theta - \cos \theta + \tan \theta \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값의 부호를 알 수 있다.	60%
② 주어진 식을 간단히 할 수 있다.	40%

30 [답] ㄱ, ㄴ, ㄷ

$\sqrt{\sin \theta} \sqrt{\tan \theta} = -\sqrt{\sin \theta \tan \theta} (\sin \theta \neq 0)$ 에서
 $\sin \theta < 0, \tan \theta < 0$ 이므로 θ 는 제4사분면의 각이다.

이때 $\cos \theta > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \text{ㄱ. } \sin \theta \cos \theta &< 0 & \text{ㄴ. } \sin \theta \tan \theta &> 0 \\ \text{ㄷ. } \sin \theta + \tan \theta &< 0 & \text{ㄹ. } \tan \theta - \cos \theta &< 0 \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

Lecture 음수의 제곱근의 성질

실수 a, b 에 대하여

$$(1) a < 0, b < 0 \text{ 이면 } \sqrt{a} \sqrt{b} = -\sqrt{ab}$$

그 외에는 $\sqrt{a} \sqrt{b} = \sqrt{ab}$

$$(2) a > 0, b < 0 \text{ 이면 } \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$$

그 외에는 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ (단, $b \neq 0$)

30-1 [답] ④

$$\frac{\sqrt{\sin \theta}}{\sqrt{\cos \theta}} = -\sqrt{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} \text{ 이고 } \sin \theta \cos \theta \neq 0 \text{ 이므로}$$

$$\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$$

따라서 $\sin \theta - \cos \theta > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} &\sqrt{\sin^2 \theta} + \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2} - |\cos \theta| \\ &= |\sin \theta| + |\sin \theta - \cos \theta| - (-\cos \theta) \\ &= \sin \theta + \sin \theta - \cos \theta + \cos \theta = 2 \sin \theta \end{aligned}$$

31 [답] ③

$$\begin{aligned} \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} - \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} &= \frac{\sin^2 \theta - (1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta)}{(1 + \cos \theta) \sin \theta} \\ &= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 1}{(1 + \cos \theta) \sin \theta} \\ &= \frac{1 - 1}{(1 + \cos \theta) \sin \theta} \\ &= 0 \end{aligned}$$

31-1 [답] ③

$$\begin{aligned} \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} - \tan \theta &= \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \\ &= \frac{\cos^2 \theta - \sin \theta(1 - \sin \theta)}{(1 - \sin \theta) \cos \theta} \\ &= \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta - \sin \theta}{(1 - \sin \theta) \cos \theta} \\ &= \frac{1 - \sin \theta}{(1 - \sin \theta) \cos \theta} \\ &= \frac{1}{\cos \theta} \end{aligned}$$

32 [답] ④

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} + \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} &= \frac{\cos^2 \theta + (1 + \sin \theta)^2}{(1 + \sin \theta) \cos \theta} \\ &= \frac{2(1 + \sin \theta)}{(1 + \sin \theta) \cos \theta} \\ &= \frac{2}{\cos \theta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \frac{1}{\tan \theta} - \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} &= \frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} \\ &= \frac{\cos \theta(1 - \cos \theta) - \sin^2 \theta}{\sin \theta(1 - \cos \theta)} \\ &= \frac{\cos \theta - 1}{\sin \theta(1 - \cos \theta)} \\ &= -\frac{1}{\sin \theta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{1 + 2 \sin \theta \cos \theta} &= \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{(\cos \theta + \sin \theta)(\cos \theta - \sin \theta)}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} \\ &= \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta} = \frac{\frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta}}{\frac{\cos \theta + \sin \theta}{\cos \theta}} \\ &= \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \frac{\tan \theta}{\cos \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta} &= \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta} = \frac{\sin \theta + 1}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{\sin \theta + 1}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{\sin \theta + 1}{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)} \\ &= \frac{1}{1 - \sin \theta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{5} \left(\tan \theta + \frac{1}{\cos \theta} \right)^2 &= \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{1}{\cos \theta} \right)^2 = \frac{(\sin \theta + 1)^2}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{(\sin \theta + 1)^2}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{(\sin \theta + 1)^2}{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)} \\ &= \frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta} \end{aligned}$$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

32-1 [답] ㄴ, ㄷ

$$\begin{aligned} \text{ㄱ. } \cos^4 \theta - \sin^4 \theta &= (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \\ &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= \cos^2 \theta - (1 - \cos^2 \theta) \\ &= 2 \cos^2 \theta - 1 \end{aligned}$$

$$\text{ㄴ. } \frac{1}{1 + \cos \theta} + \frac{1}{1 - \cos \theta} = \frac{1 - \cos \theta + 1 + \cos \theta}{1 - \cos^2 \theta} = \frac{2}{\sin^2 \theta}$$

$$\text{ㄷ. } \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{1 + 2 \sin \theta \cos \theta} + \frac{\tan \theta - 1}{\tan \theta + 1}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta} + \frac{\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - 1}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + 1} \\ &= \frac{(\cos \theta - \sin \theta)(\cos \theta + \sin \theta)}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} + \frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} \\ &= \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\sin \theta + \cos \theta} + \frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} = 0 \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

33 [답] $2 \sin \theta$

$$\begin{aligned} &\sqrt{1 + 2 \sin \theta \cos \theta} + \sqrt{1 - 2 \sin \theta \cos \theta} \\ &= \sqrt{\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta} \\ &\quad + \sqrt{\sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{(\sin \theta + \cos \theta)^2} + \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2} \\ &= |\sin \theta + \cos \theta| + |\sin \theta - \cos \theta| \\ &= \sin \theta + \cos \theta + \sin \theta - \cos \theta (\because \sin \theta - \cos \theta > 0) \\ &= 2 \sin \theta \end{aligned}$$

33-1 ㉓ ③

$\sin \theta - \cos \theta > 0$, $\sin \theta \cos \theta < 0$ 에서

$\sin \theta > 0$, $\cos \theta < 0$

$$\begin{aligned} \therefore \sqrt{4-8\sin\theta\cos\theta} - |\sin\theta| - \sqrt{\cos^2\theta} \\ = \sqrt{4\sin^2\theta - 8\sin\theta\cos\theta + 4\cos^2\theta} - \sin\theta - |\cos\theta| \\ = \sqrt{4(\sin\theta - \cos\theta)^2} - \sin\theta - (-\cos\theta) \\ = 2|\sin\theta - \cos\theta| - \sin\theta + \cos\theta \\ = 2(\sin\theta - \cos\theta) - \sin\theta + \cos\theta \\ = \sin\theta - \cos\theta \end{aligned}$$

34 ㉓ $\frac{1}{2}$

$$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = 1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$$

이때 θ 가 제4사분면의 각이므로 $\cos\theta > 0$

$$\therefore \cos\theta = \frac{4}{5}$$

$$\text{따라서 } \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{-\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4} \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{\cos\theta} + \tan\theta = \frac{5}{4} + \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

34-1 ㉓ $-\frac{5}{6}$

$$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

이때 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 $\sin\theta > 0$ 이므로

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\text{따라서 } \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{3}}{-\frac{2}{3}} = -\frac{\sqrt{5}}{2} \text{ 이므로}$$

$$\sin\theta \tan\theta = \frac{\sqrt{5}}{3} \times \left(-\frac{\sqrt{5}}{2}\right) = -\frac{5}{6}$$

35 ㉓ ④

$$\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta} = 2 - \sqrt{3} \text{에서}$$

$$1 + \cos\theta = (2 - \sqrt{3})(1 - \cos\theta)$$

$$(3 - \sqrt{3})\cos\theta = 1 - \sqrt{3}$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{1-\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} = \frac{(1-\sqrt{3})(3+\sqrt{3})}{(3-\sqrt{3})(3+\sqrt{3})} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore \sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}$$

이때 θ 가 제3사분면의 각이므로 $\sin\theta < 0$

$$\therefore \sin\theta = -\frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\therefore \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{-\frac{\sqrt{6}}{3}}{-\frac{\sqrt{3}}{3}} = \sqrt{2}$$

35-1 ㉓ $\frac{1}{2}$

$|\sin\theta| = |\cos\theta|$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2\theta = \cos^2\theta$$

..... ㉓

㉓을 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 에 대입하면

$$2\cos^2\theta = 1 \quad \therefore \cos^2\theta = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \sin^2\theta = \cos^2\theta = \frac{1}{2}$$

이때 θ 가 제2사분면의 각이므로 $\sin\theta > 0$, $\cos\theta < 0$

$$\therefore \sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{따라서 } \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{-\frac{\sqrt{2}}{2}} = -1 \text{ 이므로}$$

$$\sin\theta \cos\theta - \tan\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - (-1) = \frac{1}{2}$$

36 ㉓ $\frac{8}{7}$

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 의 양변을 $\cos^2\theta$ 으로 나누면

$$\tan^2\theta + 1 = \frac{1}{\cos^2\theta} \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{\cos^2\theta} = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 1 = \frac{10}{9} \quad \therefore \cos^2\theta = \frac{9}{10}$$

$$\therefore \sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \frac{9}{10} = \frac{1}{10}$$

이때 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 $\sin\theta > 0$, $\cos\theta < 0$ 이므로

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{10}}{10}, \cos\theta = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\cos^2\theta - \sin^2\theta}{1 + \sin\theta \cos\theta} &= \frac{\frac{9}{10} - \frac{1}{10}}{1 + \frac{\sqrt{10}}{10} \times \left(-\frac{3\sqrt{10}}{10}\right)} \\ &= \frac{\frac{8}{10}}{1 - \frac{3}{10}} = \frac{8}{7} \end{aligned}$$

36-1 ㉓ ④

$$\frac{1+\tan\theta}{1-\tan\theta} = 3 \text{에서 } 1 + \tan\theta = 3 - 3\tan\theta$$

$$4\tan\theta = 2 \quad \therefore \tan\theta = \frac{1}{2}$$

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 의 양변을 $\cos^2\theta$ 으로 나누면

$$\tan^2\theta + 1 = \frac{1}{\cos^2\theta} \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{\cos^2\theta} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = \frac{5}{4} \quad \therefore \cos^2\theta = \frac{4}{5}$$

$$\therefore \sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$$

이때 θ 가 제3사분면의 각이므로 $\sin\theta < 0$, $\cos\theta < 0$

$$\therefore \sin\theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}, \cos\theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\therefore \sin\theta \cos\theta = -\frac{\sqrt{5}}{5} \times \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right) = \frac{2}{5}$$

유형 + 완성하기

p. 137

37 ㉓ $\frac{\sqrt{17}}{9}$

$\sin\theta + \cos\theta = -\frac{1}{3}$ 의 양변을 제곱하면

$$\begin{aligned}\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta &= \frac{1}{9} \\ 1 + 2 \sin \theta \cos \theta &= \frac{1}{9} \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{4}{9} \\ \therefore (\sin \theta - \cos \theta)^2 &= \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta \\ &= 1 - 2 \times \left(-\frac{4}{9}\right) = \frac{17}{9}\end{aligned}$$

이때 $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 에서 $\sin \theta < 0, \cos \theta > 0$ 이므로
 $\sin \theta - \cos \theta < 0$

$$\begin{aligned}\therefore \sin \theta - \cos \theta &= -\frac{\sqrt{17}}{3} \\ \therefore \sin^2 \theta - \cos^2 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta)(\sin \theta - \cos \theta) \\ &= -\frac{1}{3} \times \left(-\frac{\sqrt{17}}{3}\right) = \frac{\sqrt{17}}{9}\end{aligned}$$

38 ㉡ ⑤

$\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{3}$ 의 양변을 제곱하면

$$\begin{aligned}\sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta &= \frac{1}{9} \\ 1 - 2 \sin \theta \cos \theta &= \frac{1}{9} \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = \frac{4}{9} \\ \therefore \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{1}{\frac{4}{9}} = \frac{9}{4}\end{aligned}$$

39 ㉡ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\begin{aligned}(\sin \theta - \cos \theta)^2 &= \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta \\ &= 1 - 2 \sin \theta \cos \theta \\ &= 1 - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 2\end{aligned}$$

이때 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$ 이므로

$$\begin{aligned}\sin \theta - \cos \theta &> 0 \\ \therefore \sin \theta - \cos \theta &= \sqrt{2} \\ \therefore \sin^3 \theta - \cos^3 \theta &= (\sin \theta - \cos \theta)(\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta) \\ &= \sqrt{2} \times \left\{1 + \left(-\frac{1}{2}\right)\right\} = \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

40 ㉡ ⑤

이차방정식 $2x^2 - ax + 1 = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{a}{2} \quad \dots\dots ㉠$$

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \quad \dots\dots ㉡$$

㉠의 양변을 제곱하면

$$1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{a^2}{4} \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = \frac{a^2 - 4}{8} \quad \dots\dots ㉢$$

$$\text{㉡, ㉢에서 } \frac{a^2 - 4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$a^2 = 8 \quad \therefore a = \pm 2\sqrt{2}$$

그런데 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin \theta > 0, \cos \theta > 0$ 이므로 $a > 0$ ($\therefore$ ㉠)
 $\therefore a = 2\sqrt{2}$

41 ㉡ 1

이차방정식 $x^2 - \sqrt{3}x + k = 0$ 의 두 근이 $\frac{1}{\sin \theta}, \frac{1}{\cos \theta}$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\frac{1}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta} = \sqrt{3}, \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = k \quad \dots\dots ㉠$$

$$\frac{1}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta} = \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \sqrt{3} \text{에서}$$

$$k(\sin \theta + \cos \theta) = \sqrt{3} \quad \therefore \sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{k}$$

이때 $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta$ 이므로

$$\frac{3}{k^2} = 1 + 2 \times \frac{1}{k}, k^2 + 2k - 3 = 0$$

$$(k+3)(k-1) = 0 \quad \therefore k = -3 \text{ 또는 } k = 1$$

그런데 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin \theta > 0, \cos \theta > 0$ 이므로 $k > 0$ ($\therefore$ ㉠)

$$\therefore k = 1$$

42 ㉡ -7

이차방정식 $9x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\sin \theta + \cos \theta = -\frac{a}{9}, \sin \theta \cos \theta = \frac{b}{9}$$

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{3} \text{이므로 } -\frac{a}{9} = \frac{1}{3} \quad \therefore a = -3 \quad \dots\dots ㉠$$

이때 $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta$ 이므로

$$\frac{1}{9} = 1 + \frac{2}{9}b, \frac{2}{9}b = -\frac{8}{9} \quad \therefore b = -4 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\therefore a + b = -3 + (-4) = -7 \quad \dots\dots ㉢$$

채점 기준	비율
① a의 값을 구할 수 있다.	40%
② b의 값을 구할 수 있다.	40%
③ a + b의 값을 구할 수 있다.	20%

학교 시험 대비 문제

p. 138~141

01 ㉡ ④

$$\textcircled{1} -320^\circ = 360^\circ \times (-1) + 40^\circ$$

$$\textcircled{2} 40^\circ = 360^\circ \times 0 + 40^\circ$$

$$\textcircled{3} 400^\circ = 360^\circ \times 1 + 40^\circ$$

$$\textcircled{4} 650^\circ = 360^\circ \times 1 + 290^\circ$$

$$\textcircled{5} 1120^\circ = 360^\circ \times 3 + 40^\circ$$

따라서 각을 나타내는 동경이 나머지 넷과 다른 하나는 ㉣이다.

02 ㉡ ④

θ 가 제4사분면의 각이므로

$$360^\circ \times n + 270^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 360^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore 180^\circ \times n + 135^\circ < \frac{\theta}{2} < 180^\circ \times n + 180^\circ$$

(i) $n=2k$ (k 는 정수)일 때

$360^\circ \times k + 135^\circ < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 180^\circ$ 이므로 각 $\frac{\theta}{2}$ 는 제2사분면의 각이다.

(ii) $n=2k+1$ (k 는 정수)일 때

$360^\circ \times k + 315^\circ < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 360^\circ$ 이므로 각 $\frac{\theta}{2}$ 는 제4사분면의 각이다.

(i), (ii)에서 각 $\frac{\theta}{2}$ 는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다.

03 ㉮ ⑤

① $920^\circ = 360^\circ \times 2 + 200^\circ \Rightarrow$ 제3사분면

② $-530^\circ = 360^\circ \times (-2) + 190^\circ \Rightarrow$ 제3사분면

③ $-\frac{5}{6}\pi = -\frac{5}{6}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = -150^\circ$

$\therefore -150^\circ = 360^\circ \times (-1) + 210^\circ \Rightarrow$ 제3사분면

④ $\frac{4}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 240^\circ \Rightarrow$ 제3사분면

⑤ $\frac{14}{5}\pi = \frac{14}{5}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 504^\circ$

$\therefore 504^\circ = 360^\circ \times 1 + 144^\circ \Rightarrow$ 제2사분면

따라서 각을 나타내는 동경이 존재하는 사분면이 나머지 넷과 다른 하나는 ⑤이다.

04 ㉮ $\frac{17}{9}$

$120^\circ + \frac{5}{2}\pi - 230^\circ = 120^\circ \times \frac{\pi}{180} + \frac{5}{2}\pi - 230^\circ \times \frac{\pi}{180} = \frac{17}{9}\pi$

$\therefore a = \frac{17}{9}$

05 ㉮ $\frac{4}{3}\pi$

각 θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 일치하므로 $4\theta - \theta = 2n\pi$ (n 은 정수)

$3\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n}{3}\pi$

$\pi < \theta < 2\pi$ 에서 $\pi < \frac{2n}{3}\pi < 2\pi$ 이므로

$\frac{3}{2} < n < 3$

이때 n 은 정수이므로 $n=2$

$\therefore \theta = \frac{4}{3}\pi$

06 ㉮ $\frac{\pi}{4}$

각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭이므로

$5\theta - \theta = (2n+1)\pi$ (n 은 정수)

$4\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{4}\pi$

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $0 < \frac{2n+1}{4}\pi < \frac{\pi}{2}$ 이므로

$0 < 2n+1 < 2 \quad \therefore -\frac{1}{2} < n < \frac{1}{2}$

이때 n 은 정수이므로 $n=0$

$\therefore \theta = \frac{\pi}{4}$

07 ㉮ 3π

각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭이므로

$\theta + 5\theta = 2n\pi$ (n 은 정수)

$6\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{n}{3}\pi$

$\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 에서 $\frac{\pi}{2} < \frac{n}{3}\pi < \frac{3}{2}\pi$ 이므로

$\frac{3}{2} < n < \frac{9}{2}$

이때 n 은 정수이므로 $n=2, 3, 4$

$\therefore \theta = \frac{2}{3}\pi$ 또는 $\theta = \pi$ 또는 $\theta = \frac{4}{3}\pi$

따라서 모든 θ 의 값의 합은

$\frac{2}{3}\pi + \pi + \frac{4}{3}\pi = 3\pi$

08 ㉮ $\frac{17}{12}\pi$

각 2θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$2\theta + 4\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)

$6\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad \therefore \theta = \frac{n}{3}\pi + \frac{\pi}{12}$

$\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 에서 $\frac{\pi}{2} < \frac{n}{3}\pi + \frac{\pi}{12} < \frac{3}{2}\pi$ 이므로

$\frac{5}{12}\pi < \frac{n}{3}\pi < \frac{17}{12}\pi \quad \therefore \frac{5}{4} < n < \frac{17}{4}$

이때 n 은 정수이므로 $n=2, 3, 4$

$\therefore \theta = \frac{3}{4}\pi$ 또는 $\theta = \frac{13}{12}\pi$ 또는 $\theta = \frac{17}{12}\pi$

따라서 θ 의 최댓값은 $\frac{17}{12}\pi$ 이다.

09 ㉮ $\frac{\pi}{6}$

부채꼴의 반지름의 길이를 r , 중심각의 크기를 θ 라 하면

넓이가 $\frac{3}{4}\pi$ 이므로 $\frac{1}{2} \times r \times \frac{\pi}{2} = \frac{3}{4}\pi \quad \therefore r=3$

호의 길이가 $\frac{\pi}{2}$ 이므로 $3\theta = \frac{\pi}{2}$

$\therefore \theta = \frac{\pi}{6}$

10 ㉮ ④

부채꼴 AOB의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2^2 \times \theta = 2\theta$

$\tan \theta = \frac{\overline{AC}}{2}$ 에서 $\overline{AC} = 2 \tan \theta$ 이므로

$\triangle OAC = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \tan \theta = 2 \tan \theta$

따라서 색칠한 부분의 넓이는

$2 \tan \theta - 2\theta = 2(\tan \theta - \theta)$

11 ㉮ ②

부채꼴의 반지름의 길이를 r 라 하면 둘레의 길이가 24이므로

호의 길이는 $24 - 2r$

이때 $r > 0, 24 - 2r > 0$ 이므로 $0 < r < 12$

부채꼴의 넓이를 S라 하면

$$S = \frac{1}{2}r(24-2r) = -r^2 + 12r$$

$$= -(r-6)^2 + 36 \quad (0 < r < 12)$$

즉 $r=6$ 일 때 S의 최댓값은 36이다.

이때 부채꼴의 중심각의 크기를 θ 라 하면

$$\frac{1}{2} \times 6^2 \times \theta = 36 \quad \therefore \theta = 2$$

12 ㉠ 0

점 P의 좌표를 (a, b) 라 하면 $\overline{OP}=1$ 이므로

$$\cos \alpha = \frac{a}{\overline{OP}} = a$$

이때 두 점 P, Q가 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이므로

점 Q의 좌표는 $(-b, -a)$ 이고 $\overline{OQ}=1$

$$\therefore \sin \beta = \frac{-a}{\overline{OQ}} = -a$$

$$\therefore \cos \alpha + \sin \beta = a + (-a) = 0$$

13 ㉠ ①

$\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 에서 $\sin \theta < 0, \cos \theta > 0$ 이므로 $\sin \theta - \cos \theta < 0$

$$\begin{aligned} \therefore & \sqrt{\sin^2 \theta} + \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2} + \sqrt{\cos^2 \theta} \\ &= |\sin \theta| + |\sin \theta - \cos \theta| + |\cos \theta| \\ &= -\sin \theta - (\sin \theta - \cos \theta) + \cos \theta \\ &= -2(\sin \theta - \cos \theta) \end{aligned}$$

14 ㉠ ②

$$\begin{aligned} & \left(1 + \frac{1}{\tan \theta} + \frac{1}{\sin \theta}\right) \left(1 + \tan \theta - \frac{1}{\cos \theta}\right) \\ &= \frac{\sin \theta + \cos \theta + 1}{\sin \theta} \times \frac{\cos \theta + \sin \theta - 1}{\cos \theta} \\ &= \frac{(\sin \theta + \cos \theta)^2 - 1}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta - 1}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= 2 \end{aligned}$$

15 ㉠ 2

$$\begin{aligned} & \cos^2 \theta (1 - \tan \theta)^2 + \cos^2 \theta (1 + \tan \theta)^2 \\ &= \cos^2 \theta \{(1 - \tan \theta)^2 + (1 + \tan \theta)^2\} \\ &= \cos^2 \theta (1 - 2 \tan \theta + \tan^2 \theta + 1 + 2 \tan \theta + \tan^2 \theta) \\ &= \cos^2 \theta (2 + 2 \tan^2 \theta) \\ &= 2 \cos^2 \theta \left(1 + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}\right) \\ &= 2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ &= 2 \end{aligned}$$

16 ㉠ ③

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

이때 θ 가 제4사분면의 각이므로 $\sin \theta < 0$

$$\therefore \sin \theta = -\frac{3}{5}$$

$$\text{따라서 } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{-\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4} \text{이므로}$$

$$5 \sin \theta - 4 \tan \theta = 5 \times \left(-\frac{3}{5}\right) - 4 \times \left(-\frac{3}{4}\right) = 0$$

17 ㉠ ⑤

$$\begin{aligned} \cos^4 \theta - \sin^4 \theta &= (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \\ &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= \cos^2 \theta - (1 - \cos^2 \theta) \\ &= 2 \cos^2 \theta - 1 \end{aligned}$$

$$\text{즉 } 2 \cos^2 \theta - 1 = \frac{1}{2} \text{이므로 } \cos^2 \theta = \frac{3}{4}$$

이때 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\cos \theta > 0$ 이므로

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

18 ㉠ $\frac{5\sqrt{7}}{16}$

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4} \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\sin \theta - \cos \theta)^2 &= \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta \\ &= 1 - 2 \times \left(-\frac{3}{8}\right) = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

이때 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$ 이므로 $\sin \theta - \cos \theta > 0$

$$\therefore \sin \theta - \cos \theta = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin^3 \theta - \cos^3 \theta &= (\sin \theta - \cos \theta)(\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta) \\ &= \frac{\sqrt{7}}{2} \times \left\{1 + \left(-\frac{3}{8}\right)\right\} \\ &= \frac{5\sqrt{7}}{16} \end{aligned}$$

다른 풀이

$$\begin{aligned} \sin^3 \theta - \cos^3 \theta &= (\sin \theta - \cos \theta)^3 + 3 \sin \theta \cos \theta (\sin \theta - \cos \theta) \\ &= \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^3 + 3 \times \left(-\frac{3}{8}\right) \times \frac{\sqrt{7}}{2} \\ &= \frac{7\sqrt{7}}{8} - \frac{9\sqrt{7}}{16} \\ &= \frac{5\sqrt{7}}{16} \end{aligned}$$

19 ㉠ ⑤

$$\begin{aligned} (\sin \theta + \cos \theta)^2 &= \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta \\ &= 1 + 2 \sin \theta \cos \theta \\ &= 1 + 2 \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

이때 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin \theta > 0, \cos \theta > 0$ 이므로 $\sin \theta + \cos \theta > 0$

$$\therefore \sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\begin{aligned}
&\therefore \frac{\cos \theta}{1-\tan \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{\sin \theta - \cos \theta} \\
&= \frac{\cos \theta}{1-\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} + \frac{\sin^2 \theta}{\sin \theta - \cos \theta} \\
&= \frac{\cos \theta}{\frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta}} + \frac{\sin^2 \theta}{\sin \theta - \cos \theta} \\
&= \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\cos \theta - \sin \theta} \\
&= \frac{(\cos \theta - \sin \theta)(\cos \theta + \sin \theta)}{\cos \theta - \sin \theta} \\
&= \cos \theta + \sin \theta \\
&= \frac{\sqrt{6}}{2}
\end{aligned}$$

20 ㉡ ㉢

이차방정식 $6x^2 - 3x + 2a = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}, \sin \theta \cos \theta = \frac{a}{3}$$

이때 $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta$ 이므로

$$\frac{1}{4} = 1 + \frac{2}{3}a, \frac{2}{3}a = -\frac{3}{4}$$

$$\therefore a = -\frac{9}{8}$$

21 ㉡ ㉤

이차방정식 $x^2 - kx + 3 = 0$ 의 두 근이 $\frac{1}{\sin \theta}, \frac{1}{\cos \theta}$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\frac{1}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta} = k, \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = 3$$

$$\frac{1}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta} = \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta} = k \text{에서}$$

$$3(\sin \theta + \cos \theta) = k \quad \therefore \sin \theta + \cos \theta = \frac{k}{3}$$

이때 $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta$ 이므로

$$\frac{k^2}{9} = 1 + 2 \times \frac{1}{3}, \frac{k^2}{9} = \frac{5}{3}$$

$$\therefore k^2 = 15$$

서술형 1 ㉡ 제4사분면

θ 가 제1사분면의 각이므로

$$2n\pi < \theta < 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore \frac{2n}{3}\pi < \frac{\theta}{3} < \frac{2n}{3}\pi + \frac{\pi}{6} \quad \dots\dots ①$$

(i) $n = 3k$ (k 는 정수)일 때

$$2k\pi < \frac{\theta}{3} < 2k\pi + \frac{\pi}{6} \text{이므로 각 } \frac{\theta}{3} \text{는 제1사분면의 각이다.}$$

(ii) $n = 3k + 1$ (k 는 정수)일 때

$$2k\pi + \frac{2}{3}\pi < \frac{\theta}{3} < 2k\pi + \frac{5}{6}\pi \text{이므로 각 } \frac{\theta}{3} \text{는 제2사분면의 각이다.}$$

(iii) $n = 3k + 2$ (k 는 정수)일 때

$$2k\pi + \frac{4}{3}\pi < \frac{\theta}{3} < 2k\pi + \frac{3}{2}\pi \text{이므로 } \frac{\theta}{3} \text{는 제3사분면의 각이다.}$$

$\dots\dots ②$

(i)~(iii)에서 각 $\frac{\theta}{3}$ 는 제1사분면 또는 제2사분면 또는 제3사분면의 각이므로 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면은 제4사분면이다. $\dots\dots ③$

채점 기준	비율
① 각 $\frac{\theta}{3}$ 의 범위를 n 에 대한 부등식으로 나타낼 수 있다.	30%
② n 의 값에 따라 각 $\frac{\theta}{3}$ 가 제몇 사분면의 각인지 구할 수 있다.	60%
③ 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면을 구할 수 있다.	10%

서술형 2 ㉡ $\frac{2}{5}\pi$ 또는 $\frac{4}{5}\pi$

각 2θ 를 나타내는 동경과 각 3θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭이므로

$$2\theta + 3\theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$5\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n}{5}\pi \quad \dots\dots ①$$

$$0 < \theta < \pi \text{에서 } 0 < \frac{2n}{5}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$0 < n < \frac{5}{2}$$

이때 n 은 정수이므로 $n = 1, 2$ $\dots\dots ②$

$$\therefore \theta = \frac{2}{5}\pi \text{ 또는 } \theta = \frac{4}{5}\pi \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 각 θ 를 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30%
② n 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ θ 의 값을 모두 구할 수 있다.	30%

서술형 3 ㉡ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = 4 \text{에서 } \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = 4$$

$$\frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = 4, \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = 4$$

$$\therefore \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4} \quad \dots\dots ①$$

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$$

$$= 1 + 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$= 1 + 2 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

이때 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin \theta > 0, \cos \theta > 0$ 이므로

$$\sin \theta + \cos \theta > 0$$

$$\therefore \sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{2} \quad \dots\dots ⑦ \quad \dots\dots ②$$

$$(\sin \theta - \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$$

$$= 1 - 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$= 1 - 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \sin \theta - \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\because \sin \theta > \cos \theta) \quad \dots\dots ⑧ \quad \dots\dots ③$$

⑦, ⑧에서

$$\sin^2 \theta - \cos^2 \theta = (\sin \theta + \cos \theta)(\sin \theta - \cos \theta)$$

$$= \frac{\sqrt{6}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \dots\dots ④$$

채점 기준	비율
① $\sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	20%
② $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ $\sin \theta - \cos \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	30%
④ $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

10% 핵심 기출 문제

p. 142~143

01 ㉔ ④

각 θ 를 나타내는 동경과 각 6θ 를 나타내는 동경이 일치하므로 $6\theta - \theta = 2n\pi$ (n 은 정수)

$$5\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n}{5}\pi$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{에서 } \frac{\pi}{2} < \frac{2n}{5}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$\frac{5}{4} < n < \frac{5}{2}$$

이때 n 은 정수이므로 $n=2$

$$\therefore \theta = \frac{4}{5}\pi$$

02 ㉔ ②

반지름의 길이가 2이고 중심각의 크기가 θ 인 호 AB의 길이는 2θ 이므로 부채꼴 APB의 둘레의 길이는 $2 \times 2 + 2\theta = 4 + 2\theta$

또 반지름의 길이가 1인 원 O의 둘레의 길이는

$$2\pi \times 1 = 2\pi$$

이때 부채꼴 APB가 원 O에 접하면서 한 바퀴를 돌아서 중심 P가 제자리에 왔으므로 부채꼴 APB의 둘레의 길이와 원 O의 둘레의 길이는 같다.

$$\therefore 4 + 2\theta = 2\pi \text{이므로 } \theta = \pi - 2$$

03 ㉔ 6

$\overline{OA} = r$ ($r > 0$), $\angle COA = \theta$ ($0 < \theta < \pi$)라 하면 호 AC의 길이가 π 이므로

$$r\theta = \pi \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{r}$$

부채꼴 BOC의 넓이는

$$\frac{1}{2}r^2(\pi - \theta) = \frac{1}{2}r^2\left(\pi - \frac{\pi}{r}\right) = \frac{1}{2}\pi(r^2 - r)$$

$$\therefore \frac{1}{2}\pi(r^2 - r) = 15\pi \text{이므로 } r^2 - r - 30 = 0$$

$$(r+5)(r-6) = 0 \quad \therefore r = 6 \quad (\because r > 0)$$

$$\therefore \overline{OA} = 6$$

04 ㉔ ②

원의 반지름의 길이를 r 라 하면 원의 넓이가 100π 이므로

$$\pi r^2 = 100\pi \quad \therefore r = 10 \quad (\because r > 0)$$

호 AB의 길이는 반지름의 길이의 2배이므로


$$r\theta = 2r \quad \therefore \theta = 2$$

오른쪽 그림과 같이 원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면 직각삼각형 OAH에서 $\overline{OA} = 10$ 이고

$$\angle AOH = \frac{1}{2}\angle AOB = \frac{1}{2} \times 2 = 1 \text{이므로}$$

$$\overline{AH} = \overline{OA} \sin 1 = 10 \sin 1$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AH} = 20 \sin 1$$



05 ㉔ ②

$$\text{점 } P(a, b) \text{에서 } \tan \theta_1 = \frac{b}{a}$$

$$\text{점 } Q(a^2, -2b^2) \text{에서 } \tan \theta_2 = -\frac{2b^2}{a^2}$$

$$\tan \theta_1 + \tan \theta_2 = 0 \text{이므로}$$

$$\frac{b}{a} + \left(-\frac{2b^2}{a^2}\right) = 0$$

$$\frac{b(a-2b)}{a^2} = 0 \quad \therefore a = 2b \quad (\because b > 0)$$

$$\therefore \sin \theta_1 = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{b}{\sqrt{(2b)^2 + b^2}}$$

$$= \frac{b}{\sqrt{5b^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

06 ㉔ 80

원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 원이 세 동경 OP, OQ, OR와 만나는 점을 각각 A, B, C라 하자.

$$\overline{OA} = 3, \sin \alpha = \frac{1}{3} \text{이므로 점 A의 } x \text{좌}$$

$$\text{표는 } \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2} \quad \therefore A(2\sqrt{2}, 1)$$

점 Q가 점 P와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 동경 OQ도 동경 OP와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.


$$\therefore B(1, 2\sqrt{2})$$

점 R가 점 Q와 원점에 대하여 대칭이므로 동경 OR도 동경 OQ와 원점에 대하여 대칭이다.

$$\therefore C(-1, -2\sqrt{2})$$

$$\text{따라서 } \sin \beta = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \tan \gamma = \frac{-2\sqrt{2}}{-1} = 2\sqrt{2} \text{이므로}$$

$$9(\sin^2 \beta + \tan^2 \gamma) = 9 \times \left\{ \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2 + (2\sqrt{2})^2 \right\} = 80$$



07 ㉔ ②

오른쪽 그림에서 삼각형 APB는 빗변의 길이가 2인 직각삼각형이고 $\overline{AP} = \sqrt{3}$ 이므로

$$\cos(\angle BAP) = \frac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$


$$\therefore \angle BAP = \frac{\pi}{6}$$

즉 $\angle BOP = \frac{\pi}{3}$ 이므로 점 P의 좌표는

$$\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right), \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) \quad \therefore \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

점 P는 함수 $y = \log_a x$ 의 그래프 위의 점이므로

$$-\frac{\sqrt{3}}{2} = \log_a \frac{1}{2}$$



$$a^{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2} \quad \therefore a^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$$

$$\therefore a^{\sqrt{3}} = (a^{\frac{\sqrt{3}}{2}})^2 = 2^2 = 4$$

참고 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$\angle BAP = \frac{1}{2} \angle BOP$$

$$\therefore \angle BOP = 2 \angle BAP = 2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

08 답 ③

$\triangle BOQ$ 에서 $\overline{OB} = 1$ 이므로

$$\cos \theta = \frac{\overline{OQ}}{\overline{OB}} = \overline{OQ}, \sin \theta = \frac{\overline{BQ}}{\overline{OB}} = \overline{BQ}$$

$\triangle POA$ 에서 $\overline{OA} = 1$ 이므로

$$\tan \theta = \frac{\overline{AP}}{\overline{OA}} = \overline{AP}$$

$$\overline{OQ} = 2\overline{AP} \times \overline{BQ} \text{에서 } \cos \theta = 2 \tan \theta \sin \theta$$

$$\cos \theta = 2 \times \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \times \sin \theta, \cos^2 \theta = 2 \sin^2 \theta$$

$$1 - \sin^2 \theta = 2 \sin^2 \theta \quad \therefore \sin^2 \theta = \frac{1}{3}$$


$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{\sin \theta} \times \frac{1}{\cos \theta} \times \frac{1}{\tan \theta} &= \frac{1}{\sin \theta} \times \frac{1}{\cos \theta} \times \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{1}{\sin^2 \theta} \\ &= 3 \end{aligned}$$

09 답 ④


마름모 $AOBO'$ 에서 $\angle AO'B = \angle AOB = \frac{5}{6}\pi$ 이므로 2개의

$\angle AO'B$ 중 크기가 더 큰 각의 크기는

$$\angle AO'B = 2\pi - \frac{5}{6}\pi = \frac{7}{6}\pi$$



[그림 1]



[그림 2]

[그림 1]과 같이 원 O' 에서 중심각의 크기가 $\angle AO'B = \frac{7}{6}\pi$ 인 부

채꼴의 넓이를 T_1 , [그림 2]와 같이 원 O 에서 중심각의 크기가


$\angle AOB = \frac{5}{6}\pi$ 인 부채꼴의 넓이를 T_2 라 하면

$$\begin{aligned} S_1 &= T_1 + S_2 - T_2 \\ &= \left(\frac{1}{2} \times 3^2 \times \frac{7}{6}\pi \right) + S_2 - \left(\frac{1}{2} \times 3^2 \times \frac{5}{6}\pi \right) \\ &= \frac{21}{4}\pi + S_2 - \frac{15}{4}\pi \\ &= \frac{3}{2}\pi + S_2 \end{aligned}$$

$$\therefore S_1 - S_2 = \frac{3}{2}\pi$$

10 답 ①

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 r_1 인 원의 중심을 C , 점 C 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 D , 선분 AP 의 중점을 E 라 하자.



$\angle BAP = \theta$ 라 하면

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin \theta > 0$ 이고 $\cos \theta = \frac{4}{5}$ 이므로

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{3}{5}$$

$\angle BOP = 2\theta$ 이므로

$$\angle BOC = \frac{1}{2} \angle BOP = \frac{1}{2} \times 2\theta = \theta$$

$$\triangle COD \text{에서 } \sin \theta = \frac{\overline{CD}}{\overline{OC}} = \frac{r_1}{1 - r_1}$$

$$\text{즉 } \frac{r_1}{1 - r_1} = \frac{3}{5} \text{이므로 } 5r_1 = 3 - 3r_1$$

$$8r_1 = 3 \quad \therefore r_1 = \frac{3}{8}$$

$$\triangle OAE \text{에서 } \sin \theta = \frac{\overline{OE}}{\overline{OA}} = 1 - 2r_2$$

$$\text{즉 } 1 - 2r_2 = \frac{3}{5} \text{이므로}$$

$$2r_2 = \frac{2}{5} \quad \therefore r_2 = \frac{1}{5}$$

$$\therefore r_1 r_2 = \frac{3}{8} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{40}$$

06 삼각함수의 그래프

II 삼각함수

개념 완성하기

p.147~148

01 ㉮ 4

$f(x+4)=f(x)$ 이므로
 $f(11)=f(7)=f(3)=4$

02 ㉮ 1

함수 $f(x)$ 의 주기가 3π 이므로
 $f(x+3\pi)=f(x)$
 $\therefore f(10\pi)=f(7\pi)=f(4\pi)=f(\pi)$
 $=\frac{\pi}{\pi}=1$


03 ㉮ 1

$f(x-3)=f(x+3)$ 에서
 $f(x)=f(x+6)$
 $\therefore f(20)=f(14)=f(8)=f(2)=1$

04 ㉮ 그래프: 풀이 참조

주기: 2π , 치역: $\{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$


함수 $y=2\sin x$ 의 그래프는
 $y=\sin x$ 의 그래프를 y 축의 방
 향으로 2배 한 것이므로 오른쪽
 그림과 같다.
 따라서 주기는 2π 이고, 치역은
 $\{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$ 이다.



05 ㉮ 그래프: 풀이 참조

주기: π , 치역: $\{y \mid -3 \leq y \leq 3\}$

함수 $y=3\sin 2x$ 의 그래프는
 $y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방
 향으로 $\frac{1}{2}$ 배, y 축의 방향으로
 3배 한 것이므로 오른쪽 그림과
 같다.
 따라서 주기는 π 이고, 치역은 $\{y \mid -3 \leq y \leq 3\}$ 이다.




06 ㉮ 그래프: 풀이 참조

주기: π , 치역: $\{y \mid -2 \leq y \leq 0\}$

$y=\sin(2x-\pi)-1=\sin 2\left(x-\frac{\pi}{2}\right)-1$


즉 주어진 함수의 그래프는 $y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로
 $\frac{1}{2}$ 배 한 후 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$
 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼
 평행이동한 것이므로 오른쪽 그
 림과 같다.
 따라서 주기는 π 이고, 치역은 $\{y \mid -2 \leq y \leq 0\}$ 이다.



07 ㉮ 그래프: 풀이 참조

주기: $\frac{2}{3}\pi$, 치역: $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$

함수 $y=\cos 3x$ 의 그래프는
 $y=\cos x$ 의 그래프를 x 축의 방
 향으로 $\frac{1}{3}$ 배 한 것이므로 오른
 쪽 그림과 같다.




따라서 주기는 $\frac{2}{3}\pi$ 이고, 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.

08 ㉮ 그래프: 풀이 참조

주기: 2π , 치역: $\{y \mid 0 \leq y \leq 2\}$

함수 $y=\cos(x-\pi)+1$ 의 그
 래프는 $y=\cos x$ 의 그래프를 x
 축의 방향으로 π 만큼, y 축의 방
 향으로 1만큼 평행이동한 것이
 므로 오른쪽 그림과 같다.




따라서 주기는 2π 이고, 치역은 $\{y \mid 0 \leq y \leq 2\}$ 이다.

09 ㉮ 그래프: 풀이 참조

주기: $\frac{2}{3}\pi$, 치역: $\{y \mid -1 \leq y \leq 3\}$

$y=2\cos(3x-\pi)+1=2\cos 3\left(x-\frac{\pi}{3}\right)+1$

즉 주어진 함수의 그래프는
 $y=\cos x$ 의 그래프를 x 축의 방
 향으로 $\frac{1}{3}$ 배, y 축의 방향으로 2
 배 한 후 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만
 큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행
 이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.




따라서 주기는 $\frac{2}{3}\pi$ 이고, 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 3\}$ 이다.

10 ㉮ 그래프: 풀이 참조

주기: $\frac{\pi}{2}$, 점근선의 방정식: $x=\frac{n}{2}\pi+\frac{\pi}{4}$ (n 은 정수)

함수 $y=\tan 2x$ 의 그래프는 $y=\tan x$
 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 배 한
 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



따라서 주기는 $\frac{\pi}{2}$ 이고, 점근선의 방정


식은 $2x=n\pi+\frac{\pi}{2}$ 에서 $x=\frac{n}{2}\pi+\frac{\pi}{4}$ (n 은 정수)

11 ㉮ 그래프: 풀이 참조

주기: 3π , 점근선의 방정식: $x=3n\pi+\frac{3}{2}\pi$ (n 은 정수)

함수 $y=2\tan \frac{x}{3}$ 의 그래프는

$y=\tan x$ 의 그래프를 x 축의 방향으
 로 3배, y 축의 방향으로 2배 한 것이므
 로 오른쪽 그림과 같다.



따라서 주기는 3π 이고, 점근선의 방정

식은 $\frac{x}{3}=n\pi+\frac{\pi}{2}$ 에서 $x=3n\pi+\frac{3}{2}\pi$ (n 은 정수)

12 그래프: 풀이 참조

주기: π , 점근선의 방정식: $x = n\pi + \frac{5}{6}\pi$ (n 은 정수)

함수 $y = 3 \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 의 그래프는


$y = \tan x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로

3배 한 후 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼 평행

이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

따라서 주기는 π 이고, 점근선의 방정식은

$x - \frac{\pi}{3} = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 에서 $x = n\pi + \frac{5}{6}\pi$ (n 은 정수)



13 최댓값: 1, 최솟값: -1, 주기: $\frac{2}{3}\pi$

$y = \sin(3x + \pi)$ 에서 최댓값은 $|1| = 1$, 최솟값은 $-|1| = -1$,

주기는 $\frac{2}{3}\pi$ 이다.

14 최댓값: 2, 최솟값: 0, 주기: 2π

$y = -\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1$ 에서 최댓값은 $|-1| + 1 = 2$, 최솟값은

$-|-1| + 1 = 0$, 주기는 2π 이다.

15 최댓값: 2, 최솟값: -2, 주기: 4π

$y = -2 \cos\left(\frac{x}{2} + \pi\right)$ 에서 최댓값은 $|-2| = 2$, 최솟값은

$-|-2| = -2$, 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$ 이다.

16 최댓값: 2, 최솟값: -8, 주기: π

$y = 5 \cos 2(x - 2\pi) - 3$ 에서 최댓값은 $|5| - 3 = 2$, 최솟값은

$-|5| - 3 = -8$, 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 이다.

17 최댓값: 없다., 최솟값: 없다., 주기: $\frac{1}{3}$

$y = \tan 3\pi x - 1$ 에서 최댓값, 최솟값은 없고, 주기는 $\frac{\pi}{3\pi} = \frac{1}{3}$ 이다.

18 최댓값: 없다., 최솟값: 없다., 주기: π

$y = \frac{1}{2} \tan\left(-x - \frac{\pi}{2}\right) + 2$ 에서 최댓값, 최솟값은 없고, 주기는

$\frac{\pi}{|-1|} = \pi$ 이다.

19 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \frac{19}{3}\pi = \sin\left(2\pi \times 3 + \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

20 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

$\tan \frac{13}{6}\pi = \tan\left(2\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

21 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

22 -1

$\tan\left(-\frac{9}{4}\pi\right) = -\tan \frac{9}{4}\pi = -\tan\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right)$
 $= -\tan \frac{\pi}{4} = -1$

23 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \frac{4}{3}\pi = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

24 1

$\tan \frac{5}{4}\pi = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1$

25 $\frac{1}{2}$

$\sin \frac{5}{6}\pi = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$

26 $-\frac{1}{2}$

$\cos \frac{2}{3}\pi = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$

27 $\frac{1}{2}$

$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$

28 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

29 $-\frac{1}{2}$

$\sin\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right) = -\cos \theta = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$

30 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

$\tan\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = -\frac{1}{\tan \theta} = -\frac{1}{\tan \frac{\pi}{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

31 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos\left(\frac{5}{2}\pi + \theta\right) = -\sin \theta = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

32 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

$\tan\left(\frac{5}{2}\pi - \theta\right) = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{\tan \frac{\pi}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

33 $-\frac{1}{2}$

$\sin\left(\frac{7}{2}\pi - \theta\right) = -\cos \theta = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$

34 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos\left(\frac{7}{2}\pi + \theta\right) = \sin \theta = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

35 $x = \frac{\pi}{4}$ 또는 $x = \frac{3}{4}\pi$

$2 \sin x = \sqrt{2}$ 에서 $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$


오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서

함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 교점의 x 좌표가 $\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi$ 이

므로 구하는 방정식의 해는

$x = \frac{\pi}{4}$ 또는 $x = \frac{3}{4}\pi$



36 $x = \frac{5}{6}\pi$ 또는 $x = \frac{7}{6}\pi$


$2 \cos x + \sqrt{3} = 0$ 에서 $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서

함수 $y = \cos x$ 의 그래프와 직선

$y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 교점의 x 좌표가 $\frac{5}{6}\pi, \frac{7}{6}\pi$ 이므로 구하는 방정식의 해는

$x = \frac{5}{6}\pi$ 또는 $x = \frac{7}{6}\pi$



37 $x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{4}{3}\pi$


$\tan x - \sqrt{3} = 0$ 에서 $\tan x = \sqrt{3}$

오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서

함수 $y = \tan x$ 의 그래프와 직선

$y = \sqrt{3}$ 의 교점의 x 좌표가 $\frac{\pi}{3}, \frac{4}{3}\pi$ 이므로 구하는 방정식의 해는

$x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{4}{3}\pi$



38 $x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{5}{3}\pi$

$\sin \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$ 에서 $\frac{x}{2} = t$ 라 하면 주어진 방정식은

$\sin t = \frac{1}{2}$

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 $0 \leq \frac{x}{2} < \pi$ $\therefore 0 \leq t < \pi$


오른쪽 그림과 같이 $0 \leq t < \pi$ 에서 함수

$y = \sin t$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 의 교점의

t 좌표가 $\frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$ 이므로

$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{x}{2} = \frac{5}{6}\pi$

$\therefore x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{5}{3}\pi$



39 $x = \frac{5}{12}\pi$ 또는 $x = \frac{11}{12}\pi$

$x + \frac{\pi}{3} = t$ 라 하면 주어진 방정식은

$\cos t = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\frac{\pi}{3} \leq x + \frac{\pi}{3} < \frac{7}{3}\pi$ $\therefore \frac{\pi}{3} \leq t < \frac{7}{3}\pi$


오른쪽 그림과 같이 $\frac{\pi}{3} \leq t < \frac{7}{3}\pi$ 에서

함수 $y = \cos t$ 의 그래프와 직선

$y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 교점의 t 좌표가 $\frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi$

이므로 $x + \frac{\pi}{3} = \frac{3}{4}\pi$ 또는 $x + \frac{\pi}{3} = \frac{5}{4}\pi$

$\therefore x = \frac{5}{12}\pi$ 또는 $x = \frac{11}{12}\pi$



40 $x = \frac{7}{12}\pi$ 또는 $x = \frac{19}{12}\pi$

$x - \frac{\pi}{4} = t$ 라 하면 주어진 방정식은

$\tan t = \sqrt{3}$

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 $-\frac{\pi}{4} \leq x - \frac{\pi}{4} < \frac{7}{4}\pi$

$\therefore -\frac{\pi}{4} \leq t < \frac{7}{4}\pi$


오른쪽 그림과 같이 $-\frac{\pi}{4} \leq t < \frac{7}{4}\pi$ 에

서 함수 $y = \tan t$ 의 그래프와 직선

$y = \sqrt{3}$ 의 교점의 t 좌표가 $\frac{\pi}{3}, \frac{4}{3}\pi$ 이므로

$x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x - \frac{\pi}{4} = \frac{4}{3}\pi$

$\therefore x = \frac{7}{12}\pi$ 또는 $x = \frac{19}{12}\pi$



41 $\frac{7}{6}\pi < x < \frac{11}{6}\pi$

$2 \sin x + 1 < 0$ 에서 $\sin x < -\frac{1}{2}$


부등식 $\sin x < -\frac{1}{2}$ 의 해는 함수

$y = \sin x$ 의 그래프가 직선 $y = -\frac{1}{2}$

보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의

범위이므로 오른쪽 그림에서

$\frac{7}{6}\pi < x < \frac{11}{6}\pi$



42 $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{7}{4}\pi$

$2 \cos x - \sqrt{2} \leq 0$ 에서 $\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$


부등식 $\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 해는 함수

$y = \cos x$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 와

만나는 부분 또는 직선보다 아래쪽에

있는 부분의 x 의 값의 범위이므로

$\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{7}{4}\pi$



43 답 $\frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi$


$3 \tan x - \sqrt{3} \geq 0$ 에서 $\tan x \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$

부등식 $\tan x \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$ 의 해는 함수

$y = \tan x$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 과

만나는 부분 또는 직선보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이므로 오른쪽 그림에서

$\frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi$



유형 완성하기

p.149~170

01 답 1

함수 $f(x)$ 의 주기가 p 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$f(x+p) = f(x)$

따라서 $f(10p) = f(9p) = f(8p) = \dots = f(p) = f(0)$ 이므로

$f(10p) = f(0) = \sin 0 + \cos 0 - \tan 0 = 0 + 1 - 0 = 1$

01-1 답 1

함수 $f(x)$ 의 주기가 p 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$f(x+p) = f(x)$

따라서 $f(\pi+3p) = f(\pi+2p) = f(\pi+p) = f(\pi)$ 이므로

$f(\pi+3p) = f(\pi) = \sin 2\pi + \cos^2 \pi + \tan 4\pi$
 $= 0 + (-1)^2 + 0 = 1$

02 답 4

(가)에서 함수 $f(x)$ 는 주기가 1인 주기함수이므로

$f\left(\frac{201}{4}\right) = f\left(\frac{197}{4}\right) = f\left(\frac{193}{4}\right) = \dots = f\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(-\frac{3}{4}\right)$

(나)에서

$f\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2} \sin\left(-\frac{3}{2}\pi\right) = -\frac{1}{2} \sin \frac{3}{2}\pi = \frac{1}{2}$

02-1 답 5

(가)에서 함수 $f(x)$ 는 주기가 $\frac{5}{4}$ 인 주기함수이므로

$f\left(\frac{51}{4}\right) = f\left(\frac{46}{4}\right) = f\left(\frac{41}{4}\right) = \dots = f\left(\frac{6}{4}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right)$

(나)에서

$f\left(\frac{1}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

03 답 4

$f\left(x - \frac{3}{2}\pi\right) = f\left(x + \frac{3}{2}\pi\right)$ 의 양변에 x 대신 $x + \frac{3}{2}\pi$ 를 대입하면

$f(x) = f(x+3\pi)$

즉 함수 $f(x)$ 는 주기가 3π 인 주기함수이므로

$f(100\pi) = f(97\pi) = f(94\pi) = \dots = f(\pi) = 2$

$f(101\pi) = f(98\pi) = f(95\pi) = \dots = f(2\pi) = 3$

$f(102\pi) = f(99\pi) = f(96\pi) = \dots = f(0) = 1$

$\therefore f(100\pi) + f(101\pi) - f(102\pi) = 2 + 3 - 1 = 4$

..... ①

..... ②

..... ③

채점 기준	비율
① 함수 $f(x)$ 의 주기를 구할 수 있다.	30%
② $f(100\pi)$, $f(101\pi)$, $f(102\pi)$ 의 값을 구할 수 있다.	60%
③ $f(100\pi) + f(101\pi) - f(102\pi)$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

03-1 답 0

$f(x-1) = f(x+3)$ 의 양변에 x 대신 $x+1$ 을 대입하면

$f(x) = f(x+4)$

즉 함수 $f(x)$ 는 주기가 4인 주기함수이므로

$f(11) = f(7) = f(3) = 1$

$f(12) = f(8) = f(4) = f(0) = 0$

$f(13) = f(9) = f(5) = f(1) = -1$

$f(14) = f(10) = f(6) = f(2) = 0$

$\therefore f(11) + f(12) + f(13) + f(14) = 1 + 0 + (-1) + 0 = 0$

04 답 ㄱ

함수 $y = \cos x$ 에 대하여

ㄱ. 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

ㄴ. 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.

ㄷ. 주기는 2π 이다.

따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

04-1 답 ㄴ, ㄷ

함수 $y = \sin x$ 에 대하여

ㄱ. 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

ㄴ. 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.

ㄷ. 주기는 2π 이다.

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

05 답 ②, ⑤

함수 $f(x) = \tan x$ 에 대하여

① 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

② 정의역은 $\left\{x \mid x \neq n\pi + \frac{\pi}{2} \text{인 실수}, n \text{은 정수}\right\}$ 이다.

③ 치역은 실수 전체의 집합이다.

④ 주기가 π 인 주기함수이므로 $f(x+\pi) = f(x)$

⑤ 점근선의 방정식은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

따라서 옳지 않은 것은 ②, ⑤이다.

05-1 답 ④, ⑤

함수 $f(x) = \cos x$ 에 대하여

① 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

② 정의역은 실수 전체의 집합이다.

③ 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이므로 치역의 원소 중 최댓값은 1이다.

④ 주기가 2π 인 주기함수이므로 $f(x+2\pi) = f(x)$

⑤ 점근선의 방정식은 존재하지 않는다.


따라서 옳지 않은 것은 ④, ⑤이다.

06 답 ㄴ, ㄷ


ㄱ. $\frac{\pi}{2} < 3 < \pi < 4$ 이므로

오른쪽 그림에서


$\sin 4 < \sin \pi < \sin 3$



ㄴ. $\frac{\pi}{2} < 2 < 3 < \pi$ 이므로
오른쪽 그림에서
 $\cos \pi < \cos 3 < \cos 2$



ㄷ. $\frac{\pi}{2} < 2 < 3 < \pi < 4$ 이므로
오른쪽 그림에서
 $\tan 2 < \tan 3 < \tan 4$



따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

06-1 ㉡ $g(1) < f(1) < h(1)$

$\frac{\pi}{4} < 1 < \frac{\pi}{3}$ 이고, 세 함수

$f(x) = \sin x, g(x) = \cos x,$


$h(x) = \tan x$ 에 대하여 $y = \sin x,$

$y = \cos x, y = \tan x$ 의 그래프가 오

른쪽 그림과 같으므로

$\cos 1 < \sin 1 < \tan 1$

$\therefore g(1) < f(1) < h(1)$



07 ㉡ π

$y = \cos 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로
1만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y - 1 = \cos 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \quad \therefore y = \cos(2x - \pi) + 1$$

이 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$y = \cos(-2x - \pi) + 1 = \cos(2x + \pi) + 1$$

따라서 $a = \pi, b = 1$ 이므로

$$ab = \pi \times 1 = \pi$$

07-1 ㉡ 4

$y = \cos \pi x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{1}{4}$ 만큼, y 축의 방향으로
1만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y - 1 = \cos \pi\left(x + \frac{1}{4}\right) \quad \therefore y = \cos \pi\left(x + \frac{1}{4}\right) + 1$$

이 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$-y = \cos \pi\left(x + \frac{1}{4}\right) + 1 \quad \therefore y = -\cos\left(\pi x + \frac{\pi}{4}\right) - 1$$

따라서 $a = -1, b = \frac{\pi}{4}, c = -1$ 이므로

$$\frac{ac}{b} \pi = \frac{-1 \times (-1)}{\frac{\pi}{4}} \times \pi = 4$$

08 ㉡ ㄴ, ㄴ

$y = \sin(2x - \pi) = \sin 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 이므로 $y = \sin(2x - \pi)$ 의 그래프는 $y = \sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것이다.

$$\therefore y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \sin 2\left(x + \frac{\pi}{12}\right)$$
이므로 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

의 그래프는 $y = \sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{12}$ 만큼 평행이동한 것이다.

ㄴ. $y = -\sin 2x + 1$ 의 그래프는 $y = \sin 2x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

ㄷ. $y = \sin 3x + \pi$ 의 그래프는 $y = \sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{2}{3}$ 배 한 후 y 축의 방향으로 π 만큼 평행이동한 것이다.

$$\therefore y = 2 \sin(2x - 3\pi) = 2 \sin 2\left(x - \frac{3}{2}\pi\right)$$
이므로

$y = 2 \sin(2x - 3\pi)$ 의 그래프는 $y = \sin 2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2배 한 후 x 축의 방향으로 $\frac{3}{2}\pi$ 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $y = \sin(2x - \pi)$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 ㄴ, ㄴ이다.

08-1 ㉡ ㄴ, ㄷ, ㄷ

$$y = 2 \tan\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = 2 \tan 2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$
이므로

$y = 2 \tan\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$ 의 그래프는 $y = 2 \tan 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{4}$ 만큼 평행이동한 것이다.

ㄴ. $y = \tan 2x + 1$ 의 그래프는 $y = 2 \tan 2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 배 한 후 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

$$\therefore y = -2 \tan(2x + \pi) = -2 \tan 2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$
의 그래프는

$y = 2 \tan 2x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것이다.

ㄷ. $y = 2 \tan 2x - \frac{3}{2}\pi$ 의 그래프는 $y = 2 \tan 2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $-\frac{3}{2}\pi$ 만큼 평행이동한 것이다.

ㄷ. $y = 2 \tan\left(-2x + \frac{\pi}{2}\right) = 2 \tan\left[-2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right]$ 의 그래프는 $y = 2 \tan 2x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $y = 2 \tan\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 ㄴ, ㄷ, ㄷ이다.

09 ㉡ 7

$y = 3 \tan \frac{x}{2}$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$-y = 3 \tan \frac{x}{2} \quad \therefore y = -3 \tan \frac{x}{2}$$

이때 $y = -3 \tan\left(\frac{x}{2} - 1\right) + 5 = -3 \tan \frac{1}{2}(x - 2) + 5$ 이므로

$y = -3 \tan\left(\frac{x}{2} - 1\right) + 5$ 의 그래프는 $y = -3 \tan \frac{x}{2}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $a = 2, b = 5$ 이므로

$$a + b = 2 + 5 = 7$$

09-1 ㉡ -3

$y = \sin 2x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$y = \sin 2(-x) \quad \therefore y = \sin(-2x)$$

이 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행 이동한 그래프의 식은 $y = \sin \left\{ -2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right\} - 4$

$\therefore y = \sin \left(-2x + \frac{\pi}{2} \right) - 4$ ①

이 그래프가 점 $(0, k)$ 를 지나므로

$k = \sin \frac{\pi}{2} - 4 = 1 - 4 = -3$ ②

채점 기준	비율
① 대칭이동과 평행이동한 그래프의 식을 구할 수 있다.	50%
② k 의 값을 구할 수 있다.	50%

10 ㉡ 3

주기는 $\frac{2\pi}{2\pi} = 1$ 이므로 $a = 1$

최댓값은 $|-3| + 1 = 4$ 이므로 $b = 4$

최솟값은 $-|-3| + 1 = -2$ 이므로 $c = -2$

$\therefore 3a + b + 2c = 3 \times 1 + 4 + 2 \times (-2) = 3$

10-1 ㉡ 6

함수 $y = 2 \sin \left(ax - \frac{\pi}{6} \right) + 1$ 의 주기가 π 이므로

$\frac{2\pi}{|a|} = \pi, |a| = 2 \quad \therefore a = -2 (\because a < 0)$

$\therefore y = 2 \sin \left(-2x - \frac{\pi}{6} \right) + 1$

최댓값은 $2 + 1 = 3$ 이므로 $b = 3$

최솟값은 $-2 + 1 = -1$ 이므로 $c = -1$

$\therefore abc = -2 \times 3 \times (-1) = 6$

11 ㉡ 3

$y = -2 \sin \pi x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{3}{4\pi}$ 만큼, y 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y - \frac{1}{2} = -2 \sin \pi \left(x - \frac{3}{4\pi} \right)$

$\therefore y = -2 \sin \left(\pi x - \frac{3}{4} \right) + \frac{1}{2}$ ①

이 함수의 최댓값은 $|-2| + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ 이므로 $a = \frac{5}{2}$

최솟값은 $-|-2| + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$ 이므로 $b = -\frac{3}{2}$

주기는 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$ 이므로 $c = 2$ ②

$\therefore a + b + c = \frac{5}{2} + \left(-\frac{3}{2} \right) + 2 = 3$ ③

채점 기준	비율
① 평행이동한 그래프의 식을 구할 수 있다.	30%
② a, b, c 의 값을 구할 수 있다.	60%
③ $a + b + c$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

11-1 ㉡ 4

$y = 3 \sin \pi x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{2}{\pi}$ 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y - 1 = 3 \sin \pi \left(x - \frac{2}{\pi} \right) \quad \therefore y = 3 \sin (\pi x - 2) + 1$

이 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$y = 3 \sin (-\pi x - 2) + 1$

이 함수의 최댓값은 $3 + 1 = 4$ 이므로 $a = 4$

최솟값은 $-3 + 1 = -2$ 이므로 $b = -2$

주기는 $\frac{2\pi}{|-\pi|} = 2$ 이므로 $c = 2$

$\therefore a + b + c = 4 + (-2) + 2 = 4$

12 ㉡ ㄴ, ㄹ

함수 $y = -\tan \frac{\pi}{2} x - 1$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\frac{\pi}{2}} = 2$

ㄱ. 함수 $y = 3 \sin \frac{x}{2} - 1$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$

ㄴ. 함수 $y = -\cos \pi x + \pi$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$

ㄷ. 함수 $y = \sin \left(2\pi x + \frac{\pi}{4} \right)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{2\pi} = 1$

ㄹ. 함수 $y = 2 \tan \left(-\frac{\pi}{2} x \right) + 3$ 의 주기는 $\frac{\pi}{|-\frac{\pi}{2}|} = 2$

따라서 함수 $y = -\tan \frac{\pi}{2} x - 1$ 과 주기가 같은 함수는 ㄴ, ㄹ이다.

12-1 ㉡ ㄴ, ㄷ

ㄱ. 함수 $f(x) = \cos 2x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$

ㄴ. 함수 $f(x) = \sin (-\pi x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{|-\pi|} = 2$

ㄷ. 함수 $f(x) = 3 \tan \frac{\pi}{2} x$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\frac{\pi}{2}} = 2$

ㄹ. 함수 $f(x) = -\cos \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3} \right) + 3$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$

따라서 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = f(x+2)$ 를 만족시키는 것은 ㄴ, ㄷ이다.

13 ㉡ ⑤

① 최댓값은 $2 - 1 = 1$, 최솟값은 $-2 - 1 = -3$ 이므로 최댓값과 최솟값의 합은 -2 이다.

② 함수 $f(x) = 2 \sin \pi x - 1$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$

함수 $y = 3 \tan \frac{\pi}{2} x$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\frac{\pi}{2}} = 2$

즉 두 함수의 주기가 같다.

③ $f(1) = 2 \sin \pi - 1 = -1$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(1, -1)$ 을 지난다.

④ 함수 $f(x)$ 의 주기가 2 이므로 $f(-1.2) = f(0.8) = f(2.8)$

⑤ $f(-x) = 2 \sin (-\pi x) - 1 = -2 \sin \pi x - 1$ 이므로 $f(x) \neq f(-x)$

따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

13-1 ㉡ ㄱ, ㄹ

ㄱ. 최댓값은 $|-2| + 1 = 3$, 최솟값은 $-|-2| + 1 = -1$

ㄴ. 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$

$$\text{ㄷ. } f(0) = -2 \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + 1 = -2 \times \frac{1}{2} + 1 = 0$$

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = -2 \cos \frac{\pi}{3} + 1 = -2 \times \frac{1}{2} + 1 = 0$$

$$\therefore f(0) + f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0 + 0 = 0$$

$$\text{ㄹ. } f(x) = -2 \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 1 = -2 \cos 2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + 1 \text{의 그}$$

래프는 $y = -2 \cos 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{6}$ 만큼, y

축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이다.

14 ㉡ ㄱ, ㄷ

ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 주기는 π 이므로 모든 실수 x 에 대하여


$$f(x) = f(x + \pi) = f(x + 2\pi)$$

$$\text{ㄴ. } f(x) = 2 \tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1 \text{의 그}$$

래프는 $y = 2 \tan x$ 의 그래프를 x

축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼, y 축의 방향

으로 1만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



즉 $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 에서 x 축과 한 점에서 만난다.

$$\text{ㄷ. 그래프의 점근선의 방정식은 } x - \frac{\pi}{2} = n\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore x = n\pi \text{ (} n \text{은 정수)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

14-1 ㉡ ④

① 주기는 $\frac{\pi}{2}$ 이다.

② 최댓값은 없다.

$$\text{③ 그래프의 점근선의 방정식은 } 2x - \frac{\pi}{2} = n\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore x = \frac{n}{2}\pi \text{ (} n \text{은 정수)}$$

$$\text{④ } f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) - 1 = -1 \text{이므로 함수 } y = f(x) \text{의 그}$$

래프는 점 $\left(\frac{\pi}{4}, -1\right)$ 을 지난다.

$$\text{⑤ } f(x) = \tan\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) - 1 = \tan 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 \text{의 그래프는}$$

$y = \tan 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼, y 축의 방향으

로 -1만큼 평행이동한 것이다.

따라서 옳은 것은 ④이다.

15 ㉡ 1

$f(x) = \cos x$ 의 그래프에서 두 점 $(a, 0)$, $(d, 0)$ 은 직선 $x = 2\pi$ 에

대하여 대칭이므로 $\frac{a+d}{2} = 2\pi \quad \therefore a+d = 4\pi$

또 두 점 $(b, 0)$, $(c, 0)$ 은 직선 $x = 2\pi$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{b+c}{2} = 2\pi \quad \therefore b+c = 4\pi$$

이때 $2a - b - c + 2d = 2(a+d) - (b+c) = 8\pi - 4\pi = 4\pi$ 이므로

$$f(2a - b - c + 2d) = f(4\pi) = \cos 4\pi = 1$$

15-1 ㉡ 3

$y = \sin x$ 의 그래프에서 두 점 $(a, 0)$, $(b, 0)$ 은 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하

여 대칭이므로 $\frac{a+b}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore a+b = \pi$

또 두 점 $(c, 0)$, $(d, 0)$ 은 직선 $x = \frac{3}{2}\pi$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{c+d}{2} = \frac{3}{2}\pi \quad \therefore c+d = 3\pi$$

$$\therefore \frac{c+d}{a+b} = \frac{3\pi}{\pi} = 3$$

16 ㉡ 0

$$y = \sin \frac{x}{2} \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$$

두 점 $(a, 0)$, $(b, 0)$ 은 직선 $x = \pi$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{a+b}{2} = \pi \quad \therefore a+b = 2\pi$$

두 점 $(c, 0)$, $(d, 0)$ 은 직선 $x = 3\pi$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{c+d}{2} = 3\pi \quad \therefore c+d = 6\pi$$

두 점 $(e, 0)$, $(f, 0)$ 은 직선 $x = 5\pi$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{e+f}{2} = 5\pi \quad \therefore e+f = 10\pi$$

이때 $a+b+c+d+e+f = 2\pi + 6\pi + 10\pi = 18\pi$ 이므로

$$\tan(a+b+c+d+e+f) = \tan 18\pi = 0$$

16-1 ㉡ 0

$$k > 0 \text{이므로 } y = \sin 2kx \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{2k} = \frac{\pi}{k}$$

두 점 $(\alpha, 0)$, $(\beta, 0)$ 은 직선 $x = \frac{\pi}{4k}$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\alpha+\beta}{2} = \frac{\pi}{4k} \quad \therefore \alpha+\beta = \frac{\pi}{2k}$$

두 점 $(\gamma, 0)$, $(\delta, 0)$ 은 직선 $x = \frac{3\pi}{4k}$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\gamma+\delta}{2} = \frac{3\pi}{4k} \quad \therefore \gamma+\delta = \frac{3\pi}{2k}$$

$$\text{이때 } \alpha+\beta+\gamma+\delta = \frac{\pi}{2k} + \frac{3\pi}{2k} = \frac{2\pi}{k} \text{이므로}$$

$$f(\alpha+\beta+\gamma+\delta) = f\left(\frac{2\pi}{k}\right) = \sin 4\pi = 0$$


17 ㉡ 0

$$k > 0 \text{이므로 } y = \tan 2kx \text{의 주기는 } \frac{\pi}{2k}$$

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{k}$ 에서 함수 $y = \tan 2kx$ 의 그래프와 직선 $y = -1$ 은 오른쪽 그림과 같다.

$$\text{이때 } b = \frac{\pi}{2k} + a \text{이므로 } b-a = \frac{\pi}{2k}$$

$$\therefore f(b-a) = f\left(\frac{\pi}{2k}\right) = \tan \pi = 0$$



17-1 ㉡ $-\frac{1}{2}$

$y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \tan 2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ 의 그래프는 $y = \tan 2x$ 의 그

래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{6}$ 만큼 평행이동한 것이다.


주기는 $\frac{\pi}{2}$

$0 \leq x < \pi$ 에서 함수 $y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{3}$ 은 오른쪽 그림과 같다.

$$\beta = \frac{\pi}{2} + \alpha \quad \therefore \alpha - \beta = -\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{3}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$



18 ㉡ 9

함수 $y = \sin \frac{\pi}{6}x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}} = 12$ 이므로 두 점 B, C는 직선

$x=3$ 에 대하여 대칭이다.

이때 $\overline{BC} = 4$ 이므로 두 점 B, C의 좌표는 B(1, 0), C(5, 0)

$x=1$ 일 때 $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ 이므로 점 A의 좌표는 A(1, $\frac{1}{2}$)

따라서 직사각형 ABCD의 둘레의 길이는

$$2\left(4 + \frac{1}{2}\right) = 9$$

18-1 ㉡ 8

함수 $y = 2 \sin \frac{\pi}{12}x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{12}} = 24$ 이므로 두 점 B, C는 직선

$x=6$ 에 대하여 대칭이다.

이때 $\overline{BC} = 8$ 이므로 두 점 B, C의 좌표는 B(2, 0), C(10, 0)

$x=2$ 일 때 $2 \sin \frac{\pi}{6} = 1$ 이므로 점 A의 좌표는 A(2, 1)


따라서 직사각형 ABCD의 넓이는 $1 \times 8 = 8$

19 ㉡ 12

다음 그림에서 빗금 친 부분의 넓이가 서로 같으므로 함수

$y = 2 \cos \frac{\pi}{3}x$ 의 그래프와 세 직선 $x = -3$, $x = 3$, $y = -2$ 로

둘러싸인 부분의 넓이는 직사각형 ABCD의 넓이와 같다.




이때 직사각형 ABCD의 가로의 길이는 3이고 세로의 길이는 4이므로 구하는 넓이는 $3 \times 4 = 12$

19-1 ㉡ $\frac{2}{3}\pi$

다음 그림에서 빗금 친 부분의 넓이가 서로 같으므로 함수

$y = \sin 3x$ 의 그래프와 세 직선 $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{7\pi}{6}$, $y = -1$ 로 둘러싸

인 부분의 넓이는 직사각형 ABCD의 넓이와 같다.



이때 직사각형 ABCD의 가로의 길이는 $\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}$ 이고 세로

의 길이는 2이므로 구하는 넓이는

$$\frac{\pi}{3} \times 2 = \frac{2}{3}\pi$$

20 ㉡ 8π

오른쪽 그림에서 빗금 친 부분의 넓이가 서로 같으므로 함수


$y = \tan x$ ($0 \leq x < \frac{3}{2}\pi$)의 그래프

와 x 축 및 직선 $y=8$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 직사각형 ABCD의 넓이와 같다.

이때 직사각형 ABCD의 가로의 길

이는 $\frac{3}{2}\pi - \frac{\pi}{2} = \pi$ 이고 세로의 길이는 8이므로 구하는 넓이는

$$\pi \times 8 = 8\pi$$



20-1 ㉡ 2

오른쪽 그림에서 빗금 친 부분의 넓이가 서로 같으므로 함수

$y = \tan \frac{x}{3}$ ($-\frac{3}{2}\pi < x < \frac{9}{2}\pi$)

의 그래프와 두 직선 $y = 3k$,

$y = -k$ 로 둘러싸인 부분의 넓

이는 직사각형 ABCD의 넓이


와 같다.

이때 직사각형 ABCD의 가로의 길이는 3π 이고 세로의 길이는

$3k - (-k) = 4k$ 이므로 직사각형 ABCD의 넓이는

$$3\pi \times 4k = 12k\pi$$

따라서 $12k\pi = 24\pi$ 이므로 $k = 2$



21 ㉡ 3

$f(x) = a \sin\left(bx - \frac{\pi}{2}\right) + c$ 의 최댓값이 3, 최솟값이 -1이고

$a > 0$ 이므로

$$a + c = 3, \quad -a + c = -1$$

두 식을 연립하여 풀면 $a = 2$, $c = 1$

주기가 π 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = \pi \quad \therefore b = 2$$

따라서 $f(x) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$ 이므로

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \sin\left(\pi - \frac{\pi}{2}\right) + 1 = 2 \sin \frac{\pi}{2} + 1 = 3$$

21-1 ㉡ $-\frac{7}{2}$

$f(x) = a \sin\left(\pi x - \frac{\pi}{3}\right) + b$ 의 최댓값이 $\frac{9}{2}$ 이고 $a < 0$ 이므로

$$-a + b = \frac{9}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2} \text{에서 } a \sin \frac{\pi}{6} + b = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore \frac{a}{2} + b = -\frac{3}{2} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = -4$, $b = \frac{1}{2}$

따라서 $f(x) = -4 \sin\left(\pi x - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{1}{2}$ 이므로 $f(x)$ 의 최솟값은 $-|-4| + \frac{1}{2} = -\frac{7}{2}$

22 ㉠ 8

$f(x) = a \cos bx + c$ 의 주기가 2π 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = 2\pi \quad \therefore b = 1$$

최댓값과 최솟값의 합이 2, 차가 12이고 $a > 0$ 이므로

$$a + c + (-a + c) = 2, 2c = 2 \quad \therefore c = 1$$

$$a + c - (-a + c) = 12, 2a = 12 \quad \therefore a = 6$$

$$\therefore a + b + c = 6 + 1 + 1 = 8$$

22-1 ㉠ -80

$f(x) = a \cos\left(\frac{3}{2}\pi - \frac{x}{b}\right) + c$ 의 주기가 4π 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{\frac{1}{b}} = 4\pi \quad \therefore b = 2$$

$$\therefore f(x) = a \cos\left(\frac{3}{2}\pi - \frac{x}{2}\right) + c$$

최솟값이 -3 이고 $a < 0$ 이므로

$$a + c = -3 \quad \dots\dots ㉠$$

$f(\pi) = 13$ 에서

$$a \cos\left(\frac{3}{2}\pi - \frac{\pi}{2}\right) + c = -a + c = 13 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a = -8, c = 5 \quad \dots\dots ㉢$$

$$\therefore abc = -8 \times 2 \times 5 = -80 \quad \dots\dots ㉢$$

채점 기준	비율
㉠ b 의 값을 구할 수 있다.	30%
㉡ a, c 의 값을 구할 수 있다.	60%
㉢ abc 의 값을 구할 수 있다.	10%

23 ㉠ $\frac{\pi}{3}$

$y = 2 \tan(ax + b) - 1$ 의 주기가 $\frac{2}{3}\pi$ 이고 $a > 0$ 이므로

$$\frac{\pi}{a} = \frac{2}{3}\pi \quad \therefore a = \frac{3}{2}$$

즉 함수 $y = 2 \tan\left(\frac{3}{2}x + b\right) - 1$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$$\frac{3}{2}x + b = n\pi + \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}x = n\pi + \frac{\pi}{2} - b$$

$$\therefore x = \frac{2n}{3}\pi + \frac{\pi}{3} - \frac{2}{3}b \quad (n \text{은 정수})$$

$$\text{즉 } \frac{\pi}{3} - \frac{2}{3}b = \frac{2k}{3}\pi \quad (k \text{는 정수}) \text{이므로}$$

$$-\frac{2}{3}b = \frac{2k}{3}\pi - \frac{\pi}{3} \quad \therefore b = -k\pi + \frac{\pi}{2} \quad \dots\dots ㉠$$

이때 $0 < b < \pi$ 이므로 $0 < -k\pi + \frac{\pi}{2} < \pi$

$$-\frac{\pi}{2} < -k\pi < \frac{\pi}{2}, -\frac{1}{2} < k < \frac{1}{2}$$

$$\therefore k = 0 \quad (\because k \text{는 정수})$$

$$k = 0 \text{을 } ㉠ \text{에 대입하면 } b = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \frac{b}{a} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{\pi}{3}$$

23-1 ㉠ 8

$f(x) = a \tan bx$ 의 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 이고 $b < 0$ 이므로

$$\frac{\pi}{-b} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore b = -2$$

$$\therefore f(x) = a \tan(-2x)$$

$$f\left(\frac{\pi}{8}\right) = 4 \text{에서 } a \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 4$$

$$-a = 4 \quad \therefore a = -4$$

$$\therefore ab = -4 \times (-2) = 8$$

24 ㉠ -3π

$y = a \sin(bx - c)$ 의 그래프에서 최댓값은 3, 최솟값은 -3 이고

$a < 0$ 이므로 $a = -3$

주기가 $2\left(\frac{3}{4}\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \pi$ 이고 $b < 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{-b} = \pi \quad \therefore b = -2$$

즉 함수 $y = -3 \sin(-2x - c)$ 의 그래프가 점 $(0, -3)$ 을 지나므로

$$-3 = -3 \sin(-c) \quad \therefore \sin(-c) = 1$$

이때 $-\pi \leq c \leq 0$ 에서 $0 \leq -c \leq \pi$ 이므로

$$-c = \frac{\pi}{2} \quad \therefore c = -\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore abc = -3 \times (-2) \times \left(-\frac{\pi}{2}\right) = -3\pi$$

24-1 ㉠ 6

$y = a \sin bx + c$ 의 그래프에서 최댓값이 1, 최솟값이 -3 이고

$a > 0$ 이므로 $a + c = 1, -a + c = -3$

두 식을 연립하여 풀면 $a = 2, c = -1$

주기가 $\frac{2}{3}\pi$ 이고 $b > 0$ 이므로 $\frac{2\pi}{b} = \frac{2}{3}\pi \quad \therefore b = 3$

$$\therefore a + b - c = 2 + 3 - (-1) = 6$$

25 ㉠ 4

$y = a \cos b(x - \pi) + c$ 의 그래프에서 최댓값이 3, 최솟값이 -1

이고 $a > 0$ 이므로

$$a + c = 3, -a + c = -1$$

두 식을 연립하여 풀면 $a = 2, c = 1$

주기가 2π 이고 $b > 0$ 이므로 $\frac{2\pi}{b} = 2\pi \quad \therefore b = 1$

$$\therefore a + b + c = 2 + 1 + 1 = 4$$

25-1 ㉠ 4π

$y = a \cos(bx - c) + d$ 의 그래프에서 최댓값은 4, 최솟값은 0이고

$a > 0$ 이므로

$$a + d = 4, -a + d = 0$$

두 식을 연립하여 풀면 $a = 2, d = 2$

주기가 π 이고 $b > 0$ 이므로 $\frac{2\pi}{b} = \pi \quad \therefore b = 2$

즉 함수 $y = 2 \cos(2x - c) + 2$ 의 그래프가 점 $(0, 2)$ 를 지나므로

$$2 = 2 \cos(-c) + 2 \quad \therefore \cos(-c) = 0$$

이때 $0 < c < \pi$ 에서 $-\pi < -c < 0$ 이므로

$$-c = -\frac{\pi}{2} \quad \therefore c = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore abcd = 2 \times 2 \times \frac{\pi}{2} \times 2 = 4\pi$$

26 $\frac{4}{3}\pi$

$y = \tan(ax+b)$ 의 그래프에서 주기가 $\frac{11}{12}\pi - \frac{5}{12}\pi = \frac{\pi}{2}$ 이고

$a > 0$ 이므로

$$\frac{\pi}{a} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore a = 2 \quad \dots\dots ①$$

즉 함수 $y = \tan(2x+b)$ 의 그래프가 점 $(\frac{7}{6}\pi, 0)$ 을 지나므로

$$0 = \tan\left(\frac{7}{3}\pi + b\right)$$

이때 $\frac{\pi}{2} < b < \pi$ 에서 $\frac{17}{6}\pi < \frac{7}{3}\pi + b < \frac{10}{3}\pi$ 이므로

$$\frac{7}{3}\pi + b = 3\pi \quad \therefore b = \frac{2}{3}\pi \quad \dots\dots ②$$

$$\therefore ab = 2 \times \frac{2}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40%
② b 의 값을 구할 수 있다.	50%
③ ab 의 값을 구할 수 있다.	10%

26-1 $\frac{\pi}{2}$

$y = a \tan(bx-c)$ 의 그래프에서 주기가 $\frac{5}{4}\pi - \frac{\pi}{4} = \pi$ 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{\pi}{b} = \pi \quad \therefore b = 1$$

즉 함수 $y = a \tan(x-c)$ 의 그래프는 $y = a \tan x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼 평행이동한 것과 같으므로

$$y = a \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \quad \therefore c = \frac{\pi}{4} \left(\because 0 < c < \frac{\pi}{2}\right)$$

또 함수 $y = a \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ 의 그래프가 점 $(0, -2)$ 를 지나므로

$$-2 = a \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) \quad \therefore a = 2$$

$$\therefore abc = 2 \times 1 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

27 8

$f(x) = a|\sin bx| + c$ 의 최댓값이 -1 이고 $a > 0$ 이므로

$$a + c = -1 \quad \dots\dots ①$$

주기가 $\frac{\pi}{3}$ 이고 $b > 0$ 이므로 $\frac{\pi}{b} = \frac{\pi}{3} \quad \therefore b = 3$

$$\therefore f(x) = a|\sin 3x| + c$$

$$f\left(\frac{\pi}{18}\right) = -2 \text{에서 } a\left|\sin \frac{\pi}{6}\right| + c = \frac{a}{2} + c = -2 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a = 2, c = -3$

$$\therefore a + b - c = 2 + 3 - (-3) = 8$$

Lecture 절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 주기

(1) $y = |\sin x|$ 의 주기가 π 이므로 $y = |\sin bx|$ 의 주기는 $\frac{\pi}{|b|}$

(2) $y = |\cos x|$ 의 주기가 π 이므로 $y = |\cos bx|$ 의 주기는 $\frac{\pi}{|b|}$

(3) $y = |\tan x|$ 의 주기가 π 이므로 $y = |\tan bx|$ 의 주기는 $\frac{\pi}{|b|}$

27-1 2

$f(x) = a|\sin bx| - c$ 의 주기가 2π 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{\pi}{b} = 2\pi \quad \therefore b = \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \left|\sin \frac{1}{2}x\right| \leq 1 \text{이므로 } 0 \leq a\left|\sin \frac{1}{2}x\right| \leq a$$

$$\therefore -c \leq a\left|\sin \frac{1}{2}x\right| - c \leq a - c$$

이때 최댓값이 3, 최솟값이 -1 이므로

$$a - c = 3, -c = -1 \quad \therefore a = 4, c = 1$$

$$\therefore abc = 4 \times \frac{1}{2} \times 1 = 2$$

28 $\frac{5}{2}$

$a > 0$ 이므로 $y = |4 \cos ax|$ 의 주기는 $\frac{\pi}{a}$

$$y = 3 \sin(-5x) \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{|-5|} = \frac{2}{5}\pi$$

$$\text{따라서 } \frac{\pi}{a} = \frac{2}{5}\pi \text{이므로 } a = \frac{5}{2}$$

28-1 24

$y = a|\cos bx| + 5$ 의 그래프에서 주기는 6π 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{\pi}{b} = 6\pi \quad \therefore b = \frac{1}{6} \quad \dots\dots ①$$

즉 함수 $y = a\left|\cos \frac{1}{6}x\right| + 5$ 의 그래프가 점 $(0, 9)$ 를 지나므로

$$9 = a|\cos 0| + 5, a + 5 = 9 \quad \therefore a = 4 \quad \dots\dots ②$$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{4}{\frac{1}{6}} = 24 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① b 의 값을 구할 수 있다.	40%
② a 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $\frac{a}{b}$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

29 ③

함수 $y = |2 \tan x|$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

① 주기가 π 인 주기함수이다.


② 최댓값은 존재하지 않는다.

④ 그래프의 점근선의 방정식은

$$x = n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수})$$


⑤ 정의역은 $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수})$ 인 실수 전체의 집합이다.

따라서 옳은 것은 ③이다.



29-1 ㄱ

ㄱ. 함수 $y = 2 \sin |x|$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 최솟값은 -2 이다.




ㄴ. 함수 $y = \left|\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right|$ 의

그래프는 $y = |\cos x|$ 의 그래

프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼


평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



즉 이 함수는 주기가 π 인 주기함수이다.

ㄷ. 함수 $y = \tan |x|$ 의 그래프는
오른쪽 그림과 같으므로 점근선
의 방정식은

$$x = n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수})$$



따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

30 ㉮ 1


$$\begin{aligned} & \frac{\sin(\pi+\theta)}{\sin(\frac{\pi}{2}+\theta)} + \frac{\cos(\frac{\pi}{2}+\theta)}{\cos(\pi-\theta)} + \tan(\frac{3}{2}\pi+\theta) \tan(\pi-\theta) \\ &= \frac{-\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{-\sin\theta}{-\cos\theta} - \frac{1}{\tan\theta} \times (-\tan\theta) = 1 \end{aligned}$$

30-1 ㉮ $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} 3x+4y-5=0 \text{에서 } y &= -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4} \quad \therefore \tan\theta = -\frac{3}{4} \\ \therefore \frac{\cos(\frac{3}{2}\pi+\theta)}{\sin(\frac{3}{2}\pi-\theta)} + \tan(\pi-\theta) &= \frac{-\sin\theta}{-\cos\theta} - \tan\theta \\ &= -\tan\theta - \tan\theta \\ &= -2\tan\theta \\ &= -2 \times \left(-\frac{3}{4}\right) \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Lecture

직선 $y = mx + n$ 이 x 축의 양의 방향과 이루는
각의 크기를 θ 라 하면
 $\tan\theta = m$



31 ㉮ ③

$$\begin{aligned} \sin 780^\circ &= \sin(90^\circ \times 8 + 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos(-600^\circ) &= \cos 600^\circ = \cos(90^\circ \times 6 + 60^\circ) \\ &= -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2} \\ \tan 240^\circ &= \tan(90^\circ \times 2 + 60^\circ) = \tan 60^\circ = \sqrt{3} \\ \therefore 2\sin 780^\circ + \cos(-600^\circ) - \tan 240^\circ \\ &= 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) - \sqrt{3} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

31-1 ㉮ ①

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{3} &= \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \frac{2}{3}\pi = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \frac{4}{3}\pi &= \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \frac{5}{3}\pi &= \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \therefore \sin \frac{\pi}{3} + \sin \frac{2}{3}\pi + \sin \frac{4}{3}\pi + \sin \frac{5}{3}\pi \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0 \end{aligned}$$

32 ㉮ $-\sin\theta$

$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, $\sin\theta < 0, \cos\theta < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} & \sqrt{\left\{\cos\left(\theta - \frac{3}{2}\pi\right) - \sin\left(\theta - \frac{3}{2}\pi\right)\right\}^2} - \sin\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right) \\ &= \left|\cos\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right) - \left\{-\sin\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right)\right\}\right| - (-\cos\theta) \\ &= |-\sin\theta - \cos\theta| + \cos\theta \\ &= -\sin\theta - \cos\theta + \cos\theta \quad (\because -\sin\theta - \cos\theta > 0) \\ &= -\sin\theta \end{aligned}$$

32-1 ㉮ $-\frac{19}{20}$

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이므로 $\cos\theta < 0, \tan\theta < 0$

$$\therefore \cos\theta = -\sqrt{1 - \sin^2\theta} = -\sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = -\frac{4}{5} \quad \dots\dots ①$$

$$\text{이때 } \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4} \text{이므로} \quad \dots\dots ②$$

$$\begin{aligned} & \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - \sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) + \tan(\pi + \theta) \\ &= \sin\theta - (-\cos\theta) + \tan\theta \\ &= \sin\theta + \cos\theta + \tan\theta \\ &= \frac{3}{5} + \left(-\frac{4}{5}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right) \\ &= -\frac{19}{20} \quad \dots\dots ③ \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① $\cos\theta$ 의 값을 구할 수 있다.	20%
② $\tan\theta$ 의 값을 구할 수 있다.	20%
③ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - \sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) + \tan(\pi + \theta)$ 의 값을 구할 수 있다.	60%

33 ㉮ 2

$$\begin{aligned} \theta = \frac{\pi}{10} \text{에서 } 5\theta &= \frac{\pi}{2} \text{이므로 } 3\theta = \frac{\pi}{2} - 2\theta, 4\theta = \frac{\pi}{2} - \theta \\ \therefore \sin\theta \cos 4\theta + \sin 2\theta \cos 3\theta + \sin 3\theta \cos 2\theta + \sin 4\theta \cos \theta \\ &= \sin\theta \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \sin 2\theta \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right) \\ &\quad + \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right) \cos 2\theta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \cos \theta \\ &= \sin\theta \sin\theta + \sin 2\theta \sin 2\theta + \cos 2\theta \cos 2\theta + \cos \theta \cos \theta \\ &= \sin^2\theta + \cos^2\theta + \sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta \\ &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

33-1 ㉮ 1

$$\begin{aligned} \theta = \frac{\pi}{8} \text{에서 } 4\theta &= \frac{\pi}{2} \text{이므로 } 3\theta = \frac{\pi}{2} - \theta \\ \therefore \sin\theta \cos 3\theta + \sin \theta \sin 3\theta - \cos \theta \cos 3\theta + \sin 3\theta \cos \theta \\ &= \sin\theta \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \sin \theta \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \\ &\quad - \cos \theta \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \cos \theta \\ &= \sin\theta \sin\theta + \sin \theta \cos \theta - \cos \theta \sin \theta + \cos \theta \cos \theta \\ &= \sin^2\theta + \cos^2\theta \\ &= 1 \end{aligned}$$

34 ㉮ 1

$$\begin{aligned}
 \tan 1^\circ &= \tan (90^\circ - 89^\circ) = \frac{1}{\tan 89^\circ} \\
 \tan 3^\circ &= \tan (90^\circ - 87^\circ) = \frac{1}{\tan 87^\circ} \\
 \tan 5^\circ &= \tan (90^\circ - 85^\circ) = \frac{1}{\tan 85^\circ} \\
 &\vdots \\
 \tan 43^\circ &= \tan (90^\circ - 47^\circ) = \frac{1}{\tan 47^\circ} \\
 \therefore \tan 1^\circ \times \tan 3^\circ \times \tan 5^\circ \times \cdots \times \tan 87^\circ \times \tan 89^\circ \\
 &= (\tan 1^\circ \times \tan 89^\circ) \times (\tan 3^\circ \times \tan 87^\circ) \\
 &\quad \times \cdots \times (\tan 43^\circ \times \tan 47^\circ) \times \tan 45^\circ \\
 &= \left(\frac{1}{\tan 89^\circ} \times \tan 89^\circ \right) \times \left(\frac{1}{\tan 87^\circ} \times \tan 87^\circ \right) \\
 &\quad \times \cdots \times \left(\frac{1}{\tan 47^\circ} \times \tan 47^\circ \right) \times \tan 45^\circ \\
 &= 1 \times 1 \times \cdots \times 1 \times 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

34-1 ㉮ 1

$$\begin{aligned}
 \tan 1^\circ &= \tan (90^\circ - 89^\circ) = \frac{1}{\tan 89^\circ} \\
 \tan 2^\circ &= \tan (90^\circ - 88^\circ) = \frac{1}{\tan 88^\circ} \\
 \tan 3^\circ &= \tan (90^\circ - 87^\circ) = \frac{1}{\tan 87^\circ} \\
 &\vdots \\
 \tan 44^\circ &= \tan (90^\circ - 46^\circ) = \frac{1}{\tan 46^\circ} \\
 \therefore \tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \tan 3^\circ \times \cdots \times \tan 88^\circ \times \tan 89^\circ \\
 &= (\tan 1^\circ \times \tan 89^\circ) \times (\tan 2^\circ \times \tan 88^\circ) \\
 &\quad \times \cdots \times (\tan 44^\circ \times \tan 46^\circ) \times \tan 45^\circ \\
 &= \left(\frac{1}{\tan 89^\circ} \times \tan 89^\circ \right) \times \left(\frac{1}{\tan 88^\circ} \times \tan 88^\circ \right) \\
 &\quad \times \cdots \times \left(\frac{1}{\tan 46^\circ} \times \tan 46^\circ \right) \times \tan 45^\circ \\
 &= 1 \times 1 \times \cdots \times 1 \times 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

35 ㉮ $\frac{9}{2}$

$$\begin{aligned}
 \sin \frac{9}{20}\pi &= \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{20} \right) = \cos \frac{\pi}{20} \\
 \sin \frac{8}{20}\pi &= \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{20}\pi \right) = \cos \frac{2}{20}\pi \\
 \sin \frac{7}{20}\pi &= \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{3}{20}\pi \right) = \cos \frac{3}{20}\pi \\
 \sin \frac{6}{20}\pi &= \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{4}{20}\pi \right) = \cos \frac{4}{20}\pi \\
 \therefore \sin^2 \frac{\pi}{20} + \sin^2 \frac{2}{20}\pi + \sin^2 \frac{3}{20}\pi + \cdots + \sin^2 \frac{9}{20}\pi \\
 &= \sin^2 \frac{\pi}{20} + \sin^2 \frac{2}{20}\pi + \sin^2 \frac{3}{20}\pi + \sin^2 \frac{4}{20}\pi + \sin^2 \frac{5}{20}\pi \\
 &\quad + \cos^2 \frac{4}{20}\pi + \cos^2 \frac{3}{20}\pi + \cos^2 \frac{2}{20}\pi + \cos^2 \frac{\pi}{20} \\
 &= 4 + \sin^2 \frac{\pi}{4} \\
 &= 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}
 \end{aligned}$$

35-1 ㉮ ⑤

$$\begin{aligned}
 f(1) &= \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 f(2) &= \sin \frac{2}{3}\pi = \sin \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 f(3) &= \sin \pi = 0 \\
 f(4) &= \sin \frac{4}{3}\pi = \sin \left(\pi + \frac{\pi}{3} \right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\
 f(5) &= \sin \frac{5}{3}\pi = \sin \left(2\pi - \frac{\pi}{3} \right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\
 f(6) &= \sin 2\pi = 0 \\
 f(7) &= \sin \frac{7}{3}\pi = \sin \left(2\pi + \frac{\pi}{3} \right) = \sin \frac{\pi}{3} = f(1) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 f(8) &= \sin \frac{8}{3}\pi = \sin \left(2\pi + \frac{2}{3}\pi \right) = \sin \frac{2}{3}\pi = f(2) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 &\vdots \\
 f(12) &= f(6) = 0 \\
 f(13) &= f(1) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 \therefore f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(13) \\
 &= 2\{f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) + f(6)\} + f(1) \\
 &= 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + 0 - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + 0 \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2}
 \end{aligned}$$

36 ㉮ 0

$$\begin{aligned}
 \overline{AB} \text{가 원의 지름이므로 } \angle APB &= \frac{\pi}{2} \quad \therefore \theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2} \\
 \therefore \sin \left(\frac{4}{3}\pi - \theta_1 - \theta_2 \right) + \cos \left(\theta_1 + \theta_2 + \frac{\pi}{6} \right) \\
 &= \sin \left(\frac{4}{3}\pi - \frac{\pi}{2} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) \\
 &= \sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) \\
 &= \cos \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{6} \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0
 \end{aligned}$$

36-1 ㉮ $\frac{3}{5}$

$$\begin{aligned}
 \overline{AB} \text{가 원의 지름이므로 } \angle ACB &= \frac{\pi}{2} \quad \therefore \alpha + \beta = \frac{\pi}{2} \\
 \triangle ABC \text{에서 } \overline{AB} &= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \\
 \therefore \sin (2\alpha + \beta) &= \sin (\alpha + \beta + \alpha) = \sin \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = \cos \alpha \\
 &= \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{3}{5}
 \end{aligned}$$

37 ㉮ $-2\sqrt{2}$

$$\begin{aligned}
 \cos \theta_1 &= \frac{1}{3} \text{에서 } \theta_1 \text{은 예각이므로} \\
 \sin \theta_1 &= \sqrt{1 - \cos^2 \theta_1} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3} \right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \quad \cdots \cdots ① \\
 \therefore \tan \theta_1 &= \frac{\sin \theta_1}{\cos \theta_1} = 2\sqrt{2} \quad \cdots \cdots ② \\
 \text{이때 } \square ABCD \text{가 원에 내접하므로 } \theta_1 + \theta_2 &= \pi \\
 \therefore \tan \theta_2 &= \tan (\pi - \theta_1) = -\tan \theta_1 = -2\sqrt{2} \quad \cdots \cdots ③
 \end{aligned}$$


채점 기준	비율
① $\sin \theta_1$ 의 값을 구할 수 있다.	30%
② $\tan \theta_1$ 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ $\tan \theta_2$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

Lecture 원에 내접하는 사각형

사각형 ABCD가 원에 내접할 때

$$(1) \angle A + \angle C = \pi$$

$$(2) \angle B + \angle D = \pi$$



37-1 ㉠ ㄱ, ㄴ

□ABCD가 원에 내접하므로 $A+C=\pi$, $B+D=\pi$

$$\text{ㄱ. } B=\pi-D \text{이므로 } \cos B = \cos(\pi-D) = -\cos D$$

$$\text{ㄴ. } A=\pi-C \text{이므로 } \sin A = \sin(\pi-C) = \sin C$$

$$\text{ㄷ. } A+B+C+D=2\pi \text{이므로 } D=2\pi-(A+B+C)$$

$$\therefore \tan D = \tan \{2\pi-(A+B+C)\}$$

$$= -\tan(A+B+C)$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

38 ㉠ 0

$$4\theta=\pi \text{이므로}$$

$$\sin \theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta + \cdots + \sin 8\theta$$

$$= \sin \theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta + \sin 4\theta + \sin(\pi+\theta)$$

$$+ \sin(\pi+2\theta) + \sin(\pi+3\theta) + \sin(\pi+4\theta)$$

$$= \sin \theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta + \sin 4\theta$$

$$- \sin \theta - \sin 2\theta - \sin 3\theta - \sin 4\theta$$

$$= 0$$

38-1 ㉠ 2

네 점 P_1, P_2, P_3, P_4 는 사분원의 호 AB를 5등분한 점이므로

$\angle AOP_1 = \theta$ 라 하면

$$\angle AOP_2 = 2\theta, \angle AOP_3 = 3\theta, \angle AOP_4 = 4\theta$$

이때 $OA=OB=1$ 이므로

$$\overline{P_1Q_1} = \sin \theta, \overline{P_2Q_2} = \sin 2\theta, \overline{P_3Q_3} = \sin 3\theta, \overline{P_4Q_4} = \sin 4\theta$$

$$5\theta = \frac{\pi}{2} \text{이므로 } 3\theta = \frac{\pi}{2} - 2\theta, 4\theta = \frac{\pi}{2} - \theta$$

$$\therefore \overline{P_1Q_1}^2 + \overline{P_2Q_2}^2 + \overline{P_3Q_3}^2 + \overline{P_4Q_4}^2$$

$$= \sin^2 \theta + \sin^2 2\theta + \sin^2 3\theta + \sin^2 4\theta$$

$$= \sin^2 \theta + \sin^2 2\theta + \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right) + \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$$= \sin^2 \theta + \sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta + \cos^2 \theta$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2$$

39 ㉠ 2

$$y = -\sin(x+\pi) + \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) + 1$$

$$= \sin x + \sin x + 1 = 2\sin x + 1$$

$$\text{이때 } -1 \leq \sin x \leq 1 \text{이므로 } -1 \leq 2\sin x + 1 \leq 3$$

따라서 $M=3, m=-1$ 이므로

$$M+m=3+(-1)=2$$

39-1 ㉠ 2

$$y = \sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right) - \cos(x+\pi) + k$$

$$= \cos x + \cos x + k = 2\cos x + k$$

이때 $-1 \leq \cos x \leq 1$ 이므로

$$-2+k \leq 2\cos x + k \leq 2+k$$

즉 최댓값은 $2+k$, 최솟값은 $-2+k$ 이므로

$$2+k+(-2+k)=4, 2k=4 \quad \therefore k=2$$

40 ㉠ 5

$$y = \sin\left(\frac{3}{2}\pi+x\right) - 2\cos(\pi-x) + k$$

$$= -\cos x + 2\cos x + k = \cos x + k$$

$$\text{이때 } -1 \leq \cos x \leq 1 \text{이므로 } -1+k \leq \cos x + k \leq 1+k$$

즉 최댓값은 $1+k$ 이므로

$$1+k=6 \quad \therefore k=5$$

40-1 ㉠ 4

$$y = 2\sin(\pi-x) + \cos\left(\frac{3}{2}\pi+x\right) + k$$

$$= 2\sin x + \sin x + k = 3\sin x + k$$

$$\text{이때 } -1 \leq \sin x \leq 1 \text{이므로 } -3+k \leq 3\sin x + k \leq 3+k$$

즉 최솟값은 $-3+k$ 이므로

$$-3+k=-2 \quad \therefore k=1$$

$$\text{따라서 최댓값은 } 3+k=3+1=4$$

41 ㉠ 22

$$-1 \leq \sin \frac{2}{3}x \leq 1 \text{이므로 } -7 \leq \sin \frac{2}{3}x - 6 \leq -5$$

$$\therefore 5 \leq \left| \sin \frac{2}{3}x - 6 \right| \leq 7$$

$$\text{이때 } a < 0 \text{이므로 } 7a \leq a \left| \sin \frac{2}{3}x - 6 \right| \leq 5a$$

$$\therefore 7a+b \leq a \left| \sin \frac{2}{3}x - 6 \right| + b \leq 5a+b \quad \cdots \cdots ①$$

즉 최댓값은 $5a+b$, 최솟값은 $7a+b$ 이므로

$$5a+b=10, 7a+b=4$$

$$\text{두 식을 연립하여 풀면 } a=-3, b=25 \quad \cdots \cdots ②$$

$$\therefore a+b=-3+25=22 \quad \cdots \cdots ③$$

채점 기준	비율
① $a \left \sin \frac{2}{3}x - 6 \right + b$ 의 값의 범위를 구할 수 있다.	60%
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

41-1 ㉠ ④

$$-1 \leq \sin(3x-\pi) \leq 1 \text{이므로 } -2 \leq 2\sin(3x-\pi) \leq 2$$

$$0 \leq |2\sin(3x-\pi)| \leq 2$$

$$\therefore 4 \leq |2\sin(3x-\pi)| + 4 \leq 6$$

즉 최댓값은 6, 최솟값은 4이므로

$$M=6, m=4$$

$$\therefore Mm=6 \times 4=24$$

42 ㉠ ③

$$y = 2\cos^2 x - 2\sin x + 1 = 2(1-\sin^2 x) - 2\sin x + 1$$

$$= -2\sin^2 x - 2\sin x + 3$$

$\sin x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는

$$y = -2t^2 - 2t + 3 = -2\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{2} \text{이므로}$$

$$t = -\frac{1}{2} \text{일 때 최대이고, 최댓값 } M \text{은 } M = \frac{7}{2}$$

$$t = 1 \text{일 때 최소이고, 최솟값 } m \text{은 } m = -2 - 2 + 3 = -1$$

$$\therefore M + m = \frac{7}{2} + (-1) = \frac{5}{2}$$

참고 42에서 그래프를 이용하여 최댓값과 최솟값을 구해 보자.

$-1 \leq t \leq 1$ 에서 함수

$$y = -2t^2 - 2t + 3$$


$$= -2\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{2}$$

의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

함수 $y = -2t^2 - 2t + 3$ 의 그래프에서

$$t = -\frac{1}{2} \text{일 때, 최댓값은 } \frac{7}{2}$$

$$t = 1 \text{일 때, 최솟값은 } -1$$



42-1 ㉮ $\frac{3}{2}$

$$f(\theta) = \cos^2\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) - \cos^2 \theta + 2 \sin(3\pi + \theta)$$

$$= \sin^2 \theta - \cos^2 \theta - 2 \sin \theta$$

$$= \sin^2 \theta - (1 - \sin^2 \theta) - 2 \sin \theta$$

$$= 2 \sin^2 \theta - 2 \sin \theta - 1$$

$\sin \theta = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는

$$y = 2t^2 - 2t - 1 = 2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{2} \text{이므로}$$

$$t = -1 \text{일 때 최대이고, 최댓값은 } 2 + 2 - 1 = 3$$

$$t = \frac{1}{2} \text{일 때 최소이고, 최솟값은 } -\frac{3}{2}$$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은

$$3 + \left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

43 ㉮ $-\pi$

$\tan x = t$ 라 하면 $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 에서 $-1 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는

$$y = t^2 - 4t - 1 = (t - 2)^2 - 5 \text{이므로}$$

$$t = -1 \text{일 때 최대이고, 최댓값은 } (-1 - 2)^2 - 5 = 4$$

$$\therefore q = 4$$

$$\text{또 } t = -1, \text{ 즉 } \tan x = -1 \text{에서 } x = -\frac{\pi}{4} \left(\because -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \right) \text{이므로}$$

$$p = -\frac{\pi}{4}$$

$$\therefore pq = -\frac{\pi}{4} \times 4 = -\pi$$

43-1 ㉮ $\frac{\pi}{4}$

$\tan x = t$ 라 하면 $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 에서 $-1 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는

$$y = t^2 + 2t - 3 = (t + 1)^2 - 4 \text{이므로}$$

$t = 1$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $2^2 - 4 = 0$

$$\therefore q = 0$$

또 $t = 1$, 즉 $\tan x = 1$ 에서 $x = \frac{\pi}{4} \left(\because -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \right)$ 이므로

$$p = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore p + q = \frac{\pi}{4} + 0 = \frac{\pi}{4}$$

44 ㉮ 6

$$y = \sin^2 x + 2 \sin\left(\frac{5}{2}\pi + x\right) + k + 1$$

$$= 1 - \cos^2 x + 2 \cos x + k + 1$$

$$= -\cos^2 x + 2 \cos x + k + 2$$

$\cos x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는

$$y = -t^2 + 2t + k + 2 = -(t - 1)^2 + k + 3 \text{이므로}$$

$$t = -1 \text{일 때 최소이고, 최솟값은 } -(-2)^2 + k + 3 = k - 1$$

$$\text{즉 } k - 1 = 5 \text{이므로 } k = 6$$

44-1 ㉮ 8

$$y = 2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 2 \sin(\pi + x) + k$$

$$= 2 \cos^2 x + 2 \sin x + k$$

$$= 2(1 - \sin^2 x) + 2 \sin x + k$$

$$= -2 \sin^2 x + 2 \sin x + k + 2$$

..... ①

$\sin x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는

$$y = -2t^2 + 2t + k + 2 = -2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + k + \frac{5}{2} \text{이므로}$$

$$t = \frac{1}{2} \text{일 때 최대이고, 최댓값은 } k + \frac{5}{2}$$

$$\text{즉 } k + \frac{5}{2} = \frac{1}{2} \text{이므로 } k = -2$$

..... ②

또 주어진 함수는 $t = -1$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은

$$m = -2 - 2 + k + 2 = k - 2$$

$$= -2 - 2 = -4$$

..... ③

$$\therefore km = -2 \times (-4) = 8$$

..... ④

채점 기준	비율
① 주어진 함수를 한 종류의 삼각함수로 나타낼 수 있다.	30%
② k 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ m 의 값을 구할 수 있다.	30%
④ km 의 값을 구할 수 있다.	10%

45 ㉮ -1

$\sin x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는

$$y = \frac{2t+1}{t-2} = \frac{2(t-2)+5}{t-2} = \frac{5}{t-2} + 2$$

따라서 오른쪽 그림에서


$t = -1$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은

$$M = \frac{1}{3}$$

$t = 1$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은

$$m = -3$$

$$\therefore Mm = \frac{1}{3} \times (-3) = -1$$



45-1 ㉠ 3π

$\sin x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는

$$y = \frac{1-t}{t+2} = \frac{-(t+2)+3}{t+2} = \frac{3}{t+2} - 1$$

오른쪽 그림에서 $t = -1$ 일 때 최대이고,


최댓값은 2이므로 $b = 2$

또 $t = -1$, 즉 $\sin x = -1$ 에서

$$x = \frac{3}{2}\pi \quad (\because 0 \leq x < 2\pi) \text{이므로}$$

$$a = \frac{3}{2}\pi$$

$$\therefore ab = \frac{3}{2}\pi \times 2 = 3\pi$$



46 ㉠ ②

$$y = \frac{2 \cos x - 1}{\sin(\frac{\pi}{2} + x) + 2} = \frac{2 \cos x - 1}{\cos x + 2}$$

$\cos x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는

$$y = \frac{2t-1}{t+2} = \frac{2(t+2)-5}{t+2} = -\frac{5}{t+2} + 2$$

따라서 오른쪽 그림에서


$t = 1$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은

$$M = \frac{1}{3}$$

$t = -1$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은

$$m = -3$$

$$\therefore Mm = \frac{1}{3} \times (-3) = -1$$



46-1 ㉠ ②

$\cos x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는

$$y = \frac{-2t+1}{t-2} = \frac{-2(t-2)+3}{t-2} = -\frac{3}{t-2} - 2$$

따라서 오른쪽 그림에서


$t = 1$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은

$$M = 1$$

$t = -1$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은

$$m = -1$$

$$\therefore M - m = 1 - (-1) = 2$$



47 ㉠ $\frac{1}{2}$

$\tan x = t$ 라 하면 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 에서 $0 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는


$$y = \frac{2t-1}{t-2} = \frac{2(t-2)+3}{t-2} = \frac{3}{t-2} + 2 \quad \dots\dots ①$$

오른쪽 그림에서 $t = 0$, 즉 $x = 0$ 일 때

최대이고, 최댓값은 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$a = 0, b = \frac{1}{2} \quad \dots\dots ②$$

$$\therefore a + b = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \dots\dots ③$$



채점 기준

- ① 주어진 함수를 t 에 대한 함수로 나타낼 수 있다. 40%
- ② a, b 의 값을 구할 수 있다. 40%
- ③ $a + b$ 의 값을 구할 수 있다. 20%

비율

47-1 ㉠ $\frac{3}{2}$

$\tan x = t$ 라 하면 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 에서 $0 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는


$$y = \frac{2t+1}{t+2} = \frac{2(t+2)-3}{t+2} = -\frac{3}{t+2} + 2$$

따라서 오른쪽 그림에서

$t = 1$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은 $M = 1$

$t = 0$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은 $m = \frac{1}{2}$

$$\therefore M + m = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$



48 ㉠ $\frac{5}{6}\pi$

$2x - \frac{\pi}{3} = t$ 라 하면 $0 \leq x < \pi$ 에서 $-\frac{\pi}{3} \leq t < \frac{5}{3}\pi$

이때 주어진 방정식은 $\sin t = \frac{1}{2}$

오른쪽 그림과 같이

$-\frac{\pi}{3} \leq t < \frac{5}{3}\pi$ 에서 함수

$y = \sin t$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{1}{2}$ 의 교점의 t 좌표는


$$\frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi \text{이므로}$$

$$2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } 2x - \frac{\pi}{3} = \frac{5}{6}\pi$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } x = \frac{7}{12}\pi$$

따라서 모든 근의 합은

$$\frac{\pi}{4} + \frac{7}{12}\pi = \frac{5}{6}\pi$$



48-1 ㉠ $\frac{\pi}{2}$

$x - \frac{\pi}{4} = t$ 라 하면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $-\frac{\pi}{4} \leq t < \frac{7}{4}\pi$

이때 주어진 방정식은 $\cos t = \frac{\sqrt{2}}{2}$

오른쪽 그림과 같이

$-\frac{\pi}{4} \leq t < \frac{7}{4}\pi$ 에서 함수

$y = \cos t$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 교점의 t 좌표는


$$-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \text{이므로}$$

$$x - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} \text{ 또는 } x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = \frac{\pi}{2}$$

따라서 모든 근의 합은

$$0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$



49 ㉔ 3

$$2 \cos x - 1 = 0 \text{에서 } \cos x = \frac{1}{2}$$


오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \cos x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 의 교점의 x 좌표는

$$\frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi \text{이므로}$$

$$x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{5}{3}\pi$$

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = \frac{5}{3}\pi \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \tan(\beta - \alpha) &= \tan\left(\frac{5}{3}\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \tan \frac{4}{3}\pi \\ &= \tan\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \end{aligned}$$



49-1 ㉔ 3pi

$$2 \sin x = -\sqrt{2} \text{에서 } \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$


오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 교점의 x 좌표는

$$\frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi \text{이므로}$$

$$x = \frac{5}{4}\pi \text{ 또는 } x = \frac{7}{4}\pi$$

따라서 모든 근의 합은

$$\frac{5}{4}\pi + \frac{7}{4}\pi = 3\pi$$



50 ㉔ 2

$$\sin x + \cos x = 0 \text{에서 } \sin x = -\cos x \quad \dots\dots ㉑$$


$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\cos x \neq 0$ 이므로 ㉑의 양변을 $\cos x$ 로 나누면

$$\frac{\sin x}{\cos x} = -1 \quad \therefore \tan x = -1$$

오른쪽 그림과 같이 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 에서

함수 $y = \tan x$ 의 그래프와 직선 $y = -1$ 의 교점의 x 좌표는 $-\frac{\pi}{4}$ 이므로

$$x = -\frac{\pi}{4}$$



50-1 ㉔ 3

$$2 \sin x = \sqrt{3} \tan x \text{에서 } 2 \sin x = \sqrt{3} \times \frac{\sin x}{\cos x}$$

이때 $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\cos x \neq 0$ 이므로 양변에 $\cos x$ 를 곱하면

$$2 \sin x \cos x = \sqrt{3} \sin x, \sin x (2 \cos x - \sqrt{3}) = 0$$

$$\therefore \sin x = 0 \text{ 또는 } \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(i) $\sin x = 0$ 일 때, $x = 0$

(ii) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때, $x = \frac{\pi}{6}$

(i), (ii)에서 모든 근의 합은

$$0 + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

51 ㉔ 7/2 pi

$$2 \cos^2 x + \sin x - 1 = 0 \text{에서 } 2(1 - \sin^2 x) + \sin x - 1 = 0$$

$$2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0, (2 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0$$

$$\therefore \sin x = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } \sin x = 1$$

(i) $\sin x = -\frac{1}{2}$ 일 때

$$0 \leq x < 2\pi \text{이므로}$$


$$x = \frac{7}{6}\pi \text{ 또는 } x = \frac{11}{6}\pi$$

(ii) $\sin x = 1$ 일 때

$$0 \leq x < 2\pi \text{이므로 } x = \frac{\pi}{2}$$

(i), (ii)에서 모든 근의 합은

$$\frac{7}{6}\pi + \frac{11}{6}\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{7}{2}\pi$$



51-1 ㉔ 2pi

$$2 \sin^2 x + 3 \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = 3 \text{에서}$$

$$2(1 - \cos^2 x) + 3 \cos x - 3 = 0$$

$$2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0, (2 \cos x - 1)(\cos x - 1) = 0$$

$$\therefore \cos x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \cos x = 1$$

(i) $\cos x = \frac{1}{2}$ 일 때

$$0 \leq x < 2\pi \text{이므로}$$


$$x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{5}{3}\pi$$

(ii) $\cos x = 1$ 일 때

$$0 \leq x < 2\pi \text{이므로 } x = 0$$

(i), (ii)에서 모든 근의 합은

$$\frac{\pi}{3} + \frac{5}{3}\pi + 0 = 2\pi$$



52 ㉔ -sqrt(3)/3

$$4 \sin^2 A - 4 \cos A - 5 = 0 \text{에서 } 4(1 - \cos^2 A) - 4 \cos A - 5 = 0$$

$$4 \cos^2 A + 4 \cos A + 1 = 0, (2 \cos A + 1)^2 = 0$$

$$\therefore \cos A = -\frac{1}{2}$$

$$0 < A < \pi \text{이므로 } A = \frac{2}{3}\pi$$

이때 $A + B + C = \pi$ 이므로

$$B + C = \pi - A = \pi - \frac{2}{3}\pi = \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore \tan\left(\pi - \frac{B+C}{2}\right) = \tan\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\tan \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

52-1 ㉔ -sqrt(3)/2

$$A + B + C = \pi \text{이므로 } B + C = \pi - A$$

$$4 \sin^2(B+C) - 4 \cos A - 1 = 0 \text{에서}$$

$$4 \sin^2(\pi - A) - 4 \cos A - 1 = 0$$

$$4 \sin^2 A - 4 \cos A - 1 = 0, 4(1 - \cos^2 A) - 4 \cos A - 1 = 0$$

$$4 \cos^2 A + 4 \cos A - 3 = 0, (2 \cos A - 1)(2 \cos A + 3) = 0$$

$$\therefore \cos A = \frac{1}{2} (\because -1 < \cos A < 1)$$

$$0 < A < \pi \text{이므로 } A = \frac{\pi}{3}$$

..... ㉑

이때 $A+B+C=\pi$ 이므로

$$B+C=\pi-A=\pi-\frac{\pi}{3}=\frac{2}{3}\pi$$

$$\begin{aligned}\therefore \sin\left(\pi+\frac{B+C}{2}\right) &= \sin\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right) = -\sin\frac{\pi}{3} \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

..... ②

채점 기준	비율
① A의 값을 구할 수 있다.	60%
② $\sin\left(\pi+\frac{B+C}{2}\right)$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

53 ㉮ $\frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned}\cos x &= \sin x + 1 \text{의 양변을 제곱하면 } \cos^2 x = (\sin x + 1)^2 \\ \cos^2 x &= \sin^2 x + 2\sin x + 1, 1 - \sin^2 x = \sin^2 x + 2\sin x + 1 \\ 2\sin^2 x + 2\sin x &= 0, 2\sin x(\sin x + 1) = 0\end{aligned}$$


$$\therefore \sin x = 0 \text{ 또는 } \sin x = -1$$

(i) $\sin x = 0$ 일 때

$$0 < x < 2\pi \text{이므로 } x = \pi$$

(ii) $\sin x = -1$ 일 때

$$0 < x < 2\pi \text{이므로 } x = \frac{3}{2}\pi$$



(i), (ii)에서 두 근의 차는

$$\frac{3}{2}\pi - \pi = \frac{\pi}{2}$$

53-1 ㉮ ③

$$\frac{3\sin\theta}{\cos\theta} + 2\cos\theta = 0 \text{에서 } \cos\theta \neq 0 \text{이므로 양변에 } \cos\theta \text{를 곱하면}$$

$$3\sin\theta + 2\cos^2\theta = 0, 3\sin\theta + 2(1 - \sin^2\theta) = 0$$

$$2\sin^2\theta - 3\sin\theta - 2 = 0, (2\sin\theta + 1)(\sin\theta - 2) = 0$$


$$\therefore \sin\theta = -\frac{1}{2} \quad (\because -1 \leq \sin\theta \leq 1)$$

$$0 \leq \theta < 2\pi \text{이므로}$$

$$\theta = \frac{7}{6}\pi \text{ 또는 } \theta = \frac{11}{6}\pi$$

따라서 모든 근의 합은


$$\frac{7}{6}\pi + \frac{11}{6}\pi = 3\pi$$



54 ㉮ ③

$$2\pi \sin x = x \text{에서 } \sin x = \frac{1}{2\pi}x$$


즉 방정식 $\sin x = \frac{1}{2\pi}x$ 의 실근은 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2\pi}x$ 의 교점의 x 좌표와 같다.



위의 그림에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2\pi}x$ 의 교점의 개수는 3이므로 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

54-1 ㉮ 7

방정식 $\sin \pi x = \frac{1}{4}x$ 의 실근은 함수 $y = \sin \pi x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{4}x$ 의 교점의 x 좌표와 같다.



위의 그림에서 함수 $y = \sin \pi x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{4}x$ 의 교점의 개수는 7이므로 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 7이다.

55 ㉮ 4

$$(\sin x - \cos x) \cos x = 0 \text{에서}$$

$$\sin x = \cos x \text{ 또는 } \cos x = 0$$

(i) $\sin x = \cos x$ 일 때

$$0 < x < 2\pi \text{이므로 } x = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } x = \frac{5}{4}\pi$$

(ii) $\cos x = 0$ 일 때

$$0 < x < 2\pi \text{이므로 } x = \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } x = \frac{3}{2}\pi$$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

55-1 ㉮ 4

$$(\tan x - 1)(2\sin x - 1) = 0 \text{에서}$$

$$\tan x = 1 \text{ 또는 } \sin x = \frac{1}{2}$$

(i) $\tan x = 1$ 일 때

$$0 < x < 2\pi \text{이므로 } x = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } x = \frac{5}{4}\pi$$

(ii) $\sin x = \frac{1}{2}$ 일 때

$$0 < x < 2\pi \text{이므로 } x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{5}{6}\pi$$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

56 ㉮ 3

방정식 $|\cos 3x| = \frac{3}{\pi}x$ 의 실근은 함수 $y = |\cos 3x|$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{3}{\pi}x$ 의 교점의 x 좌표와 같다.


오른쪽 그림에서 함수

$y = |\cos 3x|$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{3}{\pi}x$ 의 교점의 개수는 3이므로

주어진 방정식의 서로 다른 실근의


개수는 3이다.



56-1 ㉮ 6

방정식 $|\sin x| = \frac{1}{9}x$ 의 실근은 함수 $y = |\sin x|$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{9}x$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

오른쪽 그림에서 함수 $y = |\sin x|$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{9}x$ 의 교점의 개수는 6이므로 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 6이다.



57 ㉡ $-2 \leq k \leq 2$

$$\cos^2 x - 2 \sin x - k = 0$$

$$1 - \sin^2 x - 2 \sin x - k = 0$$

$$\therefore -\sin^2 x - 2 \sin x + 1 = k$$


주어진 방정식이 실근을 가지려면 함수 $y = -\sin^2 x - 2 \sin x + 1$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점이 존재해야 한다.

$y = -\sin^2 x - 2 \sin x + 1$ 에서 $\sin x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = -t^2 - 2t + 1 = -(t+1)^2 + 2$$

오른쪽 그림에서 주어진 방정식이 실근을 가지려면

$$-2 \leq k \leq 2$$



57-1 ㉡ $-5 \leq k \leq 3$

$$2 \sin^2 x + 4 \cos x - 1 = k$$

$$2(1 - \cos^2 x) + 4 \cos x - 1 = k$$

$$\therefore -2 \cos^2 x + 4 \cos x + 1 = k$$

주어진 방정식이 실근을 가지려면 함수 $y = -2 \cos^2 x + 4 \cos x + 1$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점이 존재해야 한다.


$$y = -2 \cos^2 x + 4 \cos x + 1$$

$$\cos x = t \text{라 하면 } -1 \leq t \leq 1 \text{이고}$$

$$y = -2t^2 + 4t + 1 = -2(t-1)^2 + 3$$

오른쪽 그림에서 주어진 방정식이 실근을 가지려면

$$-5 \leq k \leq 3$$



58 ㉡ $\frac{9}{4}$

$$-\cos^2\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) + \cos(\pi + x) + k - 1 = 0$$

$$-(-\sin^2 x) - \cos x + k - 1 = 0$$

$$\sin^2 x + \cos x + 1 = k, 1 - \cos^2 x + \cos x + 1 = k$$

$$\therefore -\cos^2 x + \cos x + 2 = k$$

주어진 방정식이 실근을 가지려면 함수 $y = -\cos^2 x + \cos x + 2$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점이 존재해야 한다.


$$y = -\cos^2 x + \cos x + 2 \text{에서 } \cos x = t \text{라 하면 } -1 \leq t \leq 1 \text{이고}$$

$$y = -t^2 + t + 2 = -\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$$

오른쪽 그림에서 주어진 방정식이

$$\text{실근을 가지려면 } 0 \leq k \leq \frac{9}{4}$$

따라서 실수 k 의 최댓값은 $\frac{9}{4}$ 이다.



58-1 ㉡ -2

$$\cos^2 x + 2 \sin(\pi + x) + k = 0$$

$$1 - \sin^2 x - 2 \sin x + k = 0$$

$$\therefore \sin^2 x + 2 \sin x - 1 = k$$


주어진 방정식이 실근을 가지려면 함수 $y = \sin^2 x + 2 \sin x - 1$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점이 존재해야 한다.

$y = \sin^2 x + 2 \sin x - 1$ 에서 $\sin x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = t^2 + 2t - 1 = (t+1)^2 - 2$$

오른쪽 그림에서 주어진 방정식이 실근을 가지려면 $-2 \leq k \leq 2$

따라서 실수 k 의 최솟값은 -2 이다.



59 ㉡ -9

$$2 \sin x + \cos\left(\frac{3}{2}\pi + x\right) = a$$

$$2 \sin x + \sin x = a \quad \therefore 3 \sin x = a$$


주어진 방정식이 하나의 실근을 가지려면 함수 $y = 3 \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 가 한 점에서 만나야 한다. ①

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = 3 \sin x$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 함수 $y = 3 \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 가 한 점에서 만나려면

$$a = -3 \text{ 또는 } a = 3 \quad \dots\dots ②$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 곱은

$$-3 \times 3 = -9 \quad \dots\dots ③$$



채점 기준	비율
① 주어진 방정식이 하나의 실근을 가질 조건을 알 수 있다.	40%
② a 의 값을 구할 수 있다.	50%
③ 모든 실수 a 의 값의 곱을 구할 수 있다.	10%

59-1 ㉡ 1

$$\cos(\pi + x) \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 1 = k$$

$$-\cos x \times \cos x + 1 = k$$


$$\therefore -\cos^2 x + 1 = k$$

주어진 방정식이 하나의 실근을 가지려면 함수 $y = -\cos^2 x + 1$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 한 점에서 만나야 한다.

$$y = -\cos^2 x + 1 \text{에서 } \cos x = t \text{라 하면}$$

$$-1 \leq t \leq 1 \text{이고 } y = -t^2 + 1$$

오른쪽 그림에서 주어진 방정식이 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 값은 1이다.



60 ㉡ $0 < x < \frac{\pi}{3}$

$$2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) > \sqrt{3} \text{에서 } \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) > \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x + \frac{\pi}{3} = t \text{라 하면 } 0 \leq x < 2\pi \text{에서 } \frac{\pi}{3} \leq t < \frac{7}{3}\pi$$


$$\text{이때 주어진 부등식은 } \sin t > \frac{\sqrt{3}}{2}$$

오른쪽 그림에서 t 의 값의 범위는

$$\frac{\pi}{3} < t < \frac{2}{3}\pi \text{이므로}$$

$$\frac{\pi}{3} < x + \frac{\pi}{3} < \frac{2}{3}\pi$$

$$\therefore 0 < x < \frac{\pi}{3}$$



60-1 ㉔ $0 \leq x < \frac{5}{6}\pi$ 또는 $\frac{7}{6}\pi < x < 2\pi$

$2 \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) < \sqrt{3}$ 에서 $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) < \frac{\sqrt{3}}{2}$

$x - \frac{\pi}{2} = t$ 라 하면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $-\frac{\pi}{2} \leq t < \frac{3}{2}\pi$

이때 주어진 부등식은 $\sin t < \frac{\sqrt{3}}{2}$

오른쪽 그림에서 t 의 값의 범위는


$-\frac{\pi}{2} \leq t < \frac{\pi}{3}$ 또는 $\frac{2}{3}\pi < t < \frac{3}{2}\pi$

이므로

$-\frac{\pi}{2} \leq x - \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{3}$ 또는

$\frac{2}{3}\pi < x - \frac{\pi}{2} < \frac{3}{2}\pi$

$\therefore 0 \leq x < \frac{5}{6}\pi$ 또는 $\frac{7}{6}\pi < x < 2\pi$



61 ㉔ $\frac{5}{6}\pi$

$2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \leq -1$ 에서 $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \leq -\frac{1}{2}$

$x - \frac{\pi}{6} = t$ 라 하면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $-\frac{\pi}{6} \leq t < \frac{11}{6}\pi$

이때 주어진 부등식은 $\cos t \leq -\frac{1}{2}$


오른쪽 그림에서 t 의 값의 범위는

$\frac{2}{3}\pi \leq t < \frac{4}{3}\pi$ 이므로

$\frac{2}{3}\pi \leq x - \frac{\pi}{6} < \frac{4}{3}\pi$

$\therefore \frac{5}{6}\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi$

따라서 실수 x 의 최솟값은 $\frac{5}{6}\pi$ 이다.



61-1 ㉔ $\frac{4}{3}\pi$


$2 \cos x - 1 > 0$ 에서 $\cos x > \frac{1}{2}$

오른쪽 그림에서 x 의 값의 범위는

$0 \leq x < \frac{\pi}{3}$ 또는 $\frac{5}{3}\pi < x < 2\pi$

따라서 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $\beta = \frac{5}{3}\pi$ 이므로

$\beta - \alpha = \frac{5}{3}\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi$



62 ㉔ $\frac{\pi}{2} < x < \frac{2}{3}\pi$


$\sin x + \sqrt{3} \cos x > 0$ 에서 $\sin x > -\sqrt{3} \cos x$

$\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 에서 $\cos x < 0$ 이므로 양변을 $\cos x$ 로 나누면

$\frac{\sin x}{\cos x} < -\sqrt{3}$ $\therefore \tan x < -\sqrt{3}$

오른쪽 그림에서 x 의 값의 범위는

$\frac{\pi}{2} < x < \frac{2}{3}\pi$




62-1 ㉔ $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{2}{3}\pi < x < \pi$

주어진 부등식의 해는 함수 $y = \tan x$ 의 그래프가 두 직선 $y = -\sqrt{3}$ 과 $y = 1$ 사이에 있는 x 의 값의 범위이다.

오른쪽 그림에서 x 의 값의 범위는

$0 \leq x < \frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{2}{3}\pi < x < \pi$



63 ㉔ $\frac{2}{3}\pi$

$2 \cos^2 x - \sin x - 1 < 0$ 에서 $2(1 - \sin^2 x) - \sin x - 1 < 0$

$2 \sin^2 x + \sin x - 1 > 0$, $(\sin x + 1)(2 \sin x - 1) > 0$

이때 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\sin x + 1 \geq 0$ 이므로


$2 \sin x - 1 > 0$ $\therefore \sin x > \frac{1}{2}$

오른쪽 그림에서 x 의 값의 범위는

$\frac{\pi}{6} < x < \frac{5}{6}\pi$

따라서 $\alpha = \frac{\pi}{6}$, $\beta = \frac{5}{6}\pi$ 이므로

$\beta - \alpha = \frac{5}{6}\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{2}{3}\pi$



63-1 ㉔ $\frac{7}{6}\pi < x < \frac{11}{6}\pi$

$2 \cos^2 x - 5 \sin x - 4 > 0$ 에서 $2(1 - \sin^2 x) - 5 \sin x - 4 > 0$


$2 \sin^2 x + 5 \sin x + 2 < 0$, $(2 \sin x + 1)(\sin x + 2) < 0$

이때 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\sin x + 2 > 0$ 이므로

$2 \sin x + 1 < 0$ $\therefore \sin x < -\frac{1}{2}$

오른쪽 그림에서 x 의 값의 범위는

$\frac{7}{6}\pi < x < \frac{11}{6}\pi$



64 ㉔ ③

$2 \sin^2 x + 3 \cos x \leq 0$ 에서 $2(1 - \cos^2 x) + 3 \cos x \leq 0$


$2 \cos^2 x - 3 \cos x - 2 \geq 0$, $(2 \cos x + 1)(\cos x - 2) \geq 0$

이때 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\cos x - 2 < 0$ 이므로

$2 \cos x + 1 \leq 0$ $\therefore \cos x \leq -\frac{1}{2}$

오른쪽 그림에서 x 의 값의 범위는

$\frac{2}{3}\pi \leq x \leq \frac{4}{3}\pi$



64-1 ㉔ $\frac{4}{3}\pi$

$2 \sin^2 x + 5 \cos x > 4$ 에서 $2(1 - \cos^2 x) + 5 \cos x > 4$

$2 \cos^2 x - 5 \cos x + 2 < 0$, $(2 \cos x - 1)(\cos x - 2) < 0$

이때 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\cos x - 2 < 0$ 이므로


$2 \cos x - 1 > 0$ $\therefore \cos x > \frac{1}{2}$

오른쪽 그림에서 x 의 값의 범위는

$$0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \frac{5}{3}\pi < x \leq 2\pi$$

따라서 $\alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = \frac{5}{3}\pi$ 이므로

$$\beta - \alpha = \frac{5}{3}\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi$$



65 ㉠ $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ 또는 $\frac{5}{3}\pi \leq x < 2\pi$

$$2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} + x \right) - 3 \cos (\pi + x) - 3 \geq 0 \text{에서}$$


$$2(-\sin x)^2 + 3 \cos x - 3 \geq 0, 2 \sin^2 x + 3 \cos x - 3 \geq 0$$

$$2(1 - \cos^2 x) + 3 \cos x - 3 \geq 0, 2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 \leq 0$$

$$(2 \cos x - 1)(\cos x - 1) \leq 0 \quad \therefore \frac{1}{2} \leq \cos x \leq 1$$

오른쪽 그림에서 x 의 값의 범위는

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \frac{5}{3}\pi \leq x < 2\pi$$



65-1 ㉠ $0 \leq x \leq \frac{2}{3}\pi$ 또는 $\frac{4}{3}\pi \leq x < 2\pi$

$$\cos^2 x - \sin^2 x - 5 \sin \left(\frac{3}{2}\pi - x \right) + 3 \geq 0 \text{에서}$$

$$\cos^2 x - (1 - \cos^2 x) + 5 \cos x + 3 \geq 0$$

$$2 \cos^2 x + 5 \cos x + 2 \geq 0$$


$$(2 \cos x + 1)(\cos x + 2) \geq 0$$

이때 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\cos x + 2 > 0$ 이므로

$$2 \cos x + 1 \geq 0 \quad \therefore \cos x \geq -\frac{1}{2}$$

오른쪽 그림에서 x 의 값의 범위는

$$0 \leq x \leq \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } \frac{4}{3}\pi \leq x < 2\pi$$



유형 완성하기

p. 171

66 ㉠ ③

이차방정식 $x^2 - 4x \cos \theta + 1 = 0$ 이 중근을 가지므로 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-2 \cos \theta)^2 - 1 = 0, 4 \cos^2 \theta - 1 = 0$$

$$(2 \cos \theta + 1)(2 \cos \theta - 1) = 0$$

$$\therefore \cos \theta = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } \cos \theta = \frac{1}{2}$$


(i) $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ 일 때

$$0 \leq \theta < 2\pi \text{이므로}$$

$$\theta = \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } \theta = \frac{4}{3}\pi$$

(ii) $\cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때

$$0 \leq \theta < 2\pi \text{이므로}$$



$$\theta = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \theta = \frac{5}{3}\pi$$

(i), (ii)에서 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 또는 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 또는 $\theta = \frac{4}{3}\pi$ 또는 $\theta = \frac{5}{3}\pi$ 이므로 θ 의 값이 아닌 것은 ③이다.

67 ㉠ ⑤

이차함수 $y = x^2 - 2x \sin \theta - (\cos \theta + 1)$ 의 그래프가 x 축에 접하므로 이차방정식 $x^2 - 2x \sin \theta - (\cos \theta + 1) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-\sin \theta)^2 + \cos \theta + 1 = 0, \sin^2 \theta + \cos \theta + 1 = 0$$

$$1 - \cos^2 \theta + \cos \theta + 1 = 0, \cos^2 \theta - \cos \theta - 2 = 0$$

$$(\cos \theta + 1)(\cos \theta - 2) = 0$$

이때 $0 \leq \theta \leq \pi$ 에서 $\cos \theta - 2 \neq 0$ 이므로

$$\cos \theta + 1 = 0, \cos \theta = -1 \quad \therefore \theta = \pi$$

68 ㉠ $\frac{\pi}{6}$

$$y = x^2 - 2x \sin \theta + \cos^2 \theta$$

$$= (x - \sin \theta)^2 - \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$$

이므로 꼭짓점의 좌표는 $(\sin \theta, -\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)$

꼭짓점이 직선 $y = x$ 위에 있으므로

$$-\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \sin \theta, -\sin^2 \theta + (1 - \sin^2 \theta) = \sin \theta$$

$$2 \sin^2 \theta + \sin \theta - 1 = 0, (2 \sin \theta - 1)(\sin \theta + 1) = 0$$

이때 $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin \theta + 1 \neq 0$ 이므로

$$2 \sin \theta - 1 = 0, \sin \theta = \frac{1}{2} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{6}$$

69 ㉠ π

모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 4x \cos \theta + 6 \sin \theta \geq 0$ 이 성립하므로 이차방정식 $x^2 - 4x \cos \theta + 6 \sin \theta = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-2 \cos \theta)^2 - 6 \sin \theta \leq 0, 2 \cos^2 \theta - 3 \sin \theta \leq 0$$

$$2(1 - \sin^2 \theta) - 3 \sin \theta \leq 0, 2 \sin^2 \theta + 3 \sin \theta - 2 \geq 0$$

$$(\sin \theta + 2)(2 \sin \theta - 1) \geq 0$$

이때 $0 \leq \theta \leq \pi$ 에서 $\sin \theta + 2 > 0$ 이므로


$$2 \sin \theta - 1 \geq 0 \quad \therefore \sin \theta \geq \frac{1}{2}$$

오른쪽 그림에서 θ 의 값의 범위는

$$\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{5}{6}\pi$$

따라서 $\alpha = \frac{\pi}{6}, \beta = \frac{5}{6}\pi$ 이므로

$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{6} + \frac{5}{6}\pi = \pi$$



70 ㉠ $\frac{7}{6}\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 또는 $\frac{3}{2}\pi < \theta < \frac{11}{6}\pi$

이차방정식 $x^2 + 4x \cos \theta + 6 \sin \theta + 6 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지므로 이차방정식의 판별식을 D 라 하면


$$\frac{D}{4} = 4 \cos^2 \theta - (6 \sin \theta + 6) > 0, 4(1 - \sin^2 \theta) - 6 \sin \theta - 6 > 0$$

$$2 \sin^2 \theta + 3 \sin \theta + 1 < 0, (\sin \theta + 1)(2 \sin \theta + 1) < 0$$

$$\therefore -1 < \sin \theta < -\frac{1}{2}$$

오른쪽 그림에서 θ 의 값의 범위는

$$\frac{7}{6}\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \quad \text{또는} \quad \frac{3}{2}\pi < \theta < \frac{11}{6}\pi$$



71 ㉠ $0 \leq \theta < \frac{5}{4}\pi$ 또는 $\frac{7}{4}\pi < \theta < 2\pi$

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 2x \sin \theta - \cos^2 \theta \\ &= x^2 - 2x \sin \theta - (1 - \sin^2 \theta) \\ &= (x - \sin \theta)^2 - 1 \end{aligned}$$


이므로 꼭짓점의 좌표는 $(\sin \theta, -1)$

꼭짓점이 직선 $y = \sqrt{2}x$ 의 아래쪽에 있으므로

$$-1 < \sqrt{2} \sin \theta \quad \therefore \sin \theta > -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

오른쪽 그림에서 θ 의 값의 범위는

$$0 \leq \theta < \frac{5}{4}\pi \quad \text{또는} \quad \frac{7}{4}\pi < \theta < 2\pi$$



학교 시험 대비 문제

p. 172~175

01 ㉠ ㉡

함수 $f(x)$ 의 주기가 p 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+p) = f(x)$$

$$\text{따라서 } f(3p) = f(2p+p) = f(2p) = f(p+p) = f(p) = f(0)$$

이므로

$$f(3p) = f(0) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

02 ㉠ ㉡

함수 $y = \sin 4x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $a\pi$ 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y - b = \sin 4(x - a\pi) \quad \therefore y = \sin(4x - 4a\pi) + b$$

$$\text{이때 } y = \sin\left(4x - \frac{\pi}{2}\right) + 1 = \sin(4x - 4a\pi) + b \text{ 이므로}$$

$$4a\pi = \frac{\pi}{2}, b = 1 \quad \therefore a = \frac{1}{8}, b = 1$$

$$\therefore 8ab = 8 \times \frac{1}{8} \times 1 = 1$$

03 ㉠ ㉡

함수 $y = \tan x$ 의 주기는 π 이다.

$$\neg. \text{ 주기는 } \frac{2\pi}{2} = \pi \quad \neg. \text{ 주기는 } \pi$$

$$\text{ㄷ. 주기는 } 2\pi \quad \text{ㄹ. 주기는 } \pi$$

따라서 함수 $y = \tan x$ 와 주기가 같은 함수는 $\neg, \neg, \text{ㄹ}$ 이다.

04 ㉠ ㉡

$$\textcircled{1} \text{ 주기는 } \frac{2\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi$$

$$\textcircled{2} \text{ 최댓값은 } 2+1=3$$

$$\textcircled{3} \text{ 최솟값은 } -2+1=-1$$

$$\textcircled{4} x=0 \text{ 을 대입하면 } y=2 \cos(-\pi)+1=-2+1=-1$$

즉 주어진 함수의 그래프는 점 $(0, -1)$ 을 지난다.

$$\textcircled{5} y=2 \cos(3x-\pi)+1=2 \cos 3\left(x-\frac{\pi}{3}\right)+1 \text{ 의 그래프는}$$

$$y=2 \cos 3x \text{ 의 그래프를 } x \text{ 축의 방향으로 } \frac{\pi}{3} \text{ 만큼, } y \text{ 축의 방향}$$

으로 1만큼 평행이동한 것이다.

따라서 옳지 않은 것은 ㉡이다.

05 ㉠ $-\frac{3}{4}$

$$\text{함수 } f(x) = \sin \pi x \text{ 의 주기는 } \frac{2\pi}{\pi} = 2 \text{ 이므로}$$

$$b=1-a, c=2+a$$

$$\text{이때 } a+b+c=a+(1-a)+(2+a)=3+a \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} f(a+b+c) &= f(3+a) = \sin(3\pi + a\pi) = -\sin a\pi \\ &= -f(a) = -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

06 ㉠ 15

$$f(x) = a \cos\left(\frac{\pi}{2} - bx\right) + c \text{ 에서 최댓값이 } 5 \text{ 이고 } a > 0 \text{ 이므로}$$

$$a+c=5$$

.....㉠

$$\text{주기가 } 2\pi \text{ 이고 } b > 0 \text{ 이므로 } \frac{2\pi}{b} = 2\pi \quad \therefore b=1$$

$$\text{즉 } f(x) = a \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + c \text{ 이고 } f\left(\frac{5}{6}\pi\right) = 3 \text{ 이므로}$$

$$3 = a \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + c, \frac{a}{2} + c = 3$$

$$\therefore a+2c=6$$

.....㉡

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ 을 연립하여 풀면 } a=4, c=1$$

$$\therefore 3a+2b+c=3 \times 4 + 2 \times 1 + 1 = 15$$

07 ㉠ ㉡

$$\text{함수 } y = \cos a(x+b) + 1 \text{ 의 주기가 } \frac{2}{3}\pi - \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \pi \text{ 이고 } a > 0$$

$$\text{이므로 } \frac{2\pi}{a} = \pi \quad \therefore a=2$$

즉 $y = \cos 2(x+b) + 1$ 의 그래프는 $y = \cos 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{3}$ 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것과 같으므로

$$y = \cos 2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 1 \quad \therefore b = \frac{\pi}{3} (\because 0 < b < \pi)$$

$$\therefore ab = 2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi$$

08 ㉠ $\frac{\pi}{3}$

$$\text{함수 } y = \left| \cos \frac{\pi}{3} x \right| \text{ 의 주기는 } \frac{\pi}{\frac{\pi}{3}} = 3$$

$$a > 0 \text{ 이므로 함수 } y = \tan ax \text{ 의 주기는 } \frac{\pi}{a}$$

$$\text{즉 } 3 = \frac{\pi}{a} \text{ 이므로 } a = \frac{\pi}{3}$$

09 ㉓ ③

$\frac{\pi}{4} + x = \theta$ 라 하면 $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}$ 에서 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

$\frac{\pi}{4} - x = \frac{\pi}{4} - (\theta - \frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2} - \theta$ 이므로

$\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{\tan \theta}$

$\therefore \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right) \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \tan \theta \times \frac{1}{\tan \theta} = 1$

10 ㉓ ③

$\theta = \frac{\pi}{18}$ 에서 $18\theta = \pi$ 이므로

$\cos 19\theta = \cos(18\theta + \theta) = \cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$

$\cos 20\theta = \cos(18\theta + 2\theta) = \cos(\pi + 2\theta) = -\cos 2\theta$

$\cos 21\theta = \cos(18\theta + 3\theta) = \cos(\pi + 3\theta) = -\cos 3\theta$

⋮

$\cos 36\theta = \cos(18\theta + 18\theta) = \cos(\pi + 18\theta) = -\cos 18\theta$

$\therefore \cos \theta + \cos 2\theta + \cos 3\theta + \cdots + \cos 36\theta$

$= (\cos \theta + \cos 19\theta) + (\cos 2\theta + \cos 20\theta)$

$+ (\cos 3\theta + \cos 21\theta) + \cdots + (\cos 18\theta + \cos 36\theta)$

$= (\cos \theta - \cos \theta) + (\cos 2\theta - \cos 2\theta)$

$+ (\cos 3\theta - \cos 3\theta) + \cdots + (\cos 18\theta - \cos 18\theta)$

$= 0$

11 ㉓ ③

삼각형 ABC에서 세 내각의 크기의 합은 π 이므로

$A + B + C = \pi$

ㄱ. $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로 $B = C$

$A + B + C = \pi$ 에서 $A + 2B = \pi$ 이므로 $A = \pi - 2B$

$\therefore \sin A = \sin(\pi - 2B) = \sin 2B$

ㄴ. ㄱ에서 $A = \pi - 2B$ 이므로

$\cos \frac{A}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - B\right) = \sin B$

ㄷ. ㄱ에서 $A = \pi - 2B = \pi - 2C$ 이므로

$\tan A = \tan(\pi - 2C) = -\tan 2C$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

12 ㉓ 2

$-1 \leq \cos 2x \leq 1$ 이므로 $-3 \leq \cos 2x - 2 \leq -1$

$1 \leq |\cos 2x - 2| \leq 3, 3 \leq 3|\cos 2x - 2| \leq 9$

$\therefore 3 + k \leq 3|\cos 2x - 2| + k \leq 9 + k$

따라서 최댓값은 $9 + k$, 최솟값은 $3 + k$ 이므로

$9 + k + 3 + k = 16, 2k + 12 = 16$

$2k = 4 \quad \therefore k = 2$

13 ㉓ ②

$y = \cos^2 x + 2 \cos\left(\frac{3}{2}\pi + x\right) + k + 1$

$= (1 - \sin^2 x) + 2 \sin x + k + 1$

$= -\sin^2 x + 2 \sin x + k + 2$

$\sin x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는

$y = -t^2 + 2t + k + 2 = -(t - 1)^2 + k + 3$ 이므로

$t = -1$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $k - 1$

즉 $k - 1 = 1$ 이므로 $k = 2$

14 ㉓ 0

$\tan x = t$ 라 하면 $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 에서 $-1 \leq t \leq 1$

이때 주어진 함수는

$y = \frac{2t-1}{t-2} = \frac{2(t-2)+3}{t-2} = \frac{3}{t-2} + 2$ 이므로


$t = -1$ 일 때 최대이고, 최댓값 M 은

$M = 1$

$t = 1$ 일 때 최소이고, 최솟값 m 은

$m = -1$

$\therefore M + m = 1 + (-1) = 0$



15 ㉓ $-\sqrt{3}$

$4 \cos^2 A + 4 \sin A - 5 = 0$ 에서 $4(1 - \sin^2 A) + 4 \sin A - 5 = 0$

$4 \sin^2 A - 4 \sin A + 1 = 0, (2 \sin A - 1)^2 = 0$

$\therefore \sin A = \frac{1}{2}$

$0 < A < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $A = \frac{\pi}{6}$

이때 $A + B + C = \pi$ 이므로


$B + C = \pi - A = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$

$\therefore \tan\left(\frac{\pi}{2} - B - C\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{5\pi}{6}\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

$= -\tan \frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$

16 ㉓ ③

방정식 $\sin 2x = \cos 3x$ 의 실근은 두 함수 $y = \sin 2x, y = \cos 3x$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.



위의 그림과 같이 $0 < x < 2\pi$ 에서 두 함수 $y = \sin 2x, y = \cos 3x$ 의 그래프의 교점의 개수는 6이므로 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 6이다.

17 ㉓ ①

$\cos^2 x + 2 \sin x - a = 0$ 에서 $1 - \sin^2 x + 2 \sin x - a = 0$

$\therefore -\sin^2 x + 2 \sin x + 1 = a$

주어진 방정식이 실근을 가지려면 함수 $y = -\sin^2 x + 2 \sin x + 1$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점이 존재해야 한다.


$y = -\sin^2 x + 2 \sin x + 1$ 에서 $\sin x = t$ 라

하면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$y = -t^2 + 2t + 1 = -(t - 1)^2 + 2$

오른쪽 그림에서 주어진 방정식이 실근을 가지려면

$-2 \leq a \leq 2$




18 ㉮ $\frac{2}{3}\pi \leq x < \pi$

$\frac{\pi}{2} < x < \pi$ 에서 $\cos x < 0$ 이므로 $\sin x + \sqrt{3} \cos x \leq 0$ 의 양변을 $\cos x$ 로 나누면

$$\frac{\sin x}{\cos x} + \sqrt{3} \geq 0 \quad \therefore \tan x \geq -\sqrt{3}$$

오른쪽 그림에서 x 의 값의 범위는

$$\frac{2}{3}\pi \leq x < \pi$$



19 ㉮ $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ 또는 $\frac{5}{3}\pi \leq x < 2\pi$

$$2 \sin^2 x - 5 \cos x + 1 \leq 0 \text{에서 } 2(1 - \cos^2 x) - 5 \cos x + 1 \leq 0$$


$$2 \cos^2 x + 5 \cos x - 3 \geq 0, (\cos x + 3)(2 \cos x - 1) \geq 0$$

이때 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\cos x + 3 > 0$ 이므로

$$2 \cos x - 1 \geq 0 \quad \therefore \cos x \geq \frac{1}{2}$$

오른쪽 그림에서 x 의 값의 범위는

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \frac{5}{3}\pi \leq x < 2\pi$$



20 ㉮ $\frac{5}{2}\pi$

$$y = x^2 - 2x \sin \theta + \cos^2 \theta$$

$$= (x - \sin \theta)^2 - \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$$

이므로 꼭짓점의 좌표는 $(\sin \theta, -\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)$

꼭짓점이 직선 $y = 2x + 1$ 위에 있으므로

$$-\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 2 \sin \theta + 1, -\sin^2 \theta + 1 - \sin^2 \theta = 2 \sin \theta + 1$$

$$2 \sin^2 \theta + 2 \sin \theta = 0, 2 \sin \theta (\sin \theta + 1) = 0$$

$$\therefore \sin \theta = 0 \text{ 또는 } \sin \theta = -1$$

(i) $\sin \theta = 0$ 일 때

$$0 \leq \theta < 2\pi \text{이므로}$$

$$\theta = 0 \text{ 또는 } \theta = \pi$$


(ii) $\sin \theta = -1$ 일 때

$$0 \leq \theta < 2\pi \text{이므로}$$

$$\theta = \frac{3}{2}\pi$$

(i), (ii)에서 모든 θ 의 값의 합은

$$0 + \pi + \frac{3}{2}\pi = \frac{5}{2}\pi$$



21 ㉮ 3

모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2(2 \cos \theta + 1)x + 4 > 0$ 이 항상 성립하므로 이차방정식 $x^2 - 2(2 \cos \theta + 1)x + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = \{-(2 \cos \theta + 1)\}^2 - 4 < 0$$

$$4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta - 3 < 0$$

$$(2 \cos \theta + 3)(2 \cos \theta - 1) < 0$$

이때 $0 \leq \theta < \pi$ 에서 $2 \cos \theta + 3 > 0$ 이므로


$$2 \cos \theta - 1 < 0 \quad \therefore \cos \theta < \frac{1}{2}$$

오른쪽 그림에서 θ 의 값의 범위는

$$\frac{\pi}{3} < \theta < \pi$$

따라서 $\alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = \pi$ 이므로

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{\pi}{\frac{\pi}{3}} = 3$$



서술형 1 ㉮ 36

$y = a \sin\left(bx + \frac{\pi}{c}\right) + d$ 의 최댓값이 4, 최솟값이 -2 이고 $a > 0$ 이므로

$$a + d = 4, -a + d = -2$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a = 3, d = 1$$

..... ①

주기가 $\frac{7}{6}\pi - \frac{\pi}{6} = \pi$ 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = \pi \quad \therefore b = 2$$

..... ②

즉 $y = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{c}\right) + 1$ 이고 이 함수의 그래프가 점 $\left(0, \frac{5}{2}\right)$ 를

$$\text{지나므로 } \frac{5}{2} = 3 \sin \frac{\pi}{c} + 1$$

$$\sin \frac{\pi}{c} = \frac{1}{2} \quad \therefore c = 6 (\because c > 2)$$

..... ③

$$\therefore abcd = 3 \times 2 \times 6 \times 1 = 36$$

..... ④

채점 기준	비율
① a, d 의 값을 구할 수 있다.	30%
② b 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ c 의 값을 구할 수 있다.	30%
④ $abcd$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

서술형 2 ㉮ $x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{5}{6}\pi$

$\pi \sin x = t$ 라 하면 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 $0 \leq \sin x \leq 1$

$$\therefore 0 \leq t \leq \pi$$

..... ①

이때 주어진 방정식은 $\sin t = 1$

$$0 \leq t \leq \pi \text{이므로 } t = \frac{\pi}{2}$$

..... ②

$$\text{즉 } \pi \sin x = \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \sin x = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{5}{6}\pi$$

..... ③

채점 기준	비율
① $\pi \sin x = t$ 로 치환한 후 t 의 값의 범위를 구할 수 있다.	20%
② t 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ x 의 값을 구할 수 있다.	40%

서술형 3 ㉮ $0 \leq x \leq \frac{4}{3}\pi$

$x - \frac{\pi}{6} = t$ 라 하면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서

$$-\frac{\pi}{6} \leq t < \frac{11}{6}\pi$$

또 $x + \frac{\pi}{3} = x - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = t + \frac{\pi}{2}$ 이므로 주어진 부등식은

$$2 \cos^2 t + 5 \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - 4 \leq 0$$

$$2(1 - \sin^2 t) - 5 \sin t - 4 \leq 0$$

$$2\sin^2 t + 5\sin t + 2 \geq 0$$

$$(2\sin t + 1)(\sin t + 2) \geq 0 \quad \dots\dots ①$$

이때 $-\frac{\pi}{6} \leq t < \frac{11}{6}\pi$ 에서 $\sin t + 2 > 0$ 이므로


$$2\sin t + 1 \geq 0 \quad \therefore \sin t \geq -\frac{1}{2}$$

오른쪽 그림에서 t 의 값의 범위는

$$-\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{7}{6}\pi \text{이므로} \quad \dots\dots ②$$

$$-\frac{\pi}{6} \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{7}{6}\pi$$

$$\therefore 0 \leq x \leq \frac{4}{3}\pi \quad \dots\dots ③$$



채점 기준	비율
① $x - \frac{\pi}{6} = t$ 로 치환하여 주어진 부등식을 t 에 대한 부등식으로 변형할 수 있다.	40%
② t 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
③ x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	20%

10% 핵심 기출 문제

p. 176~177

01 ㉮ ③

$y = a \tan b\pi x$ 의 주기가 $8-2=6$ 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{\pi}{b\pi} = 6 \quad \therefore b = \frac{1}{6}$$

즉 $y = a \tan \frac{\pi}{6}x$ 이고 이 함수의 그래프가 점 $(2, 3)$ 을 지나므로

$$3 = a \tan \frac{\pi}{3}, \sqrt{3}a = 3 \quad \therefore a = \sqrt{3}$$

$$\therefore a^2b = (\sqrt{3})^2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

02 ㉮ 8

$f(x) = 3 \sin \frac{\pi(x+a)}{2} + b$ 의 최댓값이 5, 최솟값이 -1 이므로

$$3+b=5, -3+b=-1 \quad \therefore b=2$$

즉 함수 $f(x) = 3 \sin \frac{\pi(x+a)}{2} + 2$ 의 그래프는 함수

$y = 3 \sin \frac{\pi}{2}x + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-a$ 만큼 평행이동한 것이다.

이때 함수 $f(x)$ 의 주기가 4이므로 $f(x) = 3 \sin \frac{\pi(x+a)}{2} + 2$ 의

그래프를 평행이동하여 $y = 3 \sin \frac{\pi}{2}x + 2$ 의 그래프와 일치하려면

$a = 4k$ (k 는 정수)이어야 한다.


a 가 양수이므로 a 의 최솟값은 4이다.

따라서 ab 의 최솟값은

$$4 \times 2 = 8$$

03 ㉮ ⑤

직선 $y = -\frac{1}{5\pi}x + 1$ 과 함수 $y = \sin x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 직선 $y = -\frac{1}{5\pi}x + 1$ 과 함수 $y = \sin x$ 의 그래프의 교점의 개수는 11이다.

04 ㉮ ①

$3 + 2 \sin^2 \theta = t$ 라 하면

$$3 - 2 \cos^2 \theta = 3 - 2(1 - \sin^2 \theta) = 3 + 2 \sin^2 \theta - 2 = t - 2$$

$$\therefore 3 + 2 \sin^2 \theta + \frac{1}{3 - 2 \cos^2 \theta} = t + \frac{1}{(\text{가})t - 2}$$

$$0 < \theta < 2\pi \text{에서 } t \geq 3 \text{이므로 } (\text{가})t - 2 > 0$$

$t - 2 > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$t - 2 + \frac{1}{t - 2} \geq 2\sqrt{(t - 2) \times \frac{1}{t - 2}}$$

$$= 2$$

$$t + \frac{1}{(\text{가})t - 2} = t - 2 + \frac{1}{(\text{가})t - 2} + 2 \geq 4$$

이때 등호는 $t - 2 = \frac{1}{t - 2}$ 일 때 성립하므로

$$(t - 2)^2 = 1 \text{에서 } t^2 - 4t + 4 = 1$$

$$t^2 - 4t + 3 = 0, (t - 1)(t - 3) = 0$$

$$\therefore t = 1 \text{ 또는 } t = 3$$

$$\text{그런데 } t \geq 3 \text{이므로 } t = (\text{나})3$$

$$\text{즉 } 3 + 2 \sin^2 \theta = 3 \text{이므로 } \sin \theta = 0$$

$$\text{이때 } 0 < \theta < 2\pi \text{이므로 } \theta = \pi$$

$$\text{따라서 } 3 + 2 \sin^2 \theta + \frac{1}{3 - 2 \cos^2 \theta} \text{은 } \theta = (\text{다})\pi \text{에서 최솟값 } 4$$

를 갖는다.

$$\text{즉 } f(t) = t - 2, p = 3, q = \pi \text{이므로}$$

$$f(p) + \tan^2 \left(q + \frac{\pi}{3} \right) = f(3) + \tan^2 \left(\pi + \frac{\pi}{3} \right)$$


$$= 3 - 2 + \tan^2 \frac{\pi}{3}$$

$$= 1 + (\sqrt{3})^2 = 4$$

05 ㉮ ①

다음 그림과 같이 방정식 $\sin x = k$ 의 두 근 α, β 는 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 만나는 두 점의 x 좌표와 같으므로 두 점

$(\alpha, \sin \alpha), (\beta, \sin \beta)$ 는 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이다.



$$\approx \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \alpha + \beta = \pi \quad \therefore \beta = \pi - \alpha$$

$$\therefore \frac{\beta - \alpha}{2} = \frac{(\pi - \alpha) - \alpha}{2} = \frac{\pi}{2} - \alpha$$

$$\sin \frac{\beta - \alpha}{2} = \frac{5}{7} \text{에서 } \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \frac{5}{7}$$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{5}{7}$$

이때 $x = \alpha$ 는 방정식 $\sin x = k$ 의 근이므로 $\sin \alpha = k$

$$k^2 = \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{5}{7} \right)^2 = \frac{24}{49}$$


$$\therefore k = \frac{2\sqrt{6}}{7} \quad (\because 0 < k < 1)$$

06 ㉡ 24

$$4 \sin \frac{1}{4}(x - \pi) = 2 \text{에서 } \sin \frac{1}{4}(x - \pi) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4}(x - \pi) = t \text{라 하면 } 0 \leq x \leq 10\pi \text{에서 } -\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{9}{4}\pi$$

이때 주어진 방정식은 $\sin t = \frac{1}{2}$




즉 $-\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{9}{4}\pi$ 에서 함수 $y = \sin t$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 의 교점의 t 좌표가 $\frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi, \frac{13}{6}\pi$ 이므로

$$\frac{1}{4}(x - \pi) = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{1}{4}(x - \pi) = \frac{5}{6}\pi \text{ 또는 } \frac{1}{4}(x - \pi) = \frac{13}{6}\pi$$

$$\therefore x = \frac{5}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{13}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{29}{3}\pi$$

$0 \leq x \leq 10\pi$ 에서 곡선 $y = 4 \sin \frac{1}{4}(x - \pi)$ 와 직선 $y = 2$ 는 다음 그림과 같다.



$\triangle PAB$ 의 넓이가 최대하려면 밑변의 길이가 가장 길어야 하므로 두 점 A, B는 위의 그림과 같아야 하고, 높이도 가장 길어야 하므로 점 P는 y 좌표가 -4 인 점이어야 한다.

따라서 $\triangle PAB$ 의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{29}{3}\pi - \frac{5}{3}\pi \right) \times \{2 - (-4)\} = \frac{1}{2} \times 8\pi \times 6 = 24\pi$$

$$\therefore k = 24$$

07 ㉡ 6

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{에서 } \frac{\pi}{6} \leq x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{3}$$

즉 함수 $g(x) = 3 \tan \left(x + \frac{\pi}{6} \right)$ 는 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ 에서 증가함수이므로

$$3 \tan \frac{\pi}{6} \leq 3 \tan \left(x + \frac{\pi}{6} \right) \leq 3 \tan \frac{\pi}{3}$$

$$\sqrt{3} \leq 3 \tan \left(x + \frac{\pi}{6} \right) \leq 3\sqrt{3}$$

$$\therefore \sqrt{3} \leq g(x) \leq 3\sqrt{3}$$

$g(x) = t$ 라 하면 $\sqrt{3} \leq t \leq 3\sqrt{3}$ 이고

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(t) = \log_3 t + 2$$

$\sqrt{3} \leq t \leq 3\sqrt{3}$ 에서 함수 $f(t) = \log_3 t + 2$ 는 t 의 값이 증가하면 $f(t)$ 의 값도 증가하므로

$$\log_3 \sqrt{3} + 2 \leq \log_3 t + 2 \leq \log_3 3\sqrt{3} + 2$$

$$\frac{1}{2} + 2 \leq \log_3 t + 2 \leq \frac{3}{2} + 2$$


$$\therefore \frac{5}{2} \leq (f \circ g)(x) \leq \frac{7}{2}$$

따라서 $M = \frac{7}{2}, m = \frac{5}{2}$ 이므로

$$M + m = \frac{7}{2} + \frac{5}{2} = 6$$

08 ㉡ 5

함수 $y = \tan \pi x$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\pi} = 1$



위의 그림과 같이 $0 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = \tan \pi x$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{10}{3}x + n$ 이 서로 다른 세 점에서 만나려면 직선

$y = -\frac{10}{3}x + n$ 의 x 절편인 $\frac{3}{10}n$ 이 0보다 크거나 같고 2보다 작거나 같아야 하므로 $0 \leq \frac{3}{10}n \leq 2 \quad \therefore 0 \leq n \leq \frac{20}{3}$

따라서 자연수 n 의 최댓값은 6이다.

09 ㉡ 5

함수 $y = k \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) + k^2 - 6$ 의 그래프에서

(i) $k = 0$ 일 때

$y = -6$ 이므로 함수의 그래프는 제1사분면을 지나지 않는다.

(ii) $k > 0$ 일 때

$$y = k \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) + k^2 - 6 \text{의 최댓값은 } k + (k^2 - 6)$$

함수의 그래프가 제1사분면을 지나지 않으려면 최댓값이 0보다 작거나 같아야 하므로

$$k + (k^2 - 6) \leq 0, k^2 + k - 6 \leq 0$$

$$(k + 3)(k - 2) \leq 0 \quad \therefore -3 \leq k \leq 2$$

그런데 $k > 0$ 이므로 $0 < k \leq 2$

(iii) $k < 0$ 일 때

$$y = k \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) + k^2 - 6 \text{의 최댓값은 } -k + (k^2 - 6)$$

함수의 그래프가 제1사분면을 지나지 않으려면 최댓값이 0보다 작거나 같아야 하므로

$$-k + (k^2 - 6) \leq 0, k^2 - k - 6 \leq 0$$

$$(k + 2)(k - 3) \leq 0 \quad \therefore -2 \leq k \leq 3$$

그런데 $k < 0$ 이므로 $-2 \leq k < 0$

(i)~(iii)에서 $-2 \leq k \leq 2$


따라서 정수 k 의 값은 $-2, -1, 0, 1, 2$ 이므로 그 개수는 5이다.

10 ㉔ ④

$$\sin x + \cos \frac{\pi}{8} < 0 \text{에서 } \sin x < -\cos \frac{\pi}{8}$$

$$\text{이때 } -\cos \frac{\pi}{8} = -\sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} \right) = -\sin \frac{3}{8}\pi = \sin \left(-\frac{3}{8}\pi \right) \text{이}$$

$$\text{므로 주어진 부등식은 } \sin x < \sin \left(-\frac{3}{8}\pi \right)$$



$-\pi \leq x \leq 2\pi$ 에서 x 의 값의 범위는

$$-\frac{5}{8}\pi < x < -\frac{3}{8}\pi \text{ 또는 } \frac{11}{8}\pi < x < \frac{13}{8}\pi$$

즉 $-\pi \leq x \leq k$ 에서 부등식 $\sin x < \sin \left(-\frac{3}{8}\pi \right)$ 를 만족시키는

모든 x 의 값의 범위가 $-\pi - \alpha < x < \alpha$ 이려면 $\alpha = -\frac{3}{8}\pi$ 이고

$$0 \leq k \leq \frac{11}{8}\pi \text{이어야 한다.}$$

따라서 k 의 최댓값은 $\frac{11}{8}\pi$ 이다.


11 ㉔ ④

$$\text{함수 } y = 3 \sin 2nx \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{2n} = \frac{\pi}{n}$$

오른쪽 그림과 같이 원점을 지나고 기울기가 양수인 직선이

$$-\frac{\pi}{2n} < x < \frac{\pi}{2n} \text{에서 함수}$$

$y = 3 \sin 2nx$ 의 그래프와 만나는 원점이 아닌 두 점 A, B는 원점에 대하여 대칭이다.



즉 실수 $t \left(-\frac{\pi}{2n} < t < \frac{\pi}{2n}, t \neq 0 \right)$ 에 대하여 점 A의 좌표를

$(t, 3 \sin 2nt)$ 라 하면 점 B의 좌표는 $(-t, -3 \sin 2nt)$

이때 $\triangle AOC$ 의 넓이와 $\triangle BOC$ 의 넓이가 같고 $\triangle ABC$ 의 넓이는 $\frac{\pi}{12}$ 이므로

$$2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2n} \times 3 |\sin 2nt| = \frac{\pi}{12} \quad \therefore |\sin 2nt| = \frac{n}{18}$$

$$0 < |\sin 2nt| \leq 1 \text{이므로 } 0 < \frac{n}{18} \leq 1$$

$$\therefore 0 < n \leq 18$$

따라서 자연수 n 의 최댓값은 18이다.

07 사인법칙과 코사인법칙

II 삼각함수

개념 완성하기

p.181~182

01 답 $5\sqrt{2}$

사인법칙에 의하여 $\frac{10}{\sin 45^\circ} = \frac{c}{\sin 30^\circ}$ 이므로
 $c \sin 45^\circ = 10 \sin 30^\circ$
 $\therefore c = 10 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}$

02 답 $\sqrt{2}$

사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\sin 60^\circ}$ 이므로
 $a \sin 60^\circ = \sqrt{3} \sin 45^\circ$
 $\therefore a = \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = \sqrt{2}$

03 답 $2\sqrt{3}$

사인법칙에 의하여 $\frac{2}{\sin 30^\circ} = \frac{c}{\sin 120^\circ}$ 이므로
 $c \sin 30^\circ = 2 \sin 120^\circ$
 $\therefore c = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 = 2\sqrt{3}$

04 답 $\sqrt{6}$

$A + B + C = 180^\circ$ 이므로
 $B = 180^\circ - (A + C) = 180^\circ - (75^\circ + 60^\circ) = 45^\circ$
 사인법칙에 의하여 $\frac{b}{\sin 45^\circ} = \frac{3}{\sin 60^\circ}$ 이므로
 $b \sin 60^\circ = 3 \sin 45^\circ$
 $\therefore b = 3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = \sqrt{6}$

05 답 $2\sqrt{6}$

$A + B + C = 180^\circ$ 이므로
 $B = 180^\circ - (A + C) = 180^\circ - (45^\circ + 75^\circ) = 60^\circ$
 사인법칙에 의하여 $\frac{b}{\sin 60^\circ} = \frac{4}{\sin 45^\circ}$ 이므로
 $b \sin 45^\circ = 4 \sin 60^\circ$
 $\therefore b = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{6}$

06 답 30°

사인법칙에 의하여 $\frac{2\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = \frac{2}{\sin B}$ 이므로
 $2\sqrt{2} \sin B = 2 \sin 45^\circ$
 $\therefore \sin B = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$
 이때 $0^\circ < B < 180^\circ$ 이므로 $B = 30^\circ$ 또는 $B = 150^\circ$
 그런데 $B = 150^\circ$ 이면 $A + B > 180^\circ$ 이므로
 $B = 30^\circ$

07 답 90°

사인법칙에 의하여 $\frac{6}{\sin A} = \frac{3}{\sin 30^\circ}$ 이므로
 $3 \sin A = 6 \sin 30^\circ$
 $\therefore \sin A = 6 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = 1$
 이때 $0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로 $A = 90^\circ$

08 답 30°

사인법칙에 의하여 $\frac{2}{\sin B} = \frac{2\sqrt{3}}{\sin 60^\circ}$ 이므로
 $2\sqrt{3} \sin B = 2 \sin 60^\circ$
 $\therefore \sin B = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$
 이때 $0^\circ < B < 180^\circ$ 이므로 $B = 30^\circ$ 또는 $B = 150^\circ$
 그런데 $B = 150^\circ$ 이면 $B + C > 180^\circ$ 이므로
 $B = 30^\circ$

09 답 30°

사인법칙에 의하여 $\frac{2}{\sin A} = \frac{2\sqrt{3}}{\sin 120^\circ}$ 이므로
 $2\sqrt{3} \sin A = 2 \sin 120^\circ$
 $\therefore \sin A = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$
 이때 $0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로 $A = 30^\circ$ 또는 $A = 150^\circ$
 그런데 $A = 150^\circ$ 이면 $A + C > 180^\circ$ 이므로
 $A = 30^\circ$

10 답 15° 또는 75°

사인법칙에 의하여 $\frac{\sqrt{6}}{\sin 45^\circ} = \frac{3}{\sin B}$ 이므로
 $\sqrt{6} \sin B = 3 \sin 45^\circ$
 $\therefore \sin B = 3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 이때 $0^\circ < B < 180^\circ$ 이므로 $B = 60^\circ$ 또는 $B = 120^\circ$
 (i) $B = 60^\circ$ 일 때, $C = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ$
 (ii) $B = 120^\circ$ 일 때, $C = 180^\circ - (45^\circ + 120^\circ) = 15^\circ$
 (i), (ii)에서 $C = 15^\circ$ 또는 $C = 75^\circ$

11 답 4

사인법칙에 의하여 $\frac{4\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 2R$ 이므로
 $R = \frac{4\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \times \frac{1}{2} = 4$

12 답 5

$A + B + C = 180^\circ$ 이므로
 $A = 180^\circ - (B + C) = 180^\circ - (50^\circ + 100^\circ) = 30^\circ$
 사인법칙에 의하여 $\frac{5}{\sin 30^\circ} = 2R$ 이므로
 $R = \frac{5}{\frac{1}{2}} \times \frac{1}{2} = 5$

13 $\text{답 } 2\sqrt{2}$

$A+B+C=180^\circ$ 이므로

$$B=180^\circ-(A+C)=180^\circ-(110^\circ+25^\circ)=45^\circ$$

사인법칙에 의하여 $\frac{4}{\sin 45^\circ}=2R$ 이므로

$$R=\frac{4}{\frac{\sqrt{2}}{2}}\times\frac{1}{2}=2\sqrt{2}$$

14 $\text{답 } 3\sqrt{3}$

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C \\&= 3^2 + 6^2 - 2 \times 3 \times 6 \times \cos 60^\circ \\&= 9 + 36 - 2 \times 3 \times 6 \times \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$= 9 + 36 - 18 = 27$$

이때 $c > 0$ 이므로 $c = 3\sqrt{3}$

15 $\text{답 } \sqrt{3}$

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\&= 3^2 + (2\sqrt{3})^2 - 2 \times 3 \times 2\sqrt{3} \times \cos 30^\circ \\&= 9 + 12 - 2 \times 3 \times 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\&= 9 + 12 - 18 = 3\end{aligned}$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a = \sqrt{3}$

16 $\text{답 } \sqrt{2}$

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}b^2 &= c^2 + a^2 - 2ca \cos B \\&= (\sqrt{2})^2 + 2^2 - 2 \times \sqrt{2} \times 2 \times \cos 45^\circ \\&= 2 + 4 - 2 \times \sqrt{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\&= 2 + 4 - 4 = 2\end{aligned}$$

이때 $b > 0$ 이므로 $b = \sqrt{2}$

17 $\text{답 } \sqrt{237}$

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C \\&= 9^2 + (4\sqrt{3})^2 - 2 \times 9 \times 4\sqrt{3} \times \cos 150^\circ \\&= 81 + 48 - 2 \times 9 \times 4\sqrt{3} \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\&= 81 + 48 + 108 = 237\end{aligned}$$

이때 $c > 0$ 이므로 $c = \sqrt{237}$

18 $\text{답 } 7$

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}b^2 &= c^2 + a^2 - 2ca \cos B \\&= 3^2 + 5^2 - 2 \times 3 \times 5 \times \cos 120^\circ \\&= 9 + 25 - 2 \times 3 \times 5 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \\&= 9 + 25 + 15 = 49\end{aligned}$$

이때 $b > 0$ 이므로 $b = 7$

19 $\text{답 } \frac{13}{14}$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5^2 + 7^2 - 3^2}{2 \times 5 \times 7} = \frac{13}{14}$$

20 $\text{답 } \frac{\sqrt{2}}{10}$

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{(4\sqrt{2})^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 4\sqrt{2} \times 5} = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

21 $\text{답 } \frac{13}{15}$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{5^2 + 6^2 - 3^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{13}{15}$$

22 $\text{답 } \frac{1}{8}$

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{4^2 + 5^2 - 6^2}{2 \times 4 \times 5} = \frac{1}{8}$$

23 $\text{답 } 6$

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \frac{1}{2} \times 4 \times 6 \times \sin 30^\circ \\&= \frac{1}{2} \times 4 \times 6 \times \frac{1}{2} \\&= 6\end{aligned}$$

24 $\text{답 } \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{2} \times \sin 135^\circ \\&= \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\&= \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

25 $\text{답 } 3\sqrt{2}$

$$\triangle ABC = \frac{36\sqrt{2}}{4 \times 3} = 3\sqrt{2}$$

26 $\text{답 } 4\sqrt{3}$

$A+B+C=180^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned}A &= 180^\circ - (B+C) = 180^\circ - (30^\circ + 120^\circ) = 30^\circ \\ \therefore \triangle ABC &= 2 \times 4^2 \times \sin 30^\circ \times \sin 30^\circ \times \sin 120^\circ \\&= 2 \times 16 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\&= 4\sqrt{3}\end{aligned}$$

27 $\text{답 } 4$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times c \times 2\sqrt{3} \times \sin 60^\circ = 6 \text{이므로}$$

$$\frac{3}{2}c = 6 \quad \therefore c = 4$$

28 $\text{답 } 2$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times a \times 6 \times \sin 45^\circ = 3\sqrt{2} \text{이므로}$$

$$\frac{3\sqrt{2}}{2}a = 3\sqrt{2} \quad \therefore a = 2$$

29 ㉡ 60° 또는 120°

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 2 \times 8 \times \sin A = 4\sqrt{3} \text{이므로}$$

$$8 \sin A = 4\sqrt{3} \quad \therefore \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

이때 $0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로 $A = 60^\circ$ 또는 $A = 120^\circ$

30 ㉡ $6\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \square ABCD &= 3 \times 4 \times \sin 60^\circ \\ &= 3 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 6\sqrt{3} \end{aligned}$$

31 ㉡ $8\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} B + C &= 180^\circ \text{이므로} \\ C &= 180^\circ - B = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ \\ \therefore \square ABCD &= 4 \times 4 \times \sin 45^\circ \\ &= 4 \times 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 8\sqrt{2} \end{aligned}$$

32 ㉡ 5

$$\begin{aligned} A + B &= 180^\circ \text{이므로} \\ B &= 180^\circ - A = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ \\ \therefore \square ABCD &= 2 \times 5 \times \sin 30^\circ \\ &= 2 \times 5 \times \frac{1}{2} \\ &= 5 \end{aligned}$$

33 ㉡ 120°

$$\begin{aligned} \text{평행사변형의 넓이가 } 4\sqrt{3} \text{이므로} \\ 2 \times 4 \times \sin A &= 4\sqrt{3} \quad \therefore \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{이때 } 90^\circ < A < 180^\circ \text{이므로 } A &= 120^\circ \end{aligned}$$

34 ㉡ $2\sqrt{39}$

$$\begin{aligned} \text{평행사변형 } ABCD \text{의 넓이가 } 70\sqrt{3} \text{이므로} \\ 10 \times \overline{BC} \times \sin 60^\circ &= 70\sqrt{3} \\ 5\sqrt{3} \times \overline{BC} &= 70\sqrt{3} \quad \therefore \overline{BC} = 14 \\ \triangle ABC \text{에서 코사인법칙에 의하여} \\ \overline{AC}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos B \\ &= 10^2 + 14^2 - 2 \times 10 \times 14 \times \cos 60^\circ \\ &= 100 + 196 - 2 \times 10 \times 14 \times \frac{1}{2} \\ &= 100 + 196 - 140 = 156 \\ \therefore \overline{AC} &= \sqrt{156} = 2\sqrt{39} \quad (\because \overline{AC} > 0) \end{aligned}$$

35 ㉡ 24

$$\begin{aligned} \square ABCD &= \frac{1}{2} \times 8 \times 12 \times \sin 150^\circ \\ &= \frac{1}{2} \times 8 \times 12 \times \frac{1}{2} \\ &= 24 \end{aligned}$$

유형 완성하기

p. 183~199

01 ㉡ ①

$$\begin{aligned} \text{사인법칙에 의하여 } \frac{10}{\sin B} &= \frac{10\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} \text{이므로} \\ 10\sqrt{2} \sin B &= 10 \sin 45^\circ \\ \therefore \sin B &= 10 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{10\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \\ \text{이때 } 0^\circ < B < 180^\circ \text{이므로 } B &= 30^\circ \text{ 또는 } B = 150^\circ \\ \text{그런데 } B = 150^\circ \text{이면 } B + C > 180^\circ \text{이므로} \\ B &= 30^\circ \end{aligned}$$

01-1 ㉡ $\frac{3}{4}$

$$\begin{aligned} \text{사인법칙에 의하여 } \frac{\sqrt{3}}{\sin A} &= \frac{1}{\sin 30^\circ} \text{이므로} \\ \sin A &= \sqrt{3} \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{이때 } 0^\circ < A < 180^\circ \text{이므로 } A &= 60^\circ \text{ 또는 } A = 120^\circ \\ \text{(i) } A = 60^\circ \text{일 때, } C &= 180^\circ - (60^\circ + 30^\circ) = 90^\circ \\ \text{(ii) } A = 120^\circ \text{일 때, } C &= 180^\circ - (120^\circ + 30^\circ) = 30^\circ \\ \text{그런데 } 0^\circ < C < 90^\circ \text{이므로 } C &= 30^\circ \\ \therefore \cos^2 30^\circ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

02 ㉡ $4\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \text{사인법칙에 의하여 } \frac{4}{\sin 30^\circ} &= \frac{\overline{AB}}{\sin 45^\circ} \text{이므로} \\ \overline{AB} \times \sin 30^\circ &= 4 \sin 45^\circ \\ \therefore \overline{AB} &= 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times 2 = 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

02-1 ㉡ ④

$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{에서 } B &= 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ \\ \text{또 } A + 75^\circ &= 135^\circ \text{이므로 } A = 60^\circ \\ \triangle ABC \text{에서 사인법칙에 의하여 } \frac{50}{\sin 60^\circ} &= \frac{\overline{AC}}{\sin 45^\circ} \text{이므로} \\ \overline{AC} \times \sin 60^\circ &= 50 \sin 45^\circ \\ \therefore \overline{AC} &= 50 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{50\sqrt{6}}{3} \end{aligned}$$

03 ㉡ ④

$$\begin{aligned} \text{사인법칙에 의하여 } \frac{\overline{BC}}{\sin A} &= \frac{\overline{CA}}{\sin B} \text{이므로} \\ \frac{7}{\sin A} &= \frac{5}{\sin B} \quad \therefore \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{7}{5} \end{aligned}$$

03-1 ㉡ ①

$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{에서 } A + B + C &= \pi \text{이므로 } B + C = \pi - A \\ \therefore \sin(B + C) &= \sin(\pi - A) = \sin A \quad \dots\dots ㉠ \\ \text{사인법칙에 의하여 } \frac{a}{\sin A} &= \frac{c}{\sin C} \text{이므로} \\ \frac{4}{\sin A} &= \frac{6}{\sin C} \quad \therefore \frac{\sin A}{\sin C} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \\ \therefore \frac{\sin(B + C)}{\sin C} &= \frac{\sin A}{\sin C} = \frac{2}{3} \quad (\because ㉠) \end{aligned}$$

04 ㉔ $\sqrt{2}$

$$\angle DBC = 60^\circ - \angle ABD = 60^\circ - 15^\circ = 45^\circ$$

한 호에 대한 원주각의 크기는 같으므로

$$\angle BDC = \angle BAC = 60^\circ$$

$\triangle DBC$ 에서 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{CD}}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\sin 60^\circ}$ 이므로

$$\overline{CD} \times \sin 60^\circ = \sqrt{3} \sin 45^\circ$$

$$\therefore \overline{CD} = \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = \sqrt{2}$$

04-1 ㉔ 6

$$\angle DBC = 60^\circ - \angle ABD = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

한 호에 대한 원주각의 크기는 같으므로

$$\angle BDC = \angle BAC = 60^\circ$$

$\triangle DBC$ 에서 사인법칙에 의하여 $\frac{2\sqrt{3}}{\sin 30^\circ} = \frac{\overline{BC}}{\sin 60^\circ}$ 이므로

$$\overline{BC} \times \sin 30^\circ = 2\sqrt{3} \sin 60^\circ$$

$$\therefore \overline{BC} = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 = 6$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 한 변의 길이는 6이다.

05 ㉔ $2\sqrt{2}$

$\triangle ABP$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BP}}{\sin(\angle BAP)} = \frac{\overline{AP}}{\sin 45^\circ} = \frac{\overline{AP}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2} \overline{AP} \quad \dots \textcircled{1} \quad \dots \textcircled{1}$$

즉 $\overline{AP}$ 의 길이가 최소일 때 $\textcircled{1}$ 의 값이 최소이다.

$\overline{AP} \perp \overline{BC}$ 일 때 $\overline{AP}$ 의 길이가 최소가 되므로

$$\overline{AP} \geq 2\sqrt{2} \sin 45^\circ = 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 \quad \dots \textcircled{2}$$

따라서 $\textcircled{1}$ 의 최솟값은 $2\sqrt{2}$ 이다. $\dots \textcircled{3}$

채점 기준	비율
① 주어진 식을 $\overline{AP}$ 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
② $\overline{AP}$ 의 길이의 최솟값을 구할 수 있다.	40%
③ 주어진 식의 최솟값을 구할 수 있다.	20%

05-1 ㉔ $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{6}}{6}$

오른쪽 그림과 같이 점 A에서 $\overline{BC}$

에 내린 수선의 발을 P라 하면

$\triangle ABP$ 는 직각이등변삼각형이므로

$$\overline{AP} = \overline{BP} = 2 \sin 45^\circ = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$\triangle APC$ 는 직각삼각형이므로

$$\overline{PC} = \sqrt{(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{2})^2} = 2$$

즉 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} = 2 + \sqrt{2}$ 이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\sqrt{6}}{\sin 45^\circ} = \frac{2+\sqrt{2}}{\sin A}, \sqrt{6} \sin A = (2+\sqrt{2}) \sin 45^\circ$$

$$\therefore \sin A = (2+\sqrt{2}) \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{3}+\sqrt{6}}{6}$$

06 ㉔ ④

$\angle EAC = \theta$ 라 하면 $\angle EAC = 90^\circ - \angle ACE = \angle BCD = \theta$

$\triangle ACE$ 에서 $\overline{CE} = 2 \sin \theta$ 이므로

$$\overline{BD} = \overline{CE} = 2 \sin \theta$$

$\triangle BCD$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin(\angle BDC)} = \frac{\overline{BD}}{\sin(\angle BCD)}$$

이때 $\angle BCD = \angle EAC = \theta$, $\angle BDC = 30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$ 이므로

$$\frac{\overline{BC}}{\sin 120^\circ} = \frac{2 \sin \theta}{\sin \theta} = 2$$

$$\therefore \overline{BC} = 2 \sin 120^\circ = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

06-1 ㉔ $2\sqrt{3}$

$\angle ACD = \theta$ 라 하면 $\angle ACD = 90^\circ - \angle ADC = \angle BDE = \theta$

$\triangle ADC$ 에서 $\overline{AD} = 4 \sin \theta$ 이므로

$$\overline{BE} = \overline{AD} = 4 \sin \theta \quad \dots \textcircled{1}$$

$\triangle DBE$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BE}}{\sin(\angle BDE)} = \frac{\overline{BD}}{\sin(\angle BED)} \quad \dots \textcircled{2}$$

이때 $\angle BDE = \angle ACD = \theta$, $\angle BED = 30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$ 이므로

$$\frac{\overline{BD}}{\sin 120^\circ} = \frac{4 \sin \theta}{\sin \theta} = 4$$

$$\therefore \overline{BD} = 4 \sin 120^\circ = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \quad \dots \textcircled{3}$$

채점 기준	비율
① $\angle ACD = \theta$ 라 하고 $\overline{BE}$ 의 길이를 θ 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
② $\triangle DBE$ 에서 사인법칙을 이용할 수 있다.	30%
③ $\overline{BD}$ 의 길이를 구할 수 있다.	30%

07 ㉔ $\frac{7}{25}$

$\triangle ADB$ 와 $\triangle ADC$ 의 외접원이 같으므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{5}{\sin(\angle DAB)} = \frac{2}{\sin(\angle DAC)}$$

$$\therefore \sin(\angle DAC) = \frac{2}{5} \sin(\angle DAB) = \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{7}{25}$$

07-1 ㉔ 2

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{2\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 2R \quad \therefore R = \frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \times \frac{1}{2} = 2$$

$\triangle ADC$ 에서 $\angle CAD = 30^\circ$ 이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CD}}{\sin 30^\circ} = 2R = 2 \times 2 = 4$$

$$\therefore \overline{CD} = 4 \sin 30^\circ = 4 \times \frac{1}{2} = 2$$

08 ㉔ $16\sqrt{3}$

사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin 60^\circ} = \frac{4\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = 2R$

이때 $\frac{4\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = 8$ 이므로

$$a = 8 \sin 60^\circ = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}, R = 8 \times \frac{1}{2} = 4$$

$$\therefore aR = 4\sqrt{3} \times 4 = 16\sqrt{3}$$

08-1 ㉔ 16

$\triangle ABC$ 에서 $A = 180^\circ - (105^\circ + 45^\circ) = 30^\circ$

$$\text{사인법칙에 의하여 } \frac{8}{\sin 30^\circ} = \frac{c}{\sin 45^\circ} = 2R$$

$$\text{이때 } \frac{8}{\sin 30^\circ} = 16 \text{이므로}$$

$$c = 16 \sin 45^\circ = 16 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 8\sqrt{2}, R = 16 \times \frac{1}{2} = 8$$

$$\therefore \frac{c^2}{R} = \frac{(8\sqrt{2})^2}{8} = 16$$

09 ㉔ ⑤

$$A+B+C=\pi \text{이므로 } B+C=\pi-A$$

$$\therefore \sin(B+C) = \sin(\pi-A) = \sin A$$

$$4 \sin A \sin(B+C) = 3 \text{에서 } 4 \sin^2 A = 3$$

$$\sin^2 A = \frac{3}{4} \quad \therefore \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2} (\because 0^\circ < A < 180^\circ)$$

$$\text{사인법칙에 의하여 } \frac{a}{\sin A} = 2 \times 3 \text{이므로}$$

$$a = 6 \sin A = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

09-1 ㉔ $\frac{81}{4}\pi$

$$A+B+C=\pi \text{이므로 } A+C=\pi-B$$

$$\therefore \sin(A+C) = \sin(\pi-B) = \sin B$$

$$\frac{3}{4} \sin(A+C) = \frac{1}{3 \sin B} \text{에서 } \frac{3}{4} \sin B = \frac{1}{3 \sin B}$$

$$\sin^2 B = \frac{4}{9} \quad \therefore \sin B = \frac{2}{3} (\because 0^\circ < B < 180^\circ)$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{b}{\sin B} = 2R \text{이므로 } \frac{6}{\frac{2}{3}} = 2R$$

$$2R = 9 \quad \therefore R = \frac{9}{2}$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 외접원의 넓이는

$$\pi \times \left(\frac{9}{2}\right)^2 = \frac{81}{4}\pi$$

10 ㉔ ③

$$\frac{a+b}{8} = \frac{b+c}{9} = \frac{c+a}{11} = k (k>0) \text{라 하면}$$

$$a+b=8k, b+c=9k, c+a=11k \quad \dots\dots ㉔$$

위의 세 식을 각각 변끼리 더하면

$$2(a+b+c) = 28k \quad \therefore a+b+c = 14k \quad \dots\dots ㉕$$

㉕에서 ㉔의 각 식을 빼면 $a=5k, b=3k, c=6k$

$$\therefore \sin A : \sin B : \sin C = a : b : c = 5k : 3k : 6k = 5 : 3 : 6$$

10-1 ㉔ ⑤

$$a+2b-2c=0 \quad \dots\dots ㉔$$

$$3a-6b+4c=0 \quad \dots\dots ㉕$$

$$㉔ \times 2 + ㉕ \text{을 하면 } 5a-2b=0 \quad \therefore a = \frac{2}{5}b$$

$$a = \frac{2}{5}b \text{를 } ㉔ \text{에 대입하면 } \frac{2}{5}b + 2b - 2c = 0$$

$$2c = \frac{12}{5}b \quad \therefore c = \frac{6}{5}b$$

$$\therefore \sin A : \sin B : \sin C = a : b : c = \frac{2}{5}b : b : \frac{6}{5}b = 2 : 5 : 6$$

11 ㉔ ②

$$A = 180^\circ \times \frac{3}{6} = 90^\circ, B = 180^\circ \times \frac{2}{6} = 60^\circ, C = 180^\circ \times \frac{1}{6} = 30^\circ$$

이므로

$$\begin{aligned} a : b : c &= \sin A : \sin B : \sin C \\ &= \sin 90^\circ : \sin 60^\circ : \sin 30^\circ \\ &= 1 : \frac{\sqrt{3}}{2} : \frac{1}{2} \\ &= 2 : \sqrt{3} : 1 \end{aligned}$$

11-1 ㉔ $\sqrt{6}$

$$A = 180^\circ \times \frac{3}{12} = 45^\circ, B = 180^\circ \times \frac{4}{12} = 60^\circ \text{이므로}$$

$$a : b = \sin A : \sin B \text{에서 } 2 : b = \sin 45^\circ : \sin 60^\circ$$

$$2 : b = \frac{\sqrt{2}}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}b = \sqrt{3}$$

$$\therefore b = \sqrt{3} \times \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{6}$$

12 ㉔ $\frac{15}{16}$

$$\triangle ABC \text{에서 } A+B+C=\pi \text{이므로}$$

$$A+B=\pi-C, B+C=\pi-A, C+A=\pi-B$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin(A+B) : \sin(B+C) : \sin(C+A) \\ &= \sin(\pi-C) : \sin(\pi-A) : \sin(\pi-B) \\ &= \sin C : \sin A : \sin B \quad \dots\dots ㉔ \\ &= 4 : 5 : 3 \end{aligned}$$

$$\text{즉 } c : a : b = 4 : 5 : 3 \text{이므로} \quad \dots\dots ㉕$$

$$a=5k, b=3k, c=4k (k>0) \text{라 하면}$$

$$\frac{ab}{c^2} = \frac{5k \times 3k}{(4k)^2} = \frac{15k^2}{16k^2} = \frac{15}{16} \quad \dots\dots ㉖$$

채점 기준	비율
㉔ $\sin(A+B) = \sin C, \sin(B+C) = \sin A, \sin(C+A) = \sin B$ 을 알 수 있다.	60%
㉕ $c : a : b$ 를 구할 수 있다.	30%
㉖ $\frac{ab}{c^2}$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

12-1 ㉔ ①

$$9 \sin A = 12 \sin B = 8 \sin C = k (k>0) \text{라 하면}$$

$$\sin A = \frac{k}{9}, \sin B = \frac{k}{12}, \sin C = \frac{k}{8}$$

$$\therefore a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = \frac{k}{9} : \frac{k}{12} : \frac{k}{8} = 8 : 6 : 9$$

$$\text{이때 } a=8p, b=6p, c=9p (p>0) \text{라 하면}$$

$$\frac{a}{b+c} = \frac{8p}{6p+9p} = \frac{8p}{15p} = \frac{8}{15}$$

13 ㉔ ③

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이를 주어진 식에 대입하면

$$a \times \frac{a}{2R} = c \times \frac{c}{2R} \quad \therefore a^2 = c^2$$

$$\text{이때 } a, c \text{는 양수이므로 } a=c$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $a=c$ 인 이등변삼각형이다.

13-1 ㉔ ①

△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이를 주어진 식에 대입하면

$$a^2 \times \frac{a}{2R} = b^2 \times \frac{b}{2R} = c^2 \times \frac{c}{2R}$$

$$\therefore a^3 = b^3 = c^3$$

이때 a, b, c 는 양수이므로 $a=b=c$

따라서 △ABC는 정삼각형이다.

14 ㉔ ⑤

$\cos^2 A + \cos^2 B = 2 - \sin^2 C$ 에서

$$(1 - \sin^2 A) + (1 - \sin^2 B) = 2 - \sin^2 C$$

$$\therefore \sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C \quad \dots\dots ①$$

△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이를 ①에 대입하면

$$\left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{b}{2R}\right)^2 = \left(\frac{c}{2R}\right)^2 \quad \therefore a^2 + b^2 = c^2$$

따라서 △ABC는 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

14-1 ㉔ ④

△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이를 주어진 식에 대입하면

$$a \times \frac{a}{2R} + c \times \frac{c}{2R} = b \times \frac{b}{2R}$$

$$\therefore a^2 + c^2 = b^2$$

따라서 △ABC는 $B=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

15 ㉔ $a=b$ 인 이등변삼각형

△ABC에서 $A+B+C=\pi$ 이므로 $B+C=\pi-A$

$\sin^2 A + \sin^2 B = 2 \sin A \sin(B+C)$ 에서

$$\sin^2 A + \sin^2 B = 2 \sin A \sin(\pi - A)$$

$$\sin^2 A + \sin^2 B = 2 \sin^2 A \quad \left[\begin{array}{l} 0^\circ < \theta < 180^\circ \text{에서 } \sin \theta > 0 \text{이므로} \\ \sin A > 0, \sin B > 0 \end{array} \right]$$

$$\sin^2 A = \sin^2 B \quad \therefore \sin A = \sin B \quad \dots\dots ① \quad \dots\dots ①$$

△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}$$

이를 ①에 대입하면

$$\frac{a}{2R} = \frac{b}{2R} \quad \therefore a=b \quad \dots\dots ②$$

따라서 △ABC는 $a=b$ 인 이등변삼각형이다. ③

채점 기준	비율
① $\sin(B+C) = \sin A$ 임을 이용하여 주어진 식을 정리할 수 있다.	40%
② a, b 사이의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.	50%
③ △ABC가 어떤 삼각형인지 말할 수 있다.	10%

15-1 ㉔ ⑤

△ABC에서 $A+B+C=\pi$ 이므로 $C+A=\pi-B$

$\cos^2 A + \cos^2(C+A) - 1 = \cos^2 C$ 에서

$$\cos^2 A + \cos^2(\pi - B) - 1 = \cos^2 C$$

$$\cos^2 A + (-\cos B)^2 - 1 = \cos^2 C$$

$$\cos^2 A + \cos^2 B - 1 = \cos^2 C$$

$$(1 - \sin^2 A) + (1 - \sin^2 B) - 1 = 1 - \sin^2 C$$

$$\therefore \sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C \quad \dots\dots ①$$

△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이를 ①에 대입하면

$$\left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{b}{2R}\right)^2 = \left(\frac{c}{2R}\right)^2 \quad \therefore a^2 + b^2 = c^2$$

따라서 △ABC는 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

16 ㉔ ③

△ABC에서 $\overline{AB}=c$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$7^2 = 5^2 + c^2 - 2 \times 5 \times c \times \cos \frac{\pi}{3}$$

$$49 = 25 + c^2 - 5c, c^2 - 5c - 24 = 0$$

$$(c+3)(c-8) = 0 \quad \therefore c=8 (\because c>0)$$

$$\therefore \overline{AB}=8$$

16-1 ㉔ 1

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 60^\circ \text{이므로}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - bc \quad \therefore b^2 + c^2 = a^2 + bc \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{c}{a+b} + \frac{b}{a+c} &= \frac{c(a+c) + b(a+b)}{(a+b)(a+c)} \\ &= \frac{ac + c^2 + ab + b^2}{a^2 + ab + ac + bc} \\ &= \frac{a^2 + bc + ac + ab}{a^2 + ab + ac + bc} (\because ①) \\ &= 1 \end{aligned}$$

17 ㉔ 120°

$$(a+b+c)(a-b-c) + bc = 0 \text{에서}$$

$$\{a + (b+c)\} \{a - (b+c)\} + bc = 0$$

$$a^2 - (b+c)^2 + bc = 0, a^2 - b^2 - bc - c^2 = 0$$

$$\therefore a^2 = b^2 + c^2 + bc \quad \dots\dots ①$$

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad \dots\dots ②$$

①을 ②에 대입하면

$$b^2 + c^2 + bc = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$2bc \cos A = -bc \quad \therefore \cos A = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore A = 120^\circ (\because 0^\circ < A < 180^\circ)$$

17-1 ㉔ 60°

$$(a+b+c)(a+b-c) = 3ab \text{에서 } (a+b)^2 - c^2 = 3ab$$

$$a^2 + 2ab + b^2 - c^2 = 3ab$$

$$\therefore c^2 = a^2 + b^2 - ab \quad \dots\dots ①$$

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \quad \dots\dots ②$$

①을 ②에 대입하면

$$a^2 + b^2 - ab = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$2ab \cos C = ab \quad \therefore \cos C = \frac{1}{2}$$

$$\therefore C = 60^\circ (\because 0^\circ < C < 180^\circ)$$

18 ㉔ $\sqrt{7}$

부채꼴의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\pi = r \times \frac{\pi}{3} \quad \therefore r = 3$$

즉 $\overline{OA} = 3, \overline{OP} = 2$ 이므로 $\triangle AOP$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AP}^2 &= \overline{OA}^2 + \overline{OP}^2 - 2 \times \overline{OA} \times \overline{OP} \times \cos \frac{\pi}{3} \\ &= 3^2 + 2^2 - 2 \times 3 \times 2 \times \frac{1}{2} \\ &= 9 + 4 - 6 = 7 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AP} = \sqrt{7} (\because \overline{AP} > 0)$$

18-1 ㉔ 244

$$\overline{BD} = \overline{AB} = 5, \overline{BE} = \overline{BC} = 13$$

$\triangle ABC$ 에서 $\angle ABC = \theta$ 라 하면

$$\cos \theta = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{5}{13}, \angle DBE = \pi - \theta$$

$\triangle BDE$ 에서 코사인법칙에 의하여 $\theta + \angle ABD + \angle DBE + \angle CBE = 2\pi$ 이므로 $\angle DBE = \pi - \theta$

$$\begin{aligned} \overline{DE}^2 &= \overline{BE}^2 + \overline{BD}^2 - 2 \times \overline{BE} \times \overline{BD} \times \cos (\pi - \theta) \\ &= 13^2 + 5^2 - 2 \times 13 \times 5 \times (-\cos \theta) \\ &= 169 + 25 - 2 \times 13 \times 5 \times \left(-\frac{5}{13}\right) \end{aligned}$$

$$= 169 + 25 + 50 = 244$$

따라서 $\overline{DE}$ 를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이는

$$\overline{DE}^2 = 244$$

채점 기준	비율
① $\overline{BD}, \overline{BE}$ 의 길이를 구할 수 있다.	20%
② $\overline{DE}^2$ 의 값을 구할 수 있다.	50%
③ $\overline{DE}$ 를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이를 구할 수 있다.	30%

19 ㉔ 5

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{7^2 + 6^2 - 5^2}{2 \times 7 \times 6} = \frac{5}{7}$$

$\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AD}^2 &= 7^2 + 4^2 - 2 \times 7 \times 4 \times \cos B \\ &= 49 + 16 - 2 \times 7 \times 4 \times \frac{5}{7} = 25 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AD} = 5 (\because \overline{AD} > 0)$$

19-1 ㉔ 6

$$\overline{BP} : \overline{CP} = \overline{AB} : \overline{AC} = 3 : 4 \text{이므로 } \overline{BP} = 3, \overline{CP} = 4$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{6^2 + 7^2 - 8^2}{2 \times 6 \times 7} = \frac{1}{4}$$

$\triangle ABP$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AP}^2 &= 6^2 + 3^2 - 2 \times 6 \times 3 \times \cos B \\ &= 36 + 9 - 2 \times 6 \times 3 \times \frac{1}{4} = 36 \end{aligned}$$


$$\therefore \overline{AP} = 6 (\because \overline{AP} > 0)$$

Lecture 각의 이등분선의 성질

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서

$\angle BAD = \angle CAD$ 이면

$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$



20 ㉔ ③

코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{3^2 + 8^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 8} = \frac{1}{2}$$

20-1 ㉔ $\frac{5}{7}$

세 원의 반지름의 길이를 각각 $2k, 3k, 4k$ ($k > 0$)라 하면

$$\overline{AB} = 2k + 3k = 5k, \overline{BC} = 3k + 4k = 7k, \overline{CA} = 4k + 2k = 6k$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{(7k)^2 + (6k)^2 - (5k)^2}{2 \times 7k \times 6k} = \frac{60k^2}{84k^2} = \frac{5}{7}$$

21 ㉔ ⑤

$$(a+b) : (b+c) : (c+a) = 5 : 7 : 6 \text{에서}$$

$$a+b=5k, b+c=7k, c+a=6k \quad (k > 0)$$

.....㉔

라 하자.

위의 세 식을 각각 변끼리 더하면

$$2(a+b+c) = 18k \quad \therefore a+b+c = 9k$$

.....㉕

㉕에서 ㉔의 각 식을 빼면 $a=2k, b=3k, c=4k$

따라서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{(3k)^2 + (4k)^2 - (2k)^2}{2 \times 3k \times 4k} = \frac{21k^2}{24k^2} = \frac{7}{8}$$

21-1 ㉔ 90°

$$a = \frac{b+c}{3} \text{에서 } b = 3a - c$$

.....㉖

$$b = \frac{a+c}{2}$$

.....㉗

$$\text{㉖을 ㉗에 대입하면 } 3a - c = \frac{a+c}{2}$$

$$6a - 2c = a + c, 5a = 3c \quad \therefore c = \frac{5}{3}a$$

$$c = \frac{5}{3}a \text{를 ㉖에 대입하면 } b = 3a - \frac{5}{3}a = \frac{4}{3}a$$

$$\therefore a : b : c = a : \frac{4}{3}a : \frac{5}{3}a = 3 : 4 : 5$$

즉 $a=3k, b=4k, c=5k$ ($k > 0$)라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{(3k)^2 + (4k)^2 - (5k)^2}{2 \times 3k \times 4k} = 0$$

이때 $0^\circ < C < 180^\circ$ 이므로 $C = 90^\circ$

22 ㉔ ④

삼각형에서 가장 긴 변의 대각이 최대각이므로 주어진 조건에서 B 가 최대각이 된다.

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos B &= \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \\ &= \frac{(3-\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{3})^2 - (3\sqrt{2})^2}{2 \times (3-\sqrt{3}) \times 2\sqrt{3}} \\ &= \frac{12-6\sqrt{3}+12-18}{12\sqrt{3}-12} \\ &= \frac{6(1-\sqrt{3})}{12(\sqrt{3}-1)} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

이때 $0^\circ < B < 180^\circ$ 이므로 $B = 120^\circ$

22-1 ㉮ 120°

삼각형에서 가장 긴 변의 대각이 최대각이므로 주어진 조건에서 C가 최대각이 된다.

$a=3k, b=5k, c=7k$ ($k>0$)라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos C &= \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} \\ &= \frac{(3k)^2+(5k)^2-(7k)^2}{2 \times 3k \times 5k} \\ &= \frac{-15k^2}{30k^2} = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

이때 $0^\circ < C < 180^\circ$ 이므로 $C=120^\circ$

23 ㉮ ④

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $y=2x$,

$y=\frac{1}{2}x$ 와 직선 $x=2$ 의 교점을 각각

A, B라 하면

$A(2, 4), B(2, 1)$


$$\therefore \overline{OA} = \sqrt{2^2+4^2} = 2\sqrt{5}$$

$$\overline{OB} = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{AB} = 4-1=3$$

$\triangle AOB$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{(2\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2 - 3^2}{2 \times 2\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{4}{5}$$



23-1 ㉮ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $y=2x, y=x$

와 직선 $y=2$ 의 교점을 각각 A, B라 하면

$A(1, 2), B(2, 2)$


$$\therefore \overline{OA} = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{OB} = \sqrt{2^2+2^2} = 2\sqrt{2}$$

$$\overline{AB} = 2-1=1$$

$\triangle AOB$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{(\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{2})^2 - 1^2}{2 \times \sqrt{5} \times 2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$



24 ㉮ $\frac{1}{3}$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{PB}$ 를 그으면

$\angle APB=90^\circ$ 이므로 $\triangle PAB$ 에서

$$\overline{PB}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{AP}^2 = 6^2 - (2\sqrt{6})^2 = 12$$

$$\therefore \overline{PB} = 2\sqrt{3} \quad (\because \overline{PB} > 0)$$

또 $\overline{PO}$ 를 그으면


$$\overline{PO} = \overline{BO} = \frac{1}{2}\overline{AB} = 3$$

중심각의 크기는 원주각의 크기의 2배이므로

$$\angle POB = 2\theta$$

$\triangle POB$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos 2\theta = \frac{3^2 + 3^2 - (2\sqrt{3})^2}{2 \times 3 \times 3} = \frac{1}{3}$$



채점 기준	비율
① $\overline{PB}, \overline{PO}, \overline{BO}$ 의 길이를 구할 수 있다.	30%
② $\angle POB$ 의 크기를 θ 를 이용하여 나타낼 수 있다.	30%
③ $\cos 2\theta$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

24-1 ㉮ ⑤

$\triangle PAB$ 에서 $\angle APB=90^\circ$ 이므로

$$\overline{PB}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{AP}^2 = (2\sqrt{5})^2 - 4^2 = 4$$

$$\therefore \overline{PB} = 2 \quad (\because \overline{PB} > 0)$$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{PO}$ 를 그으면


$$\overline{PO} = \overline{BO} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \sqrt{5}$$

중심각의 크기는 원주각의 크기의 2배이

므로 $\angle POB = 2\theta$

$\triangle POB$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos 2\theta = \frac{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2 - 2^2}{2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3}{5}$$



25 ㉮ $-\frac{1}{15}$

$$\frac{\sin A}{3} = \frac{\sin B}{5} = \frac{\sin C}{6} = k \quad (k>0) \text{라 하면}$$

$$\sin A = 3k, \sin B = 5k, \sin C = 6k$$

$$\therefore a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 3k : 5k : 6k = 3 : 5 : 6$$

이때 $a=3p, b=5p, c=6p$ ($p>0$)라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{(3p)^2 + (5p)^2 - (6p)^2}{2 \times 3p \times 5p} = \frac{-2p^2}{30p^2} = -\frac{1}{15}$$

다른 풀이

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\text{이를 } \frac{\sin A}{3} = \frac{\sin B}{5} = \frac{\sin C}{6} \text{에 대입하면}$$

$$\frac{\frac{a}{2R}}{3} = \frac{\frac{b}{2R}}{5} = \frac{\frac{c}{2R}}{6} \quad \therefore \frac{a}{3} = \frac{b}{5} = \frac{c}{6}$$

$$\text{이때 } \frac{a}{3} = \frac{b}{5} = \frac{c}{6} = k \quad (k>0) \text{라 하면}$$

$$a=3k, b=5k, c=6k$$

따라서 코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{(3k)^2 + (5k)^2 - (6k)^2}{2 \times 3k \times 5k} = \frac{-2k^2}{30k^2} = -\frac{1}{15}$$

25-1 ㉮ $-\sqrt{3}$

$$\frac{\sin A + \sin B}{4} = \frac{\sin B + \sin C}{5} = \frac{\sin C + \sin A}{6} = k \quad (k>0)$$

라 하면

$$\sin A + \sin B = 4k, \sin B + \sin C = 5k,$$

$$\sin C + \sin A = 6k \quad \dots\dots ㉠$$

위의 세 식을 각각 변끼리 더하면

$$2(\sin A + \sin B + \sin C) = 15k$$

$$\therefore \sin A + \sin B + \sin C = \frac{15}{2}k \quad \dots\dots ㉡$$

㉡에서 ㉠의 각 식을 빼면

$$\sin A = \frac{5}{2}k, \sin B = \frac{3}{2}k, \sin C = \frac{7}{2}k$$

$$\therefore a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = \frac{5}{2}k : \frac{3}{2}k : \frac{7}{2}k = 5 : 3 : 7$$

이때 $a=5p, b=3p, c=7p$ ($p>0$)라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{(5p)^2 + (3p)^2 - (7p)^2}{2 \times 5p \times 3p} = \frac{-15p^2}{30p^2} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } \sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{이므로}$$

$$\tan C = \frac{\sin C}{\cos C} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}$$

다른 풀이

$$\cos C = -\frac{1}{2} \text{이므로 } C = 120^\circ (\because 0^\circ < C < 180^\circ)$$

$$\begin{aligned} \therefore \tan C &= \tan 120^\circ = \tan (180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \end{aligned}$$

26 ㉮ $\frac{49}{3}\pi$

$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{에서 코사인법칙에 의하여} \\ \overline{AC}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos B \\ &= 3^2 + 8^2 - 2 \times 3 \times 8 \times \cos 60^\circ \\ &= 9 + 64 - 2 \times 3 \times 8 \times \frac{1}{2} = 49 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AC} = 7 (\because \overline{AC} > 0) \quad \dots\dots ①$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{7}{\sin 60^\circ} = 2R \quad \therefore R = \frac{7}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \times \frac{1}{2} = \frac{7\sqrt{3}}{3} \quad \dots\dots ②$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 외접원의 넓이는

$$\pi \times \left(\frac{7\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{49}{3}\pi \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① $\overline{AC}$ 의 길이를 구할 수 있다.	40%
② $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 구할 수 있다.	40%
③ $\triangle ABC$ 의 외접원의 넓이를 구할 수 있다.	20%

26-1 ㉮ $\frac{8\sqrt{7}}{7}$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{5^2 + 4^2 - 6^2}{2 \times 5 \times 4} = \frac{1}{8}$$

$$\therefore \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^2} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{6}{\sin A} = 2R \quad \therefore R = \frac{6}{\frac{3\sqrt{7}}{8}} \times \frac{1}{2} = \frac{8\sqrt{7}}{7}$$

27 ㉮ $\frac{13}{14}$

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 7 : 5 : 3 \text{이므로}$$

$$a = 7k, b = 5k, c = 3k (k > 0) \text{라 하자.}$$

이때 삼각형에서 가장 짧은 변의 대각이 가장 작은 각이므로 주어진 조건에서 C 가 가장 작은 각이 된다.

즉 $C = \theta$ 이므로 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos \theta = \cos C &= \frac{(7k)^2 + (5k)^2 - (3k)^2}{2 \times 7k \times 5k} \\ &= \frac{65k^2}{70k^2} = \frac{13}{14} \end{aligned}$$

27-1 ㉮ $-\frac{1}{5}$

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 4 : 5 : 7 \text{이므로}$$

$$a = 4k, b = 5k, c = 7k (k > 0) \text{라 하자.}$$

이때 삼각형에서 가장 긴 변의 대각이 가장 큰 각이므로 주어진 조건에서 C 가 가장 큰 각이 된다.

즉 $C = \theta$ 이므로 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \cos C = \frac{(4k)^2 + (5k)^2 - (7k)^2}{2 \times 4k \times 5k} = \frac{-8k^2}{40k^2} = -\frac{1}{5}$$

28 ㉮ ④

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$\sin A \cos B = \sin C$ 에서

$$\frac{a}{2R} \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{c}{2R}, \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2c} = c$$

$$c^2 + a^2 - b^2 = 2c^2 \quad \therefore a^2 = b^2 + c^2$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

28-1 ㉮ ①

$\triangle ABC$ 에서 $A + B + C = \pi$ 이므로 $A + C = \pi - B$

$$\therefore \sin \left(\frac{A - B + C}{2} \right) = \sin \left(\frac{\pi - 2B}{2} \right) = \sin \left(\frac{\pi}{2} - B \right) = \cos B$$

이때 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$\sin A = 2 \sin \left(\frac{A - B + C}{2} \right) \sin C \text{에서}$$

$$\sin A = 2 \cos B \sin C$$

$$\frac{a}{2R} = 2 \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \times \frac{c}{2R}, a = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{a}$$

$$a^2 = c^2 + a^2 - b^2, b^2 = c^2$$

$$\therefore b = c (\because b > 0, c > 0)$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $b = c$ 인 이등변삼각형이다.

29 ㉮ $a = b$ 인 이등변삼각형

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R},$$

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$\sin A \cos B = \sin B \cos A$ 에서

$$\frac{a}{2R} \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{b}{2R} \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$c^2 + a^2 - b^2 = b^2 + c^2 - a^2$$

$$a^2 = b^2 \quad \therefore a = b (\because a > 0, b > 0)$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $a = b$ 인 이등변삼각형이다.

29-1 ㉮ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

$\triangle ABC$ 에서 $A + B + C = \pi$ 이므로 $A + B = \pi - C$

$$\therefore \cos(A + B) = \cos(\pi - C) = -\cos C$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$\sin A + \sin B \cos(A + B) = 0 \text{에서 } \sin A - \sin B \cos C = 0$$

$$\frac{a}{2R} - \frac{b}{2R} \times \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = 0, a - \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2a} = 0$$

$$2a^2 - (a^2 + b^2 - c^2) = 0, a^2 - b^2 + c^2 = 0$$

$$\therefore b^2 = a^2 + c^2$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $B=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

30 $b=c$ 인 이등변삼각형

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$\sin A = 2 \cos B \sin C$ 에서

$$\frac{a}{2R} = 2 \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \times \frac{c}{2R}$$

$$a = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{a}, a^2 = c^2 + a^2 - b^2$$

$$b^2 = c^2 \quad \therefore b = c \quad (\because b > 0, c > 0)$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $b=c$ 인 이등변삼각형이다.

30-1 ⑤

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R},$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$\sin A + \sin B = (\cos A + \cos B) \sin C$ 에서

$$\frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} = \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} + \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \right) \times \frac{c}{2R}$$

$$a + b = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2b} + \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2a}$$

$$2ab(a+b) = a(b^2 + c^2 - a^2) + b(c^2 + a^2 - b^2)$$

$$(a+b)c^2 - (a^3 + a^2b + ab^2 + b^3) = 0$$

$$(a+b)c^2 - (a+b)a^2 - (a+b)b^2 = 0$$

$$(a+b)(c^2 - a^2 - b^2) = 0$$

이때 $a+b \neq 0$ 이므로 $c^2 - a^2 - b^2 = 0$

$$\therefore c^2 = a^2 + b^2$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

31 $5\sqrt{21}$

$\triangle BCD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = 8^2 + 10^2 - 2 \times 8 \times 10 \times \cos 60^\circ$$

$$= 64 + 100 - 2 \times 8 \times 10 \times \frac{1}{2}$$

$$= 84$$

$$\therefore \overline{BD} = \sqrt{84} = 2\sqrt{21} \quad (\because \overline{BD} > 0)$$

따라서 $\triangle ABD$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{21} \times 10 \times \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{21} \times 10 \times \frac{1}{2} = 5\sqrt{21}$$

31-1 $\frac{15\sqrt{3}}{2}$

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} = x$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$(2\sqrt{13})^2 = x^2 + 2^2 - 2 \times x \times 2 \times \cos 120^\circ$$

$$52 = x^2 + 4 + 2x, x^2 + 2x - 48 = 0$$

$$(x+8)(x-6) = 0 \quad \therefore x = 6 \quad (\because x > 0)$$

이때 $\angle BCD = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned} \triangle BDC &= \frac{1}{2} \times 5 \times 6 \times \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 5 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{15\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

32 $\frac{2}{3}\pi$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{AB} \times \sin A = 6 \text{이므로}$$

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 4 \times \sin A = 6$$

$$4\sqrt{3} \times \sin A = 6, \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore A = \frac{2}{3}\pi \quad \left(\because \frac{\pi}{2} < A < \pi \right)$$

32-1 $2\sqrt{37}$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 8 \times c \times \sin 120^\circ = 12\sqrt{3} \text{이므로}$$

$$\frac{1}{2} \times 8 \times c \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}, 2\sqrt{3}c = 12\sqrt{3} \quad \therefore c = 6$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$a^2 = 8^2 + 6^2 - 2 \times 8 \times 6 \times \cos 120^\circ$$

$$= 64 + 36 - 2 \times 8 \times 6 \times \left(-\frac{1}{2} \right)$$

$$= 148$$

$$\therefore a = \sqrt{148} = 2\sqrt{37} \quad (\because a > 0)$$

33 $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(\sqrt{10})^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 60^\circ, 10 = b^2 + c^2 - 2bc \times \frac{1}{2}$$

$$10 = b^2 + c^2 - bc \quad \therefore 10 = (b+c)^2 - 3bc \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때 $b+c=5$ 이므로 이를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$10 = 5^2 - 3bc, 3bc = 15 \quad \therefore bc = 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} bc \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{4} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

채점 기준	비율
① 코사인법칙을 이용하여 b, c 사이의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.	40%
② bc 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ $\triangle ABC$ 의 넓이를 구할 수 있다.	30%

33-1 ①

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$4^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos 45^\circ, 16 = a^2 + c^2 - 2ac \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$16 = a^2 + c^2 - \sqrt{2}ac, 16 = (a+c)^2 - 2ac - \sqrt{2}ac$$

$$\therefore 16 = (a+c)^2 - (2+\sqrt{2})ac \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때 $a+c=6$ 이므로 이를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$16 = 6^2 - (2+\sqrt{2})ac, (2+\sqrt{2})ac = 20$$

$$\therefore ac = \frac{20}{2+\sqrt{2}} = 10(2-\sqrt{2})$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle ABC &= \frac{1}{2} ac \sin 45^\circ = \frac{1}{2} \times 10(2-\sqrt{2}) \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 5(\sqrt{2}-1) \end{aligned}$$

34 $4\sqrt{3} \text{ cm}^2$

$$\triangle ABC \text{에서 } A = 180^\circ - (30^\circ + 30^\circ) = 120^\circ$$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이는

$$\frac{1}{2} \times 8 = 4 \text{ (cm)}$$

$$\begin{aligned}\therefore \triangle ABC &= 2 \times 4^2 \times \sin 120^\circ \times \sin 30^\circ \times \sin 30^\circ \\ &= 2 \times 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= 4\sqrt{3} (\text{cm}^2)\end{aligned}$$

34-1 $\frac{28\sqrt{3}}{3}$

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\triangle ABC = \frac{6 \times 10 \times 14}{4R} = 15\sqrt{3} \text{이므로}$$

$$\frac{210}{R} = 15\sqrt{3} \quad \therefore R = \frac{210}{15\sqrt{3}} = \frac{14\sqrt{3}}{3}$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 외접원의 지름의 길이는

$$2R = 2 \times \frac{14\sqrt{3}}{3} = \frac{28\sqrt{3}}{3}$$

35 280

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이가 7이므로

$$10 = \frac{abc}{4 \times 7} \quad \therefore abc = 4 \times 7 \times 10 = 280$$

다른 풀이

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin A} = 2 \times 7 \quad \therefore \sin A = \frac{a}{14}$$

이때 $\triangle ABC$ 의 넓이가 10이므로

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}bc \sin A = 10, \frac{1}{2}bc \times \frac{a}{14} = 10$$

$$\frac{abc}{28} = 10 \quad \therefore abc = 280$$

35-1 ⑤

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이가 3이므로

$$15 = \frac{abc}{4 \times 3} \quad \therefore abc = 4 \times 3 \times 15 = 180$$

36 $25(3+\sqrt{3})$

원주각의 크기는 호의 길이에 정비례하므로

$$\triangle ABC \text{에서 } A : B : C = \widehat{BC} : \widehat{CA} : \widehat{AB} = 4 : 5 : 3$$

$$A = 180^\circ \times \frac{4}{12} = 60^\circ, B = 180^\circ \times \frac{5}{12} = 75^\circ,$$

$$C = 180^\circ \times \frac{3}{12} = 45^\circ$$

..... ①

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이가 10이므로

$$\triangle ABC = 2 \times 10^2 \times \sin 60^\circ \times \sin 75^\circ \times \sin 45^\circ$$

$$= 2 \times 10^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= 25(3+\sqrt{3})$$

..... ②

채점 기준	비율
① A, B, C의 크기를 구할 수 있다.	60%
② $\triangle ABC$ 의 넓이를 구할 수 있다.	40%


다른 풀이

오른쪽 그림에서

$$\angle AOB = 360^\circ \times \frac{3}{12} = 90^\circ$$

$$\angle BOC = 360^\circ \times \frac{4}{12} = 120^\circ$$

$$\angle COA = 360^\circ \times \frac{5}{12} = 150^\circ$$



$$\therefore \triangle ABC = S_1 + S_2 + S_3$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times \sin 90^\circ + \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times \sin 120^\circ \\ &\quad + \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times \sin 150^\circ \\ &= 50 + 25\sqrt{3} + 25 = 25(3+\sqrt{3})\end{aligned}$$

36-1 $\frac{105\sqrt{7}}{4}$

$\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CA} = 4 : 5 : 6$ 이므로

$\overline{AB} = 4k, \overline{BC} = 5k, \overline{CA} = 6k (k > 0)$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{(5k)^2 + (6k)^2 - (4k)^2}{2 \times 5k \times 6k} = \frac{45k^2}{60k^2} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

이때 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이가 8이므로 사인법칙에

$$\text{의하여 } \frac{\overline{AB}}{\sin C} = 2 \times 8$$

$$\frac{4k}{\frac{\sqrt{7}}{4}} = 16 \quad \therefore k = 16 \times \frac{\sqrt{7}}{4} \times \frac{1}{4} = \sqrt{7}$$

즉 $\overline{AB} = 4\sqrt{7}, \overline{BC} = 5\sqrt{7}, \overline{CA} = 6\sqrt{7}$ 이므로

$$\triangle ABC = \frac{4\sqrt{7} \times 5\sqrt{7} \times 6\sqrt{7}}{4 \times 8} = \frac{105\sqrt{7}}{4}$$

다른 풀이

36-1의 풀이에서

$$\overline{BC} = 5\sqrt{7}, \overline{CA} = 6\sqrt{7} \text{이고 } \sin C = \frac{\sqrt{7}}{4} \text{이므로}$$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{CA} \times \sin C$$

$$= \frac{1}{2} \times 5\sqrt{7} \times 6\sqrt{7} \times \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$= \frac{105\sqrt{7}}{4}$$

37 $\sqrt{3}$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$c^2 = 7^2 + 8^2 - 2 \times 7 \times 8 \times \cos 120^\circ$$

$$= 49 + 64 - 2 \times 7 \times 8 \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= 169$$

$$\therefore c = 13 (\because c > 0)$$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 7 \times 8 \times \sin 120^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 7 \times 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 14\sqrt{3}$$

$\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c) \text{이므로 } 14\sqrt{3} = \frac{1}{2}r(7+8+13)$$

$$14r = 14\sqrt{3} \quad \therefore r = \sqrt{3}$$


Lecture 삼각형의 넓이와 내접원의 반지름의 길이

삼각형 ABC의 내심을 I, 내접원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\triangle ABC = \triangle IBC + \triangle ICA + \triangle IAB$$

$$= \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr$$

$$= \frac{1}{2}r(a+b+c)$$



37-1 ㉔ ②

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BC}^2 = 8^2 + 5^2 - 2 \times 8 \times 5 \times \cos 60^\circ$$

$$= 64 + 25 - 2 \times 8 \times 5 \times \frac{1}{2}$$

$$= 49$$

$$\therefore \overline{BC} = 7 \quad (\because \overline{BC} > 0)$$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 10\sqrt{3}$$

△ABC의 내접원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}r(7+8+5) = 10\sqrt{3}$$

$$10r = 10\sqrt{3} \quad \therefore r = \sqrt{3}$$

따라서 △ABC의 내접원의 넓이는

$$\pi \times (\sqrt{3})^2 = 3\pi$$

38 ㉔ ③

헤론의 공식에서 $s = \frac{7+5+3}{2} = \frac{15}{2}$ 이므로

$$\triangle ABC = \sqrt{\frac{15}{2} \left(\frac{15}{2} - 7 \right) \left(\frac{15}{2} - 5 \right) \left(\frac{15}{2} - 3 \right)}$$

$$= \sqrt{\frac{15}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \times \frac{9}{2}}$$

$$= \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

△ABC의 내접원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}r(7+5+3) = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

$$\frac{15}{2}r = \frac{15\sqrt{3}}{4} \quad \therefore r = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

따라서 △ABC의 내접원의 반지름의 길이는 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.

다른 풀이

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{5^2 + 3^2 - 7^2}{2 \times 5 \times 3} = -\frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{CA} \times \overline{AB} \times \sin A$$

$$= \frac{1}{2} \times 5 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

38-1 ㉔ $\frac{\sqrt{15}}{3}$

헤론의 공식에서 $s = \frac{6+8+4}{2} = 9$ 이므로

$$\triangle ABC = \sqrt{9(9-6)(9-8)(9-4)}$$

$$= \sqrt{9 \times 3 \times 1 \times 5}$$

$$= 3\sqrt{15}$$

△ABC의 내접원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}r(6+8+4) = 3\sqrt{15}$$

$$9r = 3\sqrt{15} \quad \therefore r = \frac{\sqrt{15}}{3}$$

따라서 △ABC의 내접원의 반지름의 길이는 $\frac{\sqrt{15}}{3}$ 이다.

39 ㉔ 16

△ABC의 넓이를 S 라 하자.

헤론의 공식에서 $s = \frac{8+10+12}{2} = 15$ 이므로

$$S = \sqrt{15(15-8)(15-10)(15-12)}$$

$$= \sqrt{15 \times 7 \times 5 \times 3}$$

$$= 15\sqrt{7}$$

△ABC의 외접원의 반지름의 길이가 R 이므로

$$S = \frac{8 \times 10 \times 12}{4R} = 15\sqrt{7}, \quad \frac{240}{R} = 15\sqrt{7} \quad \therefore R = \frac{16\sqrt{7}}{7}$$

△ABC의 내접원의 반지름의 길이가 r 이므로

$$S = \frac{1}{2}r(8+10+12) = 15\sqrt{7}, \quad 15r = 15\sqrt{7} \quad \therefore r = \sqrt{7}$$

$$\therefore Rr = \frac{16\sqrt{7}}{7} \times \sqrt{7} = 16$$

다른 풀이

$$S = \frac{abc}{4R} = \frac{1}{2}r(a+b+c) \text{이므로}$$

$$\frac{8 \times 10 \times 12}{4R} = \frac{1}{2}r(8+10+12)$$

$$\frac{240}{R} = 15r \quad \therefore Rr = \frac{240}{15} = 16$$

39-1 ㉔ ③

△ABC의 넓이를 S 라 하자.

헤론의 공식에서 $s = \frac{9+10+11}{2} = 15$ 이므로

$$S = \sqrt{15(15-9)(15-10)(15-11)}$$

$$= \sqrt{15 \times 6 \times 5 \times 4}$$

$$= 30\sqrt{2}$$

△ABC의 외접원의 반지름의 길이가 R 이므로

$$S = \frac{9 \times 10 \times 11}{4R} = 30\sqrt{2}, \quad \frac{495}{2R} = 30\sqrt{2} \quad \therefore R = \frac{33\sqrt{2}}{8}$$

△ABC의 내접원의 반지름의 길이가 r 이므로

$$S = \frac{1}{2}r(9+10+11) = 30\sqrt{2}, \quad 15r = 30\sqrt{2} \quad \therefore r = 2\sqrt{2}$$

$$\therefore Rr = \frac{33\sqrt{2}}{8} \times 2\sqrt{2} = \frac{33}{2}$$

40 ㉔ $\frac{25}{6}\pi$

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$7^2 = c^2 + 8^2 - 2 \times c \times 8 \times \cos 60^\circ$$

$$49 = c^2 + 64 - 2 \times c \times 8 \times \frac{1}{2}$$

$$c^2 - 8c + 15 = 0, \quad (c-3)(c-5) = 0$$

$$\therefore c = 5 \quad (\because c > 4)$$


이때 △ABC의 넓이는

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 10\sqrt{3}$$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{OA}$ 를 긋고 반원의 반지름의 길이를 r 라 하면
 $\triangle ABC = \triangle ABO + \triangle AOC$ 이므로
 $10\sqrt{3} = \frac{1}{2} \times 5 \times r + \frac{1}{2} \times 7 \times r$
 $10\sqrt{3} = 6r \quad \therefore r = \frac{5\sqrt{3}}{3}$




따라서 반원의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{5\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{25}{6}\pi$

40-1 ㉡ ④

헤론의 공식에서 $s = \frac{6+7+5}{2} = 9$ 이므로
 $\triangle ABC = \sqrt{9(9-6)(9-7)(9-5)}$
 $= \sqrt{9 \times 3 \times 2 \times 4}$
 $= 6\sqrt{6}$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{OA}$ 를 긋고 반원의 반지름의 길이를 r 라 하면
 $\triangle ABC = \triangle ABO + \triangle AOC$ 이므로
 $6\sqrt{6} = \frac{1}{2} \times 5 \times r + \frac{1}{2} \times 7 \times r$
 $6\sqrt{6} = 6r \quad \therefore r = \sqrt{6}$
 따라서 반원의 반지름의 길이는 $\sqrt{6}$ 이다.



41 ㉡ 6√6

$\overline{AB} = 2+3=5, \overline{BC} = 3+4=7, \overline{CA} = 2+4=6$
 헤론의 공식에서 $s = \frac{5+7+6}{2} = 9$ 이므로
 $\triangle ABC = \sqrt{9(9-5)(9-7)(9-6)}$
 $= \sqrt{9 \times 4 \times 2 \times 3}$
 $= 6\sqrt{6}$

41-1 ㉡ $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

헤론의 공식에서 $s = \frac{7+4+5}{2} = 8$ 이므로
 $\triangle ABC = \sqrt{8(8-7)(8-4)(8-5)}$
 $= \sqrt{8 \times 1 \times 4 \times 3}$
 $= 4\sqrt{6}$

이때 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \times \sin \theta = 10 \sin \theta$ 이므로
 $10 \sin \theta = 4\sqrt{6} \quad \therefore \sin \theta = \frac{2\sqrt{6}}{5}$

42 ㉡ $\frac{39\sqrt{3}}{4}$

$\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여
 $\overline{BD}^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \times 3 \times 5 \times \cos 120^\circ$
 $= 9 + 25 - 2 \times 3 \times 5 \times \left(-\frac{1}{2}\right)$
 $= 49$
 $\therefore \overline{BD} = 7 (\because \overline{BD} > 0)$
 $\triangle BCD$ 에서 코사인법칙에 의하여
 $\cos C = \frac{8^2 + 3^2 - 7^2}{2 \times 8 \times 3} = \frac{1}{2}$
 이때 $0^\circ < C < 180^\circ$ 이므로 $C = 60^\circ$

따라서 $\square ABCD$ 의 넓이는

$$\begin{aligned} \triangle ABD + \triangle BCD &= \frac{1}{2} \times 3 \times 5 \times \sin 120^\circ + \frac{1}{2} \times 8 \times 3 \times \sin 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} \times 3 \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times 8 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{15\sqrt{3}}{4} + 6\sqrt{3} = \frac{39\sqrt{3}}{4} \end{aligned}$$

참고 42에서 $\triangle BCD$ 의 넓이를 다음과 같이 헤론의 공식을 이용하여 구할 수도 있다.

$$\begin{aligned} \triangle BCD \text{에서 } s &= \frac{8+3+7}{2} = 9 \text{이므로} \\ \triangle BCD &= \sqrt{9(9-8)(9-3)(9-7)} \\ &= \sqrt{9 \times 1 \times 6 \times 2} \\ &= 6\sqrt{3} \end{aligned}$$

세 변의 길이가 주어진 삼각형의 넓이를 구할 때는 42의 해설과 같이 구하거나 헤론의 공식을 이용하여 구할 수 있다. 두 가지 방법 중 계산이 편한 방법으로 문제를 해결한다.

42-1 ㉡ $4\sqrt{35} + 14\sqrt{3}$

$\triangle BCD$ 에서 코사인법칙에 의하여
 $\overline{BD}^2 = 7^2 + 8^2 - 2 \times 7 \times 8 \times \cos 120^\circ$
 $= 49 + 64 - 2 \times 7 \times 8 \times \left(-\frac{1}{2}\right)$
 $= 169$

$\therefore \overline{BD} = 13 (\because \overline{BD} > 0)$

$\triangle ABD$ 에서 헤론의 공식에 의하여

$$s = \frac{13+6+9}{2} = 14 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \triangle ABD &= \sqrt{14(14-13)(14-6)(14-9)} \\ &= \sqrt{14 \times 1 \times 8 \times 5} \\ &= 4\sqrt{35} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangle BCD &= \frac{1}{2} \times 7 \times 8 \times \sin 120^\circ \\ &= \frac{1}{2} \times 7 \times 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 14\sqrt{3} \end{aligned}$$

따라서 $\square ABCD$ 의 넓이는

$$\triangle ABD + \triangle BCD = 4\sqrt{35} + 14\sqrt{3}$$

43 ㉡ $6 + 4\sqrt{6}$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{BD}$ 를 그으면 $\triangle DBC$ 에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{BD} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$


$\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{4^2 + 7^2 - 5^2}{2 \times 4 \times 7} = \frac{5}{7}$$

$$\therefore \sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{5}{7}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{7}$$

따라서 $\square ABCD$ 의 넓이는

$$\begin{aligned} \triangle ABD + \triangle BCD &= \frac{1}{2} \times 7 \times 4 \times \sin A + \frac{1}{2} \times 4 \times 3 \\ &= \frac{1}{2} \times 7 \times 4 \times \frac{2\sqrt{6}}{7} + 6 \\ &= 6 + 4\sqrt{6} \end{aligned}$$



43-1 ㉮ ⑤

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{AC}^2 &= 4^2 + (2+2\sqrt{3})^2 - 2 \times 4 \times (2+2\sqrt{3}) \times \cos 60^\circ \\ &= 16 + 16 + 8\sqrt{3} - 2 \times 4 \times (2+2\sqrt{3}) \times \frac{1}{2} \\ &= 24\end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AC} = 2\sqrt{6} \quad (\because \overline{AC} > 0)$$

△ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{2\sqrt{6}}{\sin 60^\circ} = \frac{4}{\sin(\angle ACB)}, \quad 2\sqrt{6} \sin(\angle ACB) = 4 \sin 60^\circ$$

$$\therefore \sin(\angle ACB) = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

이때 $0^\circ < \angle ACB < 90^\circ$ 이므로 $\angle ACB = 45^\circ$

$$\therefore \angle ACD = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$

$$\therefore \square ABCD$$

$$= \triangle ABC + \triangle ACD$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times (2+2\sqrt{3}) \times \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \times 2\sqrt{6} \times 4 \times \sin 45^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times (2+2\sqrt{3}) \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times 2\sqrt{6} \times 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= 2\sqrt{3} + 6 + 4\sqrt{3} = 6 + 6\sqrt{3}$$

44 ㉮ 3

△ABC의 넓이가 $4\sqrt{2}$ 이므로

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin B = 4\sqrt{2}$$

$$6 \sin B = 4\sqrt{2} \quad \therefore \sin B = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\sin^2 B + \cos^2 B = 1 \text{ 이므로}$$

$$\cos^2 B = 1 - \sin^2 B = 1 - \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$\therefore \cos B = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } \cos B = \frac{1}{3}$$

$$\text{이때 } 0^\circ < B < 90^\circ \text{ 이므로 } \cos B = \frac{1}{3}$$

$\overline{AC} = x$ 라 하면 △ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$x^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \times 3 \times 4 \times \cos B$$

$$= 9 + 16 - 2 \times 3 \times 4 \times \frac{1}{3}$$

$$= 17$$

$$\therefore x = \sqrt{17} \quad (\because x > 0)$$

원에 내접하는 사각형에서 마주 보는 두 각의 크기의 합은 π 이므로

$$\triangle ACD \text{에서 } D = \pi - B$$

$\overline{AD} = y$ 라 하면 코사인법칙에 의하여


$$\cos(\pi - B) = \frac{2^2 + y^2 - (\sqrt{17})^2}{2 \times 2 \times y} = \frac{y^2 - 13}{4y}$$

$$\text{이때 } \cos(\pi - B) = -\cos B = -\frac{1}{3} \text{ 이므로}$$

$$\frac{y^2 - 13}{4y} = -\frac{1}{3}, \quad 3y^2 + 4y - 39 = 0$$

$$(3y + 13)(y - 3) = 0 \quad \therefore y = 3 \quad (\because y > 0)$$

$$\therefore \overline{AD} = 3$$



44-1 ㉮ 44√3

원에 내접하는 사각형에서 마주 보는 각의 크기의 합은 180° 이므로

$$\angle BCD = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

△BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{BD}^2 &= 8^2 + 15^2 - 2 \times 8 \times 15 \times \cos 60^\circ \\ &= 64 + 225 - 2 \times 8 \times 15 \times \frac{1}{2} \\ &= 169\end{aligned}$$

$$\therefore \overline{BD} = 13 \quad (\because \overline{BD} > 0) \quad \dots\dots ①$$

$\overline{AD} = x$ 라 하면 △ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = x^2 + 7^2 - 2 \times x \times 7 \times \cos 120^\circ$$

$$169 = x^2 + 49 + 7x, \quad x^2 + 7x - 120 = 0$$

$$(x + 15)(x - 8) = 0 \quad \therefore x = 8 \quad (\because x > 0) \quad \dots\dots ②$$


$$\therefore \square ABCD = \triangle ABD + \triangle BCD$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 7 \times \sin 120^\circ + \frac{1}{2} \times 8 \times 15 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 7 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times 8 \times 15 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 14\sqrt{3} + 30\sqrt{3}$$

$$= 44\sqrt{3} \quad \dots\dots ③$$



채점 기준	비율
① BD의 길이를 구할 수 있다.	30%
② $\overline{AD} = x$ 라 하고 x 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ □ABCD의 넓이를 구할 수 있다.	40%

45 ㉮ 9√3

△ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{3^2 + 6^2 - (3\sqrt{7})^2}{2 \times 3 \times 6} = -\frac{1}{2}$$

이때 $0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로 $A = 120^\circ$

따라서 평행사변형 ABCD의 넓이는

$$6 \times 3 \times \sin 120^\circ = 6 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}$$

45-1 ㉮ 4√14

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{3^2 + 6^2 - 5^2}{2 \times 3 \times 6} = \frac{5}{9}$$

$$\therefore \sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{5}{9}\right)^2} = \frac{2\sqrt{14}}{9}$$

따라서 평행사변형 ABCD의 넓이는

$$3 \times 6 \times \sin B = 3 \times 6 \times \frac{2\sqrt{14}}{9} = 4\sqrt{14}$$

46 ㉮ 9√3

$\overline{BC} = x$ 라 하면 △ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$(3\sqrt{3})^2 = 3^2 + x^2 - 2 \times 3 \times x \times \cos 60^\circ$$

$$27 = 9 + x^2 - 2 \times 3 \times x \times \frac{1}{2}$$

$$x^2 - 3x - 18 = 0, \quad (x + 3)(x - 6) = 0$$

$$\therefore x = 6 \quad (\because x > 0), \quad \text{즉 } \overline{BC} = 6 \quad \dots\dots ①$$

따라서 평행사변형 ABCD의 넓이는

$$3 \times 6 \times \sin 60^\circ = 3 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3} \quad \dots\dots ②$$

채점 기준	비율
① $\overline{BC}$ 의 길이를 구할 수 있다.	50%
② 평행사변형 ABCD의 넓이를 구할 수 있다.	50%

46-1 ㉔ $16\sqrt{3}$

$$C=A=120^\circ$$

$\overline{CD}=x$ 라 하면 $\triangle BCD$ 에서 코사인법칙에 의하여
 $(4\sqrt{7})^2=8^2+x^2-2\times 8\times x\times \cos 120^\circ$

$$112=64+x^2-2\times 8\times x\times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$x^2+8x-48=0, (x+12)(x-4)=0$$

$$\therefore x=4 (\because x>0), \text{ 즉 } \overline{CD}=4$$

따라서 평행사변형 ABCD의 넓이는

$$8\times 4\times \sin 120^\circ=8\times 4\times \frac{\sqrt{3}}{2}=16\sqrt{3}$$

47 ㉔ ②

$$\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\sqrt{1-\left(\frac{1}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

따라서 평행사변형 ABCD의 넓이는

$$4\times 6\times \sin B=4\times 6\times \frac{2\sqrt{2}}{3}=16\sqrt{2}$$

47-1 ㉔ $8\sqrt{15}$

$\overline{AB}=\overline{CD}=x, \overline{AD}=\overline{BC}=y$ 라 하면

$$\overline{AB}+\overline{BC}=10 \text{ 이므로 } x+y=10$$

$\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(2\sqrt{13})^2=x^2+y^2-2xy\cos A \text{ 이므로}$$

$$52=x^2+y^2-2xy\left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$52=x^2+y^2+\frac{1}{2}xy, 52=(x+y)^2-\frac{3}{2}xy$$

$$52=10^2-\frac{3}{2}xy (\because \text{㉔}), \frac{3}{2}xy=48$$

$$\therefore xy=32$$

이때 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\left(-\frac{1}{4}\right)^2}=\frac{\sqrt{15}}{4}$ 이므로 평행사

변형 ABCD의 넓이는

$$xy\sin A=32\times \frac{\sqrt{15}}{4}=8\sqrt{15}$$

48 ㉔ ④

$\square ABCD$ 는 등변사다리꼴이므로 $\overline{AC}=\overline{BD}$

이때 $\square ABCD$ 의 넓이가 64이므로

$$\frac{1}{2}\times \overline{AC}\times \overline{BD}\times \sin 30^\circ=64$$

$$\frac{1}{4}\overline{AC}^2=64, \overline{AC}^2=256$$

$$\therefore \overline{AC}=16 (\because \overline{AC}>0)$$

48-1 ㉔ $2\sqrt{3}$

$\overline{AC}=\overline{BD}=x$ 라 하면 $\square ABCD$ 의 넓이가 $12\sqrt{3}$ 이므로

$$\square ABCD=\frac{1}{2}x^2\sin 120^\circ=12\sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4}x^2=12\sqrt{3}, x^2=48 \quad \therefore x=4\sqrt{3} (\because x>0)$$


두 대각선의 교점을 O라 하면

$\triangle OBC$ 는 이등변삼각형이므로

$$\angle OCB=\angle OBC=30^\circ$$

이때 직각삼각형 AHC에서

$$\overline{AH}=\overline{AC}\sin 30^\circ=4\sqrt{3}\times \frac{1}{2}=2\sqrt{3}$$



49 ㉔ 30°

두 대각선이 이루는 예각의 크기를 θ 라 하면

$$\square ABCD=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{6}\times 3\sqrt{2}\times \sin \theta=3\sqrt{3} \text{ 이므로}$$

$$6\sqrt{3}\sin \theta=3\sqrt{3}, \sin \theta=\frac{1}{2}$$

$$\therefore \theta=30^\circ (\because \theta \text{는 예각})$$

49-1 ㉔ $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

$$\square ABCD=2\times 4\times \sin 60^\circ=4\sqrt{3}$$

..... ①

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2=2^2+4^2-2\times 2\times 4\times \cos 60^\circ$$

$$=4+16-2\times 2\times 4\times \frac{1}{2}$$

$$=12$$

$$\therefore \overline{AC}=2\sqrt{3} (\because \overline{AC}>0)$$

$\triangle ABD$ 에서 $A=120^\circ$ 이므로 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2=4^2+2^2-2\times 4\times 2\times \cos 120^\circ$$

$$=16+4-2\times 4\times 2\times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$=28$$

$$\therefore \overline{BD}=2\sqrt{7} (\because \overline{BD}>0)$$

..... ②

$$\text{즉 } \square ABCD=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{3}\times 2\sqrt{7}\times \sin \theta=4\sqrt{3} \text{ 이므로}$$

$$\sqrt{7}\sin \theta=2 \quad \therefore \sin \theta=\frac{2\sqrt{7}}{7}$$

..... ③

채점 기준	비율
① $\square ABCD$ 의 넓이를 구할 수 있다.	30%
② $\overline{AC}, \overline{BD}$ 의 길이를 구할 수 있다.	40%
③ $\sin \theta$ 의 값을 구할 수 있다.	30%

50 ㉔ 20

$\square ABCD$ 의 넓이가 $2\sqrt{3}$ 이므로

$$\frac{1}{2}pq\sin 120^\circ=2\sqrt{3}, \frac{1}{2}pq\times \frac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$$

$$\therefore pq=8$$

이때 $p+q=6$ 이므로

$$p^2+q^2=(p+q)^2-2pq=6^2-2\times 8=20$$

50-1 ㉔ ②

$\square ABCD$ 의 두 대각선의 길이를 각각 p, q 라 하면

$$p+q=12 \quad \therefore q=12-p$$

이때 $q=12-p>0$ 이므로 $0<p<12$

$\square ABCD$ 의 넓이를 S 라 하면

$$S=\frac{1}{2}pq\sin 60^\circ$$

$$=\frac{1}{2}p(12-p)\times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{4}(-p^2+12p)$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{4}(p-6)^2+9\sqrt{3}$$

$0<p<12$ 에서 $\square ABCD$ 의 넓이는 $p=6$ 일 때 최대이고, 최댓값은 $9\sqrt{3}$ 이다.

51 ㉓ ③

$$\triangle PAC \text{에서 } \overline{AP} = \frac{10\sqrt{2}}{\sin 30^\circ} = \frac{10\sqrt{2}}{\frac{1}{2}} = 20\sqrt{2} \text{ (m)}$$

$$\triangle PDB \text{에서 } \overline{BP} = \frac{15\sqrt{2}}{\sin 30^\circ} = \frac{15\sqrt{2}}{\frac{1}{2}} = 30\sqrt{2} \text{ (m)}$$

$\triangle APB$ 에서 $\angle APB = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ$ 이므로 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = (20\sqrt{2})^2 + (30\sqrt{2})^2 - 2 \times 20\sqrt{2} \times 30\sqrt{2} \times \cos 120^\circ$$

$$= 800 + 1800 - 2 \times 20\sqrt{2} \times 30\sqrt{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= 800 + 1800 + 1200 = 3800$$

$$\therefore \overline{AB} = 10\sqrt{38} \text{ (m)} \quad (\because \overline{AB} > 0)$$

52 ㉓ $(1+\sqrt{3})$ m

$\triangle ABD$ 에서 $\angle ADB = 75^\circ - 45^\circ = 30^\circ$

$\triangle ABD$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{2}{\sin 30^\circ} = \frac{\overline{DB}}{\sin 45^\circ}$$

$$\overline{DB} \times \sin 30^\circ = 2 \sin 45^\circ$$


$$\therefore \overline{DB} = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times 2 = 2\sqrt{2} \text{ (m)}$$

$\overline{DC} = x$ m라 하면 $\overline{BC} = (x-2)$ m이므로 $\triangle BCD$ 에서 피타고라스 정리에 의하여

$$(2\sqrt{2})^2 = (x-2)^2 + x^2, \quad x^2 - 2x - 2 = 0$$

$$\therefore x = 1 + \sqrt{3} \quad (\because x > 2)$$

따라서 나무의 높이는 $(1+\sqrt{3})$ m이다.

53 ㉓ $50\sqrt{2}$ m

$\triangle ABQ$ 에서 $\angle AQB = 180^\circ - (60^\circ + 75^\circ) = 45^\circ$

$\triangle ABQ$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BQ}}{\sin 60^\circ} = \frac{100}{\sin 45^\circ}, \quad \overline{BQ} \sin 45^\circ = 100 \sin 60^\circ$$

$$\therefore \overline{BQ} = 100 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{2}} = 50\sqrt{6} \text{ (m)}$$

$\triangle PBQ$ 에서 $\angle BPQ = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

$\triangle PBQ$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{50\sqrt{6}}{\sin 60^\circ} = \frac{\overline{PQ}}{\sin 30^\circ}, \quad \overline{PQ} \sin 60^\circ = 50\sqrt{6} \sin 30^\circ$$

$$\therefore \overline{PQ} = 50\sqrt{6} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 50\sqrt{2} \text{ (m)}$$

따라서 타워의 높이는 $50\sqrt{2}$ m이다.

54 ㉓ (1) $\frac{5}{7}$ (2) 5 km

(1) $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{7^2 + (4+2)^2 - 5^2}{2 \times 7 \times (4+2)} = \frac{60}{84} = \frac{5}{7}$$

(2) $\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AD}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BD}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BD} \times \cos B$$

$$= 7^2 + 4^2 - 2 \times 7 \times 4 \times \frac{5}{7}$$

$$= 49 + 16 - 40 = 25$$

$$\therefore \overline{AD} = 5 \text{ (km)} \quad (\because \overline{AD} > 0)$$

따라서 두 지점 A, D 사이의 거리는 5 km이다.

55 ㉓ 340 m

$\overline{PQ} = a$ m라 하면 $\triangle PAQ$ 는 직각이등변삼각형이므로

$$\overline{AQ} = \overline{PQ} = a$$

$$\triangle PBQ \text{에서 } \tan 30^\circ = \frac{\overline{PQ}}{\overline{BQ}} = \frac{a}{\overline{BQ}} \text{ 이므로}$$

$$\overline{BQ} = \frac{a}{\tan 30^\circ} = \frac{a}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3}a$$

$\triangle ABQ$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$340^2 = (\sqrt{3}a)^2 + a^2 - 2 \times \sqrt{3}a \times a \times \cos 30^\circ$$

$$340^2 = 3a^2 + a^2 - 2 \times \sqrt{3}a \times a \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$340^2 = 3a^2 + a^2 - 3a^2, \quad a^2 = 340^2$$

$$\therefore a = 340 \quad (\because a > 0)$$

따라서 탑의 높이는 340 m이다.

학교 시험 대비 문제

p. 201~204

01 ㉓ 4

사인법칙에 의하여 $\frac{2}{\sin 30^\circ} = \frac{\overline{AB}}{\sin C}$ 이므로

$$\overline{AB} \sin 30^\circ = 2 \sin C$$

$$\therefore \overline{AB} = 4 \sin C$$

$0^\circ < C < 180^\circ$ 에서 $0 < \sin C \leq 1$ 이므로 $\sin C = 1$ 일 때 $\overline{AB}$ 의 길이의 최댓값은 4이다.

02 ㉓ 9π

$\triangle ABC$ 는 정삼각형이므로 $\overline{AC} = 3\sqrt{3}$

외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{3\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 2R \quad \therefore R = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2} = 3$$

따라서 구하는 원의 넓이는

$$\pi \times 3^2 = 9\pi$$

03 ㉓ ①

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = 2R$$

$$\therefore R = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} = 1$$

따라서 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는 1이다.

04 ㉓ ③

$\square ABCD$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하자.

$\triangle ABD$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AD}}{\sin 45^\circ} = 2R \quad \therefore \overline{AD} = \sqrt{2}R$$

△BCD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CD}}{\sin 60^\circ} = 2R \quad \therefore \overline{CD} = \sqrt{3}R$$

$$\therefore \overline{AD} : \overline{CD} = \sqrt{2}R : \sqrt{3}R = \sqrt{2} : \sqrt{3}$$

05 ㉑

$ab : bc : ca = 8 : 9 : 12$ 에서 $ab = 8k^2, bc = 9k^2, ca = 12k^2 (k > 0)$ 이라 하면

$$ab \times bc \times ca = 8k^2 \times 9k^2 \times 12k^2, (abc)^2 = 864k^6$$

$$\therefore abc = 12\sqrt{6}k^3 (\because abc > 0)$$

$$\therefore a = \frac{abc}{bc} = \frac{12\sqrt{6}k^3}{9k^2} = \frac{4\sqrt{6}}{3}k$$

$$b = \frac{abc}{ca} = \frac{12\sqrt{6}k^3}{12k^2} = \sqrt{6}k$$

$$c = \frac{abc}{ab} = \frac{12\sqrt{6}k^3}{8k^2} = \frac{3\sqrt{6}}{2}k$$

$$\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$$

$$= \frac{4\sqrt{6}}{3}k : \sqrt{6}k : \frac{3\sqrt{6}}{2}k$$

$$= 8 : 6 : 9$$

이므로 $\sin A = 8t, \sin B = 6t, \sin C = 9t (t > 0)$ 라 하면

$$\frac{\sin A}{\sin B + \sin C} = \frac{8t}{6t + 9t} = \frac{8}{15}$$

06 ㉒

주어진 이차방정식이 중근을 가지므로 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (\cos C)^2 + (\sin A + \cos B)(\sin A - \cos B)$$

$$= \cos^2 C + \sin^2 A - \cos^2 B$$

$$= 1 - \sin^2 C + \sin^2 A - (1 - \sin^2 B)$$

$$= \sin^2 A + \sin^2 B - \sin^2 C = 0$$

$$\therefore \sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$$

△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하

$$\text{여 } \sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R} \text{ 이므로}$$

$$\left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{b}{2R}\right)^2 = \left(\frac{c}{2R}\right)^2$$

$$\therefore a^2 + b^2 = c^2$$

따라서 △ABC는 c 를 빗변으로 하는 직각삼각형이다.

07 ㉓

오른쪽 그림과 같이 $\overline{BA}$ 의 연장선과 $\overline{CD}$ 의 연장선이 만나는 점을 E 라 하면

△EBC는 정삼각형이므로

$$\overline{AE} = 6, \overline{ED} = 3, \angle E = 60^\circ$$

△EAD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AD}^2 = 3^2 + 6^2 - 2 \times 3 \times 6 \times \cos 60^\circ$$

$$= 9 + 36 - 2 \times 3 \times 6 \times \frac{1}{2} = 27$$

$$\therefore \overline{AD} = 3\sqrt{3} (\because \overline{AD} > 0)$$

08 ㉔ $\frac{\sqrt{15}}{9}$

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{4^2 + (2\sqrt{10})^2 - 6^2}{2 \times 4 \times 2\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{8} \text{ 이므로}$$

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{10}}{8}\right)^2} = \frac{3\sqrt{6}}{8}$$

$$\therefore \frac{\cos B}{\sin B} = \frac{\frac{\sqrt{10}}{8}}{\frac{3\sqrt{6}}{8}} = \frac{\sqrt{10}}{3\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{15}}{9}$$

09 ㉕ $-\frac{13}{14}$

$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$ 이므로

$a = 3k, b = 5k, c = 7k (k > 0)$ 라 하자.

이때 $A + B + C = \pi$ 이므로 $B + C = \pi - A$

$$\therefore \cos(B + C) = \cos(\pi - A) = -\cos A$$

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(5k)^2 + (7k)^2 - (3k)^2}{2 \times 5k \times 7k} = \frac{65k^2}{70k^2} = \frac{13}{14}$$

$$\therefore \cos(B + C) = -\cos A = -\frac{13}{14}$$

10 ㉖

△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$\sin A = \sin B \cos C \text{ 에서}$$

$$\frac{a}{2R} = \frac{b}{2R} \times \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$2a^2 = a^2 + b^2 - c^2 \quad \therefore a^2 + c^2 = b^2$$

따라서 △ABC는 $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

11 ㉗ 2

원 O의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\triangle ABC = \triangle ABO + \triangle AOC$$

$$= \frac{1}{2}r^2 \sin \theta + \frac{1}{2}r^2 \sin(\pi - \theta)$$

$$= r^2 \sin \theta \quad \left(\sin(\pi - \theta) = \sin \theta \right)$$

부채꼴 AOB의 넓이는 $\frac{1}{2}r^2\theta$ 이므로

$$r^2 \sin \theta = \frac{1}{2}r^2\theta \quad \therefore \frac{\theta}{\sin \theta} = 2$$

12 ㉘ $27\sqrt{3}$

$A = B = C = 60^\circ$ 이고 외접원의 반지름의 길이가 6이므로 정삼각형 ABC의 넓이는

$$2 \times 6^2 \times \sin 60^\circ \times \sin 60^\circ \times \sin 60^\circ$$

$$= 2 \times 36 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 27\sqrt{3}$$

다른 풀이


정삼각형 ABC의 한 변의 길이를 a 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin 60^\circ} = 2 \times 6$$

$$\therefore a = 2 \times 6 \times \sin 60^\circ = 2 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

따라서 정삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (6\sqrt{3})^2 = 27\sqrt{3}$$



13 ㉡ $\frac{7\sqrt{7}}{2}$

$\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CA} = 1 : \sqrt{2} : 2$ 이므로

$\overline{AB} = k, \overline{BC} = \sqrt{2}k, \overline{CA} = 2k (k > 0)$ 라 하면

$$\cos B = \frac{k^2 + (\sqrt{2}k)^2 - (2k)^2}{2 \times k \times \sqrt{2}k} = \frac{-k^2}{2\sqrt{2}k^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\therefore \sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{14}}{4}$$

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{CA}}{\sin B} = 2R$ 이므로

$$\frac{2k}{\frac{\sqrt{14}}{4}} = 2 \times 4 \quad \therefore k = \sqrt{14}$$

$$\therefore \overline{AB} = \sqrt{14}, \overline{BC} = \sqrt{2} \times \sqrt{14} = 2\sqrt{7}$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin B = \frac{1}{2} \times \sqrt{14} \times 2\sqrt{7} \times \frac{\sqrt{14}}{4} = \frac{7\sqrt{7}}{2}$$

14 ㉡ 16

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R , 내접원의 반지름의 길이를 r 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \sin A + \sin B + \sin C &= \frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R} \\ &= \frac{a+b+c}{2R} \\ &= \frac{a+b+c}{8} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{a+b+c}{8} = \sqrt{2} + 1 \text{ 이므로 } a+b+c = 8(\sqrt{2}+1)$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle ABC &= \frac{1}{2}r(a+b+c) = \frac{1}{2} \times 4(\sqrt{2}-1) \times 8(\sqrt{2}+1) \\ &= 16(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1) = 16 \end{aligned}$$

15 ㉡ ③

$\triangle ABC$ 의 세 변의 길이의 비가 $2 : 3 : 4$ 이므로 세 변의 길이를 $4k, 6k, 8k (k > 0)$ 라 하자.

헤론의 공식에서 $s = \frac{4k+6k+8k}{2} = 9k$ 이므로

$$\begin{aligned} \triangle ABC &= \sqrt{9k(9k-4k)(9k-6k)(9k-8k)} \\ &= \sqrt{9k \times 5k \times 3k \times k} = 3\sqrt{15}k^2 \end{aligned}$$

$$\therefore 3\sqrt{15}k^2 = \frac{9\sqrt{15}}{8} \text{ 이므로 } k^2 = \frac{3}{8}$$

$$\therefore k = \frac{\sqrt{6}}{4} (\because k > 0)$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 세 변의 길이는 $\sqrt{6}, \frac{3\sqrt{6}}{2}, 2\sqrt{6}$ 이므로 $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이는

$$\sqrt{6} + \frac{3\sqrt{6}}{2} + 2\sqrt{6} = \frac{9\sqrt{6}}{2}$$

16 ㉡ $32 + 24\sqrt{3}$

$$\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 8 \times 16 \times \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \times 8 \times 16 \times \frac{1}{2} = 32$$

$\triangle BCD$ 에서 헤론의 공식에 의하여

$$s = \frac{16+14+6}{2} = 18 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \triangle BCD &= \sqrt{18(18-16)(18-14)(18-6)} \\ &= \sqrt{18 \times 2 \times 4 \times 12} = 24\sqrt{3} \end{aligned}$$

따라서 사각형 $ABCD$ 의 넓이는

$$\square ABCD = \triangle ABD + \triangle BCD = 32 + 24\sqrt{3}$$

17 ㉡ $\frac{45\sqrt{3}}{2}$

$\overline{AB} = x, \overline{BC} = \overline{AD} = y$ 라 하면

$$\overline{AB} + \overline{BC} = 9 \text{ 이므로 } x + y = 9 \quad \dots\dots ㉠$$

$\triangle ABD$ 에서 $A = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ 이므로 코사인법칙에 의하여

$$6^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos 120^\circ$$

$$36 = x^2 + y^2 + xy, 36 = (x+y)^2 - xy$$

$$36 = 9^2 - xy (\because ㉠) \quad \therefore xy = 45$$

따라서 평행사변형 $ABCD$ 의 넓이는

$$xy \sin 120^\circ = 45 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{45\sqrt{3}}{2}$$

18 ㉡ ④

오른쪽 그림과 같은

등변사다리꼴 $ABCD$ 에서 두 대각선의

길이는 서로 같으므로 $\overline{AC} = \overline{BD}$


등변사다리꼴의 넓이가 $2\sqrt{2}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BD} \times \sin 45^\circ = 2\sqrt{2}$$

$$\frac{1}{2} \times \overline{AC}^2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

$$\overline{AC}^2 = 8 \quad \therefore \overline{AC} = 2\sqrt{2} (\because \overline{AC} > 0)$$

따라서 등변사다리꼴의 대각선의 길이는 $2\sqrt{2}$ 이다.



19 ㉡ 1

$\overline{AB} = a, \overline{BC} = b$ 라 하면

$$\square ABCD = ab \sin 60^\circ = ab \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} ab$$

$$\overline{AC} = 2\sqrt{3}, \overline{BD} = 6 \text{ 이므로}$$

$$\square ABCD = \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BD} \times \sin \theta$$

$$= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 6 \times \sin \theta$$

$$= 6\sqrt{3} \sin \theta$$

$$\therefore \frac{\sqrt{3}}{2} ab = 6\sqrt{3} \sin \theta \text{ 이므로 } ab = 12 \sin \theta \quad \dots\dots ㉠$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(2\sqrt{3})^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 60^\circ$$

$$\therefore 12 = a^2 + b^2 - ab \quad \dots\dots ㉡$$

$\triangle BCD$ 에서 $C = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ 이므로 코사인법칙에 의하여

$$6^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 120^\circ$$

$$\therefore 36 = a^2 + b^2 + ab \quad \dots\dots ㉢$$

㉡에서 ㉢을 변끼리 빼면

$$2ab = 24 \quad \therefore ab = 12$$

$ab = 12$ 를 ㉠에 대입하면

$$12 = 12 \sin \theta \quad \therefore \sin \theta = 1$$

20 ㉡ $10\sqrt{2}$

사인법칙에 의하여 $\frac{10\sqrt{3}}{\sin 120^\circ} = \frac{\overline{OA}}{\sin 45^\circ}$ 이므로

$$\overline{OA} \times \sin 120^\circ = 10\sqrt{3} \sin 45^\circ$$

$$\therefore \overline{OA} = 10\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{2}$$

21 $\sqrt{19}$ km

주어진 원뿔의 전개도를 그리면 오른쪽 그림과 같고, 구하는 최단 거리는 $\overline{AB}$ 의 길이와 같다.

부채꼴 AOA' 의 중심각의 크기를 θ 라 하면 호 AA' 의 길이는 3θ 이고, 이는 반지름의 길이가 1인 원의 둘레의 길이와 같으므로


$$3\theta = 2\pi \quad \therefore \theta = \frac{2}{3}\pi$$

$\triangle OAB$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= 2^2 + 3^2 - 2 \times 2 \times 3 \times \cos \frac{2}{3}\pi \\ &= 4 + 9 - 2 \times 2 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 19 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AB} = \sqrt{19} \text{ (km)} \quad (\because \overline{AB} > 0)$$

따라서 구하는 최단 거리는 $\sqrt{19}$ km이다.



서술형 1 $2\sqrt{3}$

$\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선이므로

$$\overline{BD} : \overline{CD} = \overline{AB} : \overline{AC} = 6 : 12 = 1 : 2$$

$\overline{BD} = x$, $\overline{CD} = 2x$ ($x > 0$)라 하고 $\angle BAD = \angle CAD = \theta$ 라 하면

$\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{(4\sqrt{3})^2 + 6^2 - x^2}{2 \times 4\sqrt{3} \times 6} \\ &= \frac{84 - x^2}{48\sqrt{3}} \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{1} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\triangle ADC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{12^2 + (4\sqrt{3})^2 - (2x)^2}{2 \times 12 \times 4\sqrt{3}} \\ &= \frac{192 - 4x^2}{96\sqrt{3}} \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{2} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } \frac{84 - x^2}{48\sqrt{3}} = \frac{192 - 4x^2}{96\sqrt{3}}$$

$$168 - 2x^2 = 192 - 4x^2, 2x^2 = 24$$

$$x^2 = 12 \quad \therefore x = 2\sqrt{3} \quad (\because x > 0)$$

$$\therefore \overline{BD} = 2\sqrt{3} \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

채점 기준	비율
① $\triangle ABD$ 에서 $\cos(\angle BAD)$ 를 구할 수 있다.	30%
② $\triangle ADC$ 에서 $\cos(\angle CAD)$ 를 구할 수 있다.	30%
③ $\overline{BD}$ 의 길이를 구할 수 있다.	40%

서술형 2 19π

오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC}$ 를 그으면 $\triangle ABC$


에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BC}^2 &= 8^2 + (3\sqrt{3})^2 - 2 \times 8 \times 3\sqrt{3} \times \cos 30^\circ \\ &= 64 + 27 - 2 \times 8 \times 3\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 19 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{BC} = \sqrt{19} \quad (\because \overline{BC} > 0) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 원 O 의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{\sqrt{19}}{\sin 30^\circ} = 2R \quad \therefore R = \frac{\sqrt{19}}{\frac{1}{2}} \times \frac{1}{2} = \sqrt{19} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$



따라서 원 O 의 넓이는

$$\pi \times (\sqrt{19})^2 = 19\pi \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

채점 기준	비율
① $\overline{BC}$ 의 길이를 구할 수 있다.	40%
② 원 O 의 반지름의 길이를 구할 수 있다.	40%
③ 원 O 의 넓이를 구할 수 있다.	20%

서술형 3 $12\sqrt{3}$

$\overline{BC} = x$ ($x > 0$)라 하면 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(2\sqrt{13})^2 = 6^2 + x^2 - 2 \times 6 \times x \times \cos 60^\circ$$

$$52 = x^2 + 36 - 6x, x^2 - 6x - 16 = 0$$

$$(x+2)(x-8) = 0$$

$$\therefore x = 8 \quad (\because x > 0), \text{ 즉 } \overline{BC} = 8 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin B$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 12\sqrt{3} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

채점 기준	비율
① $\overline{BC}$ 의 길이를 구할 수 있다.	50%
② $\triangle ABC$ 의 넓이를 구할 수 있다.	50%

1등 10% 핵심 기출 문제

p. 205

01 41

$\triangle ABD$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AD} = 6$, $\overline{BD} = \sqrt{15}$ 이므로 $\angle BAD = \theta$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{6^2 + 6^2 - (\sqrt{15})^2}{2 \times 6 \times 6} = \frac{19}{24}$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} k^2 &= \overline{BC}^2 \\ &= 10^2 + 6^2 - 2 \times 10 \times 6 \times \cos \theta \\ &= 100 + 36 - 2 \times 10 \times 6 \times \frac{19}{24} \\ &= 41 \end{aligned}$$

02 11

$\triangle ABD$ 에서 $\angle ADB = \theta$ 라 하자.

$\triangle ABD$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin \theta} = 2r_1 \quad \therefore r_1 = \frac{\overline{AB}}{2 \sin \theta} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\triangle ACD$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin(\pi - \theta)} = \frac{\overline{AC}}{\sin \theta} = 2r_2 \quad \therefore r_2 = \frac{\overline{AC}}{2 \sin \theta} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } \frac{r_2}{r_1} = \frac{\frac{\overline{AC}}{2 \sin \theta}}{\frac{\overline{AB}}{2 \sin \theta}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{\sqrt{13}}{3}$$

$\overline{AB}=3k, \overline{AC}=\sqrt{13}k (k>0)$ 라 하면 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(\sqrt{13}k)^2 = (3k)^2 + 6^2 - 2 \times 3k \times 6 \times \cos \frac{\pi}{3}$$

$$13k^2 = 9k^2 + 36 - 18k, 2k^2 + 9k - 18 = 0$$

$$(k+6)(2k-3)=0 \quad \therefore k=\frac{3}{2} (\because k>0)$$

$$\therefore \overline{AB}=3k=\frac{9}{2}$$

따라서 $p=2, q=9$ 이므로

$$p+q=2+9=11$$

03 ㉓ ③

$\angle COA=\theta$ 라 하면 $\triangle COA$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{2^2 + 2^2 - 1^2}{2 \times 2 \times 2} = \frac{7}{8} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\triangle BOD$ 에서 $\angle BOD = \frac{\pi}{2} - \theta$

이때 $\overline{OD}=x$ 라 하면 $\triangle BOD$ 의 넓이가 $\frac{7}{6}$ 이므로


$$\triangle BOD = \frac{1}{2} \times 2 \times x \times \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \frac{7}{6}$$

$$x \cos \theta = \frac{7}{6}, \frac{7}{8}x = \frac{7}{6} (\because \textcircled{1}) \quad \left[\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \cos \theta \right]$$

$$\therefore x = \frac{4}{3}, \text{ 즉 } \overline{OD} = \frac{4}{3}$$

04 ㉓ 100

다음 그림과 같이 배의 위치를 해안 도로 1과 해안 도로 2에 대하여 대칭이동한 지점을 각각 A, B라 하면 수영 코스의 최단 길이는 $\overline{AB}$ 의 길이와 같다.



$\triangle APB$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$300^2 = (x\sqrt{3})^2 + (x\sqrt{3})^2 - 2 \times x\sqrt{3} \times x\sqrt{3} \times \cos 120^\circ$$

$$90000 = 3x^2 + 3x^2 - 2 \times x\sqrt{3} \times x\sqrt{3} \times \left(-\frac{1}{2} \right)$$

$$90000 = 9x^2, x^2 = 10000$$

$$\therefore x = 100 (\because x > 0)$$

05 ㉓ ②

오른쪽 그림과 같이 원의 중심을 O라 하고 $\overline{OA}, \overline{OB}, \overline{OC}$ 를 그으면 두 삼각형 $\triangle OAB$ 와 $\triangle OBC$ 는 정삼각형이므로

$$\overline{AB} = \overline{BC} = 3$$

$\triangle ABC$ 에서 $\angle ABC = \frac{2}{3}\pi$ 이므로

코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 3^2 + 3^2 - 2 \times 3 \times 3 \times \cos \frac{2}{3}\pi$$

$$= 9 + 9 - 2 \times 3 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2} \right)$$

$$= 9 + 9 + 9$$

$$= 27$$

$$\therefore \overline{AC} = 3\sqrt{3} (\because \overline{AC} > 0)$$

사각형 ABCP가 원에 내접하므로

$$\angle ABC + \angle APC = \pi, \frac{2}{3}\pi + \angle APC = \pi$$

$$\therefore \angle APC = \frac{\pi}{3}$$

$\overline{AP}=x, \overline{CP}=y$ 라 하면 $\triangle ACP$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$(3\sqrt{3})^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos \frac{\pi}{3}$$

$$27 = x^2 + y^2 - xy \quad \therefore 27 = (x+y)^2 - 3xy$$

$$\text{이때 } x+y=8 \text{이므로 } 27 = 8^2 - 3xy$$

$$3xy = 37 \quad \therefore xy = \frac{37}{3}$$

$\triangle ABC$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times \sin \frac{2}{3}\pi = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{4}$$


$\triangle ACP$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} xy \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{37}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{37\sqrt{3}}{12}$$

$$\therefore \square ABCP = \triangle ABC + \triangle ACP$$

$$= \frac{9\sqrt{3}}{4} + \frac{37\sqrt{3}}{12}$$

$$= \frac{16\sqrt{3}}{3}$$



개념 완성하기

p.209~210

01 답 1, 3, 5, 7, 9

$$a_1=2 \times 1 - 1 = 1, a_2=2 \times 2 - 1 = 3, a_3=2 \times 3 - 1 = 5, \\ a_4=2 \times 4 - 1 = 7, a_5=2 \times 5 - 1 = 9$$

02 답 0, 3, 8, 15, 24

$$a_1=1^2-1=0, a_2=2^2-1=3, a_3=3^2-1=8, \\ a_4=4^2-1=15, a_5=5^2-1=24$$

03 답 4, 10, 28, 82, 244

$$a_1=3^1+1=4, a_2=3^2+1=10, a_3=3^3+1=28, \\ a_4=3^4+1=82, a_5=3^5+1=244$$

04 답 $2, \frac{5}{2}, \frac{10}{3}, \frac{17}{4}, \frac{26}{5}$

$$a_1=1+\frac{1}{1}=2, a_2=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}, a_3=3+\frac{1}{3}=\frac{10}{3}, \\ a_4=4+\frac{1}{4}=\frac{17}{4}, a_5=5+\frac{1}{5}=\frac{26}{5}$$

05 답 2, 6, 12, 20, 30

$$a_1=1 \times 2 = 2, a_2=2 \times 3 = 6, a_3=3 \times 4 = 12, \\ a_4=4 \times 5 = 20, a_5=5 \times 6 = 30$$

06 답 $a_n=10^{n-1}$ 07 답 $a_n=(-1)^n \times (n+1)$ 08 답 $a_n=\frac{n(n+1)}{5^n}$

09 답 7, 10

$4-1=3$ 이므로 공차가 3이다. 따라서 주어진 수열은
1, 4, 7, 10, 13, ...

10 답 -12, 0

$-4-(-8)=4$ 이므로 공차가 4이다. 따라서 주어진 수열은
-16, -12, -8, -4, 0, ...

11 답 첫째항: -3, 공차: 2

$a_1=2 \times 1 - 5 = -3$ 이므로 첫째항은 -3이다.
이때 $a_2=2 \times 2 - 5 = -1$ 이므로 공차는
 $a_2-a_1=-1-(-3)=2$

12 답 첫째항: $-\frac{1}{2}$, 공차: $-\frac{5}{2}$

$a_1=-\frac{5}{2} \times 1 + 2 = -\frac{1}{2}$ 이므로 첫째항은 $-\frac{1}{2}$ 이다.

이때 $a_2=-\frac{5}{2} \times 2 + 2 = -3$ 이므로 공차는

$$a_2-a_1=-3-\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{5}{2}$$

13 답 $a_n=3n-5$

$$a_n=-2+(n-1) \times 3=3n-5$$

14 답 $a_n=4n-10$

$$a_n=-6+(n-1) \times 4=4n-10$$

15 답 $a_n=-2n-1$

$$a_n=-3+(n-1) \times (-2)=-2n-1$$

16 답 $a_n=-2n+4$

첫째항이 2, 공차가 -2이므로

$$a_n=2+(n-1) \times (-2)=-2n+4$$

17 답 $a_n=4n-3$

첫째항이 1, 공차가 4이므로

$$a_n=1+(n-1) \times 4=4n-3$$

18 답 $a_n=-4n+7$

첫째항이 3, 공차가 -4이므로

$$a_n=3+(n-1) \times (-4)=-4n+7$$

19 답 $a_n=-5n+10$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_{10}=-40 \text{에서 } 5+9d=-40$$

$$9d=-45 \quad \therefore d=-5$$

$$\therefore a_n=5+(n-1) \times (-5)=-5n+10$$

20 답 $a_n=2n+4$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_2=8 \text{에서 } a+d=8 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_{10}=24 \text{에서 } a+9d=24 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 을 연립하여 풀면 $a=6, d=2$

$$\therefore a_n=6+(n-1) \times 2=2n+4$$

21 답 26

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3=-2 \text{에서 } a+2d=-2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_6=10 \text{에서 } a+5d=10 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 을 연립하여 풀면 $a=-10, d=4$

$$\therefore a_n=-10+(n-1) \times 4=4n-14$$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 제10항은

$$a_{10}=4 \times 10 - 14 = 26$$

22 답 -4

수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_8=32 \text{에서 } 60+7d=32$$

$$7d=-28 \quad \therefore d=-4$$

23 **답** $\frac{1}{2}$ 수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_6 = 3 \text{에서 } \frac{1}{2} + 5d = 3$$

$$5d = \frac{5}{2} \quad \therefore d = \frac{1}{2}$$

24 **답** 2수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_{10} = -82 \text{에서 } -100 + 9d = -82$$

$$9d = 18 \quad \therefore d = 2$$

25 **답** -1세 수 3, x , -5가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$x = \frac{3 + (-5)}{2} = -1$$

26 **답** $\frac{1}{5}$ 세 수 x , $5x$, $4x+1$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2 \times 5x = x + (4x+1), 10x = 5x + 1 \quad \therefore x = \frac{1}{5}$$

27 **답** -2 또는 1세 수 x , 1, x^2 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2 \times 1 = x + x^2, x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x+2)(x-1) = 0 \quad \therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 1$$

참고 (i) $x = -2$ 일 때, 세 수는 -2, 1, 4이므로 공차가 3인 등차수열이 된다.

(ii) $x = 1$ 일 때, 세 수는 1, 1, 1이므로 공차가 0인 등차수열이 된다.

28 **답** -2 또는 3세 수 x , x^2+x-2 , $3x+8$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2(x^2+x-2) = x + (3x+8), x^2-x-6 = 0$$

$$(x+2)(x-3) = 0 \quad \therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 3$$

참고 (i) $x = -2$ 일 때, 세 수는 -2, 0, 2이므로 공차가 2인 등차수열이 된다.

(ii) $x = 3$ 일 때, 세 수는 3, 10, 17이므로 공차가 7인 등차수열이 된다.

29 **답** 105

$$\frac{10(-3+24)}{2} = 105$$

30 **답** 210

$$\frac{15(5+23)}{2} = 210$$

31 **답** 450등차수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 2 + (n-1) \times 4 = 4n - 2 \text{이므로}$$

$$4n - 2 = 58 \quad \therefore n = 15$$

따라서 첫째항이 2, 끝항이 58, 항수가 15인 등차수열의 합은

$$\frac{15(2+58)}{2} = 450$$

32 **답** 465등차수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 30 + (n-1) \times (-1) = -n + 31 \text{이므로}$$

$$-n + 31 = 1 \quad \therefore n = 30$$

따라서 첫째항이 30, 끝항이 1, 항수가 30인 등차수열의 합은

$$\frac{30(30+1)}{2} = 465$$

33 **답** 440

첫째항이 3, 공차가 2인 등차수열의 첫째항부터 제20항까지의 합은

$$\frac{20\{2 \times 3 + (20-1) \times 2\}}{2} = 440$$

34 **답** 470

첫째항이 -5, 공차가 3인 등차수열의 첫째항부터 제20항까지의 합은

$$\frac{20\{2 \times (-5) + (20-1) \times 3\}}{2} = 470$$

35 **답** -580

첫째항이 9, 공차가 -4인 등차수열의 첫째항부터 제20항까지의 합은

$$\frac{20\{2 \times 9 + (20-1) \times (-4)\}}{2} = -580$$

36 **답** 490

첫째항이 53, 공차가 -3인 등차수열의 첫째항부터 제20항까지의 합은

$$\frac{20\{2 \times 53 + (20-1) \times (-3)\}}{2} = 490$$

37 **답** $a_n = 2n + 3$ (i) $n = 1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 1^2 + 4 \times 1 = 5$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 + 4n - \{(n-1)^2 + 4(n-1)\} \\ &= 2n + 3 \end{aligned}$$

.....㉠

이때 $a_1 = 5$ 는 ㉠에 $n = 1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n + 3$$

38 **답** $a_n = 4n - 1$ (i) $n = 1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 2 \times 1^2 + 1 = 3$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 2n^2 + n - \{2(n-1)^2 + (n-1)\} \\ &= 4n - 1 \end{aligned}$$

.....㉡

이때 $a_1 = 3$ 은 ㉡에 $n = 1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 4n - 1$$

39 ㉡ $a_1=1, a_n=2n-2 (n \geq 2)$

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1=S_1=1^2-1+1=1$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 - n + 1 - \{(n-1)^2 - (n-1) + 1\} \\ &= 2n - 2 \end{aligned}$$

.....㉠

이때 $a_1=1$ 은 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같지 않으므로

$$a_1=1, a_n=2n-2 (n \geq 2)$$

40 ㉡ -15

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1=S_1=-1^2+2 \times 1=1$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= -n^2 + 2n - \{-(n-1)^2 + 2(n-1)\} \\ &= -2n + 3 \end{aligned}$$

.....㉠

이때 $a_1=1$ 은 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = -2n + 3$$

$$\therefore a_9 = -2 \times 9 + 3 = -15$$

다른 풀이

$$\begin{aligned} a_9 &= S_9 - S_8 = (-9^2 + 2 \times 9) - (-8^2 + 2 \times 8) \\ &= -63 - (-48) = -15 \end{aligned}$$

유형 완성하기

p.211~223

01 ㉡ ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_7=24 \text{에서 } a+6d=24$$

.....㉠

$$a_{10}=15 \text{에서 } a+9d=15$$

.....㉡

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a=42, d=-3$$

$$\therefore a_n = 42 + (n-1) \times (-3) = -3n + 45$$

$$a_k=0 \text{에서 } -3k+45=0 \quad \therefore k=15$$

01-1 ㉡ ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_9=70 \text{에서 } a+8d=70$$

.....㉠

$$a_{16}=84 \text{에서 } a+15d=84$$

.....㉡

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a=54, d=2$$

$$\therefore a_n = 54 + (n-1) \times 2 = 2n + 52$$

$$100 \text{을 제 } n \text{항이라 하면 } 2n+52=100$$

$$2n=48 \quad \therefore n=24$$

따라서 100은 제24항이다.

02 ㉡ ①

등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 공차가 각각 1, -2이므로

$$a_n = a_1 + (n-1) \times 1 = n + a_1 - 1$$

$$b_n = b_1 + (n-1) \times (-2) = -2n + b_1 + 2$$

$$\therefore 4a_n + b_n = 4(n + a_1 - 1) + (-2n + b_1 + 2)$$

$$= 4a_1 + b_1 + 2(n-1)$$

따라서 등차수열 $\{4a_n + b_n\}$ 의 공차는 2이다.

02-1 ㉡ 4

등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 공차가 각각 7, 5이므로

$$a_n = a_1 + (n-1) \times 7 = 7n + a_1 - 7$$

$$b_n = b_1 + (n-1) \times 5 = 5n + b_1 - 5$$

$$\begin{aligned} \therefore 2(a_n - b_n) &= 2\{(7n + a_1 - 7) - (5n + b_1 - 5)\} \\ &= 2(a_1 - b_1) + 4(n-1) \end{aligned}$$

따라서 등차수열 $\{2(a_n - b_n)\}$ 의 공차는 4이다.

03 ㉡ 20

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

등차수열 $\{a_{3n}\}$ 은 $a_3, a_6, a_9, \dots$ 이고 공차가 12이므로

$$a_6 - a_3 = 12, (a + 5d) - (a + 2d) = 12$$

$$3d = 12 \quad \therefore d = 4$$

.....①

등차수열 $\{a_{5n-1}\}$ 은 $a_4, a_9, a_{14}, \dots$ 이므로

$$a_9 - a_4 = (a + 8d) - (a + 3d) = 5d = 5 \times 4 = 20$$

따라서 등차수열 $\{a_{5n-1}\}$ 의 공차는 20이다.

.....②

채점 기준	비율
① 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 구할 수 있다.	50%
② 등차수열 $\{a_{5n-1}\}$ 의 공차를 구할 수 있다.	50%

03-1 ㉡ 82

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

등차수열 $\{a_{4n+2}\}$ 은 $a_6, a_{10}, a_{14}, \dots$ 이고 공차가 16이므로

$$a_{10} - a_6 = 16, (a + 9d) - (a + 5d) = 16$$

$$4d = 16 \quad \therefore d = 4$$

따라서 $a_n = 6 + (n-1) \times 4 = 4n + 2$ 이므로

$$a_{20} = 4 \times 20 + 2 = 82$$

04 ㉡ ⑤

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_1 + a_2 = 10 \text{에서 } a + (a + d) = 10$$

$$\therefore 2a + d = 10$$

.....㉠

$$a_3 + a_4 + a_5 = 45 \text{에서 } (a + 2d) + (a + 3d) + (a + 4d) = 45$$

$$3a + 9d = 45 \quad \therefore a + 3d = 15$$

.....㉡

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a=3, d=4$$

따라서 $a_n = 3 + (n-1) \times 4 = 4n - 1$ 이므로

$$a_{10} = 4 \times 10 - 1 = 39$$

04-1 ㉡ 24

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 + a_5 = 26 \text{에서 } (a + 2d) + (a + 4d) = 26$$

$$2a + 6d = 26 \quad \therefore a + 3d = 13$$

.....㉠

$$a_4 - a_7 = -12 \text{에서 } (a + 3d) - (a + 6d) = -12$$

$$-3d = -12 \quad \therefore d = 4$$

$$d=4 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } a+12=13 \quad \therefore a=1$$

$$\therefore a_n = 1 + (n-1) \times 4 = 4n - 3$$

$$a_k = 93 \text{에서 } 4k - 3 = 93$$

$$4k = 96 \quad \therefore k = 24$$

05 ㉓ ③

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_5=10$ 에서 $a+4d=10$
 $a_3:a_9=4:7$ 에서 $(a+2d):(a+8d)=4:7$
 $7(a+2d)=4(a+8d), 3a-18d=0$
 $\therefore a-6d=0$
 ㉓, ㉔을 연립하여 풀면 $a=6, d=1$
 따라서 $a_n=6+(n-1)\times 1=n+5$ 이므로
 $a_{20}=20+5=25$

.....㉓

.....㉔

05-1 ㉓ ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_2+a_4=12$ 에서 $(a+d)+(a+3d)=12$
 $2a+4d=12 \therefore a+2d=6$
 $a_3:a_5=3:7$ 에서 $(a+2d):(a+4d)=3:7$
 $7(a+2d)=3(a+4d), 4a+2d=0$
 $\therefore 2a+d=0$
 ㉓, ㉔을 연립하여 풀면 $a=-2, d=4$
 따라서 $a_n=-2+(n-1)\times 4=4n-6$ 이므로
 $a_{15}=4\times 15-6=54$

.....㉓

.....㉔

06 ㉓ 66

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_4=-a_{12}$ 이므로 $a+3d=-(a+11d)$
 $2a+14d=0 \therefore a+7d=0$
 $a_{10}=6$ 에서 $a+9d=6$
 ㉓, ㉔을 연립하여 풀면 $a=-21, d=3$
 따라서 $a_n=-21+(n-1)\times 3=3n-24$ 이므로
 $a_{30}=3\times 30-24=66$

.....㉓

.....㉔

06-1 ㉓ -470

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 (i) $a_3=a_9$ 일 때
 $a+2d=a+8d$ 이므로 $d=0$
 그런데 공차가 0이므로 조건을 만족시키지 않는다.
 (ii) $a_3=-a_9$ 일 때
 $a+2d=-(a+8d)$ 이므로
 $2a+10d=0 \therefore a+5d=0$
 $a_7=-5$ 에서 $a+6d=-5$
 ㉓, ㉔을 연립하여 풀면 $a=25, d=-5$
 따라서 $a_n=25+(n-1)\times (-5)=-5n+30$ 이므로
 $a_{100}=-5\times 100+30=-470$

.....㉓

.....㉔

.....㉕

채점 기준	비율
① 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 구할 수 있다.	50%
② a_n 을 구할 수 있다.	30%
③ a_{100} 의 값을 구할 수 있다.	20%

07 ㉓ ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_5=21$ 에서 $a+4d=21$
 $a_{20}=-39$ 에서 $a+19d=-39$
 ㉓, ㉔을 연립하여 풀면 $a=37, d=-4$
 $\therefore a_n=37+(n-1)\times (-4)=-4n+41$

.....㉓

.....㉔

$$-4n+41<0 \text{에서 } -4n<-41$$

$$\therefore n>\frac{41}{4}=10.25$$

따라서 처음으로 음수가 되는 항은 제11항이다.

07-1 ㉓ ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_2+a_4=30$ 에서 $(a+d)+(a+3d)=30$
 $2a+4d=30 \therefore a+2d=15$
 $a_3+a_5=26$ 에서 $(a+2d)+(a+4d)=26$
 $2a+6d=26 \therefore a+3d=13$
 ㉓, ㉔을 연립하여 풀면 $a=19, d=-2$
 $\therefore a_n=19+(n-1)\times (-2)=-2n+21$
 $-2n+21<-10$ 에서 $-2n<-31 \therefore n>\frac{31}{2}=15.5$
 따라서 처음으로 -10 보다 작아지는 항은 제16항이다.

.....㉓

.....㉔

08 ㉓ 제17항

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_7=-29$ 에서 $a+6d=-29$
 $a_{10}=-20$ 에서 $a+9d=-20$
 ㉓, ㉔을 연립하여 풀면 $a=-47, d=3$
 $\therefore a_n=-47+(n-1)\times 3=3n-50$
 $3n-50>0$ 에서 $3n>50 \therefore n>\frac{50}{3}=16.6\cdots$
 따라서 처음으로 양수가 되는 항은 제17항이다.

.....㉓

.....㉔

08-1 ㉓ 8

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_1+a_3=-70$ 에서 $a+(a+2d)=-70$
 $2a+2d=-70 \therefore a+d=-35$
 $a_2+a_4=-54$ 에서 $(a+d)+(a+3d)=-54$
 $2a+4d=-54 \therefore a+2d=-27$
 ㉓, ㉔을 연립하여 풀면 $a=-43, d=8$
 $\therefore a_n=-43+(n-1)\times 8=8n-51$
 $a_k>10$ 에서 $8k-51>10$
 $8k>61 \therefore k>\frac{61}{8}=7.625$
 따라서 자연수 k 의 최솟값은 8이다.

.....㉓

.....㉔

.....㉕

채점 기준	비율
① 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 구할 수 있다.	40%
② a_n 을 구할 수 있다.	20%
③ 자연수 k 의 최솟값을 구할 수 있다.	40%

09 ㉓ 13

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_5=25$ 에서 $a+4d=25$
 $a_{15}=95$ 에서 $a+14d=95$
 ㉓, ㉔을 연립하여 풀면 $a=-3, d=7$
 $\therefore a_n=-3+(n-1)\times 7=7n-10$
 $10\leq a_k<100$ 에서 $10\leq 7k-10<100, 20\leq 7k<110$
 $\therefore \frac{20}{7}\leq k<\frac{110}{7}$, 즉 $2.8\cdots\leq k<15.7\cdots$
 따라서 자연수 k 의 값은 3, 4, 5, ..., 15이므로 그 개수는 13이다.

.....㉓

.....㉔

09-1 ㉓ 3

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 5, 공차가 3이므로

$$a_n = 5 + (n-1) \times 3 = 3n + 2$$

등차수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항이 29, 공차가 -2이므로

$$b_n = 29 + (n-1) \times (-2) = -2n + 31$$

$$2a_k \leq b_k \text{에서 } 2(3k+2) \leq -2k+31$$

$$6k+4 \leq -2k+31, 8k \leq 27$$

$$\therefore k \leq \frac{27}{8} = 3.375$$

따라서 자연수 k 의 값은 1, 2, 3이므로 그 개수는 3이다.

10 ㉓ 36

첫째항이 1, 제21항이 101인 등차수열의 공차를 d 라 하면

$$1 + 20d = 101, 20d = 100 \quad \therefore d = 5$$

이때 a_7 은 주어진 수열의 제8항이므로

$$a_7 = 1 + (8-1) \times 5 = 36$$

10-1 ㉓ 168

첫째항이 4, 제5항이 108인 등차수열의 공차를 d 라 하면

$$4 + 4d = 108, 4d = 104 \quad \therefore d = 26$$

따라서 $a = 4 + 26 = 30$, $b = 4 + 2 \times 26 = 56$, $c = 4 + 3 \times 26 = 82$ 이므로

$$a + b + c = 30 + 56 + 82 = 168$$

11 ㉓ 20

첫째항이 -5, 공차가 $\frac{1}{3}$ 인 등차수열의 제 $(n+2)$ 항이 2이므로

$$-5 + (n+1) \times \frac{1}{3} = 2, \frac{1}{3}(n+1) = 7$$

$$n+1 = 21 \quad \therefore n = 20$$

11-1 ㉓ 12

첫째항이 43, 공차가 -3인 등차수열의 제 $(n+2)$ 항이 4이므로

$$43 + (n+1) \times (-3) = 4$$

$$-3(n+1) = -39, n+1 = 13 \quad \therefore n = 12$$

12 ㉓ 5

주어진 수열을 $\{b_n\}$ 이라 하면 수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 -1, 제7항이 3인 등차수열이므로 공차를 d 라 하면

$$-1 + 6d = 3, 6d = 4 \quad \therefore d = \frac{2}{3}$$

$$\therefore b_n = -1 + (n-1) \times \frac{2}{3}$$

이때 등차수열 $\{b_n\}$ 의 제 $(n+3)$ 항이 11이므로

$$-1 + (n+2) \times \frac{2}{3} = 11, \frac{2}{3}(n+2) = 12$$

$$n+2 = 18 \quad \therefore n = 16$$

12-1 ㉓ 14

첫째항이 -11, 공차가 2인 등차수열의 제 $(m+2)$ 항이 3이므로

$$-11 + (m+1) \times 2 = 3, 2(m+1) = 14$$

$$m+1 = 7 \quad \therefore m = 6$$

이때 제 $(m+n+3)$ 항, 즉 제 $(n+9)$ 항이 21이므로

$$-11 + (n+8) \times 2 = 21, 2(n+8) = 32$$

$$n+8 = 16 \quad \therefore n = 8$$

$$\therefore m+n = 6+8 = 14$$

채점 기준	비율
① m 의 값을 구할 수 있다.	40%
② n 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $m+n$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

13 ㉓ 2

세 수 $x+4$, x^2+2x , $x+8$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2(x^2+2x) = (x+4) + (x+8), x^2+x-6=0$$

$$(x+3)(x-2)=0 \quad \therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 모든 실수 x 의 값의 합은

$$-3+2 = -1$$

참고

(i) $x = -3$ 일 때, 세 수는 1, 3, 5이므로 공차가 2인 등차수열이 된다.

(ii) $x = 2$ 일 때, 세 수는 6, 8, 10이므로 공차가 2인 등차수열이 된다.

13-1 ㉓ $a=5, b=11$

세 수 2, a , 8이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2a = 2+8 \quad \therefore a = 5$$

세 수 a , 8, b 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2 \times 8 = a+b, 16 = 5+b$$

$$\therefore b = 11$$

14 ㉓ $\frac{1}{3}$

다항식 $f(x) = ax^2 + x + 4$ 를 일차식 $x+1$, $x-1$, $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 나머지정리에 의하여

$$f(-1) = a - 1 + 4 = a + 3$$

$$f(1) = a + 1 + 4 = a + 5$$

$$f(2) = 4a + 2 + 4 = 4a + 6$$

즉 세 수 $a+3$, $a+5$, $4a+6$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2(a+5) = (a+3) + (4a+6), 2a+10 = 5a+9$$

$$3a = 1 \quad \therefore a = \frac{1}{3}$$

Lecture

나머지정리

다항식 $f(x)$ 를 일차식 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지는 $f(a)$ 이다.

14-1 ㉓ 9

다항식 $f(x) = x^2 - ax - 36$ 을 일차식 $x-1$, $x-2$, $x-4$ 로 나누었을 때의 나머지는 나머지정리에 의하여

$$R_1 = f(1) = 1 - a - 36 = -a - 35$$

$$R_2 = f(2) = 4 - 2a - 36 = -2a - 32$$

$$R_3 = f(4) = 16 - 4a - 36 = -4a - 20$$

즉 세 수 R_1, R_2, R_3 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2R_2 = R_1 + R_3$$

$$2(-2a-32) = (-a-35) + (-4a-20)$$

$$-4a-64 = -5a-55$$

$$\therefore a = 9$$

채점 기준	비율
① R_1, R_2, R_3 를 구할 수 있다.	40%
② R_1, R_2, R_3 사이의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.	40%
③ a 의 값을 구할 수 있다.	20%

15 ㉮ 90

세 수 $\log_3 2, \log_3 a, \log_3 18$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로
 $2 \log_3 a = \log_3 2 + \log_3 18, \log_3 a^2 = \log_3 36$
 $a^2 = 36 \quad \therefore a = 6$ ($\because a$ 는 자연수)
세 수 $\log_3 a, \log_3 18, \log_3 b$, 즉 $\log_3 6, \log_3 18, \log_3 b$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로
 $2 \log_3 18 = \log_3 6 + \log_3 b, \log_3 18^2 = \log_3 6b$
 $6b = 18^2 \quad \therefore b = 54$
이때 세 수 b, c, a 도 이 순서대로 등차수열을 이루므로
 $c = \frac{b+a}{2} = \frac{54+6}{2} = 30$
 $\therefore a+b+c = 6+54+30 = 90$

15-1 ㉮ -8

세 수 $\log_2 6, a, \log_2 24$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로
 $2a = \log_2 6 + \log_2 24, 2a = \log_2 144 = 2 \log_2 12$
 $\therefore a = \log_2 12$
세 수 $a, \log_2 24, b$, 즉 $\log_2 12, \log_2 24, b$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로
 $2 \log_2 24 = \log_2 12 + b$
 $\therefore b = 2 \log_2 24 - \log_2 12 = \log_2 48$
세 수 $2, c, 8$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로
 $2c = 2 + 8 = 10 \quad \therefore c = 5$
세 수 $c, 8, d$, 즉 $5, 8, d$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로
 $2 \times 8 = 5 + d \quad \therefore d = 11$
 $\therefore a - b + c - d = \log_2 12 - \log_2 48 + 5 - 11$
 $= \log_2 \frac{1}{4} + 5 - 11 = -8$

16 ㉮ 384

네 수를 $a-3d, a-d, a+d, a+3d$ 라 하면
네 수의 합이 20이므로
 $(a-3d) + (a-d) + (a+d) + (a+3d) = 20$
 $4a = 20 \quad \therefore a = 5$
가운데 두 수의 곱은 처음 수와 마지막 수의 곱보다 8만큼 크므로
 $(5-d)(5+d) = (5-3d)(5+3d) + 8$
 $25 - d^2 = 25 - 9d^2 + 8, 8d^2 = 8$
 $d^2 = 1 \quad \therefore d = \pm 1$
따라서 네 수는 2, 4, 6, 8이므로 네 수의 곱은
 $2 \times 4 \times 6 \times 8 = 384$

16-1 ㉮ -25

네 수를 $a-3d, a-d, a+d, a+3d$ 라 하면
네 수의 합이 -28이므로
 $(a-3d) + (a-d) + (a+d) + (a+3d) = -28$
 $4a = -28 \quad \therefore a = -7$
가장 작은 수와 가장 큰 수의 곱이 -275이므로
 $(-7-3d)(-7+3d) = -275, 49 - 9d^2 = -275$

$$9d^2 = 324, d^2 = 36 \quad \therefore d = \pm 6$$

따라서 네 수는 -25, -13, -1, 11이므로 가장 작은 수는 -25이다.

17 ㉮ 5

삼차방정식의 세 근을 $a-d, a, a+d$ 라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 세 근의 합은
 $(a-d) + a + (a+d) = 6$
 $3a = 6 \quad \therefore a = 2$
따라서 주어진 방정식의 한 근이 2이므로 방정식에 $x=2$ 를 대입하면
 $2^3 - 6 \times 2^2 + 2k - 6 = 0, 2k = 22$
 $\therefore k = 11$

Lecture 삼차방정식의 근과 계수의 관계


삼차방정식 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하면
 $\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}, \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$

17-1 ㉮ 3

삼차방정식의 세 근을 $a-d, a, a+d$ 라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 세 근의 합은
 $(a-d) + a + (a+d) = 9$
 $3a = 9 \quad \therefore a = 3$
따라서 주어진 방정식의 한 근이 3이므로 방정식에 $x=3$ 을 대입하면
 $3^3 - 9 \times 3^2 + 11 \times 3 + k = 0$
 $\therefore k = 21$

18 ㉮ 25 π

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형의 세 변의 길이를 $a-d, a, a+d$ ($a > 0, d > 0$)라 하면 직각삼각형의 넓이가 24이므로



$$\frac{1}{2}a(a-d) = 24$$

$$\therefore a^2 - ad = 48$$

피타고라스 정리에 의하여

$$(a+d)^2 = a^2 + (a-d)^2, a^2 - 4ad = 0$$

$$a(a-4d) = 0 \quad \therefore a = 4d \quad (\because a > 0)$$

$$\textcircled{1} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } 16d^2 - 4d^2 = 48$$

$$12d^2 = 48, d^2 = 4 \quad \therefore d = 2 \quad (\because d > 0)$$

$$d = 2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } a = 4 \times 2 = 8$$

따라서 직각삼각형의 세 변의 길이는 6, 8, 10이고 가장 긴 변이 외접원의 지름이므로 외접원의 넓이는

$$\pi \times 5^2 = 25\pi$$

18-1 ㉮ $\frac{27}{8}$

세 수 $p, 3, q$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로 공차를 d 라 하면
 $p = 3 - d, q = 3 + d$


오른쪽 그림과 같이 q 가 직각삼각형의 빗변의 길이
이를 나타내므로 피타고라스 정리에 의하여

$$q^2 = 3^2 + p^2$$

$$(3+d)^2 = 3^2 + (3-d)^2$$

$$12d = 9 \quad \therefore d = \frac{3}{4}$$

$$\therefore p = 3 - \frac{3}{4} = \frac{9}{4}, q = 3 + \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$$



따라서 직각삼각형의 세 변의 길이는 $\frac{9}{4}$, 3, $\frac{15}{4}$ 이므로 직각삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{9}{4} \times 3 = \frac{27}{8}$$

다른 풀이

세 수 $p, 3, q$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$p+q=6 \quad \therefore q=6-p \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또 $p, 3, q$ 는 직각삼각형의 세 변의 길이이고, 가장 긴 변의 길이가 q 이므로 피타고라스 정리에 의하여

$$q^2=3^2+p^2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$(6-p)^2=3^2+p^2, 36-12p+p^2=p^2+9$$

$$12p=27 \quad \therefore p=\frac{9}{4}$$

따라서 직각삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{9}{4} \times 3 = \frac{27}{8}$$

19 ㉮ ⑤

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3=-2 \text{에서 } a+2d=-2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_7=14 \text{에서 } a+6d=14 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a=-10, d=4$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{10\{2 \times (-10) + (10-1) \times 4\}}{2} = 80$$

19-1 ㉮ -230

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면 첫째항부터 제12항까지의 합이 -90 이므로

$$\frac{12\{2a + (12-1) \times (-1)\}}{2} = -90$$

$$12a-66=-90, 12a=-24$$

$$\therefore a=-2$$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합은

$$\frac{20\{2 \times (-2) + (20-1) \times (-1)\}}{2} = -230$$

20 ㉮ -5

첫째항이 100, 제 n 항이 0이고, 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 1050이므로

$$\frac{n(100+0)}{2} = 1050, 50n=1050$$

$$\therefore n=21$$

즉 $a_{21}=0$ 이므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$100+20d=0, 20d=-100 \quad \therefore d=-5$$

20-1 ㉮ ①

첫째항이 50, 제 n 항이 -10 이고, 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 220이므로

$$\frac{n\{50 + (-10)\}}{2} = 220, 20n=220$$

$$\therefore n=11$$

즉 $a_{11}=-10$ 이므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$50+10d=-10, 10d=-60 \quad \therefore d=-6$$

21 ㉮ 330

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_5+a_{10}=15 \text{에서 } (a+4d)+(a+9d)=15$$

$$\therefore 2a+13d=15 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_7+a_{12}=27 \text{에서 } (a+6d)+(a+11d)=27$$

$$\therefore 2a+17d=27 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a=-12, d=3$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합은

$$\frac{20\{2 \times (-12) + (20-1) \times 3\}}{2} = 330$$

21-1 ㉮ 220

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_2+a_5+a_8=57 \text{에서 } (-5+d)+(-5+4d)+(-5+7d)=57$$

$$-15+12d=57, 12d=72$$

$$\therefore d=6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{10\{2 \times (-5) + (10-1) \times 6\}}{2} = 220 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

채점 기준	비율
① 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 구할 수 있다.	50%
② 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합을 구할 수 있다.	50%

22 ㉮ 8

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_6=44 \text{에서 } a+5d=44 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_{18}=116 \text{에서 } a+17d=116 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a=14, d=6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 280이므로

$$\frac{n\{2 \times 14 + (n-1) \times 6\}}{2} = 280 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$3n^2+11n-280=0, (3n+35)(n-8)=0$$

$$\therefore n=-\frac{35}{3} \text{ 또는 } n=8$$

그런데 n 은 자연수이므로 $n=8$ $\dots\dots \textcircled{3}$

채점 기준	비율
① 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 구할 수 있다.	40%
② 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
③ n 의 값을 구할 수 있다.	20%

22-1 ㉮ ③

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_5=10 \text{에서 } a+4d=10 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_2:a_4=1:2 \text{에서 } (a+d):(a+3d)=1:2$$

$$2(a+d)=a+3d \quad \therefore a=d \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a=2, d=2$

이때 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 110이므로

$$\frac{n\{2 \times 2 + (n-1) \times 2\}}{2} = 110$$

$$n^2+n-110=0, (n+11)(n-10)=0$$

$$\therefore n=-11 \text{ 또는 } n=10$$

그런데 n 은 자연수이므로 $n=10$

23 ㉔ ④

등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 공차를 각각 d, d' 이라 하면

$$a_1 + b_1 = 4, d + d' = 2 \text{이므로}$$

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_{15}) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_{15})$$

$$= \frac{15(2a_1 + 14d)}{2} + \frac{15(2b_1 + 14d')}{2}$$

$$= \frac{15\{2(a_1 + b_1) + 14(d + d')\}}{2}$$

$$= \frac{15(2 \times 4 + 14 \times 2)}{2}$$

$$= 270$$

다른 풀이

수열 $\{a_n + b_n\}$ 은 첫째항이 4, 공차가 2인 등차수열이므로

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_{15}) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_{15})$$

$$= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots + (a_{15} + b_{15})$$

$$= \frac{15\{2 \times 4 + (15-1) \times 2\}}{2}$$

$$= 270$$

참고 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차가 d , 등차수열 $\{b_n\}$ 의 공차가 d' 이면 수열 $\{a_n + b_n\}$ 은 첫째항이 $a_1 + b_1$, 공차가 $d + d'$ 인 등차수열이다.

23-1 ㉔ 500

$$a_1 + b_1 + c_1 = 7, a_{20} + b_{20} + c_{20} = 43 \text{이므로}$$

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_{20}) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_{20}) + (c_1 + c_2 + \cdots + c_{20})$$

$$= \frac{20(a_1 + a_{20})}{2} + \frac{20(b_1 + b_{20})}{2} + \frac{20(c_1 + c_{20})}{2}$$

$$= 10(a_1 + a_{20}) + 10(b_1 + b_{20}) + 10(c_1 + c_{20})$$

$$= 10\{(a_1 + b_1 + c_1) + (a_{20} + b_{20} + c_{20})\}$$

$$= 10(7 + 43)$$

$$= 500$$

24 ㉔ 260

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 8, 공차가 -2 이므로

$$a_n = 8 + (n-1) \times (-2) = -2n + 10$$

$$a_n < 0 \text{에서 } -2n + 10 < 0$$

$$-2n < -10 \quad \therefore n > 5$$

즉 등차수열 $\{a_n\}$ 은 제6항부터 음수이다.

이때 $a_1 = 8, a_5 = 0, a_6 = -2, a_{20} = -30$ 이므로

$$|a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots + |a_{20}|$$

$$= (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5) - (a_6 + a_7 + a_8 + \cdots + a_{20})$$

$$= \frac{5(8+0)}{2} - \frac{15\{-2+(-30)\}}{2} \quad \text{제6항부터 제20항까지의 항수는 } 20-6+1=15$$

$$= 20 + 240$$

$$= 260$$

24-1 ㉔ 578

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 = 9 \text{에서 } a + 2d = 9 \quad \cdots \text{㉔}$$

$$a_{15} = -15 \text{에서 } a + 14d = -15 \quad \cdots \text{㉕}$$

$$\text{㉔, ㉕을 연립하여 풀면 } a = 13, d = -2$$

$$\therefore a_n = 13 + (n-1) \times (-2) = -2n + 15$$

$$a_n < 0 \text{에서 } -2n + 15 < 0$$

$$-2n < -15 \quad \therefore n > \frac{15}{2} = 7.5$$

즉 등차수열 $\{a_n\}$ 은 제8항부터 음수이다.

이때 $a_1 = 13, a_7 = 1, a_8 = -1, a_{30} = -45$ 이므로

$$|a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots + |a_{30}|$$

$$= (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_7) - (a_8 + a_9 + a_{10} + \cdots + a_{30})$$

$$= \frac{7(13+1)}{2} - \frac{23\{-1+(-45)\}}{2} \quad \text{제8항부터 제30항까지의 항수는 } 30-8+1=23$$

$$= 49 + 529$$

$$= 578$$

25 ㉔ ⑤

첫째항이 -5 , 끝항이 90 , 항수가 $(n+2)$ 인 등차수열의 합이 850

이므로 $\text{제}(n+2)\text{항이 } 90\text{이다.}$

$$\frac{(n+2)(-5+90)}{2} = 850, \frac{n+2}{2} = 10$$

$$n+2=20 \quad \therefore n=18$$

즉 90 이 제20항이므로 $-5 + (20-1)d = 90$

$$19d = 95 \quad \therefore d = 5$$

25-1 ㉔ 15

첫째항이 6 , 끝항이 34 , 항수가 $(n+2)$ 인 등차수열의 합이 300 이

므로

$$\frac{(n+2)(6+34)}{2} = 300, 20(n+2) = 300$$

$$n+2=15 \quad \therefore n=13$$

즉 34 가 제15항이므로 $6 + (15-1)d = 34$

$$14d = 28 \quad \therefore d = 2$$

$$\therefore d + n = 2 + 13 = 15$$

26 ㉔ 935

첫째항이 1 , 끝항이 109 , 항수가 19 인 등차수열의 합은

$$\frac{19(1+109)}{2} = 1045$$

즉 $1 + a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{17} + 109 = 1045$ 이므로

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{17} = 1045 - (1 + 109) = 935$$

26-1 ㉔ 336

첫째항이 2 , 끝항이 30 , 항수가 23 인 등차수열의 합은

$$\frac{23(2+30)}{2} = 368$$

따라서 $2 + a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{21} + 30 = 368$ 이므로

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{21} = 368 - (2 + 30) = 336$$

27 ㉔ 18

$$-30 + a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + 6 = -30 + (-216) + 6 = -240$$

즉 첫째항이 -30 , 끝항이 6 , 항수가 $(n+2)$ 인 등차수열의 합이

-240 이므로

$$\frac{(n+2)(-30+6)}{2} = -240, -12(n+2) = -240$$

$$n+2=20 \quad \therefore n=18$$

27-1 ㉮ ⑤

$-13 + a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + 85 = -13 + 468 + 85 = 540$
 즉 첫째항이 -13 , 끝항이 85 , 항수가 $(n+2)$ 인 등차수열의 합이 540 이므로

$$\frac{(n+2)(-13+85)}{2} = 540, 36(n+2) = 540$$

 $n+2=15 \quad \therefore n=13$
 또 85 가 제 15 항이므로 $-13 + (15-1)d = 85$
 $14d = 98 \quad \therefore d = 7$
 $\therefore d+n = 7+13 = 20$

28 ㉮ ⑤

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $S_{10} = -10$ 에서 $\frac{10\{2a + (10-1)d\}}{2} = -10$
 $\therefore 2a + 9d = -2$ ㉮
 $S_{20} = 180$ 에서 $\frac{20\{2a + (20-1)d\}}{2} = 180$
 $\therefore 2a + 19d = 18$ ㉮
 ㉮, ㉮을 연립하여 풀면 $a = -10, d = 2$
 $\therefore S_{30} = \frac{30\{2 \times (-10) + (30-1) \times 2\}}{2} = 570$

28-1 ㉮ 15

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $S_5 = 70$ 에서 $\frac{5\{2a + (5-1)d\}}{2} = 70$
 $\therefore a + 2d = 14$ ㉮
 $S_{10} = 190$ 에서 $\frac{10\{2a + (10-1)d\}}{2} = 190$
 $\therefore 2a + 9d = 38$ ㉮
 ㉮, ㉮을 연립하여 풀면 $a = 10, d = 2$
 $S_k = 360$ 에서 $\frac{k\{2 \times 10 + (k-1) \times 2\}}{2} = 360$
 $k^2 + 9k - 360 = 0, (k+24)(k-15) = 0$
 $\therefore k = -24$ 또는 $k = 15$
 그런데 k 는 자연수이므로 $k = 15$

29 ㉮ ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 $S_5 = S_{11}$ 이므로

$$\frac{5\{2 \times 15 + (5-1)d\}}{2} = \frac{11\{2 \times 15 + (11-1)d\}}{2}$$

 $150 + 20d = 330 + 110d, 90d = -180$
 $\therefore d = -2$
 $\therefore a_{15} = 15 + (15-1) \times (-2) = -13$

29-1 ㉮ ⑤

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 $S_3 = S_6$ 이므로

$$\frac{3\{2 \times 12 + (3-1)d\}}{2} = \frac{6\{2 \times 12 + (6-1)d\}}{2}$$

 $24 + 2d = 48 + 10d, 8d = -24$
 $\therefore d = -3$
 $\therefore a_{20} = 12 + (20-1) \times (-3) = -45$

30 ㉮ -216

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면
 $S_4 = -8$ 에서 $\frac{4\{2a + (4-1)d\}}{2} = -8$
 $\therefore 2a + 3d = -4$ ㉮
 $S_9 - S_4 = -55$ 에서 $\frac{9\{2a + (9-1)d\}}{2} - (-8) = -55$
 $\therefore a + 4d = -7$ ㉮
 ㉮, ㉮을 연립하여 풀면 $a = 1, d = -2$
 따라서 제 5 항부터 제 16 항까지의 합은
 $S_{16} - S_4 = \frac{16\{2 \times 1 + (16-1) \times (-2)\}}{2} - (-8) = -216$

30-1 ㉮ 480

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면
 $S_6 = 60$ 에서 $\frac{6\{2a + (6-1)d\}}{2} = 60$
 $\therefore 2a + 5d = 20$ ㉮
 $S_{10} - S_6 = 80$ 에서 $\frac{10\{2a + (10-1)d\}}{2} - 60 = 80$
 $\therefore 2a + 9d = 28$ ㉮
 ㉮, ㉮을 연립하여 풀면 $a = 5, d = 2$ ①
 따라서 첫째항부터 제 20 항까지의 합은
 $S_{20} = \frac{20\{2 \times 5 + (20-1) \times 2\}}{2} = 480$ ②

채점 기준	비율
① 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 구할 수 있다.	60%
② 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 20 항까지의 합을 구할 수 있다.	40%

31 ㉮ 606

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_5 = 64$ 에서 $a + 4d = 64$ ㉮
 $a_{10} = 19$ 에서 $a + 9d = 19$ ㉮
 ㉮, ㉮을 연립하여 풀면 $a = 100, d = -9$
 $\therefore a_n = 100 + (n-1) \times (-9) = -9n + 109$
 $-9n + 109 < 0$ 에서 $-9n < -109$
 $\therefore n > \frac{109}{9} = 12.1\cdots$
 즉 등차수열 $\{a_n\}$ 은 제 13 항부터 음수이므로 첫째항부터 제 12 항까지의 합이 최대이다.
 이때 $a_{12} = -9 \times 12 + 109 = 1$ 이므로 구하는 최댓값은
 $S_{12} = \frac{12(100+1)}{2} = 606$

31-1 ㉮ -51

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_3 = -10$ 에서 $a + 2d = -10$ ㉮
 $a_{10} = 11$ 에서 $a + 9d = 11$ ㉮
 ㉮, ㉮을 연립하여 풀면 $a = -16, d = 3$
 $\therefore a_n = -16 + (n-1) \times 3 = 3n - 19$
 $3n - 19 > 0$ 에서 $3n > 19$
 $\therefore n > \frac{19}{3} = 6.3\cdots$

즉 등차수열 $\{a_n\}$ 은 제7항부터 양수이므로 첫째항부터 제6항까지의 합이 최소이다.

이때 $a_6 = 3 \times 6 - 19 = -1$ 이므로 구하는 최솟값은

$$S_6 = \frac{6\{-16 + (-1)\}}{2} = -51$$

32 ㉡ 105

등차수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 26, 공차가 -4 이므로

$$a_n = 26 + (n-1) \times (-4) = -4n + 30 \quad \dots\dots ①$$

$$-4n + 30 < 0 \text{에서 } -4n < -30$$

$$\therefore n > \frac{30}{4} = 7.5$$

즉 등차수열 $\{a_n\}$ 은 제8항부터 음수이므로 첫째항부터 제7항까지의 합이 최대이다.

$$\therefore a = 7 \quad \dots\dots ②$$

이때 $a_7 = -4 \times 7 + 30 = 2$ 이므로 구하는 최댓값은

$$S_7 = \frac{7(26+2)}{2} = 98 \quad \therefore b = 98 \quad \dots\dots ③$$

$$\therefore a+b = 7+98 = 105 \quad \dots\dots ④$$

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	20%
② a 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ b 의 값을 구할 수 있다.	40%
④ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

32-1 ㉡ -81

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$S_{10} = -45 \text{에서 } \frac{10\{2a + (10-1)d\}}{2} = -45 \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore 2a + 9d = -9$$

$$S_{15} = 120 \text{에서 } \frac{15\{2a + (15-1)d\}}{2} = 120 \quad \dots\dots ②$$

$$\therefore a + 7d = 8$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a = -27, d = 5$

$$\therefore a_n = -27 + (n-1) \times 5 = 5n - 32$$

$$5n - 32 > 0 \text{에서 } 5n > 32$$

$$\therefore n > \frac{32}{5} = 6.4$$

즉 등차수열 $\{a_n\}$ 은 제7항부터 양수이므로 첫째항부터 제6항까지의 합이 최소이다.

$$\therefore p = 6$$

이때 $a_6 = 5 \times 6 - 32 = -2$ 이므로 구하는 최솟값은

$$S_6 = \frac{6\{-27 + (-2)\}}{2} = -87 \quad \therefore q = -87$$

$$\therefore p+q = 6 + (-87) = -81$$

33 ㉡ -12

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 $S_3 = S_8$ 이므로

$$\frac{3\{2 \times (-4) + (3-1)d\}}{2} = \frac{8\{2 \times (-4) + (8-1)d\}}{2}$$

$$3d - 12 = 28d - 32, 25d = 20 \quad \therefore d = \frac{4}{5}$$

$$\therefore a_n = -4 + (n-1) \times \frac{4}{5} = \frac{4}{5}n - \frac{24}{5}$$

$$\frac{4}{5}n - \frac{24}{5} > 0 \text{에서 } n > 6$$

즉 등차수열 $\{a_n\}$ 은 제7항부터 양수이므로 첫째항부터 제6항까지의 합이 최소이다.

$$\text{이때 } a_6 = \frac{4}{5} \times 6 - \frac{24}{5} = 0 \text{이므로 구하는 최솟값은}$$

$$S_6 = \frac{6(-4+0)}{2} = -12$$

33-1 ㉡ ②

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 $S_4 = S_{10}$ 이므로

$$\frac{4\{2 \times 39 + (4-1)d\}}{2} = \frac{10\{2 \times 39 + (10-1)d\}}{2}$$

$$6d + 156 = 45d + 390, 39d = -234$$

$$\therefore d = -6$$

$$\therefore a_n = 39 + (n-1) \times (-6) = -6n + 45$$

$$-6n + 45 < 0 \text{에서 } n > \frac{45}{6} = 7.5$$

즉 등차수열 $\{a_n\}$ 은 제8항부터 음수이므로 첫째항부터 제7항까지의 합이 최대이다.

이때 $a_7 = -6 \times 7 + 45 = 3$ 이므로 구하는 최댓값은

$$S_7 = \frac{7(39+3)}{2} = 147$$

34 ㉡ ②

100 이하의 자연수 중에서 7로 나누었을 때의 나머지가 2인 수를 작은 것부터 차례로 나열하면

$$2, 9, 16, \dots, 100$$

즉 첫째항이 2, 공차가 7인 등차수열이므로 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 2 + (n-1) \times 7 = 7n - 5$$

이때 100을 제 n 항이라 하면

$$7n - 5 = 100, 7n = 105 \quad \therefore n = 15$$

따라서 구하는 총합은 첫째항이 2, 끝항이 100, 항수가 15인 등차수열의 합이므로

$$\frac{15(2+100)}{2} = 765$$

34-1 ㉡ ②

100과 300 사이에 있는 자연수 중에서 8로 나누어떨어지는 수, 즉 8의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면

$$104, 112, 120, \dots, 296$$

즉 첫째항이 104, 공차가 8인 등차수열이므로 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 104 + (n-1) \times 8 = 8n + 96$$

이때 296을 제 n 항이라 하면

$$8n + 96 = 296, 8n = 200 \quad \therefore n = 25$$

따라서 구하는 총합은 첫째항이 104, 끝항이 296, 항수가 25인 등차수열의 합이므로

$$\frac{25(104+296)}{2} = 5000$$

35 ㉡ ③

2로 나누었을 때의 나머지가 1인 자연수를 작은 것부터 차례로 나열하면

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots$$

3으로 나누었을 때의 나머지가 2인 자연수를 작은 것부터 차례로 나열하면

$$2, 5, 8, 11, 14, 17, \dots$$

즉 2로 나누었을 때의 나머지가 1이고, 3으로 나누었을 때의 나머지가 2인 자연수를 작은 것부터 차례로 나열하면
 5, 11, 17, ...
 따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 5, 공차가 6인 등차수열이므로

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10} = \frac{10\{2 \times 5 + (10-1) \times 6\}}{2}$$

$$= 320$$

35-1 ㉡ 364

두 자리 자연수 중에서 3으로 나누었을 때의 나머지가 1인 자연수를 작은 것부터 차례로 나열하면
 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, ..., 88, 91, 94, 97
 두 자리 자연수 중에서 4의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면
 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ..., 88, 92, 96
 즉 두 자리 자연수 중에서 3으로 나누었을 때의 나머지가 1이고, 4의 배수인 수를 작은 것부터 차례로 나열하면
 16, 28, 40, ..., 88
 이 수열은 첫째항이 16, 공차가 12인 등차수열이므로 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 16 + (n-1) \times 12 = 12n + 4$$
 이때 88을 제 n 항이라 하면

$$12n + 4 = 88, 12n = 84 \quad \therefore n = 7$$
 따라서 구하는 총합은 첫째항이 16, 끝항이 88, 항수가 7인 등차수열의 합이므로

$$\frac{7(16+88)}{2} = 364$$

36 ㉡ 2925

두 자리 자연수 중에서 2의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면
 10, 12, 14, ..., 98㉠
 ㉠은 첫째항이 10, 공차가 2인 등차수열이므로 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 10 + (n-1) \times 2 = 2n + 8$$
 이때 98을 제 n 항이라 하면

$$2n + 8 = 98, 2n = 90 \quad \therefore n = 45$$
 즉 두 자리 자연수 중에서 2의 배수의 총합은

$$\frac{45(10+98)}{2} = 2430$$
 두 자리 자연수 중에서 5의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면
 10, 15, 20, ..., 95㉡
 ㉡은 첫째항이 10, 공차가 5인 등차수열이므로 일반항을 b_n 이라 하면

$$b_n = 10 + (n-1) \times 5 = 5n + 5$$
 이때 95를 제 n 항이라 하면

$$5n + 5 = 95, 5n = 90 \quad \therefore n = 18$$
 즉 두 자리 자연수 중에서 5의 배수의 총합은

$$\frac{18(10+95)}{2} = 945$$
 두 자리 자연수 중에서 2와 5의 최소공배수인 10의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면
 10, 20, 30, ..., 90㉢
 ㉢은 첫째항이 10, 공차가 10인 등차수열이므로 일반항을 c_n 이라 하면

$$c_n = 10 + (n-1) \times 10 = 10n$$

이때 90을 제 n 항이라 하면

$$10n = 90 \quad \therefore n = 9$$

즉 두 자리 자연수 중에서 10의 배수의 총합은

$$\frac{9(10+90)}{2} = 450$$

따라서 두 자리 자연수 중에서 2의 배수 또는 5의 배수인 수의 총합은

$$2430 + 945 - 450 = 2925$$

36-1 ㉡ 2475

50보다 크고 100보다 작은 자연수 중에서 2로 나누어떨어지는 수, 즉 2의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면
 52, 54, 56, ..., 98㉠
 ㉠은 첫째항이 52, 공차가 2인 등차수열이므로 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 52 + (n-1) \times 2 = 2n + 50$$
 이때 98을 제 n 항이라 하면

$$2n + 50 = 98, 2n = 48 \quad \therefore n = 24$$
 즉 50보다 크고 100보다 작은 자연수 중에서 2로 나누어떨어지는 수의 총합은

$$\frac{24(52+98)}{2} = 1800 \quad \dots\dots ㉠$$
 50보다 크고 100보다 작은 자연수 중에서 3으로 나누어떨어지는 수, 즉 3의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면
 51, 54, 57, ..., 99㉡
 ㉡은 첫째항이 51, 공차가 3인 등차수열이므로 일반항을 b_n 이라 하면

$$b_n = 51 + (n-1) \times 3 = 3n + 48$$
 이때 99를 제 n 항이라 하면

$$3n + 48 = 99, 3n = 51 \quad \therefore n = 17$$
 즉 50보다 크고 100보다 작은 자연수 중에서 3으로 나누어떨어지는 수의 총합은

$$\frac{17(51+99)}{2} = 1275 \quad \dots\dots ㉡$$
 50보다 크고 100보다 작은 자연수 중에서 2와 3의 최소공배수인 6으로 나누어떨어지는 수, 즉 6의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면
 54, 60, 66, ..., 96㉢
 ㉢은 첫째항이 54, 공차가 6인 등차수열이므로 일반항을 c_n 이라 하면

$$c_n = 54 + (n-1) \times 6 = 6n + 48$$
 이때 96을 제 n 항이라 하면

$$6n + 48 = 96, 6n = 48 \quad \therefore n = 8$$
 즉 50보다 크고 100보다 작은 자연수 중에서 6으로 나누어떨어지는 수의 총합은

$$\frac{8(54+96)}{2} = 600 \quad \dots\dots ㉢$$
 따라서 50보다 크고 100보다 작은 자연수 중에서 2 또는 3으로 나누어떨어지는 수의 총합은

$$1800 + 1275 - 600 = 2475 \quad \dots\dots ㉣$$

채점 기준	비율
㉠ 50보다 크고 100보다 작은 자연수 중에서 2로 나누어떨어지는 수의 총합을 구할 수 있다.	30%
㉡ 50보다 크고 100보다 작은 자연수 중에서 3으로 나누어떨어지는 수의 총합을 구할 수 있다.	30%
㉢ 50보다 크고 100보다 작은 자연수 중에서 6으로 나누어떨어지는 수의 총합을 구할 수 있다.	30%
㉣ 50보다 크고 100보다 작은 자연수 중에서 2 또는 3으로 나누어떨어지는 수의 총합을 구할 수 있다.	10%

37 ㉔ ②

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 1^2 + 2 \times 1 = 3$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 + 2n - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\} \\ &= 2n + 1 \end{aligned} \quad \dots\dots ㉔$$

이때 $a_1=3$ 은 ㉔에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n + 1$$

즉 $a_1=3, a_3=7, a_5=11, \dots, a_{99}=199$ 이므로

$a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{99}$ 는 첫째항이 3, 끝항이 199, 항수가 50인 등차수열의 합이다.

$$\begin{aligned} \therefore a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{99} &= \frac{50(3+199)}{2} \\ &= 5050 \end{aligned}$$

37-1 ㉔ 10

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 1^2 - 2 \times 1 = -1$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 - 2n - \{(n-1)^2 - 2(n-1)\} \\ &= 2n - 3 \end{aligned} \quad \dots\dots ㉔$$

이때 $a_1=-1$ 은 ㉔에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n - 3$$

따라서 $a_2=1, a_4=5, a_6=9, \dots$ 이므로 수열 $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2k}$ 는 첫째항이 1, 공차가 4, 항수가 k 인 등차수열이므로

$$\begin{aligned} a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{2k} &= 190 \text{에서} \\ \frac{k\{2 \times 1 + (k-1) \times 4\}}{2} &= 190 \end{aligned}$$

$$k(2k-1) = 190, 2k^2 - k - 190 = 0$$

$$(2k+19)(k-10) = 0$$

$$\therefore k = -\frac{19}{2} \text{ 또는 } k = 10$$

그런데 k 는 자연수이므로 $k=10$

38 ㉔ 38

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 1^2 + 3 \times 1 + 2 = 6$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 + 3n + 2 - \{(n-1)^2 + 3(n-1) + 2\} \\ &= 2n + 2 \end{aligned} \quad \dots\dots ㉔$$

이때 $a_1=6$ 은 ㉔에 $n=1$ 을 대입한 것과 같지 않으므로

$$a_1 = 6, a_n = 2n + 2 \quad (n \geq 2)$$

따라서 $a_5 = 2 \times 5 + 2 = 12, a_9 = 2 \times 9 + 2 = 20$ 이므로

$$\begin{aligned} a_1 + a_5 + a_9 &= 6 + 12 + 20 \\ &= 38 \end{aligned}$$

참고

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = An^2 + Bn + C \quad (A, B, C \text{는 실수}) \text{일 때}$$

(1) $C=0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 등차수열을 이룬다.

(2) $C \neq 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 둘째항부터 등차수열을 이룬다.

38-1 ㉔ 43

다항식 $2x^2 + x + 1$ 을 일차식 $x-n$ 으로 나누었을 때의 나머지 S_n 은 나머지정리에 의하여

$$S_n = 2n^2 + n + 1$$

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 2 \times 1^2 + 1 + 1 = 4$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 2n^2 + n + 1 - \{2(n-1)^2 + (n-1) + 1\} \\ &= 4n - 1 \end{aligned} \quad \dots\dots ㉔$$

이때 $a_1=4$ 는 ㉔에 $n=1$ 을 대입한 것과 같지 않으므로

$$a_1 = 4, a_n = 4n - 1 \quad (n \geq 2)$$

따라서 $a_{10} = 4 \times 10 - 1 = 39$ 이므로

$$a_1 + a_{10} = 4 + 39 = 43$$

39 ㉔ 18

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 각각 S_n, T_n 이라 하면

$$S_n = n^2 + pn, T_n = 2n^2 - n$$

$$a_{10} = S_{10} - S_9 = 10^2 + 10p - (9^2 + 9p) = p + 19 \quad \dots\dots ㉑$$

$$b_{10} = T_{10} - T_9 = 2 \times 10^2 - 10 - (2 \times 9^2 - 9) = 37 \quad \dots\dots ㉒$$

이때 $a_{10} = b_{10}$ 이므로 $p + 19 = 37$

$$\therefore p = 18 \quad \dots\dots ㉓$$

채점 기준	비율
㉑ a_{10} 의 값을 p 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
㉒ b_{10} 의 값을 구할 수 있다.	40%
㉓ p 의 값을 구할 수 있다.	20%

39-1 ㉔ 23

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 각각 S_n, T_n 이라 하면

$$S_n = n^2 - n, T_n = 3n^2 + kn + 3$$

$$a_5 = S_5 - S_4 = 5^2 - 5 - (4^2 - 4) = 8$$

$$\begin{aligned} b_{10} &= T_{10} - T_9 \\ &= 3 \times 10^2 + 10k + 3 - (3 \times 9^2 + 9k + 3) \\ &= k + 57 \end{aligned}$$

이때 $10a_5 = b_{10}$ 이므로 $10 \times 8 = k + 57$

$$\therefore k = 23$$

유형 완성하기

p. 224

40 ㉔ ④

연속하는 10개의 자연수 중 가장 작은 수를 a 라 하면 10개의 자연수는 첫째항이 a , 공차가 1인 등차수열을 이루므로

$$\frac{10\{2a + (10-1) \times 1\}}{2} = 255, 2a + 9 = 51$$

$$2a = 42 \quad \therefore a = 21$$

따라서 가장 큰 자연수는

$$21 + (10-1) \times 1 = 30$$

41 ㉮ 15

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^3 A = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

⋮

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 3n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

즉 행렬 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^n$ 의 모든 성분의 합은

$$5 + 8 + 11 + \cdots + (3n + 2) = 390$$

따라서 첫째항이 5, 공차가 3인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 390이므로

$$\frac{n\{2 \times 5 + (n-1) \times 3\}}{2} = 390, n(3n+7) = 780$$

$$3n^2 + 7n - 780 = 0, (3n+52)(n-15) = 0$$

$$\therefore n = -\frac{52}{3} \text{ 또는 } n = 15$$

그런데 n 은 자연수이므로 $n = 15$

42 ㉮ 1050

공연장의 관람석 수는 24, $24+3$, $24+3 \times 2$, ⋯

즉 관람석 수는 첫째항이 24, 공차가 3인 등차수열을 이루므로 일항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 24 + (n-1) \times 3 = 3n + 21$$

20번째 줄의 관람석 수는

$$a_{20} = 3 \times 20 + 21 = 81$$

따라서 20번째 줄까지 배치되어 있는 총관람석 수는

$$\frac{20(24+81)}{2} = 1050$$

43 ㉮ 32권

1등 반에 지급되는 공책의 수를 x 권이라 하면 각 반에 지급되는 공책의 수는 다음 표와 같다.

등수	1등	2등	3등	4등	5등
공책의 수(권)	x	$x-4$	$x-8$	$x-12$	$x-16$

즉 각 반에 지급되는 공책의 수는 첫째항이 x , 공차가 -4 인 등차수열을 이루므로 5개의 반에 지급되는 공책의 총수는

$$x + (x-4) + (x-8) + (x-12) + (x-16)$$

$$= \frac{5\{x + (x-16)\}}{2}$$

$$= 5x - 40$$

이때 120권의 공책을 모두 지급하므로

$$5x - 40 = 120, 5x = 160 \quad \therefore x = 32$$

따라서 1등 반에 지급되는 공책의 수는 32권이다.

44 ㉮ ②

새로 그리는 11개의 동심원의 반지름의 길이를 $r_1, r_2, r_3, \cdots, r_{11}$ 이라 하면 $4, r_1, r_2, r_3, \cdots, r_{11}, 16$ 은 첫째항이 4, 끝항이 16, 항수가 13인 등차수열을 이루므로 모든 동심원의 둘레의 길이의 합은

$$2\pi \times 4 + 2\pi r_1 + 2\pi r_2 + 2\pi r_3 + \cdots + 2\pi r_{11} + 2\pi \times 16$$

$$= 2\pi(4 + r_1 + r_2 + r_3 + \cdots + r_{11} + 16)$$

$$= 2\pi \times \frac{13(4+16)}{2}$$

$$= 260\pi$$

45 ㉮ 3

n 각형의 내각의 크기의 합은

$$180^\circ \times (n-2) = 180^\circ \times n - 360^\circ \quad \cdots \cdots ①$$

첫째항이 30° , 공차가 30° , 항수가 n 인 등차수열의 합은

$$\frac{n\{2 \times 30^\circ + (n-1) \times 30^\circ\}}{2} = 15^\circ \times n^2 + 15^\circ \times n \quad \cdots \cdots ②$$

즉 $15^\circ \times n^2 + 15^\circ \times n = 180^\circ \times n - 360^\circ$ 이므로

$$n^2 - 11n + 24 = 0, (n-3)(n-8) = 0$$

$$\therefore n = 3 \text{ 또는 } n = 8$$

이때 $n = 8$ 이면 가장 큰 내각의 크기가 $30^\circ + (8-1) \times 30^\circ = 240^\circ$

이므로 조건을 만족시키지 않는다.

$$\therefore n = 3 \quad \cdots \cdots ③$$

채점 기준	비율
① n 각형의 내각의 크기의 합을 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20%
② 등차수열의 합을 이용하여 n 각형의 내각의 크기의 합을 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
③ n 의 값을 구할 수 있다.	40%

학교 시험 대비 문제

p. 225~228

01 ㉮ ②

주어진 등차수열의 공차를 d 라 하면 제5항이 $\log_2 243$ 이므로

$$\log_2 3 + (5-1)d = \log_2 243$$

$$4d = \log_2 243 - \log_2 3 = \log_2 \frac{243}{3} = \log_2 81 = 4 \log_2 3$$

$$\therefore d = \log_2 3$$

02 ㉮ ⑤

$$a_3 = 11 \text{에서 } a + 2d = 11 \quad \cdots \cdots ㉠$$

$$a_9 = 29 \text{에서 } a + 8d = 29 \quad \cdots \cdots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = 5, d = 3$

$$\therefore a + d = 5 + 3 = 8$$

03 ㉮ ②

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 + a_5 = 20 \text{에서 } (a + 2d) + (a + 4d) = 20$$

$$2a + 6d = 20 \quad \therefore a + 3d = 10 \quad \cdots \cdots ㉠$$

$$a_8 = 26 \text{에서 } a + 7d = 26 \quad \cdots \cdots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = -2, d = 4$

따라서 $a_n = -2 + (n-1) \times 4 = 4n - 6$ 이므로

$$a_7 = 4 \times 7 - 6 = 22$$

04 ㉑

첫째항이 -80, 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = -80 + (n-1) \times 3 = 3n - 83$$

$$a_{21} = m \text{에서 } 3 \times 21 - 83 = m$$

$$\therefore m = -20$$

$$3n - 83 > 0 \text{에서 } n > \frac{83}{3} = 27.6 \dots$$

즉 처음으로 양수가 되는 항은 제28항이므로

$$n = 28$$

$$\therefore m + n = -20 + 28 = 8$$

05 ㉑

첫째항이 11, 제5항이 35인 등차수열의 공차를 d 라 하면

$$11 + 4d = 35, 4d = 24$$

$$\therefore d = 6$$

따라서 $a = 11 + 6 = 17, c = 11 + 3 \times 6 = 29$ 이므로

$$c - a = 29 - 17 = 12$$

06 ㉑

첫째항이 -3, 공차가 $\frac{3}{2}$ 인 등차수열의 제 $(n+2)$ 항이 15이므로

$$-3 + (n+1) \times \frac{3}{2} = 15, \frac{3}{2}(n+1) = 18$$

$$n+1 = 12 \quad \therefore n = 11$$

07 ㉑

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$b = \frac{a+c}{2} \quad \dots\dots ㉑$$

세 수 b^2, c^2, a^2 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2c^2 = b^2 + a^2 \quad \dots\dots ㉒$$

$$㉑ \text{을 } ㉒ \text{에 대입하면 } 2c^2 = \left(\frac{a+c}{2}\right)^2 + a^2$$

$$7c^2 - 2ac - 5a^2 = 0, (7c+5a)(c-a) = 0$$

$$\therefore c = -\frac{5}{7}a \quad (\because c \neq a)$$

이때 c 가 정수이므로 a 는 7의 배수이다.

그런데 $0 < a < 10$ 이므로 $a = 7, c = -5$

㉒을 ㉑에 대입하면

$$b = \frac{7+(-5)}{2} = 1$$

$$\therefore abc = 7 \times 1 \times (-5) = -35$$

08 ㉑

등차수열을 이루는 세 수를 $a-d, a, a+d$ 라 하면

세 수의 합이 6이므로

$$(a-d) + a + (a+d) = 6, 3a = 6$$

$$\therefore a = 2$$

세 수의 제곱의 합이 14이므로

$$(2-d)^2 + 4 + (2+d)^2 = 14, 2d^2 + 12 = 14$$

$$d^2 = 1 \quad \therefore d = \pm 1$$

따라서 세 수는 1, 2, 3이므로 세 수의 곱은

$$1 \times 2 \times 3 = 6$$

09 ㉑

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형의 세 변의 길이를

$a-d, a, a+d$ ($a > 0, d > 0$)라 하면 직각삼각형의 넓이가 150이므로

$$\frac{1}{2}a(a-d) = 150$$

$$\therefore a^2 - ad = 300$$

피타고라스 정리에 의하여

$$(a+d)^2 = a^2 + (a-d)^2, a^2 - 4ad = 0$$

$$a(a-4d) = 0 \quad \therefore a = 4d \quad (\because a > 0)$$


$$㉑ \text{을 } ㉒ \text{에 대입하면 } 16d^2 - 4d^2 = 300$$

$$d^2 = 25 \quad \therefore d = 5 \quad (\because d > 0)$$

$$d = 5 \text{를 } ㉒ \text{에 대입하면 } a = 4 \times 5 = 20$$

따라서 직각삼각형의 빗변의 길이는

$$a+d = 20+5 = 25$$



.....㉑

.....㉒

10 ㉑ - 330

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_1 - a_{10} = 27 \text{에서 } a - (a+9d) = 27$$

$$-9d = 27 \quad \therefore d = -3$$

$$S_{10} = a_{10} \text{에서 } \frac{10\{2a + (10-1) \times (-3)\}}{2} = a + 9 \times (-3)$$

$$5(2a-27) = a-27, 10a-135 = a-27$$

$$9a = 108 \quad \therefore a = 12$$

$$\therefore S_{20} = \frac{20\{2 \times 12 + (20-1) \times (-3)\}}{2} = -330$$

11 ㉑

첫째항이 1, 끝항이 2, 항수가 $(n+2)$ 인 등차수열의 합이 24이므로

$$\frac{(n+2)(1+2)}{2} = 24, 3(n+2) = 48$$

$$n+2 = 16 \quad \therefore n = 14$$

12 ㉑

첫째항이 4, 공차가 4, 제 $(n+2)$ 항이 56이므로

$$4 + (n+1) \times 4 = 56, 4(n+1) = 52$$

$$n+1 = 13 \quad \therefore n = 12$$

즉 주어진 수열은 첫째항이 4, 끝항이 56, 항수가 14인 등차수열이므로 주어진 수열의 합은

$$\frac{14(4+56)}{2} = 420$$

$$\therefore a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 420 - 4 - 56 = 360$$

13 ㉑

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$S_5 = 40 \text{에서 } \frac{5\{2a + (5-1)d\}}{2} = 40$$

$$\therefore a + 2d = 8$$

.....㉑

$$S_{10} = 155 \text{에서 } \frac{10\{2a + (10-1)d\}}{2} = 155$$

$$\therefore 2a + 9d = 31$$

.....㉒

$$㉑, ㉒ \text{을 연립하여 풀면 } a = 2, d = 3$$

$$\therefore a_{10} = 2 + (10-1) \times 3 = 29$$

14 ㉔②

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_{10}=40 \text{에서 } \frac{10\{2a+(10-1)d\}}{2}=40$$

$$\therefore 2a+9d=8 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$S_{20}-S_{10}=240 \text{에서 } \frac{20\{2a+(20-1)d\}}{2}-40=240$$

$$\therefore 2a+19d=28 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a=-5, d=2$

따라서 첫째항부터 제30항까지의 합은

$$S_{30}=\frac{30\{2 \times (-5)+(30-1) \times 2\}}{2}=720$$

15 ㉔⑤

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_7=2 \text{에서 } a+6d=2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_{10}=-7 \text{에서 } a+9d=-7 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a=20, d=-3$

$$\therefore a_n=20+(n-1) \times (-3)=-3n+23$$

$$-3n+23 < 0 \text{에서 } -3n < -23$$

$$\therefore n > \frac{23}{3}=7.6\dots$$

즉 등차수열 $\{a_n\}$ 은 제8항부터 음수이므로 첫째항부터 제7항까지의 합이 최대이다.

이때 $a_7=2$ 이므로 구하는 최댓값은

$$S_7=\frac{7(20+2)}{2}=77$$

16 ㉔③

첫째항이 21, 끝항이 3, 항수가 $(n+2)$ 인 등차수열의 합이 120이므로

$$\frac{(n+2)(21+3)}{2}=120, 12(n+2)=120$$

$$n+2=10 \quad \therefore n=8$$

이때 공차를 d 라 하면 3은 제10항이므로

$$21+9d=3 \quad \therefore d=-2$$

주어진 수열을 $\{b_n\}$ 이라 하면 일반항은

$$b_n=21+(n-1) \times (-2)=-2n+23$$

$$-2n+23 < 0 \text{에서 } -2n < -23$$

$$\therefore n > \frac{23}{2}=11.5$$

즉 등차수열 $\{b_n\}$ 은 제12항부터 음수이므로 첫째항부터 제11항까지의 합이 최대이다.

$$\therefore p=11$$

이때 $b_{11}=-2 \times 11+23=1$ 이므로 최댓값은

$$S_{11}=\frac{11(21+1)}{2}=121 \quad \therefore q=121$$

$$\therefore p+q=11+121=132$$

17 ㉔ 5586

100과 300 사이의 자연수 중에서 7의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면

105, 112, 119, $\dots$, 294

즉 첫째항이 105, 공차가 7인 등차수열이므로 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n=105+(n-1) \times 7=7n+98$$

이때 294를 제 n 항이라 하면

$$7n+98=294, 7n=196$$

$$\therefore n=28$$

따라서 구하는 총합은 첫째항이 105, 끝항이 294, 항수가 28인 등차수열의 합이므로

$$\frac{28(105+294)}{2}=5586$$

18 ㉔①

두 자리 자연수 중에서 3으로 나누어떨어지는 수, 즉 3의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면

$$12, 15, 18, \dots, 99 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①은 첫째항이 12, 공차가 3인 등차수열이므로 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n=12+(n-1) \times 3=3n+9$$

이때 99를 제 n 항이라 하면

$$3n+9=99, 3n=90$$

$$\therefore n=30$$

즉 두 자리 자연수 중에서 3으로 나누어떨어지는 수의 총합은

$$\frac{30(12+99)}{2}=1665$$

두 자리 자연수 중에서 7로 나누어떨어지는 수, 즉 7의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면

$$14, 21, 28, \dots, 98 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

②은 첫째항이 14, 공차가 7인 등차수열이므로 일반항을 b_n 이라 하면

$$b_n=14+(n-1) \times 7=7n+7$$

이때 98을 제 n 항이라 하면

$$7n+7=98, 7n=91$$

$$\therefore n=13$$

즉 두 자리 자연수 중에서 7로 나누어떨어지는 수의 총합은

$$\frac{13(14+98)}{2}=728$$

두 자리 자연수 중에서 3과 7의 최소공배수인 21로 나누어떨어지는 수, 즉 21의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면

$$21, 42, 63, 84$$

즉 두 자리 자연수 중에서 21로 나누어떨어지는 수의 총합은

$$21+42+63+84=210$$

따라서 두 자리 자연수 중에서 3 또는 7로 나누어떨어지는 수의 총합은

$$1665+728-210=2183$$

19 ㉔ 17

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1=S_1=2 \times 1^2-1-1=0$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 2n^2 - n - 1 - \{2(n-1)^2 - (n-1) - 1\} \\ &= 4n - 3 \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 $a_1=0$ 은 ①에 $n=1$ 을 대입한 것과 같지 않으므로

$$a_1=0, a_n=4n-3 \quad (n \geq 2)$$

따라서 $a_5=4 \times 5-3=17$ 이므로

$$a_1+a_5=0+17=17$$

20 185

경기장의 관람석 수는

$$12, 12+5, 12+5 \times 2, \dots$$

즉 관람석 수는 첫째항이 12, 공차가 5인 등차수열을 이룬다.

따라서 첫 번째 줄부터 n 번째 줄까지 배치되어 있는 관람석 수를 S_n 이라 하면 4번째 줄부터 8번째 줄까지 배치되어 있는 관람석 수는

$$\begin{aligned} S_8 - S_3 &= \frac{8\{2 \times 12 + (8-1) \times 5\}}{2} - \frac{3\{2 \times 12 + (3-1) \times 5\}}{2} \\ &= 236 - 51 = 185 \end{aligned}$$

21 1

큰 원의 반지름의 길이가 $4\sqrt{3}$ 이므로

$$S_1 + S_2 = \pi \times (4\sqrt{3})^2 = 48\pi$$

이때 $S_1, S_2, S_1 + S_2$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로 공차를 d 라 하면

$$S_1 + S_2 = S_1 + 2d = 48\pi \quad \dots\dots ①$$

또 $S_1 + S_2 = S_1 + (S_1 + d) = 48\pi$ 이므로

$$2S_1 + d = 48\pi \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $S_1 = 16\pi, d = 16\pi$

따라서 작은 원의 넓이는 16π 이다.

서술형 1 제14항

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_{10} = 51 \text{에서 } a + 9d = 51 \quad \dots\dots ①$$

$$a_3 : a_8 = 2 : 1 \text{에서 } (a + 2d) : (a + 7d) = 2 : 1$$

$$a + 2d = 2(a + 7d) \quad \therefore a + 12d = 0 \quad \dots\dots ②$$

$$\text{①, ②를 연립하여 풀면 } a = 204, d = -17 \quad \dots\dots ③$$

$$\therefore a_n = 204 + (n-1) \times (-17) = -17n + 221 \quad \dots\dots ④$$

$$-17n + 221 < 0 \text{에서 } -17n < -221$$

$$\therefore n > \frac{221}{17} = 13$$

$$\text{따라서 처음으로 음수가 되는 항은 제14항이다.} \quad \dots\dots ⑤$$

채점 기준	비율
① 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 구할 수 있다.	40%
② a_n 을 구할 수 있다.	20%
③ 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구할 수 있다.	40%

서술형 2 15

$a_n = n + 3$ 에서 $a_1 = 4, a_k = k + 3$ 이므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 k 항까지의 합은

$$\frac{k\{4 + (k+3)\}}{2} = \frac{k(k+7)}{2} \quad \dots\dots ①$$

$b_n = \frac{1}{2}n + 7$ 에서 $b_1 = \frac{15}{2}, b_k = \frac{1}{2}k + 7$ 이므로 등차수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 k 항까지의 합은

$$\frac{k\left\{\frac{15}{2} + \left(\frac{1}{2}k + 7\right)\right\}}{2} = \frac{k(k+29)}{4} \quad \dots\dots ②$$

$$\text{이때 } \frac{k(k+7)}{2} = \frac{k(k+29)}{4} \text{이므로 } 2k(k+7) = k(k+29)$$

$$k^2 - 15k = 0, k(k-15) = 0$$

$$\therefore k = 0 \text{ 또는 } k = 15$$

$$\text{그런데 } k \text{는 자연수이므로 } k = 15 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 k 항까지의 합을 구할 수 있다.	40%
② 수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 k 항까지의 합을 구할 수 있다.	40%
③ k 의 값을 구할 수 있다.	20%

서술형 3 4

(i) $n = 1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 1^2 + 3 \times 1 = 4$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 + 3n - \{(n-1)^2 + 3(n-1)\} \\ &= 2n + 2 \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

이때 $a_1 = 4$ 는 ①에 $n = 1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n + 2 \quad \dots\dots ②$$

$$10 < a_n < 20 \text{에서 } 10 < 2n + 2 < 20$$

$$8 < 2n < 18 \quad \therefore 4 < n < 9 \quad \dots\dots ③$$

따라서 자연수 n 의 값은 5, 6, 7, 8이므로 그 개수는 4이다. $\dots\dots ④$

채점 기준	비율
① 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구할 수 있다.	50%
② n 의 값의 범위를 구할 수 있다.	30%
③ 자연수 n 의 개수를 구할 수 있다.	20%

1등급

10% 핵심 기출 문제

p. 229~230

01 4

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 a , 공차가 -2 이므로

$$(a_2 + a_4)^2 = 16a_3 \text{에서 } (a - 2 + a - 6)^2 = 16(a - 4)$$

$$(2a - 8)^2 = 16(a - 4), a^2 - 12a + 32 = 0$$

$$(a - 4)(a - 8) = 0 \quad \therefore a = 4 \text{ 또는 } a = 8$$

$a = 4$ 일 때, $a_3 = 4 + (3-1) \times (-2) = 0$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

$a = 8$ 일 때, $a_3 = 8 + (3-1) \times (-2) = 4$ 이므로 조건을 만족시킨다.

$$\therefore a = 8$$

02 2

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면

$$a_n = a + (n-1) \times 6 = 6n + a - 6$$

$$|a_2 - 3| = |a_3 - 3| \text{에서 } |a + 3| = |a + 9|$$

$$\therefore a + 3 = \pm(a + 9)$$

(i) $a + 3 = a + 9$ 일 때, $3 = 9$ 이므로 모순이다.

(ii) $a + 3 = -(a + 9)$ 일 때

$$a + 3 = -a - 9, 2a = -12 \quad \therefore a = -6$$

(i), (ii)에서 $a = -6$

따라서 $a_n = 6n - 12$ 이므로

$$a_5 = 6 \times 5 - 12 = 18$$

03 1

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$|a_3| - a_4 = 0 \text{에서 } |a_3| = a_4$$

$$\begin{aligned}
 &|-15+2d|=-15+3d \\
 &\therefore -15+2d=\pm(-15+3d) \\
 &\text{또 } -15+3d\geq 0 \text{이므로 } d\geq 5 \quad \dots\dots \textcircled{7} \\
 &\text{(i) } -15+2d=-15+3d \text{일 때} \\
 &\quad d=0 \text{이므로 } \textcircled{7} \text{에 모순이다.} \\
 &\text{(ii) } -15+2d=-(-15+3d) \text{일 때} \\
 &\quad 5d=30 \quad \therefore d=6 \\
 &\text{(i), (ii)에서 } d=6 \\
 &\therefore a_7=-15+(7-1)\times 6=21
 \end{aligned}$$

04 ㉡ ③

$$\begin{aligned}
 &x^2-nx+4(n-4)=0 \text{에서 } (x-4)(x-n+4)=0 \\
 &\therefore x=4 \text{ 또는 } x=n-4 \\
 &\text{세 수 } 1, \alpha, \beta \text{가 등차수열을 이루므로} \\
 &2\alpha=\beta+1 \quad \dots\dots \textcircled{7} \\
 &\text{(i) } \alpha=4, \beta=n-4 \text{일 때} \\
 &\quad \alpha<\beta \text{이므로 } 4<n-4 \quad \therefore n>8 \\
 &\quad \textcircled{7} \text{에서 } 8=(n-4)+1 \text{이므로} \\
 &\quad n=11 \\
 &\text{(ii) } \alpha=n-4, \beta=4 \text{일 때} \\
 &\quad \alpha<\beta \text{이므로 } n-4<4 \quad \therefore n<8 \\
 &\quad \textcircled{7} \text{에서 } 2(n-4)=4+1 \text{이므로} \\
 &\quad n=\frac{13}{2} \\
 &\text{그런데 } n \text{은 자연수이므로 조건을 만족시키지 않는다.} \\
 &\text{(i), (ii)에서 } n=11
 \end{aligned}$$

05 ㉡ ③

$$\begin{aligned}
 &\text{함수 } y=|x^2-9| \text{의 그래프는 } y \text{축에 대하여 대칭이므로} \\
 &a_2=-a_3 \\
 &\text{공차는 } a_3-a_2=a_3-(-a_3)=2a_3 \text{이므로} \\
 &a_4=a_3+2a_3=3a_3 \\
 &\text{이때 점 } (a_3, k) \text{는 함수 } y=-x^2+9 \text{의 그래프 위의 점이므로} \\
 &k=-a_3^2+9 \quad \therefore a_3^2=9-k \quad \dots\dots \textcircled{7} \\
 &\text{또 점 } (a_4, k) \text{는 함수 } y=x^2-9 \text{의 그래프 위의 점이므로} \\
 &k=a_4^2-9=(3a_3)^2-9=9a_3^2-9 \\
 &\therefore a_3^2=\frac{k+9}{9} \quad \dots\dots \textcircled{8} \\
 &\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{에서 } 9-k=\frac{k+9}{9} \\
 &k+9=9(9-k), 10k=72 \\
 &\therefore k=\frac{36}{5}
 \end{aligned}$$

06 ㉡ 183

$$\begin{aligned}
 &a_n=2n+1, b_n=3n+3 \quad (n=1, 2, 3, \dots) \text{이므로} \\
 &\{a_n\}: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, \dots \\
 &\{b_n\}: 6, 9, 12, 15, 18, 21, \dots \\
 &\text{두 수열에서 공통인 항을 작은 것부터 차례로 나열하면} \\
 &9, 15, 21, \dots \\
 &\text{즉 수열 } \{c_n\} \text{은 첫째항이 } 9, \text{ 공차가 } 6 \text{인 등차수열이므로} \\
 &c_{30}=9+(30-1)\times 6=183
 \end{aligned}$$

07 ㉡ 240

$$\begin{aligned}
 &\text{등차수열 } \{a_n\} \text{의 첫째항을 } a, \text{ 공차를 } d \text{라 하면} \\
 &a_3=-2 \text{에서 } a+2d=-2 \quad \dots\dots \textcircled{7} \\
 &a_9=46 \text{에서 } a+8d=46 \quad \dots\dots \textcircled{8} \\
 &\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하여 풀면 } a=-18, d=8 \\
 &\therefore a_n=-18+(n-1)\times 8=8n-26 \\
 &8n-26>0 \text{에서 } 8n>26 \\
 &\therefore n>\frac{26}{8}=3.25 \\
 &\text{즉 등차수열 } \{a_n\} \text{은 첫째항부터 제3항까지 음수이고 제4항부터} \\
 &\text{양수이다.} \\
 &\text{이때 } a_2=8\times 2-26=-10, a_3=8\times 3-26=-2 \text{이므로} \\
 &|a_1|+|a_2|+|a_3|+\dots+|a_{10}| \\
 &=-a_1-a_2-a_3+a_4+\dots+a_{10} \\
 &=a_1+a_2+a_3+a_4+\dots+a_{10}-2(a_1+a_2+a_3) \\
 &=\frac{10\{2\times(-18)+(10-1)\times 8\}}{2}-2(-18-10-2) \\
 &=180+60=240
 \end{aligned}$$

08 ㉡ 315

$$\begin{aligned}
 &x \text{좌표가 } t \text{인 점에서 선분의 길이를 } f(t) \text{라 하면 선분의 길이는 두} \\
 &\text{직선의 } y \text{의 값의 차이므로} \\
 &f(t)=a(t-1)-t=at-a-t=(a-1)t-a \\
 &\text{이때 각 선분을 같은 간격으로 그렸으므로 그 간격을 } d \text{라 하면 } t \text{는} \\
 &\text{공차가 } d \text{인 등차수열을 이루고 14개의 선분의 길이도 등차수열을} \\
 &\text{이룬다.} \\
 &\text{따라서 선분의 길이의 합은 첫째항이 3, 끝항이 42, 항수가 14인} \\
 &\text{등차수열의 합이므로} \\
 &\frac{14(3+42)}{2}=315
 \end{aligned}$$

참고 일차함수 $f(x)=ax+b$ 에서 x 의 값들이 등차수열을 이루면 $f(x)$ 의 값들도 등차수열을 이룬다.

09 ㉡ 37

$$\begin{aligned}
 &\text{등차수열 } \{a_n\} \text{의 첫째항이 } a, \text{ 공차가 } -4 \text{이므로} \\
 &S_n=\frac{n\{2a+(n-1)\times(-4)\}}{2}=-2n^2+(a+2)n \\
 &\text{모든 자연수 } n \text{에 대하여 } S_n<200 \text{이므로} \\
 &-2n^2+(a+2)n<200, 2n^2+200>(a+2)n \\
 &\therefore 2n+\frac{200}{n}>a+2 \quad \dots\dots \textcircled{7} \\
 &\text{이때 } n>0 \text{이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여} \\
 &2n+\frac{200}{n}\geq 2\sqrt{2n\times\frac{200}{n}}=2\sqrt{400}=40 \\
 &\quad \quad \quad (\text{단, 등호는 } n=10 \text{일 때 성립})
 \end{aligned}$$

모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{7}$ 이 성립하려면
 $40>a+2 \quad \therefore a<38$
 따라서 자연수 a 의 최댓값은 37이다.

10 ㉡ 30

$$\begin{aligned}
 &(\text{가}) \text{에서 } S_7=S_8 \text{이므로 } a_8=S_8-S_7=0 \\
 &\text{등차수열 } \{a_n\} \text{의 첫째항을 } a, \text{ 공차를 } d \text{라 하면} \\
 &a_8=0 \text{에서 } a+7d=0 \quad \therefore a=-7d \quad \dots\dots \textcircled{7}
 \end{aligned}$$

S_n 의 값은 $n=8$ 에서 최소이므로 $S_9 \geq S_8$

$$\therefore a_9 = S_9 - S_8 \geq 0$$

즉 $a_9 = a_8 + d$ 이므로 $d \geq 0$

그런데 $d=0$ 이면 ㉠에서 $a=0$ 이므로 ㉡를 만족시키지 않는다.

$$\therefore d > 0$$

$a_8=0$ 이고 $d>0$ 이므로 $n \geq 9$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 이다.

즉 $m > 8$ 일 때, $S_{2m} > S_m$ 이므로

$$(나)에서 -S_m = S_{2m} = 162 \quad \dots\dots ㉢$$

$$\begin{aligned} & -\frac{m\{2a+(m-1)d\}}{2} \\ &= \frac{2m\{2a+(2m-1)d\}}{2} - \frac{m\{2 \times (-7d) + (m-1)d\}}{2} \\ &= \frac{2m\{2 \times (-7d) + (2m-1)d\}}{2} \quad (\because ㉠) \end{aligned}$$

$$14 - (m-1) = -28 + 2(2m-1)$$

$$-m + 15 = 4m - 30, 5m = 45$$

$$\therefore m = 9$$

즉 ㉢에서 $S_9 = -162$ 이므로

$$\frac{9\{2a+(9-1)d\}}{2} = -162, \frac{9(-14d+8d)}{2} = -162$$

$$-27d = -162 \quad \therefore d = 6$$

$d=6$ 을 ㉠에 대입하면 $a = -42$

$$\therefore a_{13} = -42 + (13-1) \times 6 = 30$$

11 ㉡ 273

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 $a(a \neq 0)$, 공차를 d 라 하면

$$S_n = \frac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$$

이때 $S_9 = S_{18}$ 이므로

$$\frac{9\{2a+(9-1)d\}}{2} = \frac{18\{2a+(18-1)d\}}{2}$$

$$2a+8d=2(2a+17d), a+4d=2a+17d$$

$$\therefore a = -13d \quad \dots\dots ㉣$$

$$\text{즉 } S_n = \frac{n\{-26d+(n-1)d\}}{2} = \frac{d}{2}n(n-27) \text{이므로}$$

$$S_1 = S_{26} = -13d$$

$$S_2 = S_{25} = -25d$$

$$S_3 = S_{24} = -36d$$

$$\vdots$$

$$S_{13} = S_{14} = -91d$$

$$S_{27} = 0, S_{28} = 14d, S_{29} = 29d, \dots$$

이때 집합 T_n 의 원소의 개수는

$$1 \leq n \leq 12 \text{일 때}$$

$$T_n = \{S_1, S_2, \dots, S_n\} \quad \therefore n(T_n) = n \leq 12$$

$$n=13 \text{일 때}$$

$$T_{13} = \{S_1, S_2, \dots, S_{13}\} \quad \therefore n(T_{13}) = 13$$

$$n=14 \text{일 때}$$

$$\begin{aligned} T_{14} &= \{S_1, S_2, \dots, S_{13}, S_{14}\} \\ &= \{S_1, S_2, \dots, S_{13}\} \quad (\because S_{13} = S_{14}) \end{aligned}$$

$$\therefore n(T_{14}) = 13$$

$$n=15 \text{일 때}$$

$$\begin{aligned} T_{15} &= \{S_1, S_2, \dots, S_{13}, S_{14}, S_{15}\} \\ &= \{S_1, S_2, \dots, S_{13}\} \quad (\because S_{13} = S_{14}, S_{12} = S_{15}) \end{aligned}$$

$$\therefore n(T_{15}) = 13$$

$$\vdots$$

$$n=26 \text{일 때}$$

$$\begin{aligned} T_{26} &= \{S_1, S_2, \dots, S_{26}\} \\ &= \{S_1, S_2, \dots, S_{13}\} \quad (\because S_{13} = S_{14}, S_{12} = S_{15}, \dots, S_1 = S_{26}) \end{aligned}$$

$$\therefore n(T_{26}) = 13$$

$$n=27 \text{일 때}$$

$$\begin{aligned} T_{27} &= \{S_1, S_2, \dots, S_{26}, S_{27}\} \\ &= \{S_1, S_2, \dots, S_{13}, 0\} \quad (\because S_{13} = S_{14}, S_{12} = S_{15}, \dots, S_1 = S_{26}) \end{aligned}$$

$$\therefore n(T_{27}) = 14$$

$$n=28 \text{일 때}$$

$$\begin{aligned} T_{28} &= \{S_1, S_2, \dots, S_{26}, S_{27}, S_{28}\} \\ &= \{S_1, S_2, \dots, S_{13}, 0, S_{28}\} \\ &\quad (\because S_{13} = S_{14}, S_{12} = S_{15}, \dots, S_1 = S_{26}) \end{aligned}$$

$$\therefore n(T_{28}) = 15$$

$$\vdots$$

즉 $n \geq 27$ 이면 $n(T_n) \geq 14$

따라서 집합 T_n 의 원소의 개수가 13이 되도록 하는 자연수 n 의 값은 13, 14, 15, ..., 26이므로 그 합은

$$13 + 14 + 15 + \dots + 26 = \frac{14(13+26)}{2} = 273$$

01 답 $a=4, r=4$

$$a=4^1=4$$

$$r=4$$

02 답 $a=1, r=3$

$$a=3^{1-1}=1$$

$$r=3$$

03 답 $a=10, r=-\frac{1}{2}$

$$a=-20 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^1=10$$

$$r=-\frac{1}{2}$$

04 답 $a=5, r=\frac{1}{5}$

$$a=25 \times 5^{-1}=5$$

$$r=5^{-1}=\frac{1}{5}$$

05 답 공비: $-3, a=9, b=81$

공비가 -3 이므로

$$a=-3 \times (-3)=9$$

$$b=-27 \times (-3)=81$$

06 답 공비: $\frac{1}{2}, a=80, b=10$

공비가 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$a \times \frac{1}{2}=40 \quad \therefore a=80$$

$$b=20 \times \frac{1}{2}=10$$

07 답 공비: $-\sqrt{2}, a=1, b=-2\sqrt{2}$

공비가 $-\sqrt{2}$ 이므로

$$a \times (-\sqrt{2})=-\sqrt{2} \quad \therefore a=1$$

$$b=2 \times (-\sqrt{2})=-2\sqrt{2}$$

08 답 공비: $-\frac{1}{3}, a=\frac{2}{3}, b=-\frac{2}{9}$

공비가 $-\frac{1}{3}$ 이므로

$$a=-2 \times \left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}$$

$$b=a \times \left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3} \times \left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{2}{9}$$

09 답 $a_n=-3^{n-1}$

10 답 $a_n=4 \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$

11 답 $a_n=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}$

첫째항이 3, 공비가 $\frac{1}{3}$ 이므로

$$a_n=3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}$$

12 답 $a_n=2\sqrt{2} \times (-1)^{n-1}$

첫째항이 $2\sqrt{2}$, 공비가 -1 이므로

$$a_n=2\sqrt{2} \times (-1)^{n-1}$$

13 답 $a_n=3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

첫째항이 3, 공비가 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$a_n=3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

14 답 $\frac{1}{3}$

$$a_n=81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \text{ 이므로}$$

$$a_6=81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^5=\frac{1}{3}$$

15 답 8

$$a_n=\sqrt{2} \times (\sqrt{2})^{n-1}=(\sqrt{2})^n \text{ 이므로}$$

$$a_6=(\sqrt{2})^6=8$$

16 답 1

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_2=81 \text{에서 } ar=81 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_7=\frac{1}{3} \text{에서 } ar^6=\frac{1}{3} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{을 하면 } r^5=\frac{1}{243}=\left(\frac{1}{3}\right)^5 \quad \therefore r=\frac{1}{3}$$

$$r=\frac{1}{3} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면}$$

$$\frac{1}{3}a=81 \quad \therefore a=243$$

$$\text{따라서 } a_n=243 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \text{ 이므로}$$

$$a_6=243 \times \left(\frac{1}{3}\right)^5=1$$

17 답 48

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_3=6 \text{에서 } ar^2=6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_8=192 \text{에서 } ar^7=192 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{을 하면 } r^5=32=2^5 \quad \therefore r=2$$

$$r=2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면}$$

$$a \times 2^2=6 \quad \therefore a=\frac{3}{2}$$

$$\text{따라서 } a_n=\frac{3}{2} \times 2^{n-1} \text{ 이므로}$$

$$a_6=\frac{3}{2} \times 2^5=48$$

18 ㉮ -96

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_3=12 \text{에서 } ar^2=12 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_8=-384 \text{에서 } ar^7=-384 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \div \textcircled{B} \text{을 하면 } r^5=-32=(-2)^5 \quad \therefore r=-2$$

$r=-2$ 를 $\textcircled{A}$ 에 대입하면

$$a \times (-2)^2=12 \quad \therefore a=3$$

따라서 $a_n=3 \times (-2)^{n-1}$ 이므로

$$a_6=3 \times (-2)^5=-96$$

19 ㉮ 512

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_5=256 \text{에서 } ar^4=256 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_8=2048 \text{에서 } ar^7=2048 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \div \textcircled{B} \text{을 하면 } r^3=8=2^3 \quad \therefore r=2$$

$r=2$ 를 $\textcircled{A}$ 에 대입하면

$$a \times 2^4=256 \quad \therefore a=16$$

따라서 $a_n=16 \times 2^{n-1}$ 이므로

$$a_6=16 \times 2^5=512$$

20 ㉮ $-6\sqrt{6}$ 또는 $6\sqrt{6}$

세 수 6, x , 36이 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$x^2=6 \times 36=216 \quad \therefore x=\pm 6\sqrt{6}$$

참고 (i) $x=-6\sqrt{6}$ 일 때, 세 수는 6, $-6\sqrt{6}$, 36이므로 공비가 $-\sqrt{6}$ 인 등비수열이다.

(ii) $x=6\sqrt{6}$ 일 때, 세 수는 6, $6\sqrt{6}$, 36이므로 공비가 $\sqrt{6}$ 인 등비수열이다.

21 ㉮ $-\frac{1}{3}$ 또는 $\frac{1}{3}$

세 수 9, x , $\frac{1}{81}$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$x^2=9 \times \frac{1}{81}=\frac{1}{9} \quad \therefore x=\pm \frac{1}{3}$$

참고 (i) $x=-\frac{1}{3}$ 일 때, 세 수는 9, $-\frac{1}{3}$, $\frac{1}{81}$ 이므로 공비가 $-\frac{1}{27}$ 인 등비수열이다.

(ii) $x=\frac{1}{3}$ 일 때, 세 수는 9, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{81}$ 이므로 공비가 $\frac{1}{27}$ 인 등비수열이다.

22 ㉮ 6

세 수 $3x$, x , 2가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$x^2=3x \times 2, x^2-6x=0$$

$$x(x-6)=0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=6$$

그런데 $x=0$ 이면 세 수는 0, 0, 2이므로 등비수열이 아니다.

$$\therefore x=6$$

23 ㉮ 3

세 수 $x+1$, $2x$, $4x-3$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$(2x)^2=(x+1)(4x-3), 4x^2=4x^2+x-3$$

$$\therefore x=3$$

24 ㉮ $\frac{1}{4}(5^7-1)$

$$\frac{5^7-1}{5-1}=\frac{1}{4}(5^7-1)$$

25 ㉮ $\frac{2}{5}(6^{10}-1)$

$$\frac{2(6^{10}-1)}{6-1}=\frac{2}{5}(6^{10}-1)$$

26 ㉮ $\frac{27}{2}\left\{1-\left(\frac{1}{3}\right)^6\right\}$

$$\frac{9\left\{1-\left(\frac{1}{3}\right)^6\right\}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{27}{2}\left\{1-\left(\frac{1}{3}\right)^6\right\}$$

27 ㉮ $36\left\{1-\left(\frac{1}{6}\right)^8\right\}$

$$\frac{30\left\{1-\left(\frac{1}{6}\right)^8\right\}}{1-\frac{1}{6}}=36\left\{1-\left(\frac{1}{6}\right)^8\right\}$$

28 ㉮ $3(2^{10}-1)$

첫째항이 3, 공비가 2인 등비수열의 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{3(2^{10}-1)}{2-1}=3(2^{10}-1)$$

29 ㉮ $27\left\{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{10}\right\}$

첫째항이 9, 공비가 $\frac{2}{3}$ 인 등비수열의 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{9\left\{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{10}\right\}}{1-\frac{2}{3}}=27\left\{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{10}\right\}$$

30 ㉮ $\frac{1}{6}(1-2^{10})$

첫째항이 $\frac{1}{2}$, 공비가 -2 인 등비수열의 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{\frac{1}{2}\{1-(-2)^{10}\}}{1-(-2)}=\frac{1}{6}(1-2^{10})$$

31 ㉮ $\frac{25}{3}\left\{1-\left(\frac{1}{5}\right)^{10}\right\}$

첫째항이 10, 공비가 $-\frac{1}{5}$ 인 등비수열의 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{10\left\{1-\left(-\frac{1}{5}\right)^{10}\right\}}{1-\left(-\frac{1}{5}\right)}=\frac{25}{3}\left\{1-\left(\frac{1}{5}\right)^{10}\right\}$$

32 ㉮ $\frac{5}{16}(2^6-1)$

첫째항이 $\frac{5}{16}$, 공비가 2인 등비수열이므로

$$a_n=\frac{5}{16} \times 2^{n-1}$$

이때 10을 제 n 항이라 하면

$$\frac{5}{16} \times 2^{n-1} = 10, 2^{n-1} = 2^5$$

$$n-1=5 \quad \therefore n=6$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제6항까지의 합은

$$\frac{\frac{5}{16}(2^6-1)}{2-1} = \frac{5}{16}(2^6-1)$$

$$\mathbf{33} \quad \frac{1}{4}(3^7+1)$$

첫째항이 1, 공비가 -3인 등비수열이므로

$$a_n = (-3)^{n-1}$$

이때 729를 제 n 항이라 하면

$$(-3)^{n-1} = 729, (-3)^{n-1} = (-3)^6$$

$$n-1=6 \quad \therefore n=7$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제7항까지의 합은

$$\frac{1-(-3)^7}{1-(-3)} = \frac{1}{4}(3^7+1)$$

$$\mathbf{34} \quad 4\left\{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{10}\right\}$$

첫째항이 2, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로

$$a_n = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

이때 $\frac{1}{256}$ 을 제 n 항이라 하면

$$2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{256}, \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^9$$

$$n-1=9 \quad \therefore n=10$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{2\left\{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{10}\right\}}{1-\frac{1}{2}} = 4\left\{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{10}\right\}$$

$$\mathbf{35} \quad 1-0.1^9$$

첫째항이 0.9, 공비가 0.1인 등비수열이므로

$$a_n = 0.9 \times 0.1^{n-1}$$

이때 0.000000009를 제 n 항이라 하면

$$0.9 \times 0.1^{n-1} = 0.000000009, 0.1^{n-1} = 0.1^8$$

$$n-1=8 \quad \therefore n=9$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제9항까지의 합은

$$\frac{0.9 \times (1-0.1^9)}{1-0.1} = 1-0.1^9$$

$$\mathbf{36} \quad a_n = 3 \times 4^{n-1}$$

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 4-1=3$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 4^n - 1 - (4^{n-1} - 1) \\ &= 3 \times 4^{n-1} \end{aligned}$$

.....㉠

이때 $a_1=3$ 은 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 3 \times 4^{n-1}$$

$$\mathbf{37} \quad a_n = -3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 3 \times \frac{1}{2} - 3 = -\frac{3}{2}$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n - 3 - \left\{3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 3\right\} \\ &= -\frac{3}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ &= -3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned}$$

.....㉡

이때 $a_1 = -\frac{3}{2}$ 은 ㉡에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = -3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\mathbf{38} \quad a_1=4, a_n=2 \times 3^n \quad (n \geq 2)$$

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 3^2 - 5 = 4$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 3^{n+1} - 5 - (3^n - 5) \\ &= 2 \times 3^n \end{aligned}$$

.....㉢

이때 $a_1=4$ 는 ㉢에 $n=1$ 을 대입한 것과 같지 않으므로

$$a_1=4, a_n=2 \times 3^n \quad (n \geq 2)$$

$$\mathbf{39} \quad a_1 = \frac{11}{2}, a_n = \frac{9}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \quad (n \geq 2)$$

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 4 - 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{11}{2}$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 4 - 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^n - \left\{4 - 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right\} \\ &= \frac{9}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \end{aligned}$$

.....㉣

이때 $a_1 = \frac{11}{2}$ 은 ㉣에 $n=1$ 을 대입한 것과 같지 않으므로

$$a_1 = \frac{11}{2}, a_n = \frac{9}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \quad (n \geq 2)$$

$$\mathbf{40} \quad 100\text{만 원}$$

매월 초에 6만 원씩 월이율 5%의 복리로 1년, 즉 12개월 동안 적립한 적립금의 원리합계는

$$\begin{aligned} &6(1+0.05) + 6(1+0.05)^2 + 6(1+0.05)^3 + \cdots + 6(1+0.05)^{12} \\ &= \frac{6 \times 1.05 \times (1.05^{12} - 1)}{1.05 - 1} \\ &= \frac{6 \times 1.05 \times (1.8 - 1)}{0.05} \\ &= \frac{6 \times 1.05 \times 0.8}{0.05} \\ &= 100.8(\text{만 원}) \end{aligned}$$

이때 만 원 미만은 버리므로 1년 후 월말의 적립금의 원리합계는 100만 원이다.

41 ㉡ 1133만 원

매년 말에 100만 원씩 연이율 3%의 복리로 10년 동안 적립한 적립금의 원리합계는

$$\begin{aligned} & 100 + 100(1+0.03) + 100(1+0.03)^2 + \cdots + 100(1+0.03)^9 \\ &= \frac{100 \times (1.03^{10} - 1)}{1.03 - 1} \\ &= \frac{100 \times (1.34 - 1)}{0.03} \\ &= \frac{100 \times 0.34}{0.03} \\ &= 1133.33 \cdots (\text{만 원}) \end{aligned}$$

이때 만 원 미만은 버리므로 10년 후 연말의 적립금의 원리합계는 1133만 원이다.

유형 완성하기

p. 235~248

01 ㉡ ③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_2 = 6 \text{에서 } ar = 6 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_5 = 48 \text{에서 } ar^4 = 48 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{을 하면 } r^3 = 8 \quad \therefore r = 2$$

$r = 2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$2a = 6 \quad \therefore a = 3$$

따라서 $a_n = 3 \times 2^{n-1}$ 이므로

$$a_7 = 3 \times 2^6 = 192$$

01-1 ㉡ 11

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_3 = 16 \text{에서 } ar^2 = 16 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_6 = 2 \text{에서 } ar^5 = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{을 하면 } r^3 = \frac{1}{8} \quad \therefore r = \frac{1}{2}$$

$r = \frac{1}{2}$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\frac{1}{4}a = 16 \quad \therefore a = 64$$

$$\therefore a_n = 64 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\text{이때 } a_k = \frac{1}{16} \text{에서 } 64 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \frac{1}{16}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}, k-1=10$$

$$\therefore k=11$$

02 ㉡ ①

$$a_n = 3 \times 2^{1-2n} \text{에서}$$

$$a_1 = 3 \times 2^{-1} = \frac{3}{2}, a_2 = 3 \times 2^{-3} = \frac{3}{8}$$

$$\therefore (\text{공비}) = a_2 \div a_1 = \frac{3}{8} \div \frac{3}{2} = \frac{1}{4}$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항은 $\frac{3}{2}$, 공비는 $\frac{1}{4}$ 이다.

02-1 ㉡ 첫째항: $\frac{5\sqrt{3}}{3}$, 공비: $\frac{1}{3}$

$$a_n = \frac{5}{(\sqrt{3})^{2n-1}} \text{에서}$$

$$a_1 = \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{3}, a_2 = \frac{5}{(\sqrt{3})^3} = \frac{5}{3\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{9}$$

$$\therefore (\text{공비}) = a_2 \div a_1 = \frac{5\sqrt{3}}{9} \div \frac{5\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{3}$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항은 $\frac{5\sqrt{3}}{3}$, 공비는 $\frac{1}{3}$ 이다.

03 ㉡ ④

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_5 = \frac{1}{8} \text{에서 } ar^4 = \frac{1}{8} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_7 = \frac{1}{32} \text{에서 } ar^6 = \frac{1}{32} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{을 하면 } r^2 = \frac{1}{4} \quad \therefore r = \frac{1}{2} (\because r > 0)$$

$r = \frac{1}{2}$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\frac{1}{16}a = \frac{1}{8} \quad \therefore a = 2$$

따라서 $a_n = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$ 이므로

$$\begin{aligned} a_2 a_4 a_6 \cdots a_{20} &= \left(\frac{1}{2}\right)^0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \cdots \times \left(\frac{1}{2}\right)^{18} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{0+2+4+\cdots+18} \quad \text{첫째항이 0, 공차가 2, 항수가 10인 등차수열의 합} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{10(0+18)}{2}} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{90} \\ &= 2^{-90} \end{aligned}$$

03-1 ㉡ 3^{80}

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_4 = 9 \text{에서 } ar^3 = 9 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a_6 = 81 \text{에서 } ar^5 = 81 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{을 하면 } r^2 = 9 \quad \therefore r = 3 (\because r > 0) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$r = 3$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$27a = 9 \quad \therefore a = \frac{1}{3} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

따라서 $a_n = \frac{1}{3} \times 3^{n-1} = 3^{n-2}$ 이므로

$$\begin{aligned} a_1 a_3 a_5 \cdots a_{19} &= 3^{-1} \times 3^1 \times 3^3 \times \cdots \times 3^{17} \\ &= 3^{-1+1+3+\cdots+17} \quad \text{첫째항이 -1, 공차가 2, 항수가 10인 등차수열의 합} \\ &= 3^{\frac{10(-1+17)}{2}} \\ &= 3^{80} \quad \cdots \cdots \textcircled{3} \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 구할 수 있다.	30%
② 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 구할 수 있다.	30%
③ $a_1 a_3 a_5 \cdots a_{19}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

04 ㉔④

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_3 + a_4 = 12 \text{에서 } ar^2 + ar^3 = 12$$

$$\therefore ar^2(1+r) = 12 \quad \dots\dots ㉔$$

$$a_3 : a_4 = 2 : 1 \text{에서 } ar^2 : ar^3 = 2 : 1$$

$$ar^2 = 2ar^3 \quad \therefore r = \frac{1}{2}$$

$$r = \frac{1}{2} \text{을 } ㉔ \text{에 대입하면 } \frac{a}{4} \left(1 + \frac{1}{2}\right) = 12$$

$$\frac{3}{8}a = 12 \quad \therefore a = 32$$

$$\therefore a_n = 32 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-6}$$

$$\text{이때 } \frac{1}{128} \text{을 제 } n \text{항이라 하면 } \left(\frac{1}{2}\right)^{n-6} = \frac{1}{128} = \left(\frac{1}{2}\right)^7$$

$$n-6=7 \quad \therefore n=13$$

따라서 $\frac{1}{128}$ 은 제 13항이다.

04-1 ㉔②

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_2 + a_3 = 6 \text{에서 } ar + ar^2 = 6$$

$$\therefore ar(1+r) = 6 \quad \dots\dots ㉔$$

$$a_5 : a_7 = 1 : 4 \text{에서 } ar^4 : ar^6 = 1 : 4$$

$$4ar^4 = ar^6, r^2 = 4 \quad \therefore r = 2 (\because r > 0)$$

$$r = 2 \text{를 } ㉔ \text{에 대입하면 } 6a = 6 \quad \therefore a = 1$$

$$\text{따라서 } a_n = 2^{n-1} \text{이므로 } a_{10} = 2^9$$

05 ㉔48

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_1 + a_2 = 3 \text{에서 } a + ar = 3$$

$$\therefore a(1+r) = 3 \quad \dots\dots ㉔$$

$$a_5 + a_6 = 12 \text{에서 } ar^4 + ar^5 = 12$$

$$\therefore ar^4(1+r) = 12 \quad \dots\dots ㉕ \quad \dots\dots ㉑$$

$$㉕ \div ㉔ \text{을 하면 } r^4 = 4 \quad \dots\dots ㉒$$

$$\therefore a_9 + a_{10} = ar^8 + ar^9 = ar^8(1+r)$$

$$= ar^4(1+r) \times r^4$$

$$= 12 \times 4 = 48 \quad \dots\dots ㉓$$

채점 기준	비율
㉑ 주어진 조건을 첫째항과 공비에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
㉒ r^4 의 값을 구할 수 있다.	20%
㉓ $a_9 + a_{10}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

05-1 ㉔4

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a \neq 0$), 공비를 r 라 하면

$$a_1 + 2a_2 = 0 \text{에서 } a + 2ar = 0$$

$$a(1+2r) = 0 \quad \therefore r = -\frac{1}{2} (\because a \neq 0)$$

$$a_1 + a_2 + a_3 = 3 \text{에서 } a + ar + ar^2 = 3 \quad \dots\dots ㉔$$

$$r = -\frac{1}{2} \text{을 } ㉔ \text{에 대입하면 } a - \frac{1}{2}a + \frac{1}{4}a = 3$$

$$\frac{3}{4}a = 3 \quad \therefore a = 4$$

$$\text{따라서 } a_n = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \text{이므로}$$

$$a_5 = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{4} \quad \therefore \frac{1}{a_5} = 4$$

06 ㉔④

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a \neq 0$), 공비를 r 라 하면

$$8(a_1 + a_3) = a_4 + a_6 \text{에서 } 8(a + ar^2) = ar^3 + ar^5$$

$$8a(1+r^2) = ar^3(1+r^2) \quad \therefore r^3 = 8$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{a_5 + a_7 + a_9}{a_2 + a_4 + a_6} &= \frac{ar^4 + ar^6 + ar^8}{ar + ar^3 + ar^5} \\ &= \frac{ar^4(1+r^2+r^4)}{ar(1+r^2+r^4)} \\ &= r^3 = 8 \end{aligned}$$

06-1 ㉔③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

$$\frac{a_2 + a_5 + a_8}{a_5 + a_8 + a_{11}} = 8 \text{에서 } \frac{ar + ar^4 + ar^7}{ar^4 + ar^7 + ar^{10}} = 8$$

$$\frac{ar(1+r^3+r^6)}{ar^4(1+r^3+r^6)} = 8, \quad \frac{1}{r^3} = 8$$

$$\therefore r^3 = 8$$

$$\therefore \frac{a_8}{a_2} = \frac{ar^7}{ar} = r^6 = (r^3)^2 = 8^2 = 64$$

07 ㉔④

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_4 = 3 \text{에서 } ar^3 = 3 \quad \dots\dots ㉔$$

$$a_7 = 24 \text{에서 } ar^6 = 24 \quad \dots\dots ㉕$$

$$㉕ \div ㉔ \text{을 하면 } r^3 = 8 \quad \therefore r = 2$$

$$r = 2 \text{를 } ㉔ \text{에 대입하면 } 8a = 3 \quad \therefore a = \frac{3}{8}$$

$$\therefore a_n = \frac{3}{8} \times 2^{n-1}$$

$$\frac{3}{8} \times 2^{n-1} > 150 \text{에서 } 2^{n-1} > 400$$

$$\text{이때 } 2^8 = 256, 2^9 = 512 \text{이므로}$$

$$n-1 \geq 9 \quad \therefore n \geq 10$$

따라서 처음으로 150보다 커지는 항은 제 10항이다.

07-1 ㉔③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_3 = 6 \text{에서 } ar^2 = 6 \quad \dots\dots ㉔$$

$$a_6 = 48 \text{에서 } ar^5 = 48 \quad \dots\dots ㉕$$

$$㉕ \div ㉔ \text{을 하면 } r^3 = 8 \quad \therefore r = 2$$

$$r = 2 \text{를 } ㉔ \text{에 대입하면 } 4a = 6 \quad \therefore a = \frac{3}{2}$$

$$\therefore a_n = \frac{3}{2} \times 2^{n-1}$$

$$a_k > 1500 \text{에서 } \frac{3}{2} \times 2^{k-1} > 1500 \quad \therefore 2^{k-1} > 1000$$

$$\text{이때 } 2^9 = 512, 2^{10} = 1024 \text{이므로}$$

$$k-1 \geq 10 \quad \therefore k \geq 11$$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 11이다.

08 ㉔⑤

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r ($r > 0$)라 하면 첫째항이 10이므로

$$a_3 = \frac{2}{5} \text{에서 } 10r^2 = \frac{2}{5}$$

$$r^2 = \frac{1}{25} \quad \therefore r = \frac{1}{5} (\because r > 0)$$

$$\therefore a_n = 10 \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$$

$$10 \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} < \frac{1}{100} \text{에서 } \frac{1}{5^{n-1}} < \frac{1}{1000}$$

$$\therefore 5^{n-1} > 1000$$

이때 $5^4 = 625$, $5^5 = 3125$ 이므로

$$n-1 \geq 5 \quad \therefore n \geq 6$$

따라서 처음으로 $\frac{1}{100}$ 보다 작아지는 항은 제6항이다.

08-1 ㉮ 15

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a > 0$), 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$\log_2 a_3 = 4$ 에서 $a_3 = 2^4$ 이므로

$$ar^2 = 16 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$\log_2 a_5 = 2$ 에서 $a_5 = 2^2$ 이므로

$$ar^4 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \div \textcircled{B} \text{을 하면 } r^2 = \frac{1}{4} \quad \therefore r = \frac{1}{2} (\because r > 0)$$

$r = \frac{1}{2}$ 을 $\textcircled{A}$ 에 대입하면

$$\frac{1}{4}a = 16 \quad \therefore a = 64 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\therefore a_n = 64 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-7}$$

$$a_k < \frac{1}{200} \text{에서 } \left(\frac{1}{2}\right)^{k-7} < \frac{1}{200} \quad \therefore 2^{k-7} > 200$$

이때 $2^7 = 128$, $2^8 = 256$ 이므로

$$k-7 \geq 8 \quad \therefore k \geq 15 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 15이다. \dots\dots \textcircled{3}

채점 기준	비율
① 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공비를 구할 수 있다.	40%
② k 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
③ 자연수 k 의 최솟값을 구할 수 있다.	20%

09 ㉮ 3

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a > 0$), 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_5 = 4 \text{에서 } ar^4 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_9 = 16 \text{에서 } ar^8 = 16 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \div \textcircled{B} \text{을 하면 } r^4 = 4 \quad \therefore r = \sqrt{2} (\because r > 0)$$

$r = \sqrt{2}$ 를 $\textcircled{A}$ 에 대입하면

$$4a = 4 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore a_n = (\sqrt{2})^{n-1} = 2^{\frac{n-1}{2}}$$

$$100 < 2^{\frac{n-1}{2}} < 300 \text{에서 } 2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512 \text{이므로}$$

$$7 \leq \frac{n-1}{2} \leq 8, 14 \leq n-1 \leq 16$$

$$\therefore 15 \leq n \leq 17$$

따라서 자연수 n 의 값은 15, 16, 17이므로 그 개수는 3이다.

09-1 ㉮ 33

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a > 0$), 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_4 = 3 \text{에서 } ar^3 = 3 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_8 = 27 \text{에서 } ar^7 = 27 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \div \textcircled{B} \text{을 하면 } r^4 = 9 \quad \therefore r = \sqrt{3} (\because r > 0)$$

$$r = \sqrt{3} \text{을 } \textcircled{A} \text{에 대입하면 } 3\sqrt{3}a = 3 \quad \therefore a = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore a_n = \frac{\sqrt{3}}{3} \times (\sqrt{3})^{n-1} = 3^{\frac{n-2}{2}}$$

$$50 < 3^{\frac{n-2}{2}} < 500 \text{에서 } 3^3 = 27, 3^4 = 81, 3^5 = 243, 3^6 = 729 \text{이므로}$$

$$4 \leq \frac{n-2}{2} \leq 5, 8 \leq n-2 \leq 10$$

$$\therefore 10 \leq n \leq 12$$

따라서 자연수 n 의 값은 10, 11, 12이므로 그 합은

$$10 + 11 + 12 = 33$$

10 ㉮ ④

첫째항이 6, 제12항이 15인 등비수열의 공비를 r 라 하면

$$6r^{11} = 15 \quad \therefore r^{11} = \frac{5}{2}$$

이때 a_1, a_{10} 은 각각 주어진 수열의 제2항, 제11항이므로

$$a_1 = 6r, a_{10} = 6r^{10}$$

$$\therefore a_1 a_{10} = 6r \times 6r^{10} = 36r^{11} = 36 \times \frac{5}{2} = 90$$

10-1 ㉮ 10

첫째항이 1, 제7항이 1000인 등비수열의 공비를 r 라 하면

$$1 \times r^6 = 1000 \quad \therefore r^2 = 10$$

이때 a_2 는 주어진 수열의 제3항이므로

$$a_2 = 1 \times r^2 = 10$$

참고 (i) $r = \sqrt{10}$ 일 때, 주어진 등비수열은 $1, \sqrt{10}, 10, 10\sqrt{10}, \dots$,
10000이므로 $a_2 = 10$
(ii) $r = -\sqrt{10}$ 일 때, 주어진 등비수열은 $1, -\sqrt{10}, 10, -10\sqrt{10}, \dots$,
10000이므로 $a_2 = 10$

11 ㉮ 2

첫째항이 3, 공비가 4인 등비수열의 제 $(n+2)$ 항이 192이므로

$$3 \times 4^{n+1} = 192, 4^{n+1} = 64 = 4^3$$

$$n+1 = 3 \quad \therefore n = 2$$

11-1 ㉮ ③

주어진 등비수열의 공비를 r 라 하면

첫째항이 3, 제 $(n+2)$ 항이 243이므로

$$3r^{n+1} = 243 \quad \therefore r^{n+1} = 81 = 3^4 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

또 모든 항의 곱이 3^{15} 이므로

$$3 \times a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_n \times 243$$

$$= 3 \times 3r \times 3r^2 \times 3r^3 \times \dots \times 3r^n \times 3^5$$

$$= 3^{n+1} \times 3^5 \times r^{1+2+3+\dots+n}$$

$$= 3^{n+6} \times r^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$= 3^{n+6} \times (r^{n+1})^{\frac{n}{2}}$$

$$= 3^{n+6} \times (3^4)^{\frac{n}{2}} (\because \textcircled{A})$$

$$= 3^{n+6} \times 3^{2n}$$

$$= 3^{3n+6}$$

$$= 3^{15}$$

$$\text{즉 } 3n+6 = 15 \text{이므로 } 3n = 9 \quad \therefore n = 3$$

12 ㉮ 5

첫째항이 64, 제12항이 $\frac{1}{32}$ 인 등비수열의 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$64r^{11} = \frac{1}{32}, r^{11} = \left(\frac{1}{2}\right)^{11} \quad \therefore r = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
&\text{이때 } a_1=64r, a_2=64r^2, a_3=64r^3, \dots, a_{10}=64r^{10} \text{이므로} \\
&\log_2 a_1 + \log_2 a_2 + \log_2 a_3 + \dots + \log_2 a_{10} \\
&= \log_2 (a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_{10}) \\
&= \log_2 (64r \times 64r^2 \times 64r^3 \times \dots \times 64r^{10}) \\
&= \log_2 64^{10} r^{1+2+3+\dots+10} \\
&= \log_2 \{(2^6)^{10} \times r^{55}\} \\
&= \log_2 \left\{ (2^6)^{10} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{55} \right\} \\
&= \log_2 (2^{60} \times 2^{-55}) \\
&= \log_2 2^5 \\
&= 5
\end{aligned}$$

12-1 ㉔ 21

첫째항이 -3 , 제8항이 $24\sqrt{2}$ 인 등비수열의 공비를 r 라 하면
 $-3r^7 = 24\sqrt{2}$, $r^7 = -8\sqrt{2} = (-\sqrt{2})^7$
 $\therefore r = -\sqrt{2}$
 이때 $a_1 = -3r, a_2 = -3r^2, a_3 = -3r^3, \dots, a_6 = -3r^6$ 이므로

$$\begin{aligned}
\frac{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6}{3^6} &= \frac{-3r \times (-3r^2) \times (-3r^3) \times \dots \times (-3r^6)}{3^6} \\
&= \frac{(-3)^6 \times r^{1+2+3+4+5+6}}{3^6} \\
&= \frac{3^6 \times r^{21}}{3^6} = r^{21} \\
&= (-\sqrt{2})^{21} = -(\sqrt{2})^{21} \\
\therefore k &= 21
\end{aligned}$$

13 ㉔ 8

세 양수 $x, x+4, 2x+2$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로
 $(x+4)^2 = x(2x+2), x^2+8x+16=2x^2+2x$
 $x^2-6x-16=0, (x+2)(x-8)=0$
 $\therefore x=8 (\because x>0)$

13-1 ㉔ 4

세 수 $2, \log_2 a, 8$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로
 $(\log_2 a)^2 = 2 \times 8 = 16$
 이때 $a > 1$ 이므로 $\log_2 a > 0$
 즉 $\log_2 a = 4$ 이므로 $a = 2^4$
 또 세 수 $\log_2 a, 8, \log_2 b$, 즉 $4, 8, \log_2 b$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로
 $8^2 = 4 \log_2 b, \log_2 b = 16 \quad \therefore b = 2^{16}$
 $\therefore \log_2 \frac{b}{a} = \log_2 \frac{2^{16}}{2^4} = \log_2 2^{12} = 12$

14 ㉔ 3

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로
 $b^2 = ac$
 $\therefore \frac{1}{\log_a b} + \frac{1}{\log_c b} = \log_b a + \log_b c = \log_b ac$
 $= \log_b b^2 = 2$

Lecture 로그의 밑의 변환

$a > 0, a \neq 1$ 이고 $b > 0$ 일 때

(1) $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

(2) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (단, $b \neq 1$)

14-1 ㉔ 2

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로
 $b^2 = ac$
 $\therefore \frac{1}{\log_a x} + \frac{1}{\log_c x} = \log_x a + \log_x c = \log_x ac$
 $= \log_b b^2 = \frac{1}{2}$

15 ㉔ 3

다항식 $f(x) = 2x^2 + 4x + a$ 를 일차식 $x+1, x, x-1$ 로 나누었을 때의 나머지는 나머지정리에 의하여
 $f(-1) = 2 - 4 + a = a - 2$
 $f(0) = a$
 $f(1) = 2 + 4 + a = a + 6$ ①
 즉 세 수 $a-2, a, a+6$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로
 $a^2 = (a-2)(a+6)$ ②
 $a^2 = a^2 + 4a - 12, 4a = 12 \quad \therefore a = 3$ ③

채점 기준	배점
① 나머지를 구할 수 있다.	40%
② 나머지 사이의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.	40%
③ a 의 값을 구할 수 있다.	20%

Lecture 나머지정리

다항식 $f(x)$ 를 일차식 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지는 $f(a)$

15-1 ㉔ 3

다항식 $f(x) = x^2 - ax + 2a$ 를 일차식 $x-1, x-2, x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는 나머지정리에 의하여
 $R_1 = f(1) = 1 - a + 2a = a + 1$
 $R_2 = f(2) = 4 - 2a + 2a = 4$
 $R_3 = f(3) = 9 - 3a + 2a = -a + 9$
 즉 세 수 R_1, R_2, R_3 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로
 $R_2^2 = R_1 R_3$
 $4^2 = (a+1)(-a+9), 16 = -a^2 + 8a + 9$
 $a^2 - 8a + 7 = 0, (a-1)(a-7) = 0$
 $\therefore a = 1$ 또는 $a = 7$
 따라서 모든 실수 a 의 값의 합은
 $1 + 7 = 8$

16 ㉔ 4

a_1, a_6, a_{11} 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로 $a_6^2 = a_1 a_{11}$
 a_2, a_6, a_{10} 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로 $a_6^2 = a_2 a_{10}$
 a_3, a_6, a_9 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로 $a_6^2 = a_3 a_9$
 a_4, a_6, a_8 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로 $a_6^2 = a_4 a_8$
 a_5, a_6, a_7 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로 $a_6^2 = a_5 a_7$
 $\therefore a_1 a_2 a_3 \dots a_{11}$
 $= (a_1 a_{11}) \times (a_2 a_{10}) \times (a_3 a_9) \times (a_4 a_8) \times (a_5 a_7) \times a_6$
 $= a_6^2 \times a_6^2 \times a_6^2 \times a_6^2 \times a_6^2 \times a_6$
 $= a_6^{11} = 3^{11}$

16-1 ㉔ 5

a_2, a_5, a_8 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로
 $a_5^2 = a_2 a_8 = 4 \quad \therefore a_5 = 2 (\because a_5 > 0)$

$$\begin{aligned}
& a_1, a_5, a_9 \text{가 이 순서대로 등비수열을 이루므로 } a_5^2 = a_1 a_9 \\
& a_3, a_5, a_7 \text{이 이 순서대로 등비수열을 이루므로 } a_5^2 = a_3 a_7 \\
& a_4, a_5, a_6 \text{이 이 순서대로 등비수열을 이루므로 } a_5^2 = a_4 a_6 \\
& \therefore a_1 a_2 a_3 \cdots a_9 \\
& = (a_1 a_9) \times (a_2 a_8) \times (a_3 a_7) \times (a_4 a_6) \times a_5 \\
& = a_5^2 \times a_5^2 \times a_5^2 \times a_5^2 \times a_5 \\
& = a_5^9 \\
& = 2^9
\end{aligned}$$

17 ㉡ ④

$$\begin{aligned}
& \text{세 양수 } a, b, 14 \text{가 이 순서대로 등차수열을 이루므로} \\
& 2b = a + 14 \quad \dots\dots ㉠ \\
& \text{세 양수 } 2, a, 18 \text{이 이 순서대로 등비수열을 이루므로} \\
& a^2 = 2 \times 18 = 36 \quad \therefore a = 6 (\because a > 0) \\
& a = 6 \text{을 } ㉠ \text{에 대입하면 } 2b = 20 \quad \therefore b = 10 \\
& \therefore ab = 6 \times 10 = 60
\end{aligned}$$

17-1 ㉡ -3

$$\begin{aligned}
& \text{세 수 } 2, a, b \text{가 이 순서대로 등차수열을 이루므로} \\
& 2a = 2 + b \quad \therefore b = 2a - 2 \quad \dots\dots ㉠ \\
& \text{세 수 } a, 2, b \text{가 이 순서대로 등비수열을 이루므로} \\
& 2^2 = ab \quad \therefore ab = 4 \quad \dots\dots ㉡ \\
& ㉠ \text{을 } ㉡ \text{에 대입하면} \\
& a(2a - 2) = 4, a(a - 1) = 2 \\
& a^2 - a - 2 = 0, (a + 1)(a - 2) = 0 \\
& \therefore a = -1 \text{ 또는 } a = 2 \\
& \text{그런데 } a \neq 2 \text{이므로 } a = -1 \\
& a = -1 \text{을 } ㉠ \text{에 대입하면} \\
& b = -2 - 2 = -4 \\
& \therefore a + b = -1 + (-4) = -5
\end{aligned}$$

18 ㉡ 60

$$\begin{aligned}
& \text{세 양수 } 3, a, b \text{가 이 순서대로 등비수열을 이루므로} \\
& a^2 = 3b \quad \dots\dots ㉠ \\
& \text{세 양수 } b, c, 27 \text{이 이 순서대로 등비수열을 이루므로} \\
& c^2 = 27b \quad \dots\dots ㉡ \\
& \text{세 양수 } a, b, c \text{가 이 순서대로 등차수열을 이루므로} \\
& 2b = a + c \quad \dots\dots ㉢ \quad \dots\dots ㉣ \\
& ㉠, ㉡ \text{에서 } c^2 = 9a^2 \\
& \text{이때 } a, c \text{는 양수이므로 } c = 3a \\
& c = 3a \text{를 } ㉢ \text{에 대입하면} \\
& 2b = 4a \quad \therefore b = 2a \\
& \text{세 수 } 3, a, b, \text{ 즉 } 3, a, 2a \text{는 공비가 } 2 \text{인 등비수열이므로} \\
& a = 6, b = 12 \quad \text{□ (공비)} = 2a \div a = 2 \\
& \text{세 수 } a, b, c, \text{ 즉 } 6, 12, c \text{는 공차가 } 6 \text{인 등차수열이므로} \\
& c = 18 \quad \text{□ (공차)} = 12 - 6 = 6 \\
& \therefore 3a + 2b + c = 3 \times 6 + 2 \times 12 + 18 = 60 \quad \dots\dots ㉤ \quad \dots\dots ㉥
\end{aligned}$$

채점 기준	비율
㉠ a, b, c 사이의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.	40%
㉡ a, b, c 의 값을 구할 수 있다.	40%
㉢ $3a + 2b + c$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

18-1 ㉡ ②

$$\begin{aligned}
& \text{세 양수 } 2, a, b \text{가 이 순서대로 등비수열을 이루므로} \\
& a^2 = 2b \quad \dots\dots ㉠ \\
& \text{세 양수 } a, b, 12 \text{가 이 순서대로 등차수열을 이루므로} \\
& 2b = a + 12 \quad \dots\dots ㉡ \\
& ㉠ \text{을 } ㉡ \text{에 대입하면 } a^2 = a + 12 \\
& a^2 - a - 12 = 0, (a + 3)(a - 4) = 0 \\
& \therefore a = 4 (\because a > 0) \\
& a = 4 \text{를 } ㉡ \text{에 대입하면 } 16 = 2b \quad \therefore b = 8 \\
& \therefore a + b = 4 + 8 = 12
\end{aligned}$$

19 ㉡ 9

$$\begin{aligned}
& \text{등비수열을 이루는 세 수를 } a, ar, ar^2 (a \neq 0, r \neq 0) \text{이라 하면} \\
& \text{세 수의 합이 } 13 \text{이므로} \\
& a + ar + ar^2 = 13 \quad \therefore a(1 + r + r^2) = 13 \quad \dots\dots ㉠ \\
& \text{세 수의 곱이 } 27 \text{이므로} \\
& a \times ar \times ar^2 = 27, (ar)^3 = 27 \\
& ar = 3 \quad \therefore a = \frac{3}{r} \quad \dots\dots ㉡ \\
& ㉠ \text{을 } ㉡ \text{에 대입하면 } \frac{3}{r}(1 + r + r^2) = 13 \\
& 3 + 3r + 3r^2 = 13r, 3r^2 - 10r + 3 = 0 \\
& (3r - 1)(r - 3) = 0 \quad \therefore r = \frac{1}{3} \text{ 또는 } r = 3 \\
& \text{(i) } r = \frac{1}{3} \text{이면 } a = 9 \text{이므로 세 수는 } 9, 3, 1 \\
& \text{(ii) } r = 3 \text{이면 } a = 1 \text{이므로 세 수는 } 1, 3, 9 \\
& \text{(i), (ii)에서 세 수 중 가장 큰 수는 } 9 \text{이다.}
\end{aligned}$$

19-1 ㉡ 8

$$\begin{aligned}
& \text{등비수열을 이루는 세 수를 } a, ar, ar^2 (a \neq 0, r \neq 0) \text{이라 하면} \\
& \text{세 수의 합이 } 6 \text{이므로} \\
& a + ar + ar^2 = 6 \quad \therefore a(1 + r + r^2) = 6 \quad \dots\dots ㉠ \\
& \text{세 수의 곱이 } -64 \text{이므로} \\
& a \times ar \times ar^2 = -64, (ar)^3 = -64 \\
& ar = -4 \quad \therefore a = -\frac{4}{r} \quad \dots\dots ㉡ \\
& ㉠ \text{을 } ㉡ \text{에 대입하면 } -\frac{4}{r}(1 + r + r^2) = 6 \\
& 4 + 4r + 4r^2 = -6r, 2r^2 + 5r + 2 = 0 \\
& (r + 2)(2r + 1) = 0 \quad \therefore r = -2 \text{ 또는 } r = -\frac{1}{2} \\
& \text{(i) } r = -2 \text{이면 } a = 2 \text{이므로 세 수는 } 2, -4, 8 \\
& \text{(ii) } r = -\frac{1}{2} \text{이면 } a = 8 \text{이므로 세 수는 } 8, -4, 2 \\
& \text{(i), (ii)에서 세 수 중 가장 큰 수는 } 8 \text{이다.}
\end{aligned}$$

20 ㉡ 14

$$\begin{aligned}
& \text{삼차방정식의 세 실근을 } a, ar, ar^2 \text{이라 하면 삼차방정식의 근과 계} \\
& \text{수의 관계에 의하여} \\
& a + ar + ar^2 = \frac{k}{3} \quad \dots\dots ㉠ \\
& a \times ar + ar \times ar^2 + ar^2 \times a = -\frac{56}{3} \text{이므로} \\
& ar(a + ar + ar^2) = -\frac{56}{3} \\
& a \times ar \times ar^2 = -64 \text{이므로}
\end{aligned}$$

$$(ar)^3 = -64 \quad \therefore ar = -4 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

㉠, ㉡을 ㉢에 대입하면

$$-\frac{4k}{3} = -\frac{56}{3} \quad \therefore k = 14$$

20-1 ㉢ ㉠

주어진 두 곡선이 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식

$$x^3 - 20x^2 = 6x^2 + 156x + k, \text{ 즉 } x^3 - 26x^2 - 156x - k = 0 \text{ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.}$$

이때 세 실근을 a, ar, ar^2 이라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a + ar + ar^2 = 26 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a \times ar + ar \times ar^2 + ar^2 \times a = -156 \text{ 이므로}$$

$$ar(a + ar + ar^2) = -156 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$a \times ar \times ar^2 = k \text{ 이므로 } (ar)^3 = k \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$$\textcircled{A} \div \textcircled{B} \text{ 을 하면 } ar = -6$$

$ar = -6$ 을 ㉢에 대입하면

$$(-6)^3 = k \quad \therefore k = -216$$

21 ㉢ ㉣

직육면체의 가로 길이, 세로 길이, 높이를 각각 a, ar, ar^2 이라 하면 직육면체의 부피가 27이므로

$$a \times ar \times ar^2 = 27, (ar)^3 = 27 \quad \therefore ar = 3 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

겉넓이가 60이므로

$$2(a \times ar + ar \times ar^2 + ar^2 \times a) = 60$$

$$\therefore a^2r(1 + r + r^2) = 30 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \div \textcircled{B} \text{ 을 하면 } a(1 + r + r^2) = 10$$

따라서 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은

$$4(a + ar + ar^2) = 4a(1 + r + r^2) = 4 \times 10 = 40$$

21-1 ㉢ 28

직육면체의 가로 길이, 세로 길이, 높이를 각각 a, ar, ar^2 이라 하면 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합이 28이므로

$$4(a + ar + ar^2) = 28 \quad \therefore a + ar + ar^2 = 7$$

부피가 8이므로

$$a \times ar \times ar^2 = 8, (ar)^3 = 8 \quad \therefore ar = 2$$

따라서 직육면체의 겉넓이는

$$2(a \times ar + ar \times ar^2 + ar^2 \times a) = 2ar(a + ar + ar^2) = 2 \times 2 \times 7 = 28$$

22 ㉢ ㉣

$\triangle OP_1P_2$ 가 직각이등변삼각형이므로

$$\frac{P_1P_2}{OP_1} = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\overline{P_1P_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \overline{OP_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\overline{P_2P_3} = \frac{1}{\sqrt{2}} \overline{P_1P_2} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$\overline{P_3P_4} = \frac{1}{\sqrt{2}} \overline{P_2P_3} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3$$

$\vdots$

$$\overline{P_nP_{n+1}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$$

$$\text{이때 } \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \left\{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right\}^{10} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{20} \text{ 이므로}$$

$$n = 20$$

따라서 구하는 선분은 $\overline{P_{20}P_{21}}$ 이다.

22-1 ㉢ ㉣

직각삼각형 OA_1A_2 와 OA_2A_3 은 닮음이므로

$$\overline{A_1A_2} : \overline{A_2A_3} = \overline{OA_1} : \overline{OA_2} = 8 : 6 = 4 : 3$$

$$\text{이때 } \overline{A_1A_2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ 이므로}$$

$$\overline{A_2A_3} = \frac{3}{4} \overline{A_1A_2} = 10 \times \frac{3}{4}$$

$$\overline{A_3A_4} = \frac{3}{4} \overline{A_2A_3} = 10 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

$\vdots$

$$\overline{A_nA_{n+1}} = 10 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}$$

$$\therefore \overline{A_{10}A_{11}} = 10 \times \left(\frac{3}{4}\right)^9$$

참고

22-1에서

$$\triangle OA_1A_2 \sim \triangle OA_2A_3 \sim \triangle OA_3A_4 \sim \triangle OA_4A_5 \sim \dots$$

23 ㉢ $\frac{1}{64}$

한 번의 길이가 4인 색종이의 넓이는

$$4^2 = 16$$

1회 시행 후 남아 있는 색종이의 넓이는

$$16 \times \frac{1}{2}$$

2회 시행 후 남아 있는 색종이의 넓이는

$$\left(16 \times \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} = 16 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$\vdots$

n 회 시행 후 남아 있는 색종이의 넓이는

$$16 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

따라서 10회 시행 후 남아 있는 색종이의 넓이는

$$16 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{1}{64}$$

23-1 ㉢ ㉣

한 번의 길이가 4인 정사각형의 넓이는

$$4^2 = 16$$

1회 시행 후 남아 있는 종이의 넓이는

$$16 \times \frac{3}{4}$$

2회 시행 후 남아 있는 종이의 넓이는

$$\left(16 \times \frac{3}{4}\right) \times \frac{3}{4} = 16 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

$\vdots$

n 회 시행 후 남아 있는 종이의 넓이는

$$16 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

즉 12회 시행 후 남아 있는 종이의 넓이는

$$16 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{12} = 2^4 \times \frac{3^{12}}{2^{24}} = 2^{-20} \times 3^{12}$$

따라서 $a = -20, b = 12$ 이므로

$$b - a = 12 - (-20) = 32$$

24 ㉔ $2 \times \left(\frac{3}{5}\right)^9$

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 T_1 과 직각삼각형 ABC 는 닮음이므로

$$(2-a_1) : a_1 = \overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3$$

$$3(2-a_1) = 2a_1, 6-3a_1 = 2a_1$$

$$5a_1 = 6 \quad \therefore a_1 = \frac{6}{5}$$

직각삼각형 T_2 와 직각삼각형 ABC 는 닮음이므로

$$(a_1-a_2) : a_2 = \overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3$$

$$3(a_1-a_2) = 2a_2, 3a_1-3a_2 = 2a_2$$

$$5a_2 = 3a_1 \quad \therefore a_2 = \frac{3}{5}a_1 = \frac{6}{5} \times \frac{3}{5}$$

직각삼각형 T_3 와 직각삼각형 ABC 는 닮음이므로

$$(a_2-a_3) : a_3 = \overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3$$

$$3(a_2-a_3) = 2a_3, 3a_2-3a_3 = 2a_3$$

$$5a_3 = 3a_2 \quad \therefore a_3 = \frac{3}{5}a_2 = \frac{6}{5} \times \left(\frac{3}{5}\right)^2$$

$\vdots$

$$a_n = \frac{6}{5} \times \left(\frac{3}{5}\right)^{n-1} = 2 \times \left(\frac{3}{5}\right)^n$$

$$\therefore a_9 = 2 \times \left(\frac{3}{5}\right)^9$$

24-1 ㉔ 91

세 정사각형 A, B, C의 한 변의 길이를 각각 a, b, c 라 하자.

직선 l 과 세 정사각형 A, B, C 사이의 직각삼각형을 이용하여 직선 l 의 기울기를 구하면

$$\frac{b-a}{a} = \frac{c-b}{b}, b(b-a) = a(c-b)$$

$$b^2-ab=ac-ab \quad \therefore b^2=ac$$

같은 방법으로 두 정사각형 D, E의 한 변의 길이를 각각 d, e 라 하면 $c^2=bd, d^2=ce$

즉 5개의 정사각형 A, B, C, D, E의 각 변의 길이는 이웃한 순서대로 등비수열을 이루므로 정사각형의 넓이도 이웃한 순서대로 등비수열을 이룬다.

정사각형의 넓이로 이루어진 등비수열의 공비를 r 라 하면 두 정사각형 B, D의 넓이가 각각 3, 27이므로

$$3r^2 = 27, r^2 = 9$$

$$\therefore r = 3 (\because r > 0)$$

따라서 5개의 정사각형 A, B, C, D, E의 넓이는 각각 1, 3, 9, 27, 81이므로 세 정사각형 A, C, E의 넓이의 합은

$$1+9+81=91$$

25 ㉔ ⑤

처음 세포의 개수는 20

1회 배양한 후 살아 있는 세포의 개수는

$$20 \times 0.5 \times 4 = 20 \times 2$$

2회 배양한 후 살아 있는 세포의 개수는

$$(20 \times 2) \times 0.5 \times 4 = 20 \times 2^2$$


$\vdots$

n 회 배양한 후 살아 있는 세포의 개수는

$$20 \times 2^n$$

따라서 8회 배양한 후 살아 있는 세포의 개수는

$$20 \times 2^8 = 5 \times 2^{10}$$



25-1 ㉔ ③

A 도시의 올해 인구를 a 만 명, 매년 인구의 증가율을 r 라 하면 n 년 후의 인구는 $a(1+r)^n$ (만 명)

10년 후의 인구가 80만 명이므로

$$a(1+r)^{10} = 80 \quad \dots\dots ㉠$$

20년 후의 인구가 100만 명이므로

$$a(1+r)^{20} = 100 \quad \dots\dots ㉡$$

$$㉡ \div ㉠ \text{을 하면 } (1+r)^{10} = \frac{5}{4}$$

$$\therefore (1+r)^5 = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

따라서 예상되는 A 도시의 25년 후의 인구는

$$a(1+r)^{25} = a(1+r)^{20} \times (1+r)^5 = 100 \times \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$= 100 \times \frac{2.2}{2}$$

$$= 110(\text{만 명})$$

26 ㉔ 3000만 원

6년 전 이 자동차를 처음 구입했을 때의 가격을 a 만 원이라 하면

구입 후 1년이 지났을 때 중고차 가격은

$$a(1-0.08) = 0.92a(\text{만 원})$$

구입 후 2년이 지났을 때 중고차 가격은

$$0.92a(1-0.08) = 0.92^2a(\text{만 원})$$

$\vdots$

구입 후 n 년이 지났을 때 중고차 가격은

$$0.92^n a(\text{만 원})$$

구입 후 6년이 지났을 때 중고차 가격이 1800만 원이므로

$$0.92^6 a = 1800, 0.6a = 1800$$

$$\therefore a = 3000$$

따라서 6년 전 이 자동차를 처음 구입했을 때의 가격은 3000만 원이다.

26-1 ㉔ 11

유해 물질 100 g이 포함된 물이 여과기를 1번 통과하였을 때의 유해 물질의 양은

$$100(1-0.2) = 100 \times 0.8 \text{ (g)}$$

여과기를 2번 통과하였을 때의 유해 물질의 양은

$$(100 \times 0.8)(1-0.2) = 100 \times 0.8^2 \text{ (g)}$$

$\vdots$

여과기를 n 번 통과하였을 때의 유해 물질의 양은

$$100 \times (0.8)^n \text{ (g)} \quad \dots\dots ㉠$$

$$100 \times (0.8)^n \leq 10 \text{에서 } \left(\frac{4}{5}\right)^n \leq \frac{1}{10} \quad \dots\dots ㉡$$

위의 식의 양변에 상용로그를 취하면

$$n(\log 4 - \log 5) \leq -1, n\{2 \log 2 - (1 - \log 2)\} \leq -1$$

$$n(3 \log 2 - 1) \leq -1, n(3 \times 0.301 - 1) \leq -1$$

$$-0.097n \leq -1 \quad \therefore n \geq \frac{1}{0.097} = 10.3\dots$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 11이다. $\dots\dots ㉢$

채점 기준	비율
① 여과기를 n 번 통과하였을 때의 유해 물질의 양을 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
② 조건을 만족시키는 부등식을 세울 수 있다.	20%
③ 자연수 n 의 최솟값을 구할 수 있다.	40%

27 ㉡ 6

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a > 0$), 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_3 = 12 \text{에서 } ar^2 = 12 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_5 = 48 \text{에서 } ar^4 = 48 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \div \textcircled{2} \text{을 하면 } r^2 = 4 \quad \therefore r = 2 \quad (\because r > 0)$$

$$r = 2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } 4a = 12 \quad \therefore a = 3$$

이때 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 189이므로

$$\frac{3(2^n - 1)}{2 - 1} = 189, 2^n - 1 = 63$$

$$2^n = 64 = 2^6 \quad \therefore n = 6$$

27-1 ㉡ 5

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a > 0$), 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_5 = 24 \text{에서 } ar^4 = 24 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_9 = 96 \text{에서 } ar^8 = 96 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \div \textcircled{2} \text{을 하면 } r^4 = 4 \quad \therefore r = \sqrt{2} \quad (\because r > 0)$$

$$r = \sqrt{2} \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } 4a = 24 \quad \therefore a = 6$$

$$\therefore a_n = 6 \times (\sqrt{2})^{n-1}$$

즉 $a_n^2 = \{6 \times (\sqrt{2})^{n-1}\}^2 = 36 \times 2^{n-1}$ 이므로 수열 $\{a_n^2\}$ 은 첫째항이 36, 공비가 2인 등비수열이다.

이때 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2 = 1116$ 이므로

$$\frac{36(2^n - 1)}{2 - 1} = 1116, 2^n - 1 = 31$$

$$2^n = 32 = 2^5 \quad \therefore n = 5$$

28 ㉡ 1023

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_2 + a_4 = 10 \text{에서 } ar + ar^3 = 10$$

$$\therefore ar(1 + r^2) = 10 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_5 + a_7 = 80 \text{에서 } ar^4 + ar^6 = 80$$

$$\therefore ar^4(1 + r^2) = 80 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \div \textcircled{2} \text{을 하면 } r^3 = 8 \quad \therefore r = 2$$

$$r = 2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } 10a = 10 \quad \therefore a = 1$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 10항까지의 합은

$$\frac{2^{10} - 1}{2 - 1} = 1023$$

28-1 ㉡ ②

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a > 0$), 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_1 a_3 = 36 \text{에서 } a \times ar^2 = 36 \quad \therefore a^2 r^2 = 36 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_2 a_4 = 324 \text{에서 } ar \times ar^3 = 324 \quad \therefore a^2 r^4 = 324 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \div \textcircled{2} \text{을 하면 } r^2 = 9 \quad \therefore r = 3 \quad (\because r > 0)$$

$$r = 3 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } 9a^2 = 36$$

$$a^2 = 4 \quad \therefore a = 2 \quad (\because a > 0)$$

$$\therefore a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_8 = \frac{2(3^8 - 1)}{3 - 1} = 3^8 - 1$$

29 ㉡ ③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_3 = 4 \text{에서 } 1 \times r^2 = 4 \quad \therefore r = 2 \quad (\because r > 0)$$

$$\therefore S_n = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$$

$$2^n - 1 > 3000 \text{에서 } 2^n > 3001$$

이때 $2^{11} = 2048, 2^{12} = 4096$ 이므로 $n \geq 12$

따라서 S_n 이 처음으로 3000보다 커지도록 하는 자연수 n 의 값은 12이다.

29-1 ㉡ 4

주어진 등비수열의 첫째항이 36, 공비가 $\frac{1}{3}$ 이므로

$$S_n = \frac{36 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right\}}{1 - \frac{1}{3}} = 54 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right\}$$

$$54 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right\} > 53 \text{에서 } 1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n > \frac{53}{54}$$

$$\left(\frac{1}{3} \right)^n < \frac{1}{54} \quad \therefore 3^n > 54$$

$$\text{이때 } 3^3 = 27, 3^4 = 81 \text{이므로 } n \geq 4$$

따라서 S_n 이 처음으로 53보다 커지도록 하는 자연수 n 의 값은 4이다.

30 ㉡ 3

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

첫째항부터 제 5항까지의 합이 27이므로

$$\frac{a(r^5 - 1)}{r - 1} = 27$$

첫째항부터 제 5항까지의 곱이 243이므로

$$a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 = a \times ar \times ar^2 \times ar^3 \times ar^4 = a^5 r^{10} = (ar^2)^5 = 243$$

$$(ar^2)^5 = 3^5 \quad \therefore ar^2 = 3$$

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{ar^{n-1}} = \frac{1}{a} \times \left(\frac{1}{r} \right)^{n-1} \text{에서 수열 } \left\{ \frac{1}{a_n} \right\} \text{은 첫째항이 } \frac{1}{a},$$

공비가 $\frac{1}{r}$ 인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4} + \frac{1}{a_5} &= \frac{\frac{1}{a} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{r} \right)^5 \right\}}{1 - \frac{1}{r}} \\ &= \frac{\frac{1}{a} \times \frac{r^5 - 1}{r^5}}{\frac{r - 1}{r}} \\ &= \frac{1}{a} \times \frac{1}{r^4} \times \frac{r^5 - 1}{r - 1} \\ &= \frac{1}{(ar^2)^2} \times \frac{a(r^5 - 1)}{r - 1} \\ &= \frac{1}{3^2} \times 27 = 3 \end{aligned}$$

30-1 ㉡ 6

공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면

첫째항부터 제 6항까지의 합이 $\frac{63}{2}$ 이므로

$$\frac{a \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^6 \right\}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{63}{2}, 2a \left(1 - \frac{1}{64} \right) = \frac{63}{2}$$

$$\frac{63}{64} a = \frac{63}{4} \quad \therefore a = 16$$

$$\text{즉 } a_n = 16 \times \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \text{이므로 } \frac{1}{a_n} = \frac{1}{16} \times 2^{n-1}$$

따라서 수열 $\left\{ \frac{1}{a_n} \right\}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{16}$, 공비가 2인 등비수열이므로

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_k} = \frac{\frac{1}{16} (2^k - 1)}{2 - 1} = \frac{1}{16} (2^k - 1)$$

$$\begin{aligned} &\approx \frac{1}{16}(2^k - 1) = \frac{63}{16} \text{이므로 } 2^k - 1 = 63 \\ &2^k = 64 = 2^6 \quad \therefore k = 6 \end{aligned}$$

31 ㉡ 12

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_3 = \frac{1}{6} \text{에서 } ar^2 = \frac{1}{6} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_7 = \frac{1}{54} \text{에서 } ar^6 = \frac{1}{54} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{을 하면 } r^4 = \frac{1}{9} \quad \therefore r = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (\because r > 0)$$

$$r = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면}$$

$$\frac{a}{3} = \frac{1}{6} \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{n-1} \text{이므로}$$

$$a_n^2 = \left\{ \frac{1}{2} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{n-1} \right\}^2 = \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$\therefore \frac{1}{a_n^2} = 4 \times 3^{n-1}$$

수열 $\left\{ \frac{1}{a_n^2} \right\}$ 은 첫째항이 4, 공비가 3인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \frac{1}{a_3^2} + \dots + \frac{1}{a_{10}^2} &= \frac{4(3^{10} - 1)}{3 - 1} \\ &= 2(3^{10} - 1) \end{aligned}$$

따라서 $p = 2, q = 10$ 이므로

$$p + q = 2 + 10 = 12$$

31-1 ㉡ 10

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a > 0$), 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10} = 81 \text{에서}$$

$$\frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} = 81 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_{10}}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{a}$, 공비가 $\frac{1}{r}$ 인 등비수열의 첫째항부터 제10항까지의 합이므로

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{a} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{r}\right)^{10} \right\}}{1 - \frac{1}{r}} &= \frac{\frac{1}{a} \times \frac{r^{10} - 1}{r^{10}}}{\frac{r - 1}{r}} \\ &= \frac{1}{a} \times \frac{1}{r^9} \times \frac{r^{10} - 1}{r - 1} \\ &= \frac{1}{a^2 r^9} \times \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} \\ &= \frac{81}{a^2 r^9} \quad (\because \textcircled{1}) \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{81}{a^2 r^9} = 9 \text{이므로 } a^2 r^9 = 9$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \log_3 a_3 + \dots + \log_3 a_{10} &= \log_3 (a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_{10}) \\ &= \log_3 (a \times ar \times ar^2 \times \dots \times ar^9) \\ &= \log_3 (a^{10} r^{1+2+3+\dots+9}) \\ &= \log_3 (a^{10} r^{45}) \\ &= \log_3 (a^2 r^9)^5 \\ &= \log_3 9^5 \\ &= \log_3 3^{10} \\ &= 10 \end{aligned}$$

32 ㉡ 120

첫째항이 3, 제12항이 40인 등비수열의 공비를 r 라 하면

$$3r^{11} = 40 \quad \therefore r^{11} = \frac{40}{3} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$3 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10} + 40 = \frac{3(r^{12} - 1)}{r - 1} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

수열 $\frac{1}{3}, \frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, \dots, \frac{1}{a_{10}}, \frac{1}{40}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{3}$, 공비가 $\frac{1}{r}$ 인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_{10}} + \frac{1}{40} &= \frac{\frac{1}{3} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{r}\right)^{12} \right\}}{1 - \frac{1}{r}} \\ &= \frac{\frac{1}{3} \times \frac{r^{12} - 1}{r^{12}}}{\frac{r - 1}{r}} \\ &= \frac{r^{12} - 1}{3r^{11}(r - 1)} \quad \dots\dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{3(r^{12} - 1)}{r - 1} = k \times \frac{r^{12} - 1}{3r^{11}(r - 1)} \text{이므로}$$

$$k = 9r^{11} = 9 \times \frac{40}{3} = 120 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

채점 기준	비율
① 주어진 등비수열의 공비를 r 라 하고 r^{11} 의 값을 구할 수 있다.	20%
② 주어진 식의 좌변을 r 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30%
③ 주어진 식의 우변을 r 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30%
④ k 의 값을 구할 수 있다.	20%

32-1 ㉡ 60

첫째항이 2, 제22항이 30인 등비수열의 공비를 r 라 하면

$$2r^{21} = 30 \quad \therefore r^{21} = 15$$

$$2 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{20} + 30 = \frac{2(r^{22} - 1)}{r - 1}$$

수열 $\frac{1}{2}, \frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, \dots, \frac{1}{a_{20}}, \frac{1}{30}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{2}$, 공비가 $\frac{1}{r}$ 인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_{20}} + \frac{1}{30} &= \frac{\frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{r}\right)^{22} \right\}}{1 - \frac{1}{r}} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{r^{22} - 1}{r^{22}}}{\frac{r - 1}{r}} \\ &= \frac{r^{22} - 1}{2r^{21}(r - 1)} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{2(r^{22} - 1)}{r - 1} = k \times \frac{r^{22} - 1}{2r^{21}(r - 1)} \text{이므로}$$

$$k = 4r^{21} = 4 \times 15 = 60$$

33 ㉡ 3

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$S_{20} = 30 \text{에서 } \frac{a(r^{20} - 1)}{r - 1} = 30$$

$$\therefore \frac{a(r^{10} - 1)(r^{10} + 1)}{r - 1} = 30 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$S_{30} = 70 \text{에서 } \frac{a(r^{30} - 1)}{r - 1} = 70$$

$$\therefore \frac{a(r^{10} - 1)(r^{20} + r^{10} + 1)}{r - 1} = 70 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{A} \div \textcircled{B} \text{을 하면 } \frac{r^{20}+r^{10}+1}{r^{10}+1} = \frac{7}{3}$$

$$\text{이때 } r^{10}=t \ (t>0) \text{라 하면 } \frac{t^2+t+1}{t+1} = \frac{7}{3}$$

$$3(t^2+t+1)=7(t+1), 3t^2+3t+3=7t+7$$

$$3t^2-4t-4=0, (3t+2)(t-2)=0$$

$$\therefore t=2 \ (\because t>0)$$

$$\text{즉 } r^{10}=2 \text{이므로 } S_{20}=kS_{10} \text{에서}$$

$$\frac{a(r^{10}-1)(r^{10}+1)}{r-1} = k \times \frac{a(r^{10}-1)}{r-1}$$

$$\therefore k=r^{10}+1=2+1=3$$

33-1 ㉔ ④

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$S_4=15 \text{에서 } \frac{a(r^4-1)}{r-1} = 15 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$S_8=60 \text{에서 } \frac{a(r^8-1)}{r-1} = 60$$

$$\therefore \frac{a(r^4-1)(r^4+1)}{r-1} = 60 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{B} \div \textcircled{A} \text{을 하면 } r^4+1=4 \quad \therefore r^4=3$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{12} &= \frac{a(r^{12}-1)}{r-1} = \frac{a(r^4-1)(r^8+r^4+1)}{r-1} \\ &= 15(3^2+3+1) \\ &= 195 \end{aligned}$$

34 ㉔ 48

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n=50 \text{에서 } \frac{a(r^n-1)}{r-1} = 50 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$S_{2n}=80 \text{에서 } \frac{a(r^{2n}-1)}{r-1} = 80$$

$$\therefore \frac{a(r^n-1)(r^n+1)}{r-1} = 80 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{B} \div \textcircled{A} \text{을 하면 } r^n+1 = \frac{8}{5} \quad \therefore r^n = \frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{3n} &= \frac{a(r^{3n}-1)}{r-1} = \frac{a(r^n-1)(r^{2n}+r^n+1)}{r-1} \\ &= 50 \left\{ \left(\frac{3}{5} \right)^2 + \frac{3}{5} + 1 \right\} \\ &= 98 \end{aligned}$$

따라서 제 $(n+1)$ 항부터 제 $3n$ 항까지의 합은

$$S_{3n}-S_n=98-50=48$$

34-1 ㉔ 285

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_{10}=5 \text{에서 } \frac{a(r^{10}-1)}{r-1} = 5 \quad \dots\dots \textcircled{A} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$S_{20}-S_{10}=35 \text{에서 } \frac{a(r^{20}-1)}{r-1} - 5 = 35$$

$$\frac{a(r^{20}-1)}{r-1} = 40$$

$$\therefore \frac{a(r^{10}-1)(r^{10}+1)}{r-1} = 40 \quad \dots\dots \textcircled{B} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{B} \div \textcircled{A} \text{을 하면 } r^{10}+1=8 \quad \therefore r^{10}=7$$

따라서 첫째항부터 제 30항까지의 합은

$$\begin{aligned} S_{30} &= \frac{a(r^{30}-1)}{r-1} = \frac{a(r^{10}-1)(r^{20}+r^{10}+1)}{r-1} \\ &= 5(7^2+7+1)=285 \quad \dots\dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① 첫째항부터 제10항까지의 합을 a, r 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30%
② 제11항부터 제20항까지의 합을 a, r 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30%
③ 첫째항부터 제30항까지의 합을 구할 수 있다.	40%

35 ㉔ $\frac{1}{3}$

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_1+a_2+a_3+\dots+a_{20} = \frac{a(r^{20}-1)}{r-1} = 200 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

수열 $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{19}$ 는 첫째항이 a , 공비가 r^2 인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} a_1+a_3+a_5+\dots+a_{19} &= \frac{a\{(r^2)^{10}-1\}}{r^2-1} = \frac{a(r^{20}-1)}{r^2-1} \\ &= \frac{a(r^{20}-1)}{(r-1)(r+1)} = 150 \quad \dots\dots \textcircled{B} \end{aligned}$$

$$\textcircled{A} \div \textcircled{B} \text{을 하면 } r+1 = \frac{4}{3} \quad \therefore r = \frac{1}{3}$$

참고 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

(1) $a_1=a, a_3=ar^2, a_5=ar^4, \dots$ 이므로 수열 $a_1, a_3, a_5, \dots$ 는 첫째항이 a , 공비가 r^2 인 등비수열이다.

(2) $a_2=ar, a_4=ar^3, a_6=ar^5, \dots$ 이므로 수열 $a_2, a_4, a_6, \dots$ 는 첫째항이 ar , 공비가 r^2 인 등비수열이다.

35-1 ㉔ 5

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

수열 $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2k-1}$ 은 첫째항이 1, 공비가 r^2 인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} a_1+a_3+a_5+\dots+a_{2k-1} &= \frac{(r^2)^k-1}{r^2-1} = 341 \\ \therefore \frac{r^{2k}-1}{r^2-1} &= 341 \quad \dots\dots \textcircled{A} \end{aligned}$$

수열 $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2k}$ 는 첫째항이 r , 공비가 r^2 인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} a_2+a_4+a_6+\dots+a_{2k} &= \frac{r\{(r^2)^k-1\}}{r^2-1} = 682 \\ \therefore \frac{r(r^{2k}-1)}{r^2-1} &= 682 \quad \dots\dots \textcircled{B} \end{aligned}$$

$$\textcircled{B} \div \textcircled{A} \text{을 하면 } r=2$$

$$r=2 \text{를 } \textcircled{A} \text{에 대입하면 } \frac{4^k-1}{3} = 341$$

$$4^k-1=1023, 4^k=1024=4^5$$

$$\therefore k=5$$

36 ㉔ 23

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1=S_1=3-4=-1$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 3 \times 2^{n-1} - 4 - (3 \times 2^{n-2} - 4) \\ &= 3 \times 2^{n-2} \quad \dots\dots \textcircled{A} \end{aligned}$$

이때 $a_1=-1$ 은 $\textcircled{A}$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같지 않으므로

$$a_1=-1, a_n=3 \times 2^{n-2} \ (n \geq 2)$$

따라서 $a_5=3 \times 2^3=24$ 이므로

$$a_1+a_5=-1+24=23$$

36-1 ㉮ 6

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 2^{-1} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 2^{n-2} - \frac{1}{4} - \left(2^{n-3} - \frac{1}{4} \right) \\ &= 2^{n-3} \end{aligned} \quad \dots\dots ㉮$$

이때 $a_1 = \frac{1}{4}$ 은 ㉮에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2^{n-3} = \frac{1}{4} \times 2^{n-1}$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{4}$, 공비가 2인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k &= \frac{\frac{1}{4}(2^k - 1)}{2 - 1} = \frac{63}{4} \\ 2^k - 1 &= 63, 2^k = 64 = 2^6 \quad \therefore k = 6 \end{aligned}$$

37 ㉮ - 3

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 3^2 + k = k + 9$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 3^{n+1} + k - (3^n + k) \\ &= 2 \times 3^n \end{aligned} \quad \dots\dots ㉮$$

수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등비수열을 이루려면 ㉮에 $n=1$ 을 대입한 것과 $a_1 = k + 9$ 가 같아야 하므로

$$6 = k + 9 \quad \therefore k = -3$$

37-1 ㉮ 4

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 2k - 4 \quad \dots\dots ㉮$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= k \times 2^n - 4 - (k \times 2^{n-1} - 4) \\ &= k \times 2^{n-1} \end{aligned} \quad \dots\dots ㉮ \quad \dots\dots ㉮$$

수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등비수열을 이루려면 ㉮에 $n=1$ 을 대입한 것과 $a_1 = 2k - 4$ 가 같아야 하므로

$$k = 2k - 4 \quad \therefore k = 4 \quad \dots\dots ㉮$$

채점 기준	비율
㉮ a_1 의 값을 구할 수 있다.	20%
㉮ $n \geq 2$ 일 때, a_n 을 구할 수 있다.	30%
㉮ k 의 값을 구할 수 있다.	50%

38 ㉮ 9

$$\log_5 (S_n + 5) = n + 1 \text{에서 } S_n + 5 = 5^{n+1}$$

$$\therefore S_n = 5^{n+1} - 5$$

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 5^2 - 5 = 20$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 5^{n+1} - 5 - (5^n - 5) \\ &= 4 \times 5^n \end{aligned} \quad \dots\dots ㉮$$

이때 $a_1 = 20$ 은 ㉮에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 4 \times 5^n$$

따라서 $p=4, q=5$ 이므로

$$p+q=4+5=9$$

38-1 ㉮ 100

수열 $\log a_1, \log a_2, \log a_3, \dots, \log a_n$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = n^2 + 2n$$

(i) $n=1$ 일 때

$$\log a_1 = S_1 = 1 + 2 = 3$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} \log a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 + 2n - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\} \\ &= 2n + 1 \end{aligned} \quad \dots\dots ㉮$$

이때 $\log a_1 = 3$ 은 ㉮에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$\log a_n = 2n + 1 \quad \therefore a_n = 10^{2n+1} = 1000 \times 100^{n-1}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 공비는 100이다.

39 ㉮ ③

5년 동안 매년 초에 a 만 원씩 연이율 4%의 복리로 적립한 적립금의 원리합계는

$$\begin{aligned} &a(1+0.04) + a(1+0.04)^2 + a(1+0.04)^3 \\ &\quad + a(1+0.04)^4 + a(1+0.04)^5 \\ &= \frac{a \times 1.04 \times (1.04^5 - 1)}{1.04 - 1} \\ &= \frac{a \times 1.04 \times 0.2}{0.04} \\ &= 5.2a (\text{만 원}) \\ &\text{즉 } 5.2a = 1300 \text{이므로 } a = 250 \end{aligned}$$

39-1 ㉮ ①

매년 말에 적립하는 금액을 a 만 원이라 하면 10년 동안 매년 말에 a 만 원씩 연이율 6%의 복리로 적립한 적립금의 원리합계는

$$\begin{aligned} &a + a(1+0.06) + a(1+0.06)^2 + \dots + a(1+0.06)^9 \\ &= \frac{a(1.06^{10} - 1)}{1.06 - 1} \\ &= \frac{a \times 0.8}{0.06} \\ &= \frac{40}{3}a (\text{만 원}) \\ &\text{즉 } \frac{40}{3}a = 4000 \text{이므로 } a = 300 \end{aligned}$$

따라서 매년 말에 300만 원씩 적립해야 한다.

40 ㉮ ①

24년 동안 매년 말에 50만 원씩 연이율 5%의 복리로 적립한 적립금의 원리합계는

$$\begin{aligned} &50 + 50(1+0.05) + 50(1+0.05)^2 + \dots + 50(1+0.05)^{23} \\ &= \frac{50(1.05^{24} - 1)}{1.05 - 1} \\ &= \frac{50 \times 2.2}{0.05} \\ &= 2200 (\text{만 원}) \end{aligned}$$

따라서 24년 후 연말의 적립금의 원리합계는 2200만 원이다.

40-1 ㉮ ⑤

15년 동안 매년 초에 100만 원씩 연이율 4%의 복리로 적립한 적립금의 원리합계는

$$100(1+0.04) + 100(1+0.04)^2 + 100(1+0.04)^3 + \cdots + 100(1+0.04)^{15}$$

$$= \frac{100 \times 1.04 \times (1.04^{15} - 1)}{1.04 - 1}$$

$$= \frac{100 \times 1.04 \times 0.8}{0.04}$$

$$= 2080(\text{만 원})$$

따라서 15년 후 연말의 적립금의 원리합계는 2080만 원이다.

유형 완성하기

p.249

41 ㉮ ⑤

1회 시행에서 색칠한 부분의 넓이는 원래 도형의 넓이의 $\frac{1}{3}$ 이므로

$$\frac{S}{3}$$

2회 시행에서 색칠한 부분의 넓이는

$$\frac{2}{3}S \times \frac{1}{3} = \frac{S}{3} \times \frac{2}{3}$$

3회 시행에서 색칠한 부분의 넓이는

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times S \times \frac{1}{3} = \frac{S}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

⋮

이와 같은 방법으로 시행을 반복하면 이 수열은 첫째항이 $\frac{S}{3}$, 공비가

가 $\frac{2}{3}$ 인 등비수열을 이룬다.

따라서 10회 시행 후 색칠된 부분의 넓이의 합은

$$\frac{\frac{S}{3} \left\{ 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{10} \right\}}{1 - \frac{2}{3}} = S \left\{ 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{10} \right\}$$

42 ㉮ $\frac{1}{16}$ 배

1일에 가입한 신규 회원 수를 a 만 명, 매일 감소하는 신규 회원 수의 비율을 r 라 하자.

1일부터 20일까지의 신규 회원 수가 10만 명이므로

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{19} = 10 \text{에서 } \frac{a(1-r^{20})}{1-r} = 10$$

$$\therefore \frac{a(1-r^{10})(1+r^{10})}{1-r} = 10 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

11일부터 20일까지의 신규 회원 수가 2만 명이므로

$$ar^{10} + ar^{11} + ar^{12} + \cdots + ar^{19} = 2 \text{에서}$$

$$\frac{ar^{10}(1-r^{10})}{1-r} = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \div \textcircled{2} \text{을 하면 } \frac{1+r^{10}}{r^{10}} = 5$$

$$1+r^{10}=5r^{10}, 4r^{10}=1 \quad \therefore r^{10}=\frac{1}{4}$$

즉 21일에 가입한 신규 회원 수는

$$ar^{20} = a \times (r^{10})^2 = a \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}a$$

따라서 21일에 가입한 신규 회원 수는 1일에 가입한 신규 회원 수의 $\frac{1}{16}$ 배이다.

43 ㉮ $128 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \right\} \text{cm}^2$

‘넓이 조정’에서 50%를 1번 적용한 사진의 넓이는 처음 사진의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$128 \times \frac{1}{2} = 64 (\text{cm}^2)$$

2번 적용한 사진의 넓이는

$$128 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 64 \times \frac{1}{2} (\text{cm}^2)$$

3번 적용한 사진의 넓이는

$$128 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 64 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 (\text{cm}^2)$$

⋮

이와 같은 과정을 반복하면 사진의 넓이는 첫째항이 64, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열을 이룬다.

따라서 ‘넓이 조정’에서 50%를 적용하는 과정을 10번 반복하여 얻은 사진의 넓이의 합은

$$\frac{64 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \right\}}{1 - \frac{1}{2}} = 128 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \right\} (\text{cm}^2)$$

44 ㉮ ④

두 정삼각형 ABC, $A_1B_1C_1$ 의 한 변의 길이의 비는 2 : 1이므로 넓이의 비는 4 : 1

한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$$

1회 시행에서 만든 정삼각형 $A_1B_1C_1$ 의 넓이는 정삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{1}{4}$ 이므로

$$S_1 = \sqrt{3} \times \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

2회 시행에서 만든 정삼각형 $A_2B_2C_2$ 의 넓이는

$$S_2 = \frac{1}{4}S_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{1}{4}$$

3회 시행에서 만든 정삼각형 $A_3B_3C_3$ 의 넓이는

$$S_3 = \frac{1}{4}S_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{1}{4}\right)^2$$

⋮

이와 같은 방법으로 시행을 반복하면 수열 $\{S_n\}$ 은 첫째항이 $\frac{\sqrt{3}}{4}$,

공비가 $\frac{1}{4}$ 인 등비수열을 이룬다.

$$\begin{aligned} \therefore S_1 + S_2 + S_3 + \cdots + S_{20} &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{4} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{20} \right\}}{1 - \frac{1}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{20} \right\} \end{aligned}$$

01 ㉓ ③

$$a_n = 4 \times 2^{n-1} = 2^{n+1}$$

$$a_p = a \text{에서 } 2^{p+1} = a \quad \therefore 2^p = \frac{a}{2}$$

$$a_q = b \text{에서 } 2^{q+1} = b \quad \therefore 2^q = \frac{b}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore a_{p+q} &= 2^{p+q+1} = 2 \times 2^p \times 2^q \\ &= 2 \times \frac{a}{2} \times \frac{b}{2} = \frac{ab}{2} \end{aligned}$$

02 ㉓ 12

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$\therefore 2a_n - a_{n+1} = 2ar^{n-1} - ar^n = a(2-r) \times r^{n-1}$$

즉 수열 $\{2a_n - a_{n+1}\}$ 은 첫째항이 $a(2-r)$, 공비가 r 인 등비수열
이므로

$$a(2-r) = 12, r = -2$$

$r = -2$ 를 $a(2-r) = 12$ 에 대입하면

$$4a = 12 \quad \therefore a = 3$$

따라서 $a_n = 3 \times (-2)^{n-1}$ 이므로

$$a_3 = 3 \times (-2)^2 = 12$$

03 ㉓ ③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_2 + a_4 = 36 \text{에서 } ar + ar^3 = 36$$

$$\therefore ar(1+r^2) = 36 \quad \dots\dots ㉑$$

$$a_4 + a_6 = 108 \text{에서 } ar^3 + ar^5 = 108$$

$$\therefore ar^3(1+r^2) = 108 \quad \dots\dots ㉒$$

$$㉑ \div ㉒ \text{을 하면 } r^2 = 3 \quad \therefore r = \sqrt{3} (\because r > 0)$$

$$r = \sqrt{3} \text{을 } ㉑ \text{에 대입하면 } 4\sqrt{3}a = 36 \quad \therefore a = 3\sqrt{3}$$

따라서 $a_n = 3\sqrt{3} \times (\sqrt{3})^{n-1} = (\sqrt{3})^{n+2}$ 이므로

$$a_{10} = (\sqrt{3})^{12} = 3^6$$

04 ㉓ 155

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 9 \text{에서 } a + ar + ar^2 + ar^3 = 9$$

$$\therefore a(1+r+r^2+r^3) = 9 \quad \dots\dots ㉑$$

$$a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 45 \text{에서 } ar^4 + ar^5 + ar^6 + ar^7 = 45$$

$$\therefore ar^4(1+r+r^2+r^3) = 45 \quad \dots\dots ㉒$$

$$㉑ \div ㉒ \text{을 하면 } r^4 = 5$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{a_{99}}{a_{87}} + \frac{a_{100}}{a_{92}} + \frac{a_{101}}{a_{97}} &= \frac{ar^{98}}{ar^{86}} + \frac{ar^{99}}{ar^{91}} + \frac{ar^{100}}{ar^{96}} \\ &= r^{12} + r^8 + r^4 \\ &= (r^4)^3 + (r^4)^2 + r^4 \\ &= 5^3 + 5^2 + 5 \\ &= 155 \end{aligned}$$

05 ㉓ 6

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_4 = 10\sqrt{5} \text{에서 } ar^3 = 10\sqrt{5} \quad \dots\dots ㉑$$

$$a_7 = 250 \text{에서 } ar^6 = 250 \quad \dots\dots ㉒$$

$$㉑ \div ㉒ \text{을 하면 } r^3 = 5\sqrt{5} \quad \therefore r = \sqrt{5}$$

$$r = \sqrt{5} \text{를 } ㉑ \text{에 대입하면 } 5\sqrt{5}a = 10\sqrt{5} \quad \therefore a = 2$$

$$\text{즉 } a_n = 2 \times (\sqrt{5})^{n-1} \text{이므로 } a_n^2 = 4 \times 5^{n-1}$$

$$4 \times 5^{n-1} > 4000 \text{에서 } 5^{n-1} > 1000$$

$$\text{이때 } 5^4 = 625, 5^5 = 3125 \text{이므로}$$

$$n-1 \geq 5 \quad \therefore n \geq 6$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 6이다.

06 ㉓ 9

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 1, 공비가 $\frac{1}{3}$ 이므로

$$a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$\text{이때 } |a_{n+1} - a_n| < \frac{1}{5000} \text{에서 } \left|\left(\frac{1}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right| < \frac{1}{5000}$$

$$2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n < \frac{1}{5000}, \left(\frac{1}{3}\right)^n < \frac{1}{10000}$$

$$\therefore 3^n > 10000$$

$$\text{이때 } 3^8 = 6561, 3^9 = 19683 \text{이므로 } n \geq 9$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 9이다.

07 ㉓ ②

첫째항이 1, 제6항이 100인 등비수열의 공비를 r 라 하면

$$r^5 = 100 \quad \therefore r = 10^{\frac{2}{5}}$$

이때 a_3 은 주어진 수열의 제4항이므로

$$a_3 = (10^{\frac{2}{5}})^3 = 10^{\frac{6}{5}}$$

$$\therefore 10 \log a_3 = 10 \log 10^{\frac{6}{5}} = 10 \times \frac{6}{5} = 12$$

08 ㉓ 104

첫째항이 4, 제12항이 26인 등비수열의 공비를 r 라 하면

$$4r^{11} = 26 \quad \therefore r^{11} = \frac{13}{2}$$

이때 a_1, a_{10} 은 각각 주어진 수열의 제2항, 제11항이므로

$$a_1 = 4r, a_{10} = 4r^{10}$$

$$\therefore a_1 a_{10} = 4r \times 4r^{10} = 16r^{11}$$

$$= 16 \times \frac{13}{2} = 104$$

09 ㉓ 24

세 수 $a^n, 2^{18} \times 3^6, b^n$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$(2^{18} \times 3^6)^2 = a^n \times b^n \quad \therefore (ab)^n = 2^{36} \times 3^{12}$$

이때 ab 의 값이 최소가 되려면 자연수 n 의 값은 36과 12의 최대공약수인 12이어야 한다.

$$\text{이때 } (ab)^{12} = 2^{36} \times 3^{12} = (2^3 \times 3)^{12} = 24^{12} \text{이므로 } ab \text{의 최솟값은 } 24 \text{이다.}$$

10 ㉓ $\frac{8}{3}$

세 수 $\cos \theta, \frac{\sqrt{6}}{4}, \sin \theta$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$\left(\frac{\sqrt{6}}{4}\right)^2 = \cos \theta \times \sin \theta$$

$$\therefore \sin \theta \cos \theta = \frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned}\therefore \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{1}{\frac{3}{8}} = \frac{8}{3}\end{aligned}$$

11 ㉠ 8

주어진 곡선과 직선이 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식 $x^3 - 3x^2 - 2x = 4x - k$, 즉 $x^3 - 3x^2 - 6x + k = 0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

서로 다른 세 실근을 a, ar, ar^2 이라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a + ar + ar^2 = 3 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a \times ar + ar \times ar^2 + ar^2 \times a = -6 \text{이므로}$$

$$ar(a + ar + ar^2) = -6 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$a \times ar \times ar^2 = -k \text{이므로 } (ar)^3 = -k \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

$$\textcircled{8} \div \textcircled{7} \text{을 하면 } ar = -2$$

$$ar = -2 \text{를 } \textcircled{9} \text{에 대입하면}$$

$$(-2)^3 = -k \quad \therefore k = 8$$

Lecture 삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하면

$$\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}, \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$$

12 ㉠ 5

등비수열을 이루는 네 수를 a, ar, ar^2, ar^3 (a, r 는 자연수, $r > 1$)이라 하면 $ar^3 \leq 100$

$$(i) r=2 \text{일 때, } 8a \leq 100 \text{에서 } a \leq \frac{100}{8} = 12.5$$

즉 자연수 a 의 값은 1, 2, 3, ..., 12이므로 그 개수는 12이다.

$$(ii) r=3 \text{일 때, } 27a \leq 100 \text{에서 } a \leq \frac{100}{27} = 3.7\dots$$

즉 자연수 a 의 값은 1, 2, 3이므로 그 개수는 3이다.

$$(iii) r=4 \text{일 때, } 64a \leq 100 \text{에서 } a \leq \frac{100}{64} = 1.5625$$

즉 자연수 a 의 값은 1이므로 그 개수는 1이다.

(iv) $r \geq 5$ 일 때, $ar^3 \leq 100$ 을 만족시키는 자연수 a 는 존재하지 않는다.

(i)~(iv)에서 구하는 경우의 수는

$$12 + 3 + 1 = 16$$

13 ㉠ 6

두 정삼각형 A_0 과 A_1 의 한 변의 길이의 비는 2 : 1이므로 넓이의 비는 4 : 1

한 변의 길이가 $4\sqrt{3}$ 인 정삼각형 A_0 의 넓이는

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times (4\sqrt{3})^2 = 12\sqrt{3}$$

1회 시행에서 그린 정삼각형 A_1 의 넓이는 정삼각형 A_0 의 넓이의 $\frac{1}{4}$ 이므로

$$12\sqrt{3} \times \frac{1}{4} = 3\sqrt{3}$$

2회 시행에서 그린 정삼각형 A_2 의 넓이는 정삼각형 A_1 의 넓이의 $\frac{1}{4}$

이므로

$$3\sqrt{3} \times \frac{1}{4}$$

3회 시행에서 그린 정삼각형 A_3 의 넓이는 정삼각형 A_2 의 넓이의 $\frac{1}{4}$

이므로

$$3\sqrt{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = 3\sqrt{3} \times \left(\frac{1}{4}\right)^2$$

⋮

즉 n 회 시행에서 그린 정삼각형 A_n 의 넓이는

$$3\sqrt{3} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$

$$3\sqrt{3} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} < \frac{\sqrt{3}}{100} \text{에서 } \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} < \frac{1}{300}$$

$$\therefore 4^{n-1} > 300$$

$$\text{이때 } 4^4 = 256, 4^5 = 1024 \text{이므로}$$

$$n-1 \geq 5 \quad \therefore n \geq 6$$

따라서 넓이가 처음으로 $\frac{\sqrt{3}}{100}$ 보다 작게 되도록 하는 n 의 값은 6

이다.

14 ㉠ 3

두께가 0.3 mm인 종이를 한 번 접었을 때 종이의 두께는

$$0.3 \times 2 = 0.6 \text{ (mm)}$$

두 번 접었을 때 종이의 두께는

$$0.6 \times 2 \text{ (mm)}$$

세 번 접었을 때 종이의 두께는

$$0.6 \times 2 \times 2 = 0.6 \times 2^2 \text{ (mm)}$$

⋮

즉 n 번 접었을 때 종이의 두께는

$$0.6 \times 2^{n-1} \text{ (mm)}$$

$$0.6 \times 2^{n-1} > 1620 \text{에서 } 2^{n-1} > 2700$$

$$\text{이때 } 2^{11} = 2048, 2^{12} = 4096 \text{이므로}$$

$$n-1 \geq 12 \quad \therefore n \geq 13$$

따라서 종이를 접은 횟수의 최솟값은 13이다.

15 ㉠ 4

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_3 = 6 \text{에서 } ar^2 = 6 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_7 = 24 \text{에서 } ar^6 = 24 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{8} \div \textcircled{7} \text{을 하면 } r^4 = 4 \quad \therefore r^2 = 2 (\because r \text{는 실수})$$

$$r^2 = 2 \text{를 } \textcircled{7} \text{에 대입하면 } 2a = 6 \quad \therefore a = 3$$

$$\therefore a_n^2 = (ar^{n-1})^2 = a^2 \times (r^2)^{n-1} = 9 \times 2^{n-1}$$

따라서 수열 $\{a_n^2\}$ 은 첫째항이 9, 공비가 2인 등비수열이므로

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_{10}^2 = \frac{9(2^{10}-1)}{2-1} = 9(2^{10}-1)$$

16 ㉠ -5

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 a , 공비가 r 이므로

$$S_3 = -9 \text{에서 } \frac{a(r^3-1)}{r-1} = -9 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$S_6 = 63 \text{에서 } \frac{a(r^6-1)}{r-1} = 63$$

$$\therefore \frac{a(r^3-1)(r^3+1)}{r-1} = 63 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \div \textcircled{3} \text{을 하면 } r^3 + 1 &= -7 \\ r^3 &= -8 \quad \therefore r = -2 \\ r = -2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면} \\ 3a &= -9 \quad \therefore a = -3 \\ \therefore a + r &= -3 + (-2) = -5 \end{aligned}$$

17 ㉡ ①

$$\log_3 (S_n + a) = n \text{에서 } S_n + a = 3^n$$

$$\therefore S_n = 3^n - a$$

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 3 - a$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 3^n - a - (3^{n-1} - a) \\ &= 2 \times 3^{n-1} \end{aligned}$$

.....①

수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등비수열을 이루려면 ①에 $n=1$ 을 대입한 것과 $a_1 = 3 - a$ 가 같아야 하므로

$$3 - a = 2 \quad \therefore a = 1$$

18 ㉡ ②

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 2p - q + 5$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 2p^n - q + 5 - (2p^{n-1} - q + 5) \\ &= (2p - 2)p^{n-1} \end{aligned}$$

.....①

이때 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비가 3이므로 ①에서 $p=3$

수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등비수열을 이루려면 ①에 $n=1$ 을 대입한 것과 $a_1 = 2p - q + 5$ 가 같아야 하므로

$$2p - q + 5 = 2p - 2 \quad \therefore q = 7$$

$$\therefore p + q = 3 + 7 = 10$$

19 ㉡ ②

10년 동안 매년 초에 200만 원씩 연이율 2%의 복리로 적립한 적립금의 원리합계는

$$200(1+0.02) + 200(1+0.02)^2 + 200(1+0.02)^3 + \cdots + 200(1+0.02)^{10}$$

$$= \frac{200 \times 1.02 \times (1.02^{10} - 1)}{1.02 - 1}$$

$$= \frac{200 \times 1.02 \times 0.22}{0.02}$$

$$= 2244 \text{(만 원)}$$

따라서 10년 후 연말의 적립금의 원리합계는 2244만 원이다.

20 ㉡ 100만 원

매년 말에 적립하는 금액을 a 만 원이라 하면 25년 동안 매년 말에 a 만 원씩 연이율 1%의 복리로 적립한 적립금의 원리합계는

$$a + a(1+0.01) + a(1+0.01)^2 + \cdots + a(1+0.01)^{24}$$

$$= \frac{a(1.01^{25} - 1)}{1.01 - 1}$$

$$= \frac{a \times 0.28}{0.01}$$

$$= 28a \text{(만 원)}$$

$$\text{즉 } 28a = 2800 \text{이므로 } a = 100$$

따라서 매년 말에 100만 원씩 적립해야 한다.

21 ㉡ 1

첫 번째 시행에서 그린 원의 반지름의 길이는 1이므로 원의 넓이는 $\pi \times 1^2 = \pi$

첫 번째 시행에서 그린 원의 지름의 길이와 그 원에 내접하는 정사각형의 대각선의 길이는 같으므로 내접하는 정사각형의 한 변의 길

$$\text{이는 } 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

두 번째 시행에서 그린 원의 반지름의 길이는 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이므로 원의 넓

$$\text{이는 } \pi \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{2}$$

⋮

이와 같은 시행을 반복하면 원의 넓이는 첫째항이 π , 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열을 이룬다.

따라서 10회 시행 후 얻은 모든 원의 넓이의 합은

$$\frac{\pi \left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}\right\}}{1 - \frac{1}{2}} = 2\pi \left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}\right\}$$

따라서 $a=2$, $b=\frac{1}{2}$ 이므로

$$ab = 2 \times \frac{1}{2} = 1$$

서술형 1 ㉡ 224

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a + \beta = k, a\beta = 48$$

이때 $k > 0$ 이므로 $a + \beta > 0$

$$\text{즉 } a + \beta > 0, a\beta > 0 \text{이므로 } a > 0, \beta > 0$$

$$\therefore 0 < a < \beta$$

(i) $a, \beta - a, \beta$ 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때

$$2(\beta - a) = a + \beta \quad \therefore \beta = 3a \quad \text{..... ①}$$

$$\textcircled{1} \text{을 } a\beta = 48 \text{에 대입하면 } 3a^2 = 48, a^2 = 16$$

$$a \text{가 양수이므로 } a = 4, \beta = 3a = 12$$

$$\therefore a = a + \beta = 4 + 12 = 16$$

..... ①

(ii) $a, \beta - a, \beta$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때

$$(\beta - a)^2 = a\beta = 48$$

$$\therefore b^2 = (a + \beta)^2 = (\beta - a)^2 + 4a\beta$$

$$= 48 + 4 \times 48 = 240$$

..... ②

(i), (ii)에서

$$b^2 - a = 240 - 16 = 224$$

..... ③

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40%
② b^2 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $b^2 - a$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

서술형 2 ㉡ 1024

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 2, 공비가 r 이므로 수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 은 첫째

항이 $\frac{1}{2}$, 공비가 $\frac{1}{r}$ 인 등비수열이다.

$$S_{10} = 256 \text{에서 } \frac{2(r^{10} - 1)}{r - 1} = 256$$

$$\therefore \frac{r^{10}-1}{r-1}=128 \quad \dots\dots ㉑$$

$$T_{10}=4\text{에서 } \frac{\frac{1}{2}\left\{1-\left(\frac{1}{r}\right)^{10}\right\}}{1-\frac{1}{r}}=4$$

$$\therefore \frac{r^{10}-1}{r^9(r-1)}=8 \quad \dots\dots ㉒ \quad \dots\dots ①$$

$$㉑ \div ㉒ \text{을 하면 } r^9=16 \quad \dots\dots ②$$

$$S_{19}=\frac{2(r^{19}-1)}{r-1}, T_{19}=\frac{\frac{1}{2}\left\{1-\left(\frac{1}{r}\right)^{19}\right\}}{1-\frac{1}{r}}=\frac{r^{19}-1}{2r^{18}(r-1)} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \frac{S_{19}}{T_{19}} &= S_{19} \div T_{19} = \frac{2(r^{19}-1)}{r-1} \div \frac{r^{19}-1}{2r^{18}(r-1)} \\ &= \frac{2(r^{19}-1)}{r-1} \times \frac{2r^{18}(r-1)}{r^{19}-1} = 4r^{18} \\ &= 4 \times (r^9)^2 = 4 \times 16^2 = 1024 \quad \dots\dots ③ \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① S_{10}, T_{10} 을 r 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
② r^9 의 값을 구할 수 있다.	20%
③ $\frac{S_{19}}{T_{19}}$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

서술형 3 ㉒ 490

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$S_n=10\text{에서 } \frac{a(r^n-1)}{r-1}=10 \quad \dots\dots ㉑$$

$$S_{2n}=80\text{에서 } \frac{a(r^{2n}-1)}{r-1}=80$$

$$\therefore \frac{a(r^n-1)(r^n+1)}{r-1}=80 \quad \dots\dots ㉒$$

$$㉑ \div ㉒ \text{을 하면 } r^n+1=8 \quad \therefore r^n=7 \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{3n} &= \frac{a(r^{3n}-1)}{r-1} = \frac{a(r^n-1)(r^{2n}+r^n+1)}{r-1} \\ &= 10(7^2+7+1)=570 \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore a_{2n+1}+a_{2n+2}+a_{2n+3}+\dots+a_{3n} &= S_{3n}-S_{2n} \\ &= 570-80 \\ &= 490 \quad \dots\dots ③ \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① r^n 의 값을 구할 수 있다.	40%
② S_{3n} 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $a_{2n+1}+a_{2n+2}+a_{2n+3}+\dots+a_{3n}$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

이때 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면

$$\begin{aligned} \frac{S_{12}}{S_6} &= \frac{\frac{a\{(\sqrt{2})^{12}-1\}}{\sqrt{2}-1}}{\frac{a\{(\sqrt{2})^6-1\}}{\sqrt{2}-1}} \\ &= \frac{2^6-1}{2^3-1} \\ &= \frac{(2^3+1)(2^3-1)}{2^3-1} \\ &= 2^3+1 \\ &= 9 \end{aligned}$$

02 ㉒ ⑤

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a < 0$), 공비를 r 라 하면

$$\begin{aligned} a_3a_5 &= 8a_8 \text{에서 } ar^2 \times ar^4 = 8ar^7 \\ a^2r^6 &= 8ar^7 \quad \therefore a=8r \quad \dots\dots ㉑ \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = a \times r^{n-1} = 8r \times r^{n-1} = 8r^n$$

이때 ㉑에서 $a < 0$ 이므로 $r < 0$

$$\begin{aligned} \therefore a_1 + |a_2| + |2a_3| &= a + |8r^2| + |16r^3| \\ &= 8r + 8r^2 - 16r^3 \quad \begin{matrix} \text{---} 8r^2 > 0 \text{이므로 } |8r^2| = 8r^2 \\ 16r^3 < 0 \text{이므로 } |16r^3| = -16r^3 \end{matrix} \end{aligned}$$

$$\text{즉 } 8r + 8r^2 - 16r^3 = 0 \text{이므로 } 2r^2 - r - 1 = 0$$

$$(2r+1)(r-1)=0$$

$$\therefore r = -\frac{1}{2} \quad (\because r < 0)$$

$$\text{따라서 } a_n = 8 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^n \text{이므로}$$

$$a_2 = 8 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 2$$

03 ㉒ 12

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$\begin{aligned} a_3+a_2 &= 1 \text{에서 } ar^2+ar=1 \\ \therefore ar(r+1) &= 1 \quad \dots\dots ㉑ \end{aligned}$$

$$a_6-a_4=18 \text{에서 } ar^5-ar^3=18$$

$$ar^3(r^2-1)=18 \quad \therefore ar^3(r+1)(r-1)=18 \quad \dots\dots ㉒$$

$$㉑ \div ㉒ \text{을 하면 } r^2(r-1)=18$$

$$r^3-r^2-18=0, (r-3)(r^2+2r+6)=0$$

이때 $r^2+2r+6=(r+1)^2+5$ 에서 모든 실수 r 에 대하여

$$(r+1)^2 \geq 0 \text{이므로 } r^2+2r+6 > 0$$

$$\therefore r=3$$

$r=3$ 을 ㉑에 대입하면

$$12a=1 \quad \therefore a=\frac{1}{12}$$

$$\text{따라서 } a_1=a=\frac{1}{12} \text{이므로 } \frac{1}{a_1}=12$$

04 ㉒ ①

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 3이므로 공비를 r ($r > 0$)라 하면

$$a_n=3r^{n-1}$$

(i) $r=1$ 일 때

$$\frac{S_6}{S_5-S_2} = \frac{3 \times 6}{3 \times 5 - 3 \times 2} = 2, \frac{a_2}{2} = \frac{a_1 r}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{즉 } \frac{S_6}{S_5-S_2} \neq \frac{a_2}{2} \text{이므로 조건을 만족시키지 않는다.}$$

01 ㉒ ②

$\log_2 \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}$ 에서 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 $\sqrt{2}$ 인 등비수열이다.

(ii) $r \neq 1$ 일 때

$$\begin{aligned}\frac{S_6}{S_5 - S_2} &= \frac{\frac{3(r^6-1)}{r-1}}{\frac{3(r^5-1)}{r-1} - \frac{3(r^2-1)}{r-1}} \\ &= \frac{r^6-1}{r^5-r^2} = \frac{(r^3+1)(r^3-1)}{r^2(r^3-1)} \\ &= \frac{r^3+1}{r^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{이때 } \frac{a_2}{2} &= \frac{a_1 r}{2} = \frac{3r}{2} \text{ 이므로 } \frac{r^3+1}{r^2} = \frac{3r}{2} \\ 2(r^3+1) &= 3r^3 \quad \therefore r^3=2 \\ \therefore a_4 &= 3r^3 = 3 \times 2 = 6\end{aligned}$$

05 ㉮ 25

세 실수 a, b, c 가 이루는 등비수열의 공비를 r 라 하면

$$b=ar, c=ar^2$$

㉮을 $\frac{b-c}{a}$ 에 대입하면

$$\frac{b-c}{a} = \frac{ar-ar^2}{a} = -r^2+r = -\left(r-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

즉 $\frac{b-c}{a}$ 는 $r=\frac{1}{2}$ 일 때 최댓값 $\frac{1}{4}$ 을 갖는다.

따라서 $k=\frac{1}{4}$ 이므로

$$100k = 100 \times \frac{1}{4} = 25$$

06 ㉮ 64

첫째항이 $\frac{1}{4}$, 제 $(n+2)$ 항이 16인 등비수열의 공비가 r ($r>0$) 이므로

$$16 = \frac{1}{4} r^{n+1} \quad \therefore r^{n+1} = 64 = 2^6 \quad \dots\dots ㉮$$

$$\frac{1}{4} \times a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_n \times 16$$

$$= \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} r \times \frac{1}{4} r^2 \times \frac{1}{4} r^3 \times \dots \times \frac{1}{4} r^n \times 16$$

$$= \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \times 16 \times r^{\frac{1+2+3+\dots+n}{2}} \quad \text{첫째항이 1, 곱항이 } n, \text{항수가 } n \text{인 등차수열의 합}$$

$$= 2^{-2n-2} \times 2^4 \times r^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$= 2^{-2n+2} \times (r^{n+1})^{\frac{n}{2}}$$

$$= 2^{-2n+2} \times (2^6)^{\frac{n}{2}}$$

$$= 2^{-2n+2} \times 2^{3n}$$

$$= 2^{n+2}$$

이때 주어진 등비수열의 모든 항의 곱이 1024이므로

$$2^{n+2} = 1024 = 2^{10}, n+2=10$$

$$\therefore n=8$$

$n=8$ 을 ㉮에 대입하면

$$r^9 = 64$$

07 ㉮ 2

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 2이므로 공비를 r ($r \neq 0, r \neq 1$) 라 하면

$$a_n = 2r^{n-1}$$

$$\text{(나)에서 } S_{12} < S_{10} \text{ 이므로 } \frac{2(r^{12}-1)}{r-1} < \frac{2(r^{10}-1)}{r-1}$$

$$\frac{2(r^{12}-1)-2(r^{10}-1)}{r-1} < 0, \frac{2(r^{12}-r^{10})}{r-1} < 0$$

$$\frac{2r^{10}(r^2-1)}{r-1} < 0, \frac{2r^{10}(r+1)(r-1)}{r-1} < 0$$

$$2r^{10}(r+1) < 0 \quad \therefore r < -1 \quad (\because r^{10} > 0)$$

$\dots\dots ㉮$

(가)에서 $S_{12} - S_2 = 4S_{10}$ 이므로

$$\frac{2(r^{12}-1)}{r-1} - \frac{2(r^2-1)}{r-1} = 4 \times \frac{2(r^{10}-1)}{r-1}$$

$$r^{12}-1-(r^2-1)=4(r^{10}-1), r^{12}-r^2=4(r^{10}-1)$$

$$r^2(r^{10}-1)=4(r^{10}-1)$$

이때 $r \neq 1$ 이므로 $r^2=4$

$$\therefore r = -2 \quad (\because ㉮)$$

따라서 $a_n = 2 \times (-2)^{n-1}$ 이므로

$$a_4 = 2 \times (-2)^3 = -16$$

참고 $r=0$ 이면 $S_{12}=S_{10}=0$ 이므로 (나)를 만족시키지 않는다.

$r=10$ 이면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n=20$ 이므로

$$S_{12}-S_2=12 \times 2 - 2 \times 2 = 20$$

$$4S_{10}=4 \times 10 \times 2 = 80$$

즉 $S_{12}-S_2 \neq 4S_{10}$ 이므로 (가)를 만족시키지 않는다.

08 ㉮ 9

$S_{n+3}-S_n=13 \times 3^{n-1}$ 에서 $S_{n+3}-S_n=a_{n+1}+a_{n+2}+a_{n+3}$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}+a_{n+2}+a_{n+3}=13 \times 3^{n-1} \quad \dots\dots ㉮$$

이때 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하자.

$$n=1 \text{ 을 } ㉮ \text{ 에 대입하면 } a_2+a_3+a_4=13 \text{ 이므로}$$

$$ar+ar^2+ar^3=13 \quad \therefore ar(1+r+r^2)=13 \quad \dots\dots ㉮$$

$$n=2 \text{ 를 } ㉮ \text{ 에 대입하면 } a_3+a_4+a_5=13 \times 3=39 \text{ 이므로}$$

$$ar^2+ar^3+ar^4=39 \quad \therefore ar^2(1+r+r^2)=39 \quad \dots\dots ㉮$$

$$㉮ \div ㉮ \text{ 을 하면 } r=3$$

$$r=3 \text{ 을 } ㉮ \text{ 에 대입하면}$$

$$39a=13 \quad \therefore a=\frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } a_n = \frac{1}{3} \times 3^{n-1} = 3^{n-2} \text{ 이므로}$$

$$a_4 = 3^2 = 9$$

09 ㉮ 477

$A(200)$ 은 첫째항이 3이고 공비가 2 이상의 자연수인 등비수열의 제 k 항이 3×2^{200} 이 되는 모든 k 의 값의 합과 같다.

$$2^{200} = (2^1)^{200} = (2^2)^{100} = (2^4)^{50} = \dots = (2^{200})^1 \text{ 이므로 공비가 될 수 있는 수는}$$

$$2^1, 2^2, 2^4, \dots, 2^{200}$$

즉 공비는 2^p (p 는 200의 양의 약수)이다.

(i) 공비가 2^1 일 때

$$\text{제 } k \text{ 항은 } 3 \times 2^{k-1} \text{ 이므로 } k-1=200 \quad \therefore k=201$$

(ii) 공비가 2^2 일 때

$$\text{제 } k \text{ 항은 } 3 \times (2^2)^{k-1} = 3 \times 2^{2(k-1)} \text{ 이므로}$$

$$2(k-1)=200, k-1=100 \quad \therefore k=101$$

(iii) 공비가 2^4 일 때

$$\text{제 } k \text{ 항은 } 3 \times (2^4)^{k-1} = 3 \times 2^{4(k-1)} \text{ 이므로}$$

$$4(k-1)=200, k-1=50 \quad \therefore k=51$$

$\vdots$

따라서 k 의 값은 201, 101, 51, $\dots$, 2, 즉 $200+1, 100+1, 50+1, \dots, 1+1$ 이므로

$$\begin{aligned}
 A(200) &= (200+1) + (100+1) + (50+1) + \cdots + (1+1) \\
 &= (200\text{의 양의 약수의 총합}) + 1 \times 12 \\
 &= (1+2+2^2+2^3)(1+5+5^2) + 12 \\
 &= 15 \times 31 + 12 \\
 &= 477
 \end{aligned}$$

Lecture 양의 약수의 총합

자연수 N 이

$$N = a^p b^q \quad (a, b \text{는 서로 다른 소수}, p, q \text{는 자연수})$$

꼭로 소인수분해 될 때, 자연수 N 의 양의 약수의 총합은 $(1+a+a^2+\cdots+a^p)(1+b+b^2+\cdots+b^q)$

10 9

(가)에서 $r \in A$

(나)에서 집합 A 의 원소들을 작은 수부터 차례로 배열한 수열은 등비수열이고 $r > 1$ 이므로 등비수열의 첫째항은 r 이다.

이 등비수열의 공비를 r^p (p 는 102 이하의 자연수), 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = r \times (r^p)^{n-1}$$

$r^{31} \in A, r^{100} \in A$ 이므로 102 이하의 두 자연수 n_1, n_2 에 대하여 두 수 r^{31}, r^{100} 을 각각 제 n_1 항, 제 n_2 항이라 하면

$$r \times (r^p)^{n_1-1} = r^{31}, r \times (r^p)^{n_2-1} = r^{100}$$

$$\therefore r^{p(n_1-1)} = r^{30}, r^{p(n_2-1)} = r^{99}$$

즉 p 는 30과 99의 공약수이므로 $p=1$ 또는 $p=3$

(다)에서 $A \neq U$ 이므로 $p=3$

$$\therefore a_n = r \times (r^3)^{n-1} = r^{3n-2}$$

즉 집합 A 의 원소는 r^{3n-2} 꼴이므로 $\begin{cases} 3n-2=100 \text{에서 } n=34 \text{이므로} \\ n(A)=34 \end{cases}$

$$A = \{r, r^4, r^7, \dots, r^{100}\} \quad \therefore n(A) = 34$$

집합 A 의 모든 원소들의 합은 첫째항이 r , 공비가 r^3 인 등비수열의 첫째항부터 제 34항까지의 합이므로

$$\frac{r\{(r^3)^{34}-1\}}{r^3-1} = \frac{r(r^{102}-1)}{r^3-1}$$

전체집합 U 의 모든 원소들의 합이 집합 A 의 모든 원소들의 합의 91배이므로

$$\frac{r(r^{102}-1)}{r-1} = 91 \times \frac{r(r^{102}-1)}{r^3-1}$$

$$\frac{r(r^{102}-1)}{r-1} = 91 \times \frac{r(r^{102}-1)}{(r-1)(r^2+r+1)}$$

$$r^2+r+1=91, r^2+r-90=0$$

$$(r+10)(r-9)=0 \quad \therefore r=9 \quad (\because r>1)$$

참고

전체집합 U 의 모든 원소들의 합은 첫째항이 r , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 102항까지의 합이므로

$$\frac{r(r^{102}-1)}{r-1}$$

11 117

모든 항이 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차가 d 이므로 첫째항을 a ($a > 0$)라 하면

$$a_n = a + (n-1)d \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

(나)에서 $a_k^2 = a_{2a_{3k-1}}$ 이므로

$$\{a + (k-1)d\}^2 = (a+d)\{a + (3k-2)d\}$$

$$a^2 + 2(k-1)ad + (k-1)^2d^2 = a^2 + (3k-1)ad + (3k-2)d^2$$

$$\therefore d^2(k^2-5k+3) = ad(k+1) \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$(가)에서 0 < a \leq d \text{이므로 } ad(k+1) \leq d^2(k+1) \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{1} \text{을 } \textcircled{2} \text{에 대입하면 } d^2(k^2-5k+3) \leq d^2(k+1)$$

$$k^2-5k+3 \leq k+1, k^2-6k+2 \leq 0$$

$$\therefore 3-\sqrt{7} \leq k \leq 3+\sqrt{7}$$

$$\text{그런데 } k \geq 3 \text{이므로 } 3 \leq k \leq 3+\sqrt{7}$$

$$\therefore k=3 \text{ 또는 } k=4 \text{ 또는 } k=5 \quad (\because k \text{는 자연수})$$

$$\text{이때 } 0 < a \leq d \text{이므로 } \textcircled{2} \text{에서 } k^2-5k+3 > 0 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

(i) $k=3$ 일 때

$$k^2-5k+3=9-15+3=-3 \text{이므로 } \textcircled{4} \text{을 만족시키지 않는다.}$$

(ii) $k=4$ 일 때

$$k^2-5k+3=16-20+3=-1 \text{이므로 } \textcircled{4} \text{을 만족시키지 않는다.}$$

(iii) $k=5$ 일 때

$$k^2-5k+3=25-25+3=3 \text{이므로 } \textcircled{4} \text{을 만족시킨다.}$$

(i)~(iii)에서 $k=5$

$k=5$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$3d^2=6ad \quad \therefore d=2a \quad (\because d>0)$$

$d=2a$ 를 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$a_n = a + (n-1) \times 2a = a(2n-1)$$

$$\therefore a_{16} = 31a$$

$$90 \leq a_{16} \leq 100 \text{에서 } 90 \leq 31a \leq 100$$

$$\frac{90}{31} \leq a \leq \frac{100}{31}, 2.9\cdots \leq a \leq 3.2\cdots$$

$$\therefore a=3 \quad (\because a \text{는 자연수})$$

$$\text{따라서 } a_n = 3(2n-1) = 6n-3 \text{이므로}$$

$$a_{20} = 6 \times 20 - 3 = 117$$

10 수열의 합

III 수열

개념 완성하기

p. 259~260

01 ㉠ 3+6+9+12

$$\sum_{k=1}^4 3k = 3 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 3 + 3 \times 4 = 3 + 6 + 9 + 12$$

02 ㉠ $3^2 + 3^4 + 3^6 + 3^8 + 3^{10}$

$$\sum_{k=1}^5 3^{2k} = 3^{2 \times 1} + 3^{2 \times 2} + 3^{2 \times 3} + 3^{2 \times 4} + 3^{2 \times 5} = 3^2 + 3^4 + 3^6 + 3^8 + 3^{10}$$

03 ㉠ $4 + 7 + 10 + \dots + (3n+1)$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (3i+1) &= (3 \times 1 + 1) + (3 \times 2 + 1) + (3 \times 3 + 1) + \dots \\ &\quad + (3n+1) \\ &= 4 + 7 + 10 + \dots + (3n+1) \end{aligned}$$

04 ㉠ $-1 + 0 + 3 + \dots + n(n-2)$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n i(i-2) &= 1 \times (1-2) + 2 \times (2-2) + 3 \times (3-2) + \dots \\ &\quad + n(n-2) \\ &= -1 + 0 + 3 + \dots + n(n-2) \end{aligned}$$

05 ㉠ $\sum_{k=1}^{100} k$

06 ㉠ $\sum_{k=1}^{10} (2k-1)^2$

07 ㉠ $\sum_{k=1}^{21} 2^{k-1}$

08 ㉠ $\sum_{k=1}^{50} k(k+1)$

09 ㉠ 10

$$\sum_{k=1}^{10} 2a_k = 2 \sum_{k=1}^{10} a_k = 2 \times 5 = 10$$

10 ㉠ 14

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} b_k = 5 + 9 = 14$$

11 ㉠ 79

$$\sum_{k=1}^{10} (b_k + 7) = \sum_{k=1}^{10} b_k + \sum_{k=1}^{10} 7 = 9 + 7 \times 10 = 79$$

12 ㉠ 1

$$\sum_{k=1}^{10} (2a_k - b_k) = 2 \sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^{10} b_k = 2 \times 5 - 9 = 1$$

13 ㉠ 17

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (a_k - 2b_k + 3) &= \sum_{k=1}^{10} a_k - 2 \sum_{k=1}^{10} b_k + \sum_{k=1}^{10} 3 \\ &= 5 - 2 \times 9 + 3 \times 10 = 17 \end{aligned}$$

14 ㉠ 48

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^6 (2k+1) &= 2 \sum_{k=1}^6 k + \sum_{k=1}^6 1 = 2 \times \frac{6 \times 7}{2} + 1 \times 6 \\ &= 42 + 6 = 48 \end{aligned}$$

15 ㉠ 112

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^7 (k^2 - k) &= \sum_{k=1}^7 k^2 - \sum_{k=1}^7 k \\ &= \frac{7 \times 8 \times 15}{6} - \frac{7 \times 8}{2} \\ &= 140 - 28 = 112 \end{aligned}$$

16 ㉠ 200

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (k^2 - 3k - 2) &= \sum_{k=1}^{10} k^2 - 3 \sum_{k=1}^{10} k - \sum_{k=1}^{10} 2 \\ &= \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - 3 \times \frac{10 \times 11}{2} - 2 \times 10 \\ &= 385 - 165 - 20 = 200 \end{aligned}$$

17 ㉠ 430

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 (k^3 + 4k^2 - 3) &= \sum_{k=1}^5 k^3 + 4 \sum_{k=1}^5 k^2 - \sum_{k=1}^5 3 \\ &= \left(\frac{5 \times 6}{2} \right)^2 + 4 \times \frac{5 \times 6 \times 11}{6} - 3 \times 5 \\ &= 225 + 220 - 15 = 430 \end{aligned}$$

18 ㉠ 454

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 (2^k - 7) &= \sum_{k=1}^8 2^k - \sum_{k=1}^8 7 \\ &= \frac{2(2^8 - 1)}{2 - 1} - 7 \times 8 \\ &= 510 - 56 = 454 \end{aligned}$$

19 ㉠ $2n^2 + n$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (4k - 1) &= 4 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 4 \times \frac{n(n+1)}{2} - n \\ &= 2n^2 + n \end{aligned}$$

20 ㉠ $2n^2(n+1)$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (6k^2 - 2k) &= 6 \sum_{k=1}^n k^2 - 2 \sum_{k=1}^n k \\ &= 6 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2 \times \frac{n(n+1)}{2} \\ &= 2n^2(n+1) \end{aligned}$$

21 ㉠ $\frac{n(n^2-7)}{3}$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (k+1)(k-2) &= \sum_{k=1}^n (k^2 - k - 2) \\ &= \sum_{k=1}^n k^2 - \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} - 2n \\ &= \frac{n(n^2-7)}{3} \end{aligned}$$

22 ㉮ $n(n+1)(n^2-n-1)$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n 2k^2(2k-3) &= \sum_{k=1}^n (4k^3 - 6k^2) \\ &= 4 \sum_{k=1}^n k^3 - 6 \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= 4 \times \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 - 6 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= n(n+1)(n^2-n-1)\end{aligned}$$

23 ㉮ 1770

주어진 수열의 제 k 항을 a_k 라 하면 $a_k = (2k+1)^2$ 이므로
 $(2k+1)^2 = 21^2$ 에서 $k=10$

$$\begin{aligned}\therefore (\text{주어진 식}) &= \sum_{k=1}^{10} (2k+1)^2 \\ &= \sum_{k=1}^{10} (4k^2 + 4k + 1) \\ &= 4 \sum_{k=1}^{10} k^2 + 4 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 4 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 4 \times \frac{10 \times 11}{2} + 1 \times 10 \\ &= 1540 + 220 + 10 = 1770\end{aligned}$$

24 ㉮ 3080

주어진 수열의 제 k 항을 a_k 라 하면 $a_k = k(k+1)$ 이므로
 $k(k+1) = 20 \times 21$ 에서 $k=20$

$$\begin{aligned}\therefore (\text{주어진 식}) &= \sum_{k=1}^{20} k(k+1) = \sum_{k=1}^{20} (k^2 + k) \\ &= \sum_{k=1}^{20} k^2 + \sum_{k=1}^{20} k \\ &= \frac{20 \times 21 \times 41}{6} + \frac{20 \times 21}{2} \\ &= 2870 + 210 = 3080\end{aligned}$$

25 ㉮ 495

주어진 수열의 제 k 항을 a_k 라 하면 $a_k = k(k+2)$ 이므로
 $k(k+2) = 10 \times 12$ 에서 $k=10$

$$\begin{aligned}\therefore (\text{주어진 식}) &= \sum_{k=1}^{10} k(k+2) \\ &= \sum_{k=1}^{10} (k^2 + 2k) \\ &= \sum_{k=1}^{10} k^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} k \\ &= \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 2 \times \frac{10 \times 11}{2} \\ &= 385 + 110 = 495\end{aligned}$$

26 ㉮ $\frac{1023}{512}$

주어진 수열의 제 k 항을 a_k 라 하면 $a_k = \frac{1}{2^{k-1}}$ 이므로

$$\frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1}{2^9} \text{에서 } k-1=9 \quad \therefore k=10$$

$$\begin{aligned}\therefore (\text{주어진 식}) &= \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{2^{k-1}} = \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} \\ &= \frac{1 \times \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{10} \right\}}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= \frac{1023}{512}\end{aligned}$$

27 ㉮ $\frac{29}{45}$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^8 \frac{1}{k(k+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^8 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right) = \frac{29}{45}\end{aligned}$$

28 ㉮ $\frac{5}{11}$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{(k+1)(k+2)} &= \sum_{k=1}^{20} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) \\ &\quad + \dots + \left(\frac{1}{21} - \frac{1}{22} \right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{22} = \frac{5}{11}\end{aligned}$$

29 ㉮ $\frac{60}{31}$

$$\begin{aligned}1+2+3+\dots+k &= \frac{k(k+1)}{2} \text{이므로} \\ \sum_{k=1}^{30} \frac{1}{1+2+3+\dots+k} &= \sum_{k=1}^{30} \frac{2}{k(k+1)} \\ &= 2 \sum_{k=1}^{30} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 2 \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \right. \\ &\quad \left. + \dots + \left(\frac{1}{30} - \frac{1}{31} \right) \right\} \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{31} \right) = \frac{60}{31}\end{aligned}$$

30 ㉮ $\frac{36}{55}$

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{10} \frac{1}{k^2-1} &= \sum_{k=2}^{10} \frac{1}{(k-1)(k+1)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{10} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} \right) + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{10} - \frac{1}{11} \right) = \frac{36}{55}\end{aligned}$$

31 ㉮ $S_n = \frac{n}{n+1}$

주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면 $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ 이므로

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{n}{n+1}\end{aligned}$$

32 $\text{㉠} S_n = \frac{n}{2n+1}$

주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \text{이므로} \\ S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= \frac{n}{2n+1} \end{aligned}$$

33 $\text{㉠} S_n = \frac{n(3n+5)}{2(n+1)(n+2)}$

주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면 $a_n = \frac{2}{n(n+2)}$ 이므로

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+2)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots \\ &\quad + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \\ &= \frac{n(3n+5)}{2(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

34 $\text{㉠} S_n = \frac{4n(4n+5)}{3(2n+1)(2n+3)}$

주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{4}{(2n-1)(2n+3)} \text{이므로} \\ S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{4}{(2k-1)(2k+3)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+3} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} \right) + \dots \\ &\quad + \left(\frac{1}{2n-3} - \frac{1}{2n+1} \right) + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+3} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \\ &= \frac{4n(4n+5)}{3(2n+1)(2n+3)} \end{aligned}$$

35 $\text{㉠} S_n = \frac{n(11n^2+48n+49)}{6(n+1)(n+2)(n+3)}$

주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면 $a_n = \frac{3}{n(n+3)}$ 이므로

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{3}{k(k+3)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+3} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) + \dots \\ &\quad + \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+2} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \\ &= \frac{n(11n^2+48n+49)}{6(n+1)(n+2)(n+3)} \end{aligned}$$

36 $\text{㉠} S_n = \frac{n}{2(3n+2)}$

주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{(3n-1)(3n+2)} \text{이므로} \\ S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{(3k-1)(3k+2)} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-1} - \frac{1}{3k+2} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{11} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3n+2} \right) \\ &= \frac{n}{2(3n+2)} \end{aligned}$$

37 $\text{㉠} 3 + \sqrt{15} - \sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{14} (\sqrt{k+2} - \sqrt{k}) &= (\sqrt{3} - \sqrt{1}) + (\sqrt{4} - \sqrt{2}) + (\sqrt{5} - \sqrt{3}) + \dots \\ &\quad + (\sqrt{15} - \sqrt{13}) + (\sqrt{16} - \sqrt{14}) \\ &= \sqrt{15} + \sqrt{16} - 1 - \sqrt{2} \\ &= 3 + \sqrt{15} - \sqrt{2} \end{aligned}$$

38 $\text{㉠} 2 + \sqrt{6} - \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{23} \frac{1}{\sqrt{k+2} + \sqrt{k}} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{23} (\sqrt{k+2} - \sqrt{k}) \\ &= \frac{1}{2} \{ (\sqrt{3} - \sqrt{1}) + (\sqrt{4} - \sqrt{2}) + (\sqrt{5} - \sqrt{3}) + \dots \\ &\quad + (\sqrt{24} - \sqrt{22}) + (\sqrt{25} - \sqrt{23}) \} \\ &= \frac{1}{2} (\sqrt{24} + \sqrt{25} - 1 - \sqrt{2}) \\ &= 2 + \sqrt{6} - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

39 $\text{㉠} 4$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{40} \frac{1}{\sqrt{2k-1} + \sqrt{2k+1}} &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{40} (\sqrt{2k-1} - \sqrt{2k+1}) \\ &= -\frac{1}{2} \{ (\sqrt{1} - \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - \sqrt{5}) + (\sqrt{5} - \sqrt{7}) + \dots \\ &\quad + (\sqrt{79} - \sqrt{81}) \} \\ &= -\frac{1}{2} (1 - \sqrt{81}) = 4 \end{aligned}$$

40 $\text{㉠} 3 + 2\sqrt{3} - \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{48} \frac{1}{\sqrt{k-1} + \sqrt{k+1}} &= -\frac{1}{2} \sum_{k=2}^{48} (\sqrt{k-1} - \sqrt{k+1}) \\ &= -\frac{1}{2} \{ (\sqrt{1} - \sqrt{3}) + (\sqrt{2} - \sqrt{4}) + (\sqrt{3} - \sqrt{5}) + \dots \\ &\quad + (\sqrt{46} - \sqrt{48}) + (\sqrt{47} - \sqrt{49}) \} \\ &= -\frac{1}{2} (1 + \sqrt{2} - \sqrt{48} - \sqrt{49}) \\ &= 3 + 2\sqrt{3} - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

01 ㉮ 600

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) \\ &= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + \cdots + (a_{2n-1} + a_{2n}) \\ &= \sum_{k=1}^{2n} a_k \\ & \text{이므로 } \sum_{k=1}^{2n} a_k = 6n^2 \\ & \therefore \sum_{k=1}^{20} a_k = 6 \times 10^2 = 600 \end{aligned}$$

01-1 ㉮ 160

$$\begin{aligned} & \sum_{k=2}^n (a_k - a_{k-1}) = (\cancel{a_2} - a_1) + (a_3 - \cancel{a_2}) + (\cancel{a_4} - \cancel{a_3}) + \cdots \\ & \qquad \qquad \qquad + (a_n - \cancel{a_{n-1}}) \\ & \qquad \qquad \qquad = a_n - a_1 \\ & \text{이므로 } a_n - 17 = n^2 - 1 \quad \therefore a_n = n^2 + 16 \\ & \therefore a_{12} = 12^2 + 16 = 160 \end{aligned}$$

02 ㉮ ④

$$\begin{aligned} ① \quad & \sum_{k=1}^n 5^k = 5 + 5^2 + 5^3 + \cdots + 5^n \\ ② \quad & \sum_{k=1}^6 (-1)^k = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 \\ ③ \quad & \sum_{k=1}^{20} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{19} + a_{20} \\ & \qquad \qquad \qquad = (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{19}) + (a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{20}) \\ & \qquad \qquad \qquad = \sum_{k=1}^{10} a_{2k-1} + \sum_{k=1}^{10} a_{2k} \\ ④ \quad & \sum_{k=1}^n 3^k = 3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^n \\ & \qquad \qquad \qquad \sum_{k=0}^n 3^k = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^n \\ & \qquad \qquad \qquad \therefore \sum_{k=1}^n 3^k \neq \sum_{k=0}^n 3^k \\ ⑤ \quad & \sum_{i=2}^{11} (i-1)^5 = 1^5 + 2^5 + 3^5 + \cdots + 10^5 = \sum_{k=1}^{10} k^5 \end{aligned}$$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

02-1 ㉮ ⑤

$$\begin{aligned} ① \quad & \sum_{k=1}^n (-2)^k = -2 + 4 - 8 + \cdots + (-2)^n \\ ② \quad & \sum_{k=1}^6 (2k+1) = 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 \\ ③ \quad & \sum_{k=1}^{20} k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 20^2 \\ & \qquad \qquad \qquad \sum_{k=0}^{20} k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 20^2 \\ & \qquad \qquad \qquad \therefore \sum_{k=1}^{20} k^2 = \sum_{k=0}^{20} k^2 \\ ④ \quad & \sum_{k=0}^{n-1} (3k+2) = 2 + 5 + 8 + \cdots + 3(n-1) + 2 \\ & \qquad \qquad \qquad = 2 + 5 + 8 + \cdots + (3n-1) \\ & \qquad \qquad \qquad \sum_{i=1}^n (3i-1) = 2 + 5 + 8 + \cdots + (3n-1) \\ & \qquad \qquad \qquad \therefore \sum_{k=0}^{n-1} (3k+2) = \sum_{i=1}^n (3i-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ⑤ \quad & \sum_{k=1}^n k^4 = 1^4 + 2^4 + 3^4 + \cdots + n^4 \\ & \qquad \qquad \qquad \sum_{i=3}^{n+1} (i-2)^4 = 1^4 + 2^4 + 3^4 + \cdots + (n-1)^4 \\ & \qquad \qquad \qquad \therefore \sum_{k=1}^n k^4 \neq \sum_{i=3}^{n+1} (i-2)^4 \end{aligned}$$

따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

03 ㉮ 25

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{10} a_{2n-1} = a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{17} + a_{19} = 35 \quad \cdots \textcircled{㉠} \\ & \sum_{n=1}^{20} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{19} - a_{20} = 10 \quad \cdots \textcircled{㉡} \\ & \textcircled{㉠} - \textcircled{㉡} \text{을 하면} \\ & a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{20} = 25 \\ & \therefore \sum_{n=1}^{10} a_{2n} = a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{20} = 25 \end{aligned}$$

03-1 ㉮ 100

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{100} (a_k + a_{k+1}) \\ &= (a_1 + a_2) + (a_2 + a_3) + (a_3 + a_4) + \cdots + (a_{100} + a_{101}) \\ &= a_1 + 2(a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{100}) + a_{101} \\ &= 300 \quad \cdots \textcircled{㉠} \\ & \sum_{k=1}^{50} (a_{2k-1} + a_{2k}) \\ &= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + \cdots + (a_{99} + a_{100}) \\ &= 200 \quad \cdots \textcircled{㉡} \\ & \textcircled{㉠} - \textcircled{㉡} \text{을 하면} \\ & a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{101} = 100 \\ & \therefore a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{100} = 100 - a_{101} \quad \cdots \textcircled{㉢} \\ & \textcircled{㉢} \text{을 } \textcircled{㉠} \text{에 대입하면} \\ & a_1 + 2(100 - a_{101}) + a_{101} = 300 \\ & a_1 - a_{101} + 200 = 300 \\ & \therefore a_1 - a_{101} = 100 \end{aligned}$$

04 ㉮ 64

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{10} (3a_k - 2)^2 = \sum_{k=1}^{10} (9a_k^2 - 12a_k + 4) \\ & \qquad \qquad \qquad = 9 \sum_{k=1}^{10} a_k^2 - 12 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 4 \\ & \qquad \qquad \qquad = 9 \times 8 - 12 \times 4 + 4 \times 10 \\ & \qquad \qquad \qquad = 64 \end{aligned}$$

04-1 ㉮ ②

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{30} (a_k + 1)^2 = \sum_{k=1}^{30} (a_k^2 + 2a_k + 1) \\ & \qquad \qquad \qquad = \sum_{k=1}^{30} a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^{30} a_k + \sum_{k=1}^{30} 1 \\ & \qquad \qquad \qquad = \sum_{k=1}^{30} a_k^2 + 2 \times (-8) + 1 \times 30 \\ & \qquad \qquad \qquad = \sum_{k=1}^{30} a_k^2 + 14 \\ & \text{즉 } \sum_{k=1}^{30} a_k^2 + 14 = 50 \text{이므로} \\ & \sum_{k=1}^{30} a_k^2 = 36 \end{aligned}$$

05 18

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} (3a_k - b_k - 3) &= 3 \sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^{10} b_k - \sum_{k=1}^{10} 3 \\ &= 3 \times 21 - 15 - 3 \times 10 \\ &= 18\end{aligned}$$

05-1 2

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} (a_k - 2b_k) &= \sum_{k=1}^{10} a_k - 2 \sum_{k=1}^{10} b_k \\ &= 10 - 2 \sum_{k=1}^{10} b_k\end{aligned}$$

$$\text{즉 } 10 - 2 \sum_{k=1}^{10} b_k = -4 \text{ 이므로 } 2 \sum_{k=1}^{10} b_k = 14$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10} b_k = 7$$

06 20

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n (a_k - 6b_k + 2) &= \sum_{k=1}^n a_k - 6 \sum_{k=1}^n b_k + \sum_{k=1}^n 2 \\ &= \sum_{i=1}^n a_i - 6 \sum_{j=1}^n b_j + \sum_{k=1}^n 2 \\ &= n^2 - 6 \times 2n + 2n \\ &= n^2 - 10n\end{aligned}$$

$$\text{즉 } n^2 - 10n = 200 \text{ 이므로 } n^2 - 10n - 200 = 0$$

$$(n+10)(n-20) = 0$$

$$\therefore n = 20 \quad (\because n \text{ 은 자연수})$$

채점 기준	비율
① $\sum_{k=1}^n (a_k - 6b_k + 2)$ 를 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	60%
② 자연수 n 의 값을 구할 수 있다.	40%

06-1 16

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n (a_k - 2b_k + 1) &= \sum_{k=1}^n a_k - 2 \sum_{k=1}^n b_k + \sum_{k=1}^n 1 \\ &= \sum_{i=1}^n a_i - 2 \sum_{j=1}^n b_j + \sum_{k=1}^n 1 \\ &= (n+1)^2 - 2 \times 2n + n \\ &= n^2 - n + 1\end{aligned}$$

$$\text{즉 } n^2 - n + 1 = 241 \text{ 이므로 } n^2 - n - 240 = 0$$

$$(n+15)(n-16) = 0$$

$$\therefore n = 16 \quad (\because n \text{ 은 자연수})$$

07 4

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{100} \frac{3^k - 2^k}{4^k} &= \sum_{k=1}^{100} \left[\left(\frac{3}{4} \right)^k - \left(\frac{1}{2} \right)^k \right] \\ &= \sum_{k=1}^{100} \left(\frac{3}{4} \right)^k - \sum_{k=1}^{100} \left(\frac{1}{2} \right)^k \\ &= \frac{\frac{3}{4} \left[1 - \left(\frac{3}{4} \right)^{100} \right]}{1 - \frac{3}{4}} - \frac{\frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{100} \right]}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= 3 - 3 \times \left(\frac{3}{4} \right)^{100} - 1 + \left(\frac{1}{2} \right)^{100} \\ &= 2 - 3 \times \left(\frac{3}{4} \right)^{100} + \left(\frac{1}{2} \right)^{100}\end{aligned}$$

$$\text{따라서 } a=2, b=-3, c=1 \text{ 이므로}$$

$$a+b+c=2+(-3)+1=0$$

07-1 4

$$a_n = 2 \times 2^{n-1} = 2^n \text{ 이므로}$$

$$\sum_{k=1}^{50} \frac{a_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{50} \frac{2^k}{3^k} = \sum_{k=1}^{50} \left(\frac{2}{3} \right)^k = \frac{\frac{2}{3} \left[1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{50} \right]}{1 - \frac{2}{3}}$$

$$= 2 \left[1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{50} \right] = 2 - 2 \times \left(\frac{2}{3} \right)^{50}$$

$$\text{따라서 } p=2, q=2 \text{ 이므로}$$

$$pq = 2 \times 2 = 4$$

08 4

주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{n-1} = \frac{1 \times (3^n - 1)}{3 - 1} = \frac{3^n - 1}{2}$$

따라서 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} \frac{3^k - 1}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{10} 3^k - \sum_{k=1}^{10} 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{3(3^{10} - 1)}{3 - 1} - 1 \times 10 \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{3^{11} - 3}{2} - 10 \right) \\ &= \frac{3^{11} - 23}{4}\end{aligned}$$

08-1 9

$$\begin{aligned}a_n &= 1 + (-2) + (-2)^2 + (-2)^3 + \cdots + (-2)^{n-1} \\ &= \frac{1 \times \{1 - (-2)^n\}}{1 - (-2)} = \frac{1 - (-2)^n}{3}\end{aligned}$$

$$\text{이므로 } 3a_n - 1 = -(-2)^n$$

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{k=1}^n (3a_k - 1) &= \sum_{k=1}^n \{-(-2)^k\} = - \sum_{k=1}^n (-2)^k \\ &= - \frac{-2\{1 - (-2)^n\}}{1 - (-2)} \\ &= \frac{2\{1 - (-2)^n\}}{3}\end{aligned}$$

$$\text{즉 } \frac{2\{1 - (-2)^n\}}{3} = 342 \text{ 이므로 } 2\{1 - (-2)^n\} = 1026$$

$$1 - (-2)^n = 513, \quad -(-2)^n = 512$$

$$(-2)^n = -512 = (-2)^9$$

$$\therefore n = 9$$

09 30

수열 9, 99, 999, ..., 999...9의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 10^n - 1 \quad \text{..... ①}$$

이때 주어진 식의 좌변은 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합이므로

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{20} a_k &= \sum_{k=1}^{20} (10^k - 1) = \sum_{k=1}^{20} 10^k - \sum_{k=1}^{20} 1 \\ &= \frac{10(10^{20} - 1)}{10 - 1} - 1 \times 20 \\ &= \frac{10^{21} - 10}{9} - 20 \\ &= \frac{10^{21} - 190}{9}\end{aligned}$$

$$\text{따라서 } a=21, b=9 \text{ 이므로}$$

$$a+b=21+9=30 \quad \text{..... ②}$$

$$\text{..... ③}$$

채점 기준	비율
① 수열 9, 99, 999, ..., 999...9의 일반항을 구할 수 있다.	40%
② a, b의 값을 구할 수 있다.	40%
③ a+b의 값을 구할 수 있다.	20%

09-1 ㉔ ⑤

수열 7, 77, 777, 7777, ...의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 10^{n-1} \times 7 + 10^{n-2} \times 7 + \dots + 10 \times 7 + 7$$

$$= \frac{7(10^n - 1)}{10 - 1} = \frac{7(10^n - 1)}{9}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합은

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \frac{7(10^k - 1)}{9} = \frac{7}{9} \sum_{k=1}^n 10^k - \frac{7}{9} \sum_{k=1}^n 1$$

$$= \frac{7}{9} \times \frac{10(10^n - 1)}{10 - 1} - \frac{7}{9}n$$

$$= \frac{70(10^n - 1)}{81} - \frac{7}{9}n$$

$$= \frac{7(10^{n+1} - 9n - 10)}{81}$$

10 ㉔ ①

$$\sum_{k=1}^{40} \frac{1+2+3+\dots+k}{k} = \sum_{k=1}^{40} \frac{\frac{k(k+1)}{2}}{k}$$

$$= \sum_{k=1}^{40} \frac{k+1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{40} k + \sum_{k=1}^{40} \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{40 \times 41}{2} + \frac{1}{2} \times 40$$

$$= 410 + 20 = 430$$

10-1 ㉔ 223

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2}{2k+1} = \sum_{k=1}^{10} \frac{\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}}{2k+1}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} \frac{k(k+1)}{6}$$

$$= \frac{1}{6} \sum_{k=1}^{10} (k^2 + k)$$

$$= \frac{1}{6} \sum_{k=1}^{10} k^2 + \frac{1}{6} \sum_{k=1}^{10} k$$

$$= \frac{1}{6} \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{10 \times 11}{2}$$

$$= \frac{385}{6} + \frac{55}{6} = \frac{220}{3}$$

따라서 $p=3, q=220$ 이므로

$$p+q=3+220=223$$

11 ㉔ 6

$$\sum_{k=1}^n (k+4) = \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 4 = \frac{n(n+1)}{2} + 4n \text{이므로}$$

$$\frac{n(n+1)}{2} + 4n = 45, n(n+1) + 8n = 90$$

$$n^2 + 9n - 90 = 0, (n+15)(n-6) = 0$$

$$\therefore n=6 (\because n \text{은 자연수})$$

11-1 ㉔ ②

$$\sum_{k=1}^6 k(k+a) = \sum_{k=1}^6 (k^2 + ak)$$

$$= \sum_{k=1}^6 k^2 + a \sum_{k=1}^6 k$$

$$= \frac{6 \times 7 \times 13}{6} + a \times \frac{6 \times 7}{2}$$

$$= 91 + 21a$$

$$\text{즉 } 91 + 21a = 133 \text{이므로 } 21a = 42$$

$$\therefore a=2$$

12 ㉔ ⑤

$$\sum_{k=1}^{16} (k+1)^2 - \sum_{k=1}^{16} k(k-1) = \sum_{k=1}^{16} (k^2 + 2k + 1) - \sum_{k=1}^{16} (k^2 - k)$$

$$= \sum_{k=1}^{16} \{k^2 + 2k + 1 - (k^2 - k)\}$$

$$= \sum_{k=1}^{16} (3k + 1)$$

$$= 3 \sum_{k=1}^{16} k + \sum_{k=1}^{16} 1$$

$$= 3 \times \frac{16 \times 17}{2} + 1 \times 16$$

$$= 408 + 16 = 424$$

12-1 ㉔ ③

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{k^3}{k+2} + \sum_{k=1}^{10} \frac{8}{k+2} = \sum_{k=1}^{10} \frac{k^3 + 8}{k+2}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} \frac{(k+2)(k^2 - 2k + 4)}{k+2}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} (k^2 - 2k + 4)$$

$$= \sum_{k=1}^{10} k^2 - 2 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 4$$

$$= \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - 2 \times \frac{10 \times 11}{2} + 4 \times 10$$

$$= 385 - 110 + 40 = 315$$

13 ㉔ ③

$$a_n = -5 + (n-1) \times 2 = 2n - 7 \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^{20} a_k = \sum_{k=1}^{20} (2k - 7) = 2 \sum_{k=1}^{20} k - \sum_{k=1}^{20} 7$$

$$= 2 \times \frac{20 \times 21}{2} - 7 \times 20$$

$$= 420 - 140 = 280$$

13-1 ㉔ ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_2 = 6 \text{에서 } a_1 + d = 6 \quad \text{.....㉔}$$

$$a_6 = -2 \text{에서 } a_1 + 5d = -2 \quad \text{.....㉕}$$

$$\text{㉔, ㉕를 연립하여 풀면 } a_1 = 8, d = -2$$

$$\therefore a_n = 8 + (n-1) \times (-2) = -2n + 10$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{10} a_n = \sum_{n=1}^{10} (-2n + 10)$$

$$= -2 \sum_{n=1}^{10} n + \sum_{n=1}^{10} 10$$

$$= -2 \times \frac{10 \times 11}{2} + 10 \times 10$$

$$= -110 + 100 = -10$$

14 135

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = -3 \quad \dots\dots \textcircled{1} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{10} (k-\alpha)(k-\beta) &= \sum_{k=1}^{10} \{k^2 - (\alpha+\beta)k + \alpha\beta\} \\ &= \sum_{k=1}^{10} (k^2 - 4k - 3) \quad (\because \textcircled{1}) \\ &= \sum_{k=1}^{10} k^2 - 4 \sum_{k=1}^{10} k - \sum_{k=1}^{10} 3 \\ &= \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - 4 \times \frac{10 \times 11}{2} - 3 \times 10 \\ &= 385 - 220 - 30 = 135 \quad \dots\dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 의 값을 구할 수 있다.	30%
② $\sum_{k=1}^{10} (k-\alpha)(k-\beta)$ 의 값을 구할 수 있다.	70%

14-1 13

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} \alpha_n + \beta_n &= 2n + 1, \alpha_n \beta_n = n(n+1) \\ \therefore (1-\alpha_n)(1-\beta_n) &= 1 - (\alpha_n + \beta_n) + \alpha_n \beta_n \\ &= 1 - (2n+1) + n(n+1) \\ &= n^2 - n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{n=1}^{10} (1-\alpha_n)(1-\beta_n) &= \sum_{n=1}^{10} (n^2 - n) \\ &= \sum_{n=1}^{10} n^2 - \sum_{n=1}^{10} n \\ &= \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - \frac{10 \times 11}{2} \\ &= 385 - 55 = 330 \end{aligned}$$

15 12

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=1}^9 (x-k)^2 = \sum_{k=1}^9 (x^2 - 2kx + k^2) \\ &= \sum_{k=1}^9 x^2 - 2x \sum_{k=1}^9 k + \sum_{k=1}^9 k^2 \\ &= 9x^2 - 2x \times \frac{9 \times 10}{2} + \frac{9 \times 10 \times 19}{6} \\ &= 9x^2 - 90x + 285 \\ &= 9(x-5)^2 + 60 \end{aligned}$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=5$ 일 때 최솟값 60을 가지므로 구하는 함은 $60+5=65$

Lecture 이차함수의 최대·최소

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 에 대하여

- (1) $a>0$ 이면 $x=p$ 일 때 최솟값 q 를 갖는다.
(2) $a<0$ 이면 $x=p$ 일 때 최댓값 q 를 갖는다.

15-1 130

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{11} (k-a)(2k-a) &= \sum_{k=1}^{11} (2k^2 - 3ak + a^2) \\ &= 2 \sum_{k=1}^{11} k^2 - 3a \sum_{k=1}^{11} k + \sum_{k=1}^{11} a^2 \\ &= 2 \times \frac{11 \times 12 \times 23}{6} - 3a \times \frac{11 \times 12}{2} + 11a^2 \\ &= 11a^2 - 198a + 1012 \\ &= 11(a-9)^2 + 121 \quad \dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

따라서 주어진 식은 $a=9$ 일 때 최솟값 121을 가지므로

$$\begin{aligned} a=9, m=121 \quad \dots\dots \textcircled{2} \\ \therefore a+m=9+121=130 \quad \dots\dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① 주어진 식을 a 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50%
② a, m 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ $a+m$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

16 11

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^k \frac{kl}{2} &= \frac{k}{2} \sum_{l=1}^k l = \frac{k}{2} \times \frac{k(k+1)}{2} = \frac{k^3+k^2}{4} \text{이므로} \\ \sum_{k=1}^7 \left(\sum_{l=1}^k \frac{kl}{2} \right) &= \sum_{k=1}^7 \frac{k^3+k^2}{4} = \frac{1}{4} \left(\sum_{k=1}^7 k^3 + \sum_{k=1}^7 k^2 \right) \\ &= \frac{1}{4} \left\{ \left(\frac{7 \times 8}{2} \right)^2 + \frac{7 \times 8 \times 15}{6} \right\} \\ &= \frac{1}{4} (784 + 140) = 231 \end{aligned}$$

16-1 5

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} \left(\sum_{j=1}^5 kj \right) &= \sum_{k=1}^{10} \left(k \sum_{j=1}^5 j \right) = \sum_{k=1}^{10} \left(k \times \frac{5 \times 6}{2} \right) = \sum_{k=1}^{10} 15k \\ &= 15 \times \frac{10 \times 11}{2} = 825 \\ \sum_{k=1}^5 \left\{ \sum_{j=1}^{10} (k+j) \right\} &= \sum_{k=1}^5 \left(\sum_{j=1}^{10} k + \sum_{j=1}^{10} j \right) = \sum_{k=1}^5 \left(10k + \frac{10 \times 11}{2} \right) \\ &= \sum_{k=1}^5 (10k + 55) = 10 \times \frac{5 \times 6}{2} + 55 \times 5 \\ &= 425 \\ \therefore \sum_{k=1}^{10} \left(\sum_{j=1}^5 kj \right) + \sum_{k=1}^5 \left\{ \sum_{j=1}^{10} (k+j) \right\} &= 825 + 425 = 1250 \end{aligned}$$

17 8

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^n \left(\sum_{k=1}^m k \right) &= \sum_{m=1}^n \frac{m(m+1)}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{m=1}^n m^2 + \sum_{m=1}^n m \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+4)}{12} \\ &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \quad \dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$$\text{즉 } \frac{n(n+1)(n+2)}{6} = 120 \text{이므로}$$

$$n(n+1)(n+2) = 720 = 8 \times 9 \times 10$$

$$\therefore n=8 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

채점 기준	비율
① $\sum_{m=1}^n \left(\sum_{k=1}^m k \right)$ 를 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50%
② 자연수 n 의 값을 구할 수 있다.	50%

17-1 9

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^n \left\{ \sum_{k=1}^m (k+m) \right\} &= \sum_{m=1}^n \left(\sum_{k=1}^m k + \sum_{k=1}^m m \right) = \sum_{m=1}^n \left\{ \frac{m(m+1)}{2} + m^2 \right\} \\ &= \sum_{m=1}^n \left(\frac{3m^2+m}{2} \right) = \frac{3}{2} \sum_{m=1}^n m^2 + \frac{1}{2} \sum_{m=1}^n m \\ &= \frac{3}{2} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+2)}{4} = \frac{n(n+1)^2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\approx \frac{n(n+1)^2}{2} = 450 \text{ 이므로} \\ &n(n+1)^2 = 900 = 9 \times 10^2 \\ &\therefore n = 9 \end{aligned}$$

18 ㉮ ⑤

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \left\{ \sum_{j=1}^n (i+j) \right\} &= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n i + \sum_{j=1}^n j \right) = \sum_{i=1}^m \left\{ in + \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\ &= n \sum_{i=1}^m i + \sum_{i=1}^m \frac{n(n+1)}{2} \\ &= n \times \frac{m(m+1)}{2} + \frac{mn(n+1)}{2} \\ &= \frac{mn(m+n+2)}{2} \\ &= \frac{40(13+2)}{2} \quad (\because m+n=13, mn=40) \\ &= 300 \end{aligned}$$

18-1 ㉮ 45

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $m+n=7, mn=10$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n ij \right) &= \sum_{i=1}^m \left(i \sum_{j=1}^n j \right) = \sum_{i=1}^m \left\{ i \times \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \sum_{i=1}^m i \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{m(m+1)}{2} \\ &= \frac{mn(m+1)(n+1)}{4} \\ &= \frac{mn(mn+m+n+1)}{4} \\ &= \frac{10(10+7+1)}{4} \quad (\because \ominus) \\ &= 45 \end{aligned}$$

19 ㉮ ③

수열 $1 \times 5, 2 \times 6, 3 \times 7, \dots, 11 \times 15$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면
 $a_k = k(k+4) = k^2 + 4k$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{주어진 식}) &= \sum_{k=1}^{11} a_k = \sum_{k=1}^{11} (k^2 + 4k) = \sum_{k=1}^{11} k^2 + 4 \sum_{k=1}^{11} k \\ &= \frac{11 \times 12 \times 23}{6} + 4 \times \frac{11 \times 12}{2} \\ &= 506 + 264 = 770 \end{aligned}$$

19-1 ㉮ ⑤

수열 $1^2 - 2, 2^2 - 4, 3^2 - 6, \dots, 15^2 - 30$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면
 $a_k = k^2 - 2k$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{주어진 식}) &= \sum_{k=1}^{15} a_k = \sum_{k=1}^{15} (k^2 - 2k) = \sum_{k=1}^{15} k^2 - 2 \sum_{k=1}^{15} k \\ &= \frac{15 \times 16 \times 31}{6} - 2 \times \frac{15 \times 16}{2} \\ &= 1240 - 240 = 1000 \end{aligned}$$

20 ㉮ 3410

수열 $2 \times 1^2, 3 \times 2^2, 4 \times 3^2, \dots, 11 \times 10^2$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면
 $a_k = (k+1)k^2 = k^3 + k^2$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{주어진 식}) &= \sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} (k^3 + k^2) = \sum_{k=1}^{10} k^3 + \sum_{k=1}^{10} k^2 \\ &= \left(\frac{10 \times 11}{2} \right)^2 + \frac{10 \times 11 \times 21}{6} \\ &= 3025 + 385 = 3410 \end{aligned}$$


20-1 ㉮ 4404

주어진 수열의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$\begin{aligned} a_k &= k(2k-1)^2 = 4k^3 - 4k^2 + k \\ \therefore \sum_{k=1}^8 a_k &= \sum_{k=1}^8 (4k^3 - 4k^2 + k) = 4 \sum_{k=1}^8 k^3 - 4 \sum_{k=1}^8 k^2 + \sum_{k=1}^8 k \\ &= 4 \times \left(\frac{8 \times 9}{2} \right)^2 - 4 \times \frac{8 \times 9 \times 17}{6} + \frac{8 \times 9}{2} \\ &= 5184 - 816 + 36 = 4404 \end{aligned}$$

21 ㉮ 84

오른쪽 그림과 같이 각 층에 놓인 정육면체의 개수를 맨 위층부터 차례로 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 이라 하면



$$\begin{aligned} a_1 &= 1 \\ a_2 &= 1 + 2 = 3 \\ a_3 &= 1 + 2 + 3 = 6 \\ a_4 &= 1 + 2 + 3 + 4 = 10 \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$\therefore a_k = 1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad \dots \textcircled{1}$$


따라서 7층 탑을 쌓는 데 필요한 정육면체의 개수는

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^7 a_k &= \sum_{k=1}^7 \frac{k(k+1)}{2} \quad \dots \textcircled{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^7 k^2 + \sum_{k=1}^7 k \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{7 \times 8 \times 15}{6} + \frac{7 \times 8}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} (140 + 28) = 84 \quad \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① 각 층에 놓인 정육면체의 개수에 대한 일반항을 구할 수 있다.	40%
② 7층 탑을 쌓는 데 필요한 정육면체의 개수를 ㉮를 사용하여 나타낼 수 있다.	20%
③ 7층 탑을 쌓는 데 필요한 정육면체의 개수를 구할 수 있다.	40%

21-1 ㉮ 650

오른쪽 그림과 같이 각 층에 놓인 정육면체의 개수를 맨 위층부터 차례로 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 이라 하면



$$\begin{aligned} a_1 &= 1 \\ a_2 &= 4 = 2^2 \\ a_3 &= 9 = 3^2 \\ a_4 &= 16 = 4^2 \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$\therefore a_k = k^2$$

따라서 12층을 쌓는 데 필요한 정육면체의 개수는

$$\sum_{k=1}^{12} a_k = \sum_{k=1}^{12} k^2 = \frac{12 \times 13 \times 25}{6} = 650$$

22 ㉮ 7

수열 $1 \times (3n-1), 2 \times (3n-3), 3 \times (3n-5), \dots, n \times (n+1)$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$a_k = k\{3n - (2k-1)\} = (3n+1)k - 2k^2$$

주어진 식의 좌변은 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$\begin{aligned} (\text{좌변}) &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \{(3n+1)k - 2k^2\} \\ &= (3n+1) \sum_{k=1}^n k - 2 \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= (3n+1) \times \frac{n(n+1)}{2} - 2 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(5n+1)}{6} \\ &= \frac{5n^3 + 6n^2 + n}{6} \end{aligned}$$

따라서 $a=6, b=1$ 이므로

$$a+b=6+1=7$$

22-1 ㉮ ①

수열 $1^2 \times (2n-1), 2^2 \times (2n-3), 3^2 \times (2n-5), \dots, n^2 \times 1$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$a_k = k^2\{2n - (2k-1)\} = (2n+1)k^2 - 2k^3$$

주어진 식의 좌변은 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$\begin{aligned} (\text{좌변}) &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \{(2n+1)k^2 - 2k^3\} \\ &= (2n+1) \sum_{k=1}^n k^2 - 2 \sum_{k=1}^n k^3 \\ &= (2n+1) \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2 \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 \\ &= \frac{n(n+1)(n^2+n+1)}{6} \end{aligned}$$

따라서 $a=1, b=1, c=1$ 이므로

$$a+b+c=1+1+1=3$$

23 ㉮ $\frac{n(n-1)(n+1)}{12}$

수열 $1^2 \times \frac{n-1}{n}, 2^2 \times \frac{n-2}{n}, 3^2 \times \frac{n-3}{n}, \dots, (n-1)^2 \times \frac{1}{n}$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$a_k = k^2 \times \frac{n-k}{n} = k^2 - \frac{k^3}{n}$$

주어진 수열의 합은 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 $(n-1)$ 항까지의 합이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} a_k &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(k^2 - \frac{k^3}{n} \right) = \sum_{k=1}^{n-1} k^2 - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} k^3 \\ &= \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} - \frac{1}{n} \left\{ \frac{(n-1)n}{2} \right\}^2 \\ &= \frac{2n(n-1)(2n-1) - 3n(n-1)^2}{12} \\ &= \frac{n(n-1)(n+1)}{12} \end{aligned}$$

23-1 ㉮ 7

수열 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2, \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2, \left(1 + \frac{3}{n}\right)^2, \dots, \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$a_k = \left(1 + \frac{k}{n}\right)^2 = 1 + \frac{2k}{n} + \frac{k^2}{n^2}$$

주어진 식의 좌변은 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$\begin{aligned} (\text{좌변}) &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{2k}{n} + \frac{k^2}{n^2} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n 1 + \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n k + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= n + \frac{2}{n} \times \frac{n(n+1)}{2} + \frac{1}{n^2} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{6n(2n+1) + (n+1)(2n+1)}{6n} \\ &= \frac{(2n+1)(7n+1)}{6n} \end{aligned}$$

따라서 $a=1, b=7$ 이므로

$$ab=1 \times 7=7$$

24 ㉮ 11

수열 $\frac{n+1}{n}, \frac{n+2}{n}, \frac{n+3}{n}, \dots, \frac{2n}{n}$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$a_k = \frac{n+k}{n}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n} = \sum_{k=1}^n 1 + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \\ &= n + \frac{1}{n} \times \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{3n+1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{즉 } \frac{3n+1}{2} = 17 \text{ 이므로 } 3n+1=34$$

$$3n=33 \quad \therefore n=11$$

24-1 ㉮ 10

주어진 수열의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$a_k = \frac{2n+2k}{n} \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n \frac{2n+2k}{n} = \sum_{k=1}^n 2 + \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n k \\ &= 2n + \frac{2}{n} \times \frac{n(n+1)}{2} \\ &= 3n+1 \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

$$\text{즉 } 3n+1=31 \text{ 이므로 } 3n=30$$

$$\therefore n=10 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 주어진 수열의 제 k 항을 구할 수 있다.	30%
② 주어진 수열의 합을 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50%
③ 자연수 n 의 값을 구할 수 있다.	20%

25 ㉮ 190

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = n^2 \text{ 이라 하면}$$

$$(i) n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = 1^2 = 1$$

$$(ii) n \geq 2 \text{ 일 때}$$

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 - (n-1)^2 \\ &= 2n-1 \end{aligned} \quad \dots\dots ㉠$$

이때 $a_1=1$ 은 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n-1$$

$$\text{따라서 } a_{2k-1} = 2(2k-1) - 1 = 4k-3 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{10} a_{2k-1} &= \sum_{k=1}^{10} (4k-3) \\
&= 4 \sum_{k=1}^{10} k - \sum_{k=1}^{10} 3 \\
&= 4 \times \frac{10 \times 11}{2} - 3 \times 10 \\
&= 220 - 30 = 190
\end{aligned}$$

25-1 ㉔ ②

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = n^2 - 4n \text{이라 하면}$$

$$(i) n=1 \text{일 때, } a_1 = S_1 = 1^2 - 4 = -3$$

$$(ii) n \geq 2 \text{일 때}$$

$$\begin{aligned}
a_n &= S_n - S_{n-1} \\
&= n^2 - 4n - \{(n-1)^2 - 4(n-1)\} \\
&= 2n - 5
\end{aligned}$$

이때 $a_1 = -3$ 은 ㉔에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n - 5$$

$$\begin{aligned}
\therefore \sum_{k=1}^{10} ka_k &= \sum_{k=1}^{10} k(2k-5) \\
&= \sum_{k=1}^{10} (2k^2 - 5k) \\
&= 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 - 5 \sum_{k=1}^{10} k \\
&= 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - 5 \times \frac{10 \times 11}{2} \\
&= 770 - 275 = 495
\end{aligned}$$

26 ㉔ 30

$$a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + na_n = \sum_{k=1}^n ka_k = n(n+1) \text{이므로}$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n ka_k = n(n+1) \text{이라 하면}$$

$$(i) n=1 \text{일 때}$$

$$1 \times a_1 = S_1 = 1 \times 2 = 2 \text{이므로 } a_1 = 2$$

$$(ii) n \geq 2 \text{일 때}$$

$$na_n = S_n - S_{n-1} = n(n+1) - (n-1)n = 2n$$

$$\therefore a_n = 2$$

이때 $a_1 = 2$ 는 ㉔에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{15} a_k = \sum_{k=1}^{15} 2 = 2 \times 15 = 30$$

26-1 ㉔ 524

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k+1} = n^2 + 2n \text{이라 하면}$$

$$(i) n=1 \text{일 때}$$

$$\frac{a_1}{1+1} = S_1 = 1^2 + 2 = 3 \text{이므로 } a_1 = 6$$

$$(ii) n \geq 2 \text{일 때}$$

$$\begin{aligned}
\frac{a_n}{n+1} &= S_n - S_{n-1} \\
&= n^2 + 2n - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\} \\
&= 2n + 1
\end{aligned}$$

$$\therefore a_n = (n+1)(2n+1) \quad \dots\dots ㉔$$

이때 $a_1 = 6$ 은 ㉔에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = (n+1)(2n+1) \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned}
\therefore \sum_{k=1}^8 a_k &= \sum_{k=1}^8 (k+1)(2k+1) \\
&= \sum_{k=1}^8 (2k^2 + 3k + 1) \\
&= 2 \sum_{k=1}^8 k^2 + 3 \sum_{k=1}^8 k + \sum_{k=1}^8 1 \\
&= 2 \times \frac{8 \times 9 \times 17}{6} + 3 \times \frac{8 \times 9}{2} + 1 \times 8 \\
&= 408 + 108 + 8 = 524 \quad \dots\dots ②
\end{aligned}$$

채점 기준	비율
① 일반항 a_n 을 구할 수 있다.	50%
② $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값을 구할 수 있다.	50%

27 ㉔ ④

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = n^2 - 3n \text{이라 하면}$$

$$(i) n=1 \text{일 때, } a_1 = S_1 = 1^2 - 3 = -2$$

$$(ii) n \geq 2 \text{일 때}$$

$$\begin{aligned}
a_n &= S_n - S_{n-1} \\
&= n^2 - 3n - \{(n-1)^2 - 3(n-1)\} \\
&= 2n - 4
\end{aligned}$$

이때 $a_1 = -2$ 는 ㉔에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n - 4$$

$$\begin{aligned}
\therefore \sum_{k=1}^5 k^2 a_{2k} &= \sum_{k=1}^5 k^2 (4k - 4) \\
&= \sum_{k=1}^5 (4k^3 - 4k^2) \\
&= 4 \left(\sum_{k=1}^5 k^3 - \sum_{k=1}^5 k^2 \right) \\
&= 4 \left\{ \left(\frac{5 \times 6}{2} \right)^2 - \frac{5 \times 6 \times 11}{6} \right\} \\
&= 4(225 - 55) = 680
\end{aligned}$$

27-1 ㉔ 480

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k} = n(n+3) \text{이라 하면}$$

$$(i) n=1 \text{일 때}$$

$$\frac{a_1}{1} = S_1 = 1 \times 4 = 4 \text{이므로 } a_1 = 4$$

$$(ii) n \geq 2 \text{일 때}$$

$$\begin{aligned}
\frac{a_n}{n} &= S_n - S_{n-1} \\
&= n(n+3) - (n-1)(n+2) \\
&= n^2 + 3n - (n^2 + n - 2) \\
&= 2(n+1)
\end{aligned}$$

$$\therefore a_n = 2n(n+1) \quad \dots\dots ㉔$$

이때 $a_1 = 4$ 는 ㉔에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n(n+1)$$

$$\begin{aligned}
\therefore \sum_{k=1}^{10} \frac{a_{2k+1}}{k+1} &= \sum_{k=1}^{10} \frac{2(2k+1)(2k+2)}{k+1} \\
&= \sum_{k=1}^{10} (8k+4) \\
&= 8 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 4 \\
&= 8 \times \frac{10 \times 11}{2} + 4 \times 10 \\
&= 440 + 40 = 480
\end{aligned}$$

28 ㉮ 210

수열 $\frac{1}{2^2-1}, \frac{1}{4^2-1}, \frac{1}{6^2-1}, \dots, \frac{1}{20^2-1}$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$a_k = \frac{1}{(2k)^2-1} = \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$$

즉 주어진 수열의 합은

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right) + \dots + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21}\right) \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{21}\right)$$

$$= \frac{10}{21}$$

따라서 $p=21, q=10$ 이므로

$$pq = 21 \times 10 = 210$$

28-1 ㉮ 151

주어진 수열의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$a_k = \frac{1}{(k+1)^2-1} = \frac{1}{k(k+2)}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{14} a_k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{14} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \dots \right.$$

$$\left. + \left(\frac{1}{13} - \frac{1}{15}\right) + \left(\frac{1}{14} - \frac{1}{16}\right) \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{15} - \frac{1}{16}\right)$$

$$= \frac{329}{480}$$

따라서 $p=480, q=329$ 이므로

$$p-q = 480 - 329 = 151$$

29 ㉮ $\frac{5}{11}$

$$a_n = 4 + (n-1) \times 4 = 4n \text{ 이므로} \quad \dots\dots ①$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n 4k = 4 \times \frac{n(n+1)}{2} = 2n(n+1) \quad \dots\dots ②$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{S_k} = \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{2k(k+1)}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots \right.$$

$$\left. + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{11}\right) \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{11}\right)$$

$$= \frac{5}{11} \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 일반항 a_n 을 구할 수 있다.	20%
② S_n 을 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	30%
③ $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{S_k}$ 의 값을 구할 수 있다.	50%

29-1 ㉮ 43

$$a_n = 2 + (n-1) \times 5 = 5n - 3 \text{ 이므로}$$

$$a_{2n-1} = 10n - 8, a_{2n+1} = 10n + 2$$

$$\therefore \sum_{n=1}^8 \frac{1}{a_{2n-1}a_{2n+1}} = \sum_{n=1}^8 \frac{1}{(10n-8)(10n+2)}$$

$$= \frac{1}{10} \sum_{n=1}^8 \left(\frac{1}{10n-8} - \frac{1}{10n+2} \right)$$

$$= \frac{1}{10} \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{12}\right) + \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{22}\right) \right.$$

$$\left. + \left(\frac{1}{22} - \frac{1}{32}\right) + \dots + \left(\frac{1}{72} - \frac{1}{82}\right) \right]$$

$$= \frac{1}{10} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{82} \right) = \frac{2}{41}$$

따라서 $p=41, q=2$ 이므로

$$p+q = 41+2 = 43$$

30 ㉮ $\frac{10}{41}$

$$(i) n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = 2 - 1 = 1$$

$$(ii) n \geq 2 \text{ 일 때}$$

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= 2n^2 - n - \{2(n-1)^2 - (n-1)\}$$

$$= 4n - 3 \quad \dots\dots ①$$

이때 $a_1=1$ 은 ①에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 4n - 3$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{(4k-3)(4k+1)}$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{4k-3} - \frac{1}{4k+1} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left[\left(1 - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9}\right) + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{13}\right) + \dots \right.$$

$$\left. + \left(\frac{1}{37} - \frac{1}{41}\right) \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{41}\right) = \frac{10}{41}$$

30-1 ㉮ $\frac{99}{100}$

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{3}n(n^2-1) \text{ 이라 하면}$$

$$(i) n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = 0$$

$$(ii) n \geq 2 \text{ 일 때}$$

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= \frac{1}{3}n(n^2-1) - \frac{1}{3}(n-1)\{(n-1)^2-1\}$$

$$= n(n-1) \quad \dots\dots ①$$

이때 $a_1=0$ 은 ①에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = n(n-1)$$

$$\therefore \sum_{k=2}^{100} \frac{1}{a_k} = \sum_{k=2}^{100} \frac{1}{k(k-1)}$$

$$= \sum_{k=2}^{100} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots$$

$$+ \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right)$$

$$= 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$$

31 ㉮ 3

주어진 수열의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} \\ &= \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{(\sqrt{k} + \sqrt{k+1})(\sqrt{k} - \sqrt{k+1})} \\ &= \sqrt{k+1} - \sqrt{k} \\ \therefore \sum_{k=1}^{15} a_k &= \sum_{k=1}^{15} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2}-1) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + (\sqrt{4}-\sqrt{3}) + \cdots + (\sqrt{16}-\sqrt{15}) \\ &= \sqrt{16} - 1 = 3 \end{aligned}$$

31-1 ㉮ 399

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})} \\ &= \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \\ \therefore \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2}-1) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + (\sqrt{4}-\sqrt{3}) + \cdots \\ &\quad + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \sqrt{n+1} - 1 \\ \text{즉 } \sqrt{n+1} - 1 &= 19 \text{ 이므로 } \sqrt{n+1} = 20 \\ n+1 &= 400 \quad \therefore n = 399 \end{aligned}$$

32 ㉮ (1) $a_n = 3n - 2$ (2) 8

(1) 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$\begin{aligned} a_1 + a_4 &= 11 \text{에서 } a_1 + (a_1 + 3d) = 11 \text{ 이므로} \\ 2a_1 + 3d &= 11 \quad \cdots \textcircled{1} \\ a_4 + a_7 &= 29 \text{에서 } (a_1 + 3d) + (a_1 + 6d) = 29 \text{ 이므로} \\ 2a_1 + 9d &= 29 \quad \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a_1 = 1, d = 3$

$$\therefore a_n = 1 + (n-1) \times 3 = 3n - 2 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} (2) \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{3k-2} + \sqrt{3k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{3k-2} - \sqrt{3k+1}}{(\sqrt{3k-2} + \sqrt{3k+1})(\sqrt{3k-2} - \sqrt{3k+1})} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n (\sqrt{3k+1} - \sqrt{3k-2}) \\ &= \frac{1}{3} \{(\sqrt{4}-1) + (\sqrt{7}-\sqrt{4}) + (\sqrt{10}-\sqrt{7}) + \cdots \\ &\quad + (\sqrt{3n+1} - \sqrt{3n-2})\} \\ &= \frac{1}{3} (\sqrt{3n+1} - 1) \quad \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\text{즉 } \frac{1}{3} (\sqrt{3n+1} - 1) = \frac{4}{3} \text{ 이므로 } \sqrt{3n+1} - 1 = 4$$

$$\sqrt{3n+1} = 5, 3n+1 = 25$$

$$3n = 24 \quad \therefore n = 8 \quad \cdots \textcircled{3}$$

채점 기준	비율
① 일반항 a_n 을 구할 수 있다.	30%
② $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}}$ 을 간단히 할 수 있다.	50%
③ n 의 값을 구할 수 있다.	20%


32-1 ㉮ 2

$$a_n = 1 + (n-1) \times 2 = 2n - 1 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{12} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} &= \sum_{k=1}^{12} \frac{1}{\sqrt{2k-1} + \sqrt{2k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^{12} \frac{\sqrt{2k-1} - \sqrt{2k+1}}{(\sqrt{2k-1} + \sqrt{2k+1})(\sqrt{2k-1} - \sqrt{2k+1})} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{12} (\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1}) \\ &= \frac{1}{2} \{(\sqrt{3}-1) + (\sqrt{5}-\sqrt{3}) + (\sqrt{7}-\sqrt{5}) + \cdots + (\sqrt{25}-\sqrt{23})\} \\ &= \frac{1}{2} (\sqrt{25} - 1) = 2 \end{aligned}$$

33 ㉮ 20

오른쪽 그림과 같이 네 점 $(k, 0), (k+1, 0), (k, \sqrt{k}), (k+1, \sqrt{k+1})$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형은 윗변의 길이가 $\sqrt{k}$, 아랫변의 길이가 $\sqrt{k+1}$, 높이가 1인 사다리꼴이므로



$$\begin{aligned} S_k &= \frac{1}{2} (\sqrt{k} + \sqrt{k+1}) \times 1 \\ &= \frac{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}{2} \\ \therefore \sum_{k=1}^{120} \frac{1}{S_k} &= \sum_{k=1}^{120} \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} \\ &= 2 \sum_{k=1}^{120} \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{(\sqrt{k} + \sqrt{k+1})(\sqrt{k} - \sqrt{k+1})} \\ &= 2 \sum_{k=1}^{120} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= 2 \{(\sqrt{2}-1) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + (\sqrt{4}-\sqrt{3}) + \cdots \\ &\quad + (\sqrt{121} - \sqrt{120})\} \\ &= 2 (\sqrt{121} - 1) = 20 \end{aligned}$$

33-1 ㉮ 5

두 점 A_k, B_k 의 좌표는 $A_k(k, \sqrt{2k}), B_k(k, -\sqrt{2k+2})$ 이므로 $A_k B_k = \sqrt{2k} + \sqrt{2k+2}$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=2}^{71} \frac{1}{A_k B_k} &= \sum_{k=2}^{71} \frac{1}{\sqrt{2k} + \sqrt{2k+2}} \\ &= \sum_{k=2}^{71} \frac{\sqrt{2k} - \sqrt{2k+2}}{(\sqrt{2k} + \sqrt{2k+2})(\sqrt{2k} - \sqrt{2k+2})} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{71} (\sqrt{2k+2} - \sqrt{2k}) \\ &= \frac{1}{2} \{(\sqrt{6}-\sqrt{4}) + (\sqrt{8}-\sqrt{6}) + (\sqrt{10}-\sqrt{8}) + \cdots \\ &\quad + (\sqrt{144} - \sqrt{142})\} \\ &= \frac{1}{2} (\sqrt{144} - \sqrt{4}) = 5 \end{aligned}$$

34 ㉮ 3

$$\begin{aligned} a_n &= \log \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) \\ &= \log \frac{n^2 - 1}{n^2} \\ &= \log \frac{(n-1)(n+1)}{n^2} \\ &= \log \left(\frac{n-1}{n} \times \frac{n+1}{n} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \sum_{k=2}^{99} a_k &= \sum_{k=2}^{99} \log \left(\frac{k-1}{k} \times \frac{k+1}{k} \right) \\
&= \log \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \right) + \log \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \right) + \log \left(\frac{3}{4} \times \frac{5}{4} \right) + \cdots \\
&\quad + \log \left(\frac{98}{99} \times \frac{100}{99} \right) \\
&= \log \left(\frac{1}{2} \times \frac{\cancel{3}}{\cancel{2}} \times \frac{\cancel{2}}{\cancel{3}} \times \frac{\cancel{4}}{\cancel{3}} \times \frac{\cancel{3}}{\cancel{4}} \times \frac{\cancel{5}}{\cancel{4}} \times \cdots \times \frac{\cancel{98}}{\cancel{99}} \times \frac{100}{99} \right) \\
&= \log \left(\frac{1}{2} \times \frac{100}{99} \right) \\
&= 2 - \log 99
\end{aligned}$$

34-1 ㉔ ①

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n \log_4 \left(1 + \frac{1}{k} \right) &= \sum_{k=1}^n \log_4 \frac{k+1}{k} \\
&= \log_4 \frac{2}{1} + \log_4 \frac{3}{2} + \log_4 \frac{4}{3} + \cdots + \log_4 \frac{n+1}{n} \\
&= \log_4 \left(\frac{\cancel{2}}{1} \times \frac{\cancel{3}}{\cancel{2}} \times \frac{\cancel{4}}{\cancel{3}} \times \cdots \times \frac{n+1}{\cancel{n}} \right) \\
&= \log_4 (n+1)
\end{aligned}$$

$$\text{즉 } \log_4 (n+1) = 3 \text{ 이므로 } n+1 = 4^3 = 64$$

$$\therefore n = 63$$

35 ㉔ ⑤

$$a_n = \log n - \log (n+1) = \log \frac{n}{n+1} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=10}^n a_k &= \sum_{k=10}^n \log \frac{k}{k+1} \\
&= \log \frac{10}{11} + \log \frac{11}{12} + \log \frac{12}{13} + \cdots + \log \frac{n}{n+1} \\
&= \log \left(\frac{10}{\cancel{11}} \times \frac{\cancel{11}}{\cancel{12}} \times \frac{\cancel{12}}{\cancel{13}} \times \cdots \times \frac{\cancel{n}}{n+1} \right) \\
&= \log \frac{10}{n+1}
\end{aligned}$$

$$\text{즉 } \log \frac{10}{n+1} = \log \frac{5}{12} \text{ 이므로 } \frac{10}{n+1} = \frac{5}{12}$$

$$n+1 = 24 \quad \therefore n = 23$$

35-1 ㉔ 80

$$\log_3 \sqrt{\frac{k+1}{k}} = \frac{1}{2} \log_3 \frac{k+1}{k} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n \log_3 \sqrt{\frac{k+1}{k}} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \log_3 \frac{k+1}{k} \\
&= \frac{1}{2} \left(\log_3 \frac{2}{1} + \log_3 \frac{3}{2} + \log_3 \frac{4}{3} + \cdots + \log_3 \frac{n+1}{n} \right) \\
&= \frac{1}{2} \log_3 \left(\frac{\cancel{2}}{1} \times \frac{\cancel{3}}{\cancel{2}} \times \frac{\cancel{4}}{\cancel{3}} \times \cdots \times \frac{n+1}{\cancel{n}} \right) \\
&= \frac{1}{2} \log_3 (n+1)
\end{aligned}$$

$$\text{즉 } \frac{1}{2} \log_3 (n+1) = 2 \text{ 이므로 } \log_3 (n+1) = 4$$

$$n+1 = 3^4 = 81 \quad \therefore n = 80$$

36 ㉔ 21

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \log \frac{(n+1)(n+2)}{2} \text{ 라 하면}$$

$$(i) n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = \log \frac{2 \times 3}{2} = \log 3$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned}
a_n &= S_n - S_{n-1} \\
&= \log \frac{(n+1)(n+2)}{2} - \log \frac{n(n+1)}{2} \\
&= \log \frac{n+2}{n}
\end{aligned}$$

..... ㉔

이때 $a_1 = \log 3$ 은 ㉔에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = \log \frac{n+2}{n}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \sum_{k=1}^{20} a_{2k} &= \sum_{k=1}^{20} \log \frac{2k+2}{2k} = \sum_{k=1}^{20} \log \frac{k+1}{k} \\
&= \log \frac{2}{1} + \log \frac{3}{2} + \log \frac{4}{3} + \cdots + \log \frac{21}{20} \\
&= \log \left(\frac{\cancel{2}}{1} \times \frac{\cancel{3}}{\cancel{2}} \times \frac{\cancel{4}}{\cancel{3}} \times \cdots \times \frac{21}{\cancel{20}} \right) \\
&= \log 21
\end{aligned}$$

따라서 $p = \log 21$ 이므로

$$10^p = 10^{\log 21} = 21$$

36-1 ㉔ ②

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \log \frac{2}{(n+1)(n+2)} \text{ 라 하면}$$

$$(i) n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = \log \frac{2}{2 \times 3} = \log \frac{1}{3}$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned}
a_n &= S_n - S_{n-1} \\
&= \log \frac{2}{(n+1)(n+2)} - \log \frac{2}{n(n+1)} \\
&= \log \frac{n}{n+2}
\end{aligned}$$

..... ㉔

이때 $a_1 = \log \frac{1}{3}$ 은 ㉔에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = \log \frac{n}{n+2}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \sum_{k=1}^{90} a_{2k} &= \sum_{k=1}^{90} \log \frac{2k}{2k+2} = \sum_{k=1}^{90} \log \frac{k}{k+1} \\
&= \log \frac{1}{2} + \log \frac{2}{3} + \log \frac{3}{4} + \cdots + \log \frac{90}{91} \\
&= \log \left(\frac{1}{\cancel{2}} \times \frac{\cancel{2}}{\cancel{3}} \times \frac{\cancel{3}}{\cancel{4}} \times \cdots \times \frac{\cancel{90}}{91} \right) \\
&= \log \frac{1}{91} \\
&= -\log 91
\end{aligned}$$

유형 **완성하기**

p. 273

37 ㉔ 60

자연수 a 에 대하여

(i) $n = 3a - 2$ 일 때

$$\begin{aligned}
n^2 &= (3a-2)^2 = 9a^2 - 12a + 4 \\
&= 3(3a^2 - 4a + 1) + 1
\end{aligned}$$

$$\therefore f(1) = f(4) = f(7) = \cdots = 1$$

(ii) $n = 3a - 1$ 일 때

$$\begin{aligned}
n^2 &= (3a-1)^2 = 9a^2 - 6a + 1 \\
&= 3(3a^2 - 2a) + 1
\end{aligned}$$

$$\therefore f(2)=f(5)=f(8)=\cdots=1$$

(iii) $n=3a$ 일 때

$$n^2=(3a)^2=9a^2=3 \times 3a^2$$

$$\therefore f(3)=f(6)=f(9)=\cdots=0$$

(i)~(iii)에서

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{90} f(k) &= f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(90) \\ &= 30\{f(1)+f(2)+f(3)\} \\ &= 30(1+1+0)=60\end{aligned}$$

38 ㉮ 86

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 중 1이 a 개, 2가 b 개 있다고 하면

$$\sum_{k=1}^n a_k = 1 \times a + 2 \times b = 16$$

$$\therefore a+2b=16 \quad \text{.....㉠}$$

$$\sum_{k=1}^n a_k^2 = 1^2 \times a + 2^2 \times b = 26$$

$$\therefore a+4b=26 \quad \text{.....㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=6, b=5$

$$\therefore \sum_{k=1}^n a_k^4 = 1^4 \times 6 + 2^4 \times 5 = 6 + 80 = 86$$

39 ㉮ $9 \times 2^{10} + 1$

$a_n b_n = n \times 2^{n-1}$ 이므로 $S = \sum_{k=1}^{10} a_k b_k$ 라 하면

$$S = 1 \times 2^0 + 2 \times 2^1 + 3 \times 2^2 + \cdots + 10 \times 2^9 \quad \text{.....㉠}$$

㉠의 양변에 2를 곱하면

$$2S = 1 \times 2^1 + 2 \times 2^2 + 3 \times 2^3 + \cdots + 9 \times 2^9 + 10 \times 2^{10} \quad \text{.....㉡}$$

㉠-㉡을 하면

$$\begin{aligned}-S &= 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^9 - 10 \times 2^{10} \\ &= \frac{2^{10}-1}{2-1} - 10 \times 2^{10} \quad \text{첫째항이 1이고 공비가 2인 등비수열의} \\ &\quad \text{첫째항부터 제10항까지의 합} \\ &= -9 \times 2^{10} - 1\end{aligned}$$

$$\therefore S = \sum_{k=1}^{10} a_k b_k = 9 \times 2^{10} + 1$$

40 ㉮ 170

주어진 수열을 다음과 같이 나타내 보자.

$$(1), (3, 3), (5, 5, 5), (7, 7, 7, 7), (9, 9, 9, 9, 9), \dots$$

제1군 제2군 제3군 제4군 제5군

이때 제 n 군에 있는 각 항의 값은 $2n-1$ 이므로

$$2n-1=25 \quad \therefore n=13$$

즉 25는 제13군의 항이다.

제 n 군의 항의 개수는 n 이므로 제1군부터 제12군까지의 항의 개

$$\text{수는 } \sum_{k=1}^{12} k = \frac{12 \times 13}{2} = 78$$

따라서 25는 제79항부터 제91항까지 계속되므로

$$p=79, q=91 \quad \text{78+1} \quad \text{78+13}$$

$$\therefore p+q=79+91=170$$

41 ㉮ $\frac{7}{14}$

주어진 수열을 분모가 같은 항끼리 묶으면 다음과 같다.

$$\left(\frac{1}{1}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{3}{3}, \frac{5}{3}\right), \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{7}{4}\right), \dots$$

제1군 제2군 제3군 제4군

이때 제 n 군의 항의 개수는 n 이므로 제1군부터 제13군까지의 항의 개수는

$$\sum_{k=1}^{13} k = \frac{13 \times 14}{2} = 91$$

즉 제95항은 제14군의 4번째 항이다.

제14군은

$$\left(\frac{1}{14}, \frac{3}{14}, \frac{5}{14}, \frac{7}{14}, \dots, \frac{27}{14}\right)$$

이므로 제95항은 $\frac{7}{14}$ 이다.

42 ㉮ 119

위에서 1번째 줄의 1번째 칸에 있는 수는 $1=1^2$

위에서 3번째 줄의 1번째 칸에 있는 수는 $9=3^2$

위에서 5번째 줄의 1번째 칸에 있는 수는 $25=5^2$

:

위에서 $(2n-1)$ 번째 줄의 1번째 칸에 있는 수는 $(2n-1)^2$

따라서 위에서 11번째 줄의 1번째 칸에 있는 수는 $11^2=121$ 이므로

위에서 11번째 줄의 왼쪽에서 3번째 칸에 있는 수는

$$121-2=119$$

학교 시험 대비 문제

p.274~277

01 ㉮ 100

$$\sum_{k=1}^{198} a_{k+2} - \sum_{k=3}^{200} a_{k-1}$$

$$= (a_3 + a_4 + a_5 + \cdots + a_{200}) - (a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{199})$$

$$= a_{200} - a_2 = 107 - 7 = 100$$

02 ㉮ ㄱ, ㄷ

$$\text{ㄱ. } \sum_{k=1}^{30} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{29} + a_{30}$$

$$= (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{29}) + (a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{30})$$

$$= \sum_{k=1}^{15} a_{2k-1} + \sum_{k=1}^{15} a_{2k}$$

$$\text{ㄴ. } \sum_{k=1}^n 6^k = 6 + 6^2 + 6^3 + \cdots + 6^n, \sum_{k=0}^n 6^k = 1 + 6 + 6^2 + \cdots + 6^n$$

$$\therefore \sum_{k=1}^n 6^k \neq \sum_{k=0}^n 6^k$$

$$\text{ㄷ. } \sum_{i=2}^{21} (i-1)^6 = 1^6 + 2^6 + 3^6 + \cdots + 20^6 = \sum_{k=1}^{20} k^6$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

03 ㉮ ㉡

$$\sum_{k=1}^{10} (3a_k - 1)^2 = \sum_{k=1}^{10} (9a_k^2 - 6a_k + 1)$$

$$= 9 \sum_{k=1}^{10} a_k^2 - 6 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 1$$

$$= 9 \times 7 - 6 \times 4 + 1 \times 10$$

$$= 49$$

04 ㉓ ③

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{10} (2a_k + 1)^2 &= \sum_{k=1}^{10} (4a_k^2 + 4a_k + 1) \\
 &= 4 \sum_{k=1}^{10} a_k^2 + 4 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 1 \\
 &= 4 \sum_{k=1}^{10} a_k^2 + 4 \times 10 + 1 \times 10 \\
 &= 50 + 4 \sum_{k=1}^{10} a_k^2 \\
 \text{즉 } 50 + 4 \sum_{k=1}^{10} a_k^2 &= 170 \Rightarrow \text{므로 } 4 \sum_{k=1}^{10} a_k^2 = 120 \\
 \therefore \sum_{k=1}^{10} a_k^2 &= 30
 \end{aligned}$$

05 ㉓ 1023

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^6 a_k - \sum_{k=1}^5 (a_k + 1) &= a_6 + \sum_{k=1}^5 a_k - \sum_{k=1}^5 (a_k + 1) \\
 &= a_6 + \sum_{k=1}^5 \{a_k - (a_k + 1)\} \\
 &= a_6 + \sum_{k=1}^5 (-1) \\
 &= a_6 - 5 \\
 \text{즉 } a_6 - 5 &= 27 \Rightarrow \text{므로 } a_6 = 32 \\
 \text{등비수열 } \{a_n\} \text{의 공비를 } r \text{라 하면} \\
 a_6 &= a_1 r^{6-1} = 1 \times r^5 = r^5 = 32 \quad \therefore r = 2 \\
 \text{따라서 } a_n &= 1 \times 2^{n-1} = 2^{n-1} \Rightarrow \text{므로} \\
 \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} 2^{k-1} = \frac{1 \times (2^{10} - 1)}{2 - 1} \\
 &= 2^{10} - 1 = 1023
 \end{aligned}$$

06 ㉓ 210

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{20} k^2 + \sum_{k=2}^{20} k^2 + \sum_{k=3}^{20} k^2 + \cdots + \sum_{k=20}^{20} k^2 \\
 &= (1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 20^2) + (2^2 + 3^2 + 4^2 + \cdots + 20^2) \\
 &\quad + (3^2 + 4^2 + 5^2 + \cdots + 20^2) + \cdots + (19^2 + 20^2) + 20^2 \\
 &= 1^2 \times 1 + 2^2 \times 2 + 3^2 \times 3 + \cdots + 20^2 \times 20 \\
 &= 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 20^3 \\
 &= \sum_{k=1}^{20} k^3 = \left(\frac{20 \times 21}{2} \right)^2 = 210^2 \\
 \text{즉 } 210^2 &= x^2 \Rightarrow \text{므로 } x = 210 \quad (\because x > 0)
 \end{aligned}$$

07 ㉓ 55

다항식 $3x^2 - 5x + 2$ 를 일차식 $x - n$ 으로 나누었을 때의 나머지가 a_n 이므로 나머지정리에 의하여

$$a_n = 3n^2 - 5n + 2$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \sum_{k=1}^5 (a_k - k^2 + 2) &= \sum_{k=1}^5 (3k^2 - 5k + 2 - k^2 + 2) \\
 &= \sum_{k=1}^5 (2k^2 - 5k + 4) \\
 &= 2 \sum_{k=1}^5 k^2 - 5 \sum_{k=1}^5 k + \sum_{k=1}^5 4 \\
 &= 2 \times \frac{5 \times 6 \times 11}{6} - 5 \times \frac{5 \times 6}{2} + 4 \times 5 \\
 &= 110 - 75 + 20 = 55
 \end{aligned}$$

Lecture 나머지정리

다항식 $f(x)$ 를 일차식 $x - a$ 로 나누었을 때의 나머지를 R 라 하면 $R = f(a)$

08 ㉓ 940

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=1}^{10} \left\{ \sum_{k=1}^8 \left(2k + \frac{1}{2}j \right) \right\} &= \sum_{j=1}^{10} \left(2 \sum_{k=1}^8 k + \sum_{k=1}^8 \frac{1}{2}j \right) \\
 &= \sum_{j=1}^{10} \left(2 \times \frac{8 \times 9}{2} + \frac{1}{2}j \times 8 \right) \\
 &= \sum_{j=1}^{10} (72 + 4j) = \sum_{j=1}^{10} 72 + 4 \sum_{j=1}^{10} j \\
 &= 72 \times 10 + 4 \times \frac{10 \times 11}{2} \\
 &= 720 + 220 = 940
 \end{aligned}$$

09 ㉓ 6

$$\begin{aligned}
 \sum_{m=1}^n \left(\sum_{k=1}^m k \right) &= \sum_{m=1}^n \frac{m(m+1)}{2} = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^n (m^2 + m) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\sum_{m=1}^n m^2 + \sum_{m=1}^n m \right) \\
 &= \frac{1}{2} \times \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
 &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \\
 \text{즉 } \frac{n(n+1)(n+2)}{6} &= 56 \Rightarrow \text{므로} \\
 n(n+1)(n+2) &= 6 \times 7 \times 8 \\
 \therefore n &= 6
 \end{aligned}$$

10 ㉓ ③

수열 $1 \times 2, 3 \times 4, 5 \times 6, \dots, 19 \times 20$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$a_k = (2k-1) \times 2k = 4k^2 - 2k$$

$$\begin{aligned}
 \therefore 1 \times 2 + 3 \times 4 + 5 \times 6 + \cdots + 19 \times 20 \\
 &= \sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} (4k^2 - 2k) = 4 \sum_{k=1}^{10} k^2 - 2 \sum_{k=1}^{10} k \\
 &= 4 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - 2 \times \frac{10 \times 11}{2} \\
 &= 1540 - 110 \\
 &= 1430
 \end{aligned}$$

11 ㉓ ④

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{10} i \left(\frac{1}{i} + \frac{1}{i+1} + \frac{1}{i+2} + \cdots + \frac{1}{10} \right) \\
 &= \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{10} \right) + 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{10} \right) \\
 &\quad + 3 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{10} \right) + \cdots \\
 &\quad + 9 \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} \right) + 10 \times \frac{1}{10} \\
 &= \frac{1}{1} + \left(\frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{3} \right) + \cdots \\
 &\quad + \left(\frac{1}{10} + 2 \times \frac{1}{10} + 3 \times \frac{1}{10} + \cdots + 10 \times \frac{1}{10} \right) \\
 &= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} (1+2) + \frac{1}{3} (1+2+3) + \cdots \\
 &\quad + \frac{1}{10} (1+2+3+\cdots+10) \\
 &= \frac{1}{1} + \frac{1+2}{2} + \frac{1+2+3}{3} + \cdots + \frac{1+2+3+\cdots+10}{10} \\
 \text{이때 수열 } \frac{1}{1}, \frac{1+2}{2}, \frac{1+2+3}{3}, \dots, \frac{1+2+3+\cdots+10}{10} \text{의 제}
 \end{aligned}$$

k 항을 a_k 라 하면

$$a_k = \frac{1+2+3+\cdots+k}{k} = \frac{\frac{k(k+1)}{2}}{k} = \frac{k+1}{2}$$

$$\begin{aligned}\therefore (\text{주어진 식}) &= \sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} \frac{k+1}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{10 \times 11}{2} + 10 \right) = \frac{65}{2}\end{aligned}$$

12 ㉠ 7

수열 $1 \times (2n-1), 2 \times (2n-3), 3 \times (2n-5), \dots, n \times 1$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$a_k = k\{2n - (2k-1)\} = (2n+1)k - 2k^2$$

주어진 수열의 합은 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n \{(2n+1)k - 2k^2\} \\ &= (2n+1) \sum_{k=1}^n k - 2 \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= (2n+1) \times \frac{n(n+1)}{2} - 2 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ \therefore \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} &= 140 \text{ 이므로}\end{aligned}$$

$$n(n+1)(2n+1) = 7 \times 8 \times 15$$

$$\therefore n = 7$$

13 ㉠ ③

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n \text{ 이라 하면}$$

$$(i) n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = 1^2 + 1 = 2$$

$$(ii) n \geq 2 \text{ 일 때}$$

$$\begin{aligned}a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 + n - \{(n-1)^2 + (n-1)\} \\ &= 2n\end{aligned}$$

이때 $a_1 = 2$ 는 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n$$

$$\therefore a_{2k-1} = 2(2k-1) = 4k-2 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n a_{2k-1} &= \sum_{k=1}^n (4k-2) = 4 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 2 \\ &= 4 \times \frac{n(n+1)}{2} - 2n = 2n^2\end{aligned}$$

$$\text{따라서 } 2n^2 = 200 \text{ 이므로 } n^2 = 100$$

$$\therefore n = 10 \quad (\because n \text{은 자연수})$$

14 ㉠ ⑤

$$a_n = \frac{n+1}{n+1} C_{n-1} = \frac{n+1}{n+1} C_2 = \frac{n(n+1)}{2} \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{a_n} = \frac{2}{n(n+1)} = 2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{k=1}^{15} \frac{8}{a_k} &= 16 \sum_{k=1}^{15} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 16 \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{15} - \frac{1}{16} \right) \right\} \\ &= 16 \left(1 - \frac{1}{16} \right) = 15\end{aligned}$$

15 ㉠ ③

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}\frac{2k+1}{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2} &= \frac{2k+1}{\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}} = \frac{6}{k(k+1)} \\ &= 6 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2} &= 6 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 6 \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right\} \\ &= 6 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{6n}{n+1}\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{6n}{n+1} = \frac{180}{31} \text{ 이므로 } \frac{n}{n+1} = \frac{30}{31}$$

$$31n = 30n + 30 \quad \therefore n = 30$$

16 ㉠ - $\frac{20}{21}$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha_n + \beta_n = \frac{1}{n}, \alpha_n \beta_n = \frac{-n(n+1)}{n} = -n-1 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} &= \frac{\alpha_n + \beta_n}{\alpha_n \beta_n} = \frac{\frac{1}{n}}{-n-1} = -\frac{1}{n(n+1)} \\ &= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{n=1}^{20} \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} \right) &= \sum_{n=1}^{20} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \right) \\ &= \left(\frac{1}{2} - 1 \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) + \dots \\ &\quad + \left(\frac{1}{21} - \frac{1}{20} \right) \\ &= \frac{1}{21} - 1 = -\frac{20}{21}\end{aligned}$$

17 ㉠ 3

$$a_n = 25 + (n-1) \times 4 = 4n + 21 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} &= \frac{1}{\sqrt{4k+21} + \sqrt{4k+25}} \\ &= \frac{\sqrt{4k+21} - \sqrt{4k+25}}{(\sqrt{4k+21} + \sqrt{4k+25})(\sqrt{4k+21} - \sqrt{4k+25})} \\ &= \frac{\sqrt{4k+25} - \sqrt{4k+21}}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{k=1}^{66} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{66} (\sqrt{4k+25} - \sqrt{4k+21}) \\ &= \frac{1}{4} \{ (\sqrt{29} - \sqrt{25}) + (\sqrt{33} - \sqrt{29}) + (\sqrt{37} - \sqrt{33}) + \dots \\ &\quad + (\sqrt{289} - \sqrt{285}) \} \\ &= \frac{1}{4} (\sqrt{289} - \sqrt{25}) \\ &= \frac{1}{4} (17 - 5) = 3\end{aligned}$$

18 ㉔ 60

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k+1} + \sqrt{2k-1}} \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1}}{(\sqrt{2k+1} + \sqrt{2k-1})(\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1})} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1}) \\
 &= \frac{1}{2} \{(\sqrt{3}-1) + (\sqrt{5}-\sqrt{3}) + (\sqrt{7}-\sqrt{5}) + \dots \\
 &\quad + (\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1})\} \\
 &= \frac{1}{2}(\sqrt{2n+1} - 1) \\
 &\approx \frac{1}{2}(\sqrt{2n+1} - 1) = 5 \text{ 이므로 } \sqrt{2n+1} = 11 \\
 &2n+1 = 121, 2n = 120 \quad \therefore n = 60
 \end{aligned}$$

19 ㉔ 15

$$\begin{aligned}
 a_{2n-1}a_{2n} &= 2^n \times 5^n = 10^n \quad \dots\dots \textcircled{1} \\
 \therefore \sum_{k=1}^{10} \log a_k &= \log a_1 + \log a_2 + \log a_3 + \log a_4 + \dots + \log a_{10} \\
 &= (\log a_1 + \log a_2) + (\log a_3 + \log a_4) + \dots \\
 &\quad + (\log a_9 + \log a_{10}) \\
 &= \log a_1a_2 + \log a_3a_4 + \dots + \log a_9a_{10} \\
 &= \log 10 + \log 10^2 + \dots + \log 10^5 \quad (\because \textcircled{1}) \\
 &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
 \end{aligned}$$

다른 풀이

$$\begin{aligned}
 a_{2n-1} &= 2^n, a_{2n} = 5^n \text{ 이므로} \\
 \sum_{k=1}^{10} \log a_k &= \sum_{k=1}^5 (\log a_{2k-1} + \log a_{2k}) \\
 &= \sum_{k=1}^5 \log a_{2k-1} + \sum_{k=1}^5 \log a_{2k} \\
 &= \sum_{k=1}^5 \log 2^k + \sum_{k=1}^5 \log 5^k \\
 &= \sum_{k=1}^5 k \log 2 + \sum_{k=1}^5 k \log 5 \\
 &= \log 2 \sum_{k=1}^5 k + \log 5 \sum_{k=1}^5 k \\
 &= (\log 2 + \log 5) \sum_{k=1}^5 k \\
 &= \underbrace{(\log 2 + \log 5)}_{\log 2 + \log 5 = \log(2 \times 5) = \log 10 = 1} \sum_{k=1}^5 k \\
 &= \frac{5 \times 6}{2} = 15
 \end{aligned}$$

20 ㉔ 12

(i) $n=2$ 일 때
 -1 의 제곱근 중 실수인 것의 개수는 $f(2)=0$

(ii) $n=3$ 일 때
 0 의 세제곱근 중 실수인 것의 개수는 $f(3)=1$

(iii) $n \geq 4$ 인 짝수일 때
 $n-3 > 0$ 이므로 $(n-3)$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수는
 $f(n)=2$

(iv) $n \geq 4$ 인 홀수일 때
 $n-3 > 0$ 이므로 $(n-3)$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수는
 $f(n)=1$

(i)~(iv)에서
 $\sum_{n=2}^{10} f(n) = f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(9) + f(10)$
 $= 0 + 1 + 2 \times 4 + 1 \times 3 = 12$

21 ㉔ ③

각 줄을 군으로 묶으면 다음과 같다.

(1), (2, 3, 4), (5, 6, 7, 8, 9), ...
 제1군 제2군 제3군

이때 제 n 군의 항의 개수는 $2n-1$ 이므로 제1군부터 제9군까지의 항의 개수는

$$\sum_{k=1}^9 (2k-1) = 2 \sum_{k=1}^9 k - \sum_{k=1}^9 1 = 2 \times \frac{9 \times 10}{2} - 9 = 81$$

따라서 위에서 10번째 줄의 왼쪽에서 5번째에 있는 수는 제10군의 5번째 항이므로

$$81 + 5 = 86$$

서술형 1 ㉔ 1086

주어진 두 함수의 그래프의 교점의 x 좌표를 구하면

$$\log_3(2x+1) = \log_3(x+3^n) \text{에서 } 2x+1 = x+3^n$$

$$\therefore x = 3^n - 1, \text{ 즉 } a_n = 3^n - 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \sum_{k=1}^6 a_k &= \sum_{k=1}^6 (3^k - 1) \\
 &= \sum_{k=1}^6 3^k - \sum_{k=1}^6 1 \\
 &= \frac{3(3^6 - 1)}{3 - 1} - 1 \times 6 \\
 &= \frac{3^7 - 3}{2} - 6 \\
 &= 1092 - 6 \\
 &= 1086 \quad \dots\dots \textcircled{2}
 \end{aligned}$$

채점 기준	비율
① a_n 을 구할 수 있다.	40%
② $\sum_{k=1}^6 a_k$ 의 값을 구할 수 있다.	60%

서술형 2 ㉔ 11

$$\begin{aligned}
 f(a) &= \sum_{k=1}^{10} (2k-a)^2 \\
 &= \sum_{k=1}^{10} (4k^2 - 4ak + a^2) \\
 &= 4 \sum_{k=1}^{10} k^2 - 4a \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} a^2 \\
 &= 4 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - 4a \times \frac{10 \times 11}{2} + a^2 \times 10 \\
 &= 10a^2 - 220a + 1540 \quad \dots\dots \textcircled{1} \\
 &= 10(a-11)^2 + 330 \quad \dots\dots \textcircled{2}
 \end{aligned}$$

따라서 $f(a)$ 의 값은 $a=11$ 일 때 최소가 된다. $\dots\dots \textcircled{3}$

채점 기준	비율
① $f(a)$ 를 a 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50%
② $f(a)$ 를 완전제곱 꼴로 나타낼 수 있다.	20%
③ $f(a)$ 의 값이 최소가 되게 하는 a 의 값을 구할 수 있다.	30%

서술형 3 ㉔ $\frac{36}{55}$

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)(n) &= g(f(n)) = \frac{1}{f(n)-1} \\
 &= \frac{1}{(n+1)^2 - 1} \\
 &= \frac{1}{n(n+2)} \quad \dots\dots \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\therefore \sum_{k=1}^9 (g \circ f)(k) \\
&= \sum_{k=1}^9 \frac{1}{k(k+2)} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^9 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \quad \dots\dots ② \\
&= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \dots \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{10}\right) + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11}\right) \right\} \\
&= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{10} - \frac{1}{11} \right) \\
&= \frac{36}{55} \quad \dots\dots ③
\end{aligned}$$

채점 기준	비율
① $(g \circ f)(n)$ 을 n 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20%
② 부분분수로 변형할 수 있다.	30%
③ $\sum_{k=1}^9 (g \circ f)(k)$ 의 값을 구할 수 있다.	50%

10% 핵심 기출 문제

p. 278~279

01 ㉮ ⑤

$f(x) = \log_{\sqrt{2}} x$ 의 역함수는 $g(x) = (\sqrt{2})^x$
 $\neg$. $g(6) = (\sqrt{2})^6 = \{(\sqrt{2})^2\}^3 = 2^3 = 8$
 $\neg$. $f(2) = \log_{\sqrt{2}} 2 = \log_{\sqrt{2}} (\sqrt{2})^2 = 2$
 $f(4) = \log_{\sqrt{2}} 4 = \log_{\sqrt{2}} (\sqrt{2})^4 = 4$
 $f(8) = \log_{\sqrt{2}} 8 = \log_{\sqrt{2}} (\sqrt{2})^6 = 6$
즉 $f(2), f(4), f(8)$ 은 이 순서대로 공차가 2인 등차수열을 이룬다.

$$\begin{aligned}
\cap. \sum_{k=1}^n f(2^k) &= \sum_{k=1}^n \log_{\sqrt{2}} 2^k = \sum_{k=1}^n \log_{\sqrt{2}} (\sqrt{2})^{2k} \\
&= \sum_{k=1}^n 2k = 2 \sum_{k=1}^n k \\
&= 2 \times \frac{n(n+1)}{2} \\
&= n(n+1)
\end{aligned}$$

즉 $n(n+1) = 110 = 10 \times 11$ 이므로 $n = 10$

$$\begin{aligned}
\therefore \sum_{k=1}^n g(2k) &= \sum_{k=1}^{10} (\sqrt{2})^{2k} = \sum_{k=1}^{10} 2^k \\
&= \frac{2(2^{10} - 1)}{2 - 1} = 2046
\end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$, $\cap$ 이다.

02 ㉮ ②

$$\begin{aligned}
&\sum_{n=1}^{10} (2a_n - b_n) = 7, \sum_{n=1}^{10} (a_n + b_n) = 5 \text{이므로} \\
&\sum_{n=1}^{10} (2a_n - b_n) + \sum_{n=1}^{10} (a_n + b_n) = 7 + 5
\end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{10} \{ (2a_n - b_n) + (a_n + b_n) \} = 12$$

$$\sum_{n=1}^{10} 3a_n = 12, 3 \sum_{n=1}^{10} a_n = 12$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{10} a_n = 4 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\sum_{n=1}^{10} (a_n + b_n) = 5 \text{에서 } \sum_{n=1}^{10} a_n + \sum_{n=1}^{10} b_n = 5 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠을 ㉡에 대입하면 } 4 + \sum_{n=1}^{10} b_n = 5$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{10} b_n = 1$$

$$\begin{aligned}
\therefore \sum_{n=1}^{10} (a_n - 2b_n) &= \sum_{n=1}^{10} a_n - 2 \sum_{n=1}^{10} b_n \\
&= 4 - 2 \times 1 = 2
\end{aligned}$$

다른 풀이

$$\sum_{n=1}^{10} (2a_n - b_n) = 7, \sum_{n=1}^{10} (a_n + b_n) = 5 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{10} (a_n - 2b_n) &= \sum_{n=1}^{10} \{ (2a_n - b_n) - (a_n + b_n) \} \\
&= \sum_{n=1}^{10} (2a_n - b_n) - \sum_{n=1}^{10} (a_n + b_n) \\
&= 7 - 5 = 2
\end{aligned}$$

03 ㉮ ③

곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = \sqrt{n}x$ 가 만나는 점의 x 좌표를 구하면

$$x^2 = \sqrt{n}x \text{에서 } x^2 - \sqrt{n}x = 0$$

$$x(x - \sqrt{n}) = 0 \quad \therefore x = 0 \text{ 또는 } x = \sqrt{n}$$

즉 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = \sqrt{n}x$ 가 만나는 서로 다른 두 점의 좌표는

$$(0, 0), (\sqrt{n}, n) \text{이므로}$$

$$\{f(n)\}^2 = (\sqrt{n} - 0)^2 + (n - 0)^2$$

$$= n + n^2$$

$$= n(n+1)$$

$$\begin{aligned}
\therefore \sum_{n=1}^{10} \frac{1}{\{f(n)\}^2} &= \sum_{n=1}^{10} \frac{1}{n(n+1)} \\
&= \sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\
&= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots \\
&\quad + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{11} \right) \\
&= 1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}
\end{aligned}$$

04 ㉮ 105

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n}{2} \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^n b_k = 2 \sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n 2k \quad \therefore b_k = 2k \quad \dots\dots ㉠$$

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k - 5 \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n (a_k - 5) b_k = \frac{n^2(n+1)^2}{2} \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - 5) b_k = 2 \sum_{k=1}^n k^3 = \sum_{k=1}^n 2k^3$$

$$\therefore (a_k - 5) b_k = 2k^3 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠을 ㉡에 대입하면 } (a_k - 5) \times 2k = 2k^3$$

$$a_k - 5 = k^2 \quad \therefore a_k = k^2 + 5$$

$$\therefore a_{10} = 10^2 + 5 = 105$$

다른 풀이

(가)에서 $S_n = \sum_{k=1}^n b_k = n^2 + n$ 이라 하면

(i) $n=1$ 일 때, $b_1 = S_1 = 1^2 + 1 = 2$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} b_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 + n - \{(n-1)^2 + (n-1)\} \\ &= 2n \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 $b_1 = 2$ 는 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$b_n = 2n \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

(나)에서 $\sum_{k=1}^n a_k b_k - 5 \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n (a_k - 5)b_k$ 이므로

$$S'_n = \sum_{k=1}^n (a_k - 5)b_k = \frac{n^2(n+1)^2}{2} \text{이라 하면}$$

(iii) $n=1$ 일 때, $(a_1 - 5)b_1 = S'_1 = \frac{1^2 \times 2^2}{2} = 2$

(iv) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} (a_n - 5)b_n &= S'_n - S'_{n-1} \\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{2} - \frac{(n-1)^2 n^2}{2} \\ &= 2n^3 \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

이때 $(a_1 - 5)b_1 = 2$ 는 ㉡에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$(a_n - 5)b_n = 2n^3 \quad \dots\dots \textcircled{10}$$

㉡을 ㉡에 대입하면 $(a_n - 5) \times 2n = 2n^3$

$$a_n - 5 = n^2 \quad \therefore a_n = n^2 + 5$$

$$\therefore a_{10} = 10^2 + 5 = 105$$

05 ㉢ ㉠

$\angle BOA = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\overline{AB}$ 는 원의 지름이다.

원의 중심을 C라 하면 점 C는 $\overline{AB}$ 의 중점이고 $\overline{OB} = 2n$ 이므로 점 C의 y좌

표는 n 이다. 점 C는 직선 $y = \frac{n}{n+1}x$

위의 점이므로 점 C의 좌표는 $(n+1, n)$

즉 $\overline{OA} = 2(n+1)$, $\overline{OB} = 2n$ 이므로 $\triangle OAB$ 의 넓이 S_n 은

$$S_n = \frac{1}{2} \times 2n \times 2(n+1) = 2n(n+1)$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{n=1}^{10} \frac{1}{S_n} &= \sum_{n=1}^{10} \frac{1}{2n(n+1)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{11} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{11} \right) = \frac{5}{11} \end{aligned}$$

06 ㉢ ㉢

ㄱ. $P_1(0, 0)$, $P_2(x_2, x_2^2)$ 이고 직선 P_1P_2 의 기울기가 a_1 이므로

$$a_1 = \frac{x_2^2 - 0}{x_2 - 0} = x_2 = 3$$

ㄴ. 직선 P_nP_{n+1} 의 기울기 a_n 은

$$a_n = \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2}{x_{n+1} - x_n} = \frac{(x_{n+1} + x_n)(x_{n+1} - x_n)}{x_{n+1} - x_n} = x_{n+1} + x_n$$

(가), (나)에서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 3이고 공차가 $d(d > 3)$ 인 등차수열이므로

$$a_n = x_{n+1} + x_n = 3 + (n-1)d \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

㉠에 $n=1, 2, 3, \dots$ 을 차례로 대입하면

$$x_2 = 3, x_3 = d, x_4 = 3 + d, x_5 = 2d, x_6 = 3 + 2d, x_7 = 3d, \dots$$

즉 $x_{2n} = 3 + (n-1)d$, $x_{2n-1} = (n-1)d$ 이므로

$$x_{20} = 3 + 9d, x_{19} = 9d$$

$$\therefore x_{20} = x_{19} + 3$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{10} (x_{2k+1} - x_{2k}) &= (x_3 - x_2) + (x_5 - x_4) + (x_7 - x_6) + \dots + (x_{21} - x_{20}) \\ &= (d - 3) + (d - 3) + (d - 3) + \dots + (d - 3) \\ &= 10(d - 3) \end{aligned}$$

$$10(d - 3) \leq 100 \text{이므로 } d - 3 \leq 10 \quad \therefore d \leq 13$$

즉 d 의 최댓값은 13이다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

07 ㉢ ㉢

곡선 $y = 4^x$ 위의 점 P의 좌표를 $(a_n, 4^{a_n})$ 이라 하면 $\triangle OAP$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \sqrt[3]{2} \times 4^{a_n} = 2^{-1} \times 2^{\frac{1}{3}} \times 2^{2a_n} = 2^{2a_n - \frac{2}{3}}$$

이때 $\triangle OAP = 4^n$ 이므로 $2^{2a_n - \frac{2}{3}} = 4^n = 2^{2n}$

$$2a_n - \frac{2}{3} = 2n \quad \therefore a_n = n + \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^9 a_k &= \sum_{k=1}^9 \left(k + \frac{1}{3} \right) = \sum_{k=1}^9 k + \sum_{k=1}^9 \frac{1}{3} \\ &= \frac{9 \times 10}{2} + \frac{1}{3} \times 9 = 48 \end{aligned}$$

08 ㉢ ㉤

$$a_n = n + 1 \sqrt[n+2]{4} = (2^{\frac{2}{n+2}})^{\frac{1}{n+1}} = 2^{\frac{2}{(n+1)(n+2)}}$$

$$\log_2 a_k = \log_2 2^{\frac{2}{(k+1)(k+2)}} = \frac{2}{(k+1)(k+2)}$$

$$= 2 \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right)$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{10} \log_2 a_k &= 2 \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= 2 \left\{ \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{12} \right) \right\} \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{12} \right) = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

09 ㉢ 24

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_{26} = 30 \text{에서 } a_1 + 25d = 30 \quad \therefore a_1 = 30 - 25d \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{13} \{(a_{2n})^2 - (a_{2n-1})^2\} &= \sum_{n=1}^{13} (a_{2n} - a_{2n-1})(a_{2n} + a_{2n-1}) \\ &\quad \text{공차가 } d \text{이므로 } a_{2n} - a_{2n-1} = d \\ &= \sum_{n=1}^{13} d(a_{2n} + a_{2n-1}) \end{aligned}$$

$$= d \{ (a_2 + a_1) + (a_4 + a_3) + (a_6 + a_5) + \dots + (a_{26} + a_{25}) \}$$

$$= d(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{26})$$

$$= d \times \frac{26(a_1 + a_{26})}{2} \quad \text{첫째항이 } a_1, \text{ 끝항이 } a_{26}, \text{ 항수가 } 26 \text{인 등차수열의 합}$$

$$= 13d(a_1 + 30)$$

즉 $13d(a_1+30)=260$ 이므로

$$d(a_1+30)=20 \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

$\textcircled{I}$ 을 $\textcircled{L}$ 에 대입하면 $d(30-25d+30)=20$

$$25d^2-60d+20=0, 5d^2-12d+4=0$$

$$(5d-2)(d-2)=0$$

$$\therefore d=\frac{2}{5} \text{ 또는 } d=2$$

(i) $d=\frac{2}{5}$ 일 때

$\textcircled{I}$ 에서 $a_1=30-25\times\frac{2}{5}=20$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수이다.

(ii) $d=2$ 일 때

$\textcircled{I}$ 에서 $a_1=30-25\times 2=-20$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수인 것에 모순이다.

(i), (ii)에서 $a_1=20, d=\frac{2}{5}$ 이므로

$$a_{11}=20+10\times\frac{2}{5}=24$$

10 ㉡ ②

(i) $m=1$ 일 때

$$f(1)=\log_2 1=0$$

(ii) $m=2^{n-1}(n\geq 2)$ 일 때

$$f(2^{n-1})=\log_4 2^{n-1}=\frac{n-1}{2}$$

(i), (ii)에서 $f(1)=0, f(2^{n-1})=\frac{n-1}{2}$ 은 모두 유리수이므로 일반항 a_n 은

$$a_1=0, a_n=\frac{n-1}{2}(n\geq 2)$$

이때 $a_1=0$ 은 $a_n=\frac{n-1}{2}$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n=\frac{n-1}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n \frac{k-1}{2} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (k-1) = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{n(n+1)}{2} - n \right\} = \frac{1}{2} \times \frac{n(n-1)}{2} \\ &= \frac{n(n-1)}{4} \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^n a_k > 50 \text{이므로 } \frac{n(n-1)}{4} > 50$$

$$\therefore n(n-1) > 200 \quad \dots\dots \textcircled{I}$$

$$n=14 \text{일 때, } n(n-1)=14\times 13=182$$

$$n=15 \text{일 때, } n(n-1)=15\times 14=210$$

따라서 $n\geq 15$ 일 때 부등식 $\textcircled{I}$ 이 성립하므로 자연수 n 의 최솟값은 15이다.

참고 (1) m 이 3 이상인 홀수일 때, $f(m)$ 의 값은 유리수가 아니다.

$$(2) m=2 \text{일 때, } f(2)=\log_4 2=\frac{1}{2}$$

$$m=4=2^2 \text{일 때, } f(4)=\log_4 4=1$$

$$m=6 \text{일 때, } f(6)=\log_4 6$$

$$m=8=2^3 \text{일 때, } f(8)=\log_4 8=\frac{3}{2}$$

$$m=10 \text{일 때, } f(10)=\log_4 10$$

$\vdots$

따라서 m 이 2의 거듭제곱일 때, $f(m)$ 의 값은 유리수이다.

11 수학적 귀납법

III 수열

개념 완성하기

p.283~284

01 ㉠ 45

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 3a_n + n \text{에서} \\ a_2 &= 3a_1 + 1 = 3 \times 1 + 1 = 4 \\ a_3 &= 3a_2 + 2 = 3 \times 4 + 2 = 14 \\ \therefore a_4 &= 3a_3 + 3 = 3 \times 14 + 3 = 45 \end{aligned}$$

02 ㉠ $\frac{41}{6}$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + \frac{1}{n} \text{에서} \\ a_2 &= a_1 + \frac{1}{1} = 5 + 1 = 6 \\ a_3 &= a_2 + \frac{1}{2} = 6 + \frac{1}{2} = \frac{13}{2} \\ \therefore a_4 &= a_3 + \frac{1}{3} = \frac{13}{2} + \frac{1}{3} = \frac{41}{6} \end{aligned}$$

03 ㉠ -27

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2a_n - n \text{에서} \\ a_2 &= 2a_1 - 1 = 2 \times (-2) - 1 = -5 \\ a_3 &= 2a_2 - 2 = 2 \times (-5) - 2 = -12 \\ \therefore a_4 &= 2a_3 - 3 = 2 \times (-12) - 3 = -27 \end{aligned}$$

04 ㉠ 6

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= na_n \text{에서} \\ a_2 &= 1 \times a_1 = 1 \times 1 = 1 \\ a_3 &= 2 \times a_2 = 2 \times 1 = 2 \\ \therefore a_4 &= 3 \times a_3 = 3 \times 2 = 6 \end{aligned}$$

05 ㉠ 57

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= n^2 a_n + n \text{에서} \\ a_2 &= 1^2 a_1 + 1 = 1 \times 0 + 1 = 1 \\ a_3 &= 2^2 a_2 + 2 = 4 \times 1 + 2 = 6 \\ \therefore a_4 &= 3^2 a_3 + 3 = 9 \times 6 + 3 = 57 \end{aligned}$$

06 ㉠ 5

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= a_{n+1} + a_n \text{에서} \\ a_3 &= a_2 + a_1 = 2 + 1 = 3 \\ \therefore a_4 &= a_3 + a_2 = 3 + 2 = 5 \end{aligned}$$

07 ㉠ -9

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= a_{n+1} a_n \text{에서} \\ a_3 &= a_2 a_1 = 3 \times (-1) = -3 \\ \therefore a_4 &= a_3 a_2 = -3 \times 3 = -9 \end{aligned}$$

08 ㉠ $a_1=2, a_{n+1}-a_n=3 (n=1, 2, 3, \dots)$

첫째항 a_1 은 $a_1=2$ 이고, 이웃하는 항들 사이의 관계를 살펴보면

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 &= 5 - 2 = 3 \\ a_3 - a_2 &= 8 - 5 = 3 \\ a_4 - a_3 &= 11 - 8 = 3 \\ &\vdots \\ \therefore a_{n+1} - a_n &= 3 \end{aligned}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의는
 $a_1=2, a_{n+1}-a_n=3 (n=1, 2, 3, \dots)$

09 ㉠ $a_1=-9, a_{n+1}-a_n=4 (n=1, 2, 3, \dots)$

첫째항 a_1 은 $a_1=-9$ 이고, 이웃하는 항들 사이의 관계를 살펴보면

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 &= -5 - (-9) = 4 \\ a_3 - a_2 &= -1 - (-5) = 4 \\ a_4 - a_3 &= 3 - (-1) = 4 \\ &\vdots \\ \therefore a_{n+1} - a_n &= 4 \end{aligned}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의는
 $a_1=-9, a_{n+1}-a_n=4 (n=1, 2, 3, \dots)$

10 ㉠ $a_1=6, a_{n+1}-a_n=-5 (n=1, 2, 3, \dots)$

첫째항 a_1 은 $a_1=6$ 이고, 이웃하는 항들 사이의 관계를 살펴보면

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 &= 1 - 6 = -5 \\ a_3 - a_2 &= -4 - 1 = -5 \\ a_4 - a_3 &= -9 - (-4) = -5 \\ &\vdots \\ \therefore a_{n+1} - a_n &= -5 \end{aligned}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의는
 $a_1=6, a_{n+1}-a_n=-5 (n=1, 2, 3, \dots)$

11 ㉠ $a_1=17, a_{n+1}-a_n=-2 (n=1, 2, 3, \dots)$

첫째항 a_1 은 $a_1=17$ 이고, 이웃하는 항들 사이의 관계를 살펴보면

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 &= 15 - 17 = -2 \\ a_3 - a_2 &= 13 - 15 = -2 \\ a_4 - a_3 &= 11 - 13 = -2 \\ &\vdots \\ \therefore a_{n+1} - a_n &= -2 \end{aligned}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의는
 $a_1=17, a_{n+1}-a_n=-2 (n=1, 2, 3, \dots)$

12 ㉠ $a_n=3n-1$

$a_{n+1}-a_n=3$ 에서 주어진 수열은 공차가 3인 등차수열이다.
 이때 첫째항이 $a_1=2$ 이므로
 $a_n=2+(n-1) \times 3=3n-1$

13 ㉠ $a_n=-2n+5$

$a_{n+1}-a_n=-2$ 에서 주어진 수열은 공차가 -2인 등차수열이다.
 이때 첫째항이 $a_1=3$ 이므로
 $a_n=3+(n-1) \times (-2)=-2n+5$

14 ㉠ $a_n=-4n+9$

$a_{n+1}-a_n=-4$ 에서 주어진 수열은 공차가 -4인 등차수열이다.
 이때 첫째항이 $a_1=5$ 이므로
 $a_n=5+(n-1) \times (-4)=-4n+9$

15 $a_n = 4n - 2$

$2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 에서 주어진 수열은 등차수열이고, 공차는

$$a_2 - a_1 = 6 - 2 = 4$$

이때 첫째항이 $a_1 = 2$ 이므로

$$a_n = 2 + (n-1) \times 4 = 4n - 2$$

16 $a_n = -3n + 7$

$2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 에서 주어진 수열은 등차수열이고, 공차는

$$a_1 = 4, a_2 - a_1 = 1 - 4 = -3$$

이때 첫째항이 $a_1 = 4$ 이므로

$$a_n = 4 + (n-1) \times (-3) = -3n + 7$$

17 $a_n = 2n$

$2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 에서 주어진 수열은 등차수열이고, 공차는

$$a_1 = 2, a_2 - a_1 = 4 - 2 = 2$$

이때 첫째항이 $a_1 = 2$ 이므로

$$a_n = 2 + (n-1) \times 2 = 2n$$

18 $a_n = -5n + 8$

$a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$ 에서 주어진 수열은 등차수열이고, 공차는

$$a_2 - a_1 = -2 - 3 = -5$$

이때 첫째항이 $a_1 = 3$ 이므로

$$a_n = 3 + (n-1) \times (-5) = -5n + 8$$

19 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n (n=1, 2, 3, \dots)$

첫째항 a_1 은 $a_1 = 1$ 이고, 이웃하는 항들 사이의 관계를 살펴보면

$$a_2 \div a_1 = 3 \div 1 = 3$$

$$a_3 \div a_2 = 9 \div 3 = 3$$

$$a_4 \div a_3 = 27 \div 9 = 3$$

$\vdots$

$$\therefore a_{n+1} \div a_n = 3$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의는

$$a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n (n=1, 2, 3, \dots)$$

20 $a_1 = 1000, a_{n+1} = \frac{1}{10}a_n (n=1, 2, 3, \dots)$

첫째항 a_1 은 $a_1 = 1000$ 이고, 이웃하는 항들 사이의 관계를 살펴보면

$$a_2 \div a_1 = 100 \div 1000 = \frac{1}{10}$$

$$a_3 \div a_2 = 10 \div 100 = \frac{1}{10}$$

$$a_4 \div a_3 = 1 \div 10 = \frac{1}{10}$$

$\vdots$

$$\therefore a_{n+1} \div a_n = \frac{1}{10}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의는

$$a_1 = 1000, a_{n+1} = \frac{1}{10}a_n (n=1, 2, 3, \dots)$$

21 $a_1 = 2, a_{n+1} = -2a_n (n=1, 2, 3, \dots)$

첫째항 a_1 은 $a_1 = 2$ 이고, 이웃하는 항들 사이의 관계를 살펴보면

$$a_2 \div a_1 = -4 \div 2 = -2$$

$$a_3 \div a_2 = 8 \div (-4) = -2$$

$$a_4 \div a_3 = -16 \div 8 = -2$$

$\vdots$

$$\therefore a_{n+1} \div a_n = -2$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의는

$$a_1 = 2, a_{n+1} = -2a_n (n=1, 2, 3, \dots)$$

22 $a_1 = 16, a_{n+1} = -\frac{1}{4}a_n (n=1, 2, 3, \dots)$

첫째항 a_1 은 $a_1 = 16$ 이고, 이웃하는 항들 사이의 관계를 살펴보면

$$a_2 \div a_1 = -4 \div 16 = -\frac{1}{4}$$

$$a_3 \div a_2 = 1 \div (-4) = -\frac{1}{4}$$

$$a_4 \div a_3 = -\frac{1}{4} \div 1 = -\frac{1}{4}$$

$\vdots$

$$\therefore a_{n+1} \div a_n = -\frac{1}{4}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의는

$$a_1 = 16, a_{n+1} = -\frac{1}{4}a_n (n=1, 2, 3, \dots)$$

23 $a_n = 3^{n-1}$

$a_{n+1} \div a_n = 3$ 에서 주어진 수열은 공비가 3인 등비수열이다.

이때 첫째항이 $a_1 = 1$ 이므로

$$a_n = 1 \times 3^{n-1} = 3^{n-1}$$

24 $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}$

$a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n$ 에서 주어진 수열은 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열이다.

이때 첫째항이 $a_1 = 3$ 이므로

$$a_n = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}$$

25 $a_n = (\sqrt{3})^{n-1}$

$a_{n+1} = \sqrt{3}a_n$ 에서 주어진 수열은 공비가 $\sqrt{3}$ 인 등비수열이다.

이때 첫째항이 $a_1 = 1$ 이므로

$$a_n = 1 \times (\sqrt{3})^{n-1} = (\sqrt{3})^{n-1}$$

26 $a_n = 6 \times (-2)^{n-1}$

$a_{n+1} = -2a_n$ 에서 주어진 수열은 공비가 -2 인 등비수열이다.

이때 첫째항이 $a_1 = 6$ 이므로

$$a_n = 6 \times (-2)^{n-1}$$

27 $a_n = 6 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 에서 주어진 수열은 등비수열이고, 공비는

$$a_2 \div a_1 = -3 \div 6 = -\frac{1}{2}$$

이때 첫째항이 $a_1 = 6$ 이므로

$$a_n = 6 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

28 ㉡ $a_n = 4^{n-3}$

$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 에서 주어진 수열은 등비수열이고, 공비는

$$a_2 \div a_1 = \frac{1}{4} \div \frac{1}{16} = 4$$

이때 첫째항이 $a_1 = \frac{1}{16}$ 이므로

$$a_n = \frac{1}{16} \times 4^{n-1} = 4^{n-3}$$

29 ㉡ $a_n = 4^{n-1}$

$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 에서 주어진 수열은 등비수열이고, 공비는

$$a_2 \div a_1 = 4 \div 1 = 4$$

이때 첫째항이 $a_1 = 1$ 이므로

$$a_n = 1 \times 4^{n-1} = 4^{n-1}$$

30 ㉡ $a_n = 2 \times (-1)^{n-1}$

$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 에서 주어진 수열은 등비수열이고, 공비는

$$a_2 \div a_1 = (-2) \div 2 = -1$$

이때 첫째항이 $a_1 = 2$ 이므로

$$a_n = 2 \times (-1)^{n-1}$$

31 ㉡ 170

$a_{n+1} = a_n + 4n - 1$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 9를 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$\begin{aligned} & \begin{aligned} & \cancel{a_2} = a_1 + 4 \times 1 - 1 \\ & \cancel{a_3} = \cancel{a_2} + 4 \times 2 - 1 \\ & \cancel{a_4} = \cancel{a_3} + 4 \times 3 - 1 \\ & \vdots \\ & + \left) \begin{aligned} & a_{10} = \cancel{a_9} + 4 \times 9 - 1 \end{aligned} \end{aligned} \\ & a_{10} = a_1 + \sum_{k=1}^9 (4k-1) \\ & = -1 + 4 \sum_{k=1}^9 k - \sum_{k=1}^9 1 \\ & = -1 + 4 \times \frac{9 \times 10}{2} - 1 \times 9 \\ & = -1 + 180 - 9 = 170 \end{aligned}$$

32 ㉡ $\frac{3^{10}+9}{2}$

$a_{n+1} = a_n + 3^n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 9를 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$\begin{aligned} & \begin{aligned} & \cancel{a_2} = a_1 + 3^1 \\ & \cancel{a_3} = \cancel{a_2} + 3^2 \\ & \cancel{a_4} = \cancel{a_3} + 3^3 \\ & \vdots \\ & + \left) \begin{aligned} & a_{10} = \cancel{a_9} + 3^9 \end{aligned} \end{aligned} \\ & a_{10} = a_1 + \sum_{k=1}^9 3^k = 6 + \frac{3(3^9-1)}{3-1} \\ & = \frac{3^{10}+9}{2} \end{aligned}$$

33 ㉡ $\frac{2}{19}$

$a_{n+1} = \frac{2n-1}{2n+1} a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 9를 차례로 대입한 후 변끼리 곱하면

$$\begin{aligned} & \begin{aligned} & \cancel{a_2} = \frac{1}{3} a_1 \\ & \cancel{a_3} = \frac{3}{5} \cancel{a_2} \\ & \cancel{a_4} = \frac{5}{7} \cancel{a_3} \\ & \vdots \\ & \times \left) \begin{aligned} & a_{10} = \frac{17}{19} \cancel{a_9} \end{aligned} \end{aligned} \\ & a_{10} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{5}{7} \times \cdots \times \frac{17}{19} a_1 \\ & = \frac{1}{19} \times 2 = \frac{2}{19} \end{aligned}$$

34 ㉡ $\frac{11}{2}$

$a_{n+1} = \frac{n+2}{n+1} a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 9를 차례로 대입한 후 변끼리 곱하면

$$\begin{aligned} & \begin{aligned} & \cancel{a_2} = \frac{3}{2} a_1 \\ & \cancel{a_3} = \frac{4}{3} \cancel{a_2} \\ & \cancel{a_4} = \frac{5}{4} \cancel{a_3} \\ & \vdots \\ & \times \left) \begin{aligned} & a_{10} = \frac{11}{10} \cancel{a_9} \end{aligned} \end{aligned} \\ & a_{10} = \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{5}{4} \times \cdots \times \frac{11}{10} a_1 \\ & = \frac{11}{2} \times 1 = \frac{11}{2} \end{aligned}$$

35 ㉡ 2^{45}

$a_{n+1} = 2^n a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 9를 차례로 대입한 후 변끼리 곱하면

$$\begin{aligned} & \begin{aligned} & \cancel{a_2} = 2^1 a_1 \\ & \cancel{a_3} = 2^2 \cancel{a_2} \\ & \cancel{a_4} = 2^3 \cancel{a_3} \\ & \vdots \\ & \times \left) \begin{aligned} & a_{10} = 2^9 \cancel{a_9} \end{aligned} \end{aligned} \\ & a_{10} = 2^1 \times 2^2 \times 2^3 \times \cdots \times 2^9 \times a_1 \\ & = 2^{1+2+3+\cdots+9} \times 1 = 2^{\frac{9 \times 10}{2}} = 2^{45} \end{aligned}$$

36 ㉡ (가) $2k+1$ (나) $(k+1)^2$

$n=k$ 일 때, ㉠이 성립한다고 가정하면

$$1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2 \quad \cdots \text{㉡}$$

이므로 ㉡의 양변에 $\boxed{\text{가}} 2k+1$ 을 더하면

$$\begin{aligned} & 1+3+5+\cdots+(2k-1)+\boxed{\text{가}} 2k+1 \\ & = k^2 + \boxed{\text{가}} 2k+1 = \boxed{\text{나}} (k+1)^2 \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ㉠이 성립한다.

37 ㉡ 풀이 참조

(i) $n=1$ 일 때

(좌변) $=2$, (우변) $=1 \times 2 = 2$ 이므로 ㉠이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, ㉠이 성립한다고 가정하면

$$2+4+6+\cdots+2k=k(k+1) \quad \cdots \text{㉡}$$

이므로 ㉔의 양변에 $2(k+1)$ 을 더하면

$$\begin{aligned} &2+4+6+\cdots+2k+2(k+1) \\ &=k(k+1)+2(k+1) \\ &=(k+1)(k+2) \end{aligned}$$

즉 $n=k+1$ 일 때도 ㉔이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 ㉔이 성립한다.

유형 완성하기

p.285~298

01 ㉔ ①

$a_{n+1}-a_n=-4$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 -4 인 등차수열이다.

이때 첫째항이 $a_1=46$ 이므로

$$a_n=46+(n-1)\times(-4)=-4n+50$$

$$a_k=-2\text{에서 }-4k+50=-2$$

$$4k=52 \quad \therefore k=13$$

01-1 ㉔ ③

$a_{n+1}+3=a_n$ 에서 $a_{n+1}-a_n=-3$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 -3 인 등차수열이다.

이때 첫째항이 $a_1=100$ 이므로

$$a_n=100+(n-1)\times(-3)=-3n+103$$

즉 $a_6=-3\times 6+103=85$, $a_{10}=-3\times 10+103=73$ 이므로

$$a_6-a_{10}=85-73=12$$

02 ㉔ 70

$a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n=0$ 에서 $2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

이때 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_2=a+d=-1 \quad \dots\dots ㉔$$

$$a_3=a+2d=2 \quad \dots\dots ㉕$$

㉔, ㉕을 연립하여 풀면 $a=-4$, $d=3$

$$\therefore a_n=-4+(n-1)\times 3=3n-7$$

$$a_n>200\text{에서 }3n-7>200$$

$$3n>207 \quad \therefore n>69$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 70이다.

02-1 ㉔ ④

$a_{n+1}=\frac{a_n+a_{n+2}}{2}$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

이때 첫째항이 $a_1=-20$, 공차가 $a_2-a_1=-10-(-20)=10$ 이므로

$$a_n=-20+(n-1)\times 10=10n-30$$

$$\therefore a_{10}=10\times 10-30=70$$

03 ㉔ 222

$2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다. ①

이때 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_2=a+d=5 \quad \dots\dots ㉔$$

$$a_4=a+3d=11 \quad \dots\dots ㉕$$

㉔, ㉕을 연립하여 풀면 $a=2$, $d=3$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2, 공차가 3인 등차수열이므로

$$a_n=2+(n-1)\times 3=3n-1 \quad \dots\dots ②$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{12} a_k = \sum_{k=1}^{12} (3k-1)$$

$$=3\times \frac{12\times 13}{2}-1\times 12$$

$$=234-12=222 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 주어진 관계식이 등차수열을 나타내는 식임을 알 수 있다.	20%
② 일반항 a_n 을 구할 수 있다.	40%
③ $\sum_{k=1}^{12} a_k$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

03-1 ㉔ ②

$a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n=0$ 에서 $2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

이때 첫째항이 $a_1=-62$, 공차가 $a_2-a_1=-58-(-62)=4$ 이므로

$$a_n=-62+(n-1)\times 4=4n-66$$

$$4n-66>0\text{에서 }4n>66 \quad \therefore n>16.5$$

따라서 제17항부터 양수이므로 제16항까지의 합이 최소가 된다.

$$\therefore n=16$$

04 ㉔ 256

$a_{n+1}=-2a_n$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 -2 인 등비수열이다.

이때 $a_1=a_2+3$ 에서 $a_1=-2a_1+3$

$$3a_1=3 \quad \therefore a_1=1$$

따라서 $a_n=1\times(-2)^{n-1}=(-2)^{n-1}$ 이므로

$$a_9=(-2)^8=256$$

04-1 ㉔ ⑤

$a_{n+1}=2a_n$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 2인 등비수열이다.

이때 $a_1=a_2-1$ 에서 $a_1=2a_1-1$

$$\therefore a_1=1$$

따라서 $a_n=1\times 2^{n-1}=2^{n-1}$ 이므로

$$a_{10}=2^9=512$$

05 ㉔ ②

$a_{n+1}=4a_n$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 4인 등비수열이다.

이때 첫째항이 $a_1=2$ 이므로 $a_n=2\times 4^{n-1}$

$$2\times 4^{n-1}>1000\text{에서 }4^{n-1}>500$$

$$4^4=256, 4^5=1024\text{이므로}$$

$$n-1\geq 5 \quad \therefore n\geq 6$$

따라서 처음으로 1000보다 커지는 항은 제6항이다.

05-1 ㉔ 113

$a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 $\frac{2}{3}$ 인 등비수열이다.

이때 첫째항이 $a_1=3$ 이므로

$$a_n=3\times\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

$$\therefore a_6=3\times\left(\frac{2}{3}\right)^5=\frac{32}{81}$$

따라서 $p=81$, $q=32$ 이므로

$$p+q=81+32=113$$

06 50

이차방정식 $a_n x^2 - 2a_{n+1}x + a_{n+2} = 0$ 이 중근을 가지므로 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2} = 0 \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다.

이때 첫째항이 $a_1 = 2$, 공비가 $\frac{a_2}{a_1} = \frac{1}{2}$ 이므로

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}$$

주어진 이차방정식에서 근의 공식에 의하여

$$x = \frac{a_{n+1} \pm \sqrt{a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2}}}{a_n} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (\because ①)$$

$$= \frac{1}{2} \quad (\text{중근})$$

이때 주어진 이차방정식의 중근이 b_n 이므로 $b_n = \frac{1}{2}$

$$\therefore \sum_{k=1}^{100} b_k = \sum_{k=1}^{100} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 100 = 50$$

다른 풀이

위의 풀이 과정에서 첫째항이 2, 공비가 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$a_n = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

$$\therefore a_{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}, a_{n+2} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

따라서 주어진 이차방정식은

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} x^2 - 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} x + \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

이 식의 양변에 2^n 을 곱하면 $4x^2 - 4x + 1 = 0$

$$(2x-1)^2 = 0 \quad \therefore x = b_n = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{100} b_k = \sum_{k=1}^{100} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 100 = 50$$

06-1 25

$2 \log a_{n+1} = \log a_n + \log a_{n+2}$ 에서

$$\log a_{n+1}^2 = \log a_n a_{n+2} \quad \therefore a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다. ①

이때 첫째항이 $a_1 = 2$, 공비가 $\frac{a_2}{a_1} = \frac{8}{2} = 4$ 이므로

$$a_n = 2 \times 4^{n-1} = 2^{2n-1}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^5 \log_2 a_k = \sum_{k=1}^5 \log_2 2^{2k-1}$$

$$= \sum_{k=1}^5 (2k-1)$$

$$= 2 \times \frac{5 \times 6}{2} + (-1) \times 5$$

$$= 30 - 5 = 25 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 주어진 관계식이 등비수열을 나타내는 식임을 알 수 있다.	30%
② 일반항 a_n 을 구할 수 있다.	30%
③ $\sum_{k=1}^5 \log_2 a_k$ 의 값을 구할 수 있다.	40%

07 10

$a_{n+1} - a_n = 2n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 9를 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$a_2 - a_1 = 2 \times 1$$

$$a_3 - a_2 = 2 \times 2$$

$$a_4 - a_3 = 2 \times 3$$

⋮

$$+) \quad a_{10} - a_9 = 2 \times 9$$

$$a_{10} - a_1 = 2 \sum_{k=1}^9 k = 2 \times \frac{9 \times 10}{2} = 90$$

이때 $a_{10} = 88$ 이므로 $88 - a_1 = 90 \quad \therefore a_1 = -2$

$$\therefore a_4 = a_1 + 2 \sum_{k=1}^3 k = -2 + 2 \times \frac{3 \times 4}{2}$$

$$= -2 + 12 = 10$$

07-1 76

$a_2 = a_1 - 4 \times 1 + 5$ 이므로

$$a_2 = a_1 + 1 \quad \dots\dots ①$$

①을 $3a_1 = a_2 + 1$ 에 대입하면 $3a_1 = a_1 + 2 \quad \therefore a_1 = 1$

$a_{n+1} = a_n - 4n + 5$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 7을 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$a_2 = a_1 - 4 \times 1 + 5$$

$$a_3 = a_2 - 4 \times 2 + 5$$

$$a_4 = a_3 - 4 \times 3 + 5$$

⋮

$$+) \quad a_8 = a_7 - 4 \times 7 + 5$$

$$a_8 = a_1 + \sum_{k=1}^7 (-4k + 5)$$

$$= 1 + (-4) \times \frac{7 \times 8}{2} + 5 \times 7$$

$$= 1 - 112 + 35 = -76$$

08 11

$$\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})}$$

$$= \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \quad \dots\dots ①$$

즉 $a_{n+1} = a_n + \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 99를 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$a_2 = a_1 + \sqrt{2} - \sqrt{1}$$

$$a_3 = a_2 + \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

$$a_4 = a_3 + \sqrt{4} - \sqrt{3}$$

⋮

$$+) \quad a_{100} = a_{99} + \sqrt{100} - \sqrt{99}$$

$$a_{100} = a_1 + \sqrt{100} - \sqrt{1}$$

$$= 2 + 10 - 1 = 11 \quad \dots\dots ②$$

..... ③

채점 기준	비율
① 주어진 식을 유리화할 수 있다.	30%
② ①의 식의 n 에 1, 2, 3, ..., 99를 대입한 후 변끼리 더할 수 있다.	50%
③ a_{100} 의 값을 구할 수 있다.	20%

08-1 25

$$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

즉 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 24를 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$\begin{aligned}
a_2 &= a_1 + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) \\
a_3 &= a_2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \\
a_4 &= a_3 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) \\
&\vdots \\
+ \quad a_{25} &= a_{24} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{47} - \frac{1}{49} \right) \\
a_{25} &= a_1 + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{49} \right) \\
&= -1 + \frac{24}{49} = -\frac{25}{49}
\end{aligned}$$

09 ㉠ 2500

$a_{n+1} = a_n + f(n)$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 50을 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$\begin{aligned}
a_2 &= a_1 + f(1) \\
a_3 &= a_2 + f(2) \\
a_4 &= a_3 + f(3) \\
&\vdots \\
+ \quad a_{51} &= a_{50} + f(50) \\
a_{51} &= a_1 + \sum_{k=1}^{50} f(k) = 1 + (50^2 - 1) = 2500
\end{aligned}$$

09-1 ㉠ ③

$a_n = a_{n-1} + f(n)$ 의 n 에 2, 3, 4, ..., 10을 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$\begin{aligned}
a_2 &= a_1 + f(2) \\
a_3 &= a_2 + f(3) \\
a_4 &= a_3 + f(4) \\
&\vdots \\
+ \quad a_{10} &= a_9 + f(10) \\
a_{10} &= a_1 + f(2) + f(3) + \cdots + f(10) \\
&= f(2) + f(3) + f(4) + \cdots + f(10) \\
&= \sum_{k=2}^{10} f(k)
\end{aligned}$$

10 ㉠ 420

$a_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) a_n$ 에서 $a_{n+1} = \frac{n+1}{n} a_n$ 이므로 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례로 대입한 후 변끼리 곱하면

$$\begin{aligned}
a_2 &= \frac{2}{1} a_1 \\
a_3 &= \frac{3}{2} a_2 \\
a_4 &= \frac{4}{3} a_3 \\
&\vdots \\
\times \quad a_n &= \frac{n}{n-1} a_{n-1} \\
a_n &= \frac{2}{1} \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \frac{n}{n-1} \times a_1 \\
&= n \times 2 = 2n \\
\therefore \sum_{k=1}^{20} a_k &= \sum_{k=1}^{20} 2k = 2 \times \frac{20 \times 21}{2} = 420
\end{aligned}$$

10-1 ㉠ 33

$a_{n+1} = 3^n a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 11을 차례로 대입한 후 변끼리 곱하면

$$\begin{aligned}
a_2 &= 3^1 a_1 \\
a_3 &= 3^2 a_2 \\
a_4 &= 3^3 a_3 \\
&\vdots \\
\times \quad a_{12} &= 3^{11} a_{11} \\
a_{12} &= 3^1 \times 3^2 \times 3^3 \times \cdots \times 3^{11} \times a_1 \\
&= 3^{1+2+3+\cdots+11} \times 1 = 3^{\frac{11 \times 12}{2}} = 3^{66} \\
\therefore \log_9 a_{12} &= \log_9 3^{66} = \log_9 9^{33} = 33
\end{aligned}$$

11 ㉠ 10000

$\sqrt{n+1} a_{n+1} = \sqrt{n} a_n$ 에서 $a_{n+1} = \sqrt{\frac{n}{n+1}} a_n$ 이므로 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례로 대입한 후 변끼리 곱하면

$$\begin{aligned}
a_2 &= \sqrt{\frac{1}{2}} a_1 \\
a_3 &= \sqrt{\frac{2}{3}} a_2 \\
a_4 &= \sqrt{\frac{3}{4}} a_3 \\
&\vdots \\
\times \quad a_n &= \sqrt{\frac{n-1}{n}} a_{n-1} \\
a_n &= \sqrt{\frac{1}{2}} \times \sqrt{\frac{2}{3}} \times \sqrt{\frac{3}{4}} \times \cdots \times \sqrt{\frac{n-1}{n}} \times a_1 \\
&= \sqrt{\frac{1}{n}} \times 100 = \frac{100}{\sqrt{n}} \\
a_k &= 1 \text{에서 } \frac{100}{\sqrt{k}} = 1 \text{이므로} \\
\sqrt{k} &= 100 \quad \therefore k = 10000
\end{aligned}$$

11-1 ㉠ $\frac{1}{35}$

$\sqrt{n+2} a_{n+1} = \sqrt{n} a_n$ 에서 $a_{n+1} = \sqrt{\frac{n}{n+2}} a_n$ ①
이므로 n 에 1, 2, 3, ..., 48을 차례로 대입한 후 변끼리 곱하면

$$\begin{aligned}
a_2 &= \sqrt{\frac{1}{3}} a_1 \\
a_3 &= \sqrt{\frac{2}{4}} a_2 \\
a_4 &= \sqrt{\frac{3}{5}} a_3 \\
&\vdots \\
\times \quad a_{49} &= \sqrt{\frac{48}{50}} a_{48} \\
a_{49} &= \sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{\frac{2}{4}} \times \sqrt{\frac{3}{5}} \times \cdots \times \sqrt{\frac{47}{49}} \times \sqrt{\frac{48}{50}} \times a_1 \quad \cdots ② \\
&= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{49 \times \sqrt{50}}} \times 1 = \frac{\sqrt{2}}{7 \times 5\sqrt{2}} = \frac{1}{35} \quad \cdots ③
\end{aligned}$$

채점 기준	비율
① 주어진 식을 변형할 수 있다.	20%
② ①의 식의 n 에 1, 2, 3, ..., 48을 대입한 후 변끼리 곱할 수 있다.	50%
③ a_{49} 의 값을 구할 수 있다.	30%

12 ㉔ 2

$a_{n+1} = a_n \log_{n+2}(n+1)$ 에서 $a_{n+1} = \frac{\log(n+1)}{\log(n+2)} a_n$ 이므로 n 에

1, 2, 3, ..., 98을 차례로 대입한 후 변끼리 곱하면

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{\log 2}{\log 3} a_1 \\ a_3 &= \frac{\log 3}{\log 4} a_2 \\ a_4 &= \frac{\log 4}{\log 5} a_3 \\ &\vdots \\ a_{99} &= \frac{\log 99}{\log 100} a_{98} \\ \times \left(a_{99} &= \frac{\log 2}{\log 3} \times \frac{\log 3}{\log 4} \times \frac{\log 4}{\log 5} \times \cdots \times \frac{\log 99}{\log 100} \times a_1 \right. \\ &= \frac{\log 2}{\log 100} \times 2 \\ &= \log 2 \\ \therefore 10^{a_{99}} &= 10^{\log 2} = 2 \end{aligned}$$

12-1 ㉔ 12

$2^{n-1} a_{n+1} = 6^{n-1} a_n$ 에서 $a_{n+1} = \frac{6^{n-1}}{2^{n-1}} a_n = 3^{n-1} a_n$ 이므로 n 에 1, 2,

3, ..., $n-1$ 을 차례로 대입한 후 변끼리 곱하면

$$\begin{aligned} a_2 &= 3^0 a_1 \\ a_3 &= 3^1 a_2 \\ a_4 &= 3^2 a_3 \\ &\vdots \\ \times \left(a_n &= 3^{n-2} a_{n-1} \right. \\ a_n &= 3^0 \times 3^1 \times 3^2 \times \cdots \times 3^{n-2} \times a_1 \\ &= 3^{1+2+3+\cdots+(n-2)} \times 1 \\ &= 3^{\frac{(n-2)(n-1)}{2}} = 3^{\frac{n^2-3n+2}{2}} \end{aligned}$$

$a_k = 3^{55}$ 에서 $3^{\frac{k^2-3k+2}{2}} = 3^{55}$ 이므로

$$\frac{k^2-3k+2}{2} = 55, k^2-3k-108=0$$

$$(k+9)(k-12)=0 \quad \therefore k=12 (\because k \text{는 자연수})$$

13 ㉔ 450

$a_n + a_{n+1} = 2n$ 에서

$n=1$ 일 때, $a_1 + a_2 = 2 \times 1$

$n=3$ 일 때, $a_3 + a_4 = 2 \times 3$

$n=5$ 일 때, $a_5 + a_6 = 2 \times 5$

$\vdots$

$n=29$ 일 때, $a_{29} + a_{30} = 2 \times 29$

$$\therefore \sum_{n=1}^{30} a_n = 2 \times 1 + 2 \times 3 + 2 \times 5 + \cdots + 2 \times 29$$

$$= \sum_{k=1}^{15} 2(2k-1) = \sum_{k=1}^{15} (4k-2)$$

$$= 4 \times \frac{15 \times 16}{2} - 2 \times 15$$

$$= 480 - 30 = 450$$

13-1 ㉔ -1

$$a_1 = 3$$

$$a_2 = (-1)^2 a_1 = 1 \times 3 = 3$$

$$a_3 = (-1)^3 a_2 = -1 \times 3 = -3$$

$$a_4 = (-1)^4 a_3 = 1 \times (-3) = -3$$

$$a_5 = (-1)^5 a_4 = -1 \times (-3) = 3$$

$\vdots$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 3, 3, -3, -3이 이 순서대로 반복되므로

$$a_{100} = a_{4 \times 25} = a_4 = -3$$

$$a_{150} = a_{4 \times 37 + 2} = a_2 = 3$$

$$\therefore \frac{a_{100}}{a_{150}} = \frac{-3}{3} = -1$$

14 ㉔ ⑤

$a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 에서 $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = 3$$

$$a_3 = a_2 - a_1 = 3 - 2 = 1$$

$$a_4 = a_3 - a_2 = 1 - 3 = -2$$

$$a_5 = a_4 - a_3 = -2 - 1 = -3$$

$$a_6 = a_5 - a_4 = -3 - (-2) = -1$$

$$a_7 = a_6 - a_5 = -1 - (-3) = 2$$

$$a_8 = a_7 - a_6 = 2 - (-1) = 3$$

$\vdots$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 2, 3, 1, -2, -3, -1이 이 순서대로 반복되므로

$$a_{2018} = a_{6 \times 336 + 2} = a_2 = 3$$

14-1 ㉔ $\frac{41}{6}$

$a_n a_{n+2} = a_{n+1}$ 에서 $a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = 6$$

$$a_3 = \frac{a_2}{a_1} = \frac{6}{2} = 3$$

$$a_4 = \frac{a_3}{a_2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$a_5 = \frac{a_4}{a_3} = \frac{\frac{1}{2}}{3} = \frac{1}{6}$$

$$a_6 = \frac{a_5}{a_4} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

$$a_7 = \frac{a_6}{a_5} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{6}} = 2$$

$$a_8 = \frac{a_7}{a_6} = \frac{2}{\frac{1}{3}} = 6$$

$\vdots$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 2, 6, 3, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ 이 이 순서대로 반복되므로

..... ①

$$a_{100} = a_{6 \times 16 + 4} = a_4 = \frac{1}{2}$$

$$a_{200} = a_{6 \times 33 + 2} = a_2 = 6$$

$$a_{300} = a_{6 \times 50} = a_6 = \frac{1}{3}$$

..... ②

$$\therefore a_{100} + a_{200} + a_{300} = \frac{1}{2} + 6 + \frac{1}{3} = \frac{41}{6}$$

..... ③

채점 기준	비율
① 수열 $\{a_n\}$ 의 항의 값의 반복되는 규칙을 알 수 있다.	50%
② $a_{100}, a_{200}, a_{300}$ 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ $a_{100} + a_{200} + a_{300}$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

15 답 -200

$$a_n + a_{n+1} = (-1)^n \text{에서}$$

$$n=1 \text{일 때, } a_1 + a_2 = -1 \text{에서 } 1 + a_2 = -1 \quad \therefore a_2 = -2$$

$$n=2 \text{일 때, } a_2 + a_3 = 1 \text{에서 } -2 + a_3 = 1 \quad \therefore a_3 = 3$$

$$n=3 \text{일 때, } a_3 + a_4 = -1 \text{에서 } 3 + a_4 = -1 \quad \therefore a_4 = -4$$

⋮

$$\text{따라서 } a_n = (-1)^{n-1} \times n \text{이므로}$$

$$a_{200} = (-1)^{199} \times 200 = -200$$

다른 풀이

$a_n + a_{n+1} = (-1)^n$ 의 n 에 1, 3, 5, ..., 199를 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$a_1 + a_2 = -1$$

$$a_3 + a_4 = -1$$

$$a_5 + a_6 = -1$$

⋮

$$+ \left. \begin{array}{l} a_{199} + a_{200} = -1 \end{array} \right\}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{200} = -100 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$a_n + a_{n+1} = (-1)^n$ 의 n 에 2, 4, 6, ..., 198을 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$a_2 + a_3 = 1$$

$$a_4 + a_5 = 1$$

$$a_6 + a_7 = 1$$

⋮

$$+ \left. \begin{array}{l} a_{198} + a_{199} = 1 \end{array} \right\}$$

$$a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{199} = 99 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7} - \textcircled{8} \text{을 하면 } a_1 + a_{200} = -199$$

$$\therefore a_{200} = -199 - a_1 = -199 - 1 = -200$$

15-1 답 $\frac{3^{20}-1}{8}$

$a_{n+1} = 3^{n-1} - a_n$ 에서 $a_n + a_{n+1} = 3^{n-1}$ 이므로 n 에 1, 3, 5, ..., 19를 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$a_1 + a_2 = 1$$

$$a_3 + a_4 = 3^2$$

$$a_5 + a_6 = 3^4$$

⋮

$$+ \left. \begin{array}{l} a_{19} + a_{20} = 3^{18} \end{array} \right\}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{19} + a_{20}$$

$$= 1 + 3^2 + 3^4 + \dots + 3^{18}$$

$$= \frac{1 \times \{(3^2)^{10} - 1\}}{3^2 - 1} \quad \begin{array}{l} \text{첫째항이 1, 공비가 } 3^2 \text{인 등비수열의} \\ \text{첫째항부터 제10항까지의 합} \end{array}$$

$$= \frac{3^{20} - 1}{8}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{20} a_k = \frac{3^{20} - 1}{8}$$

16 답 ④

$a_1 = \frac{1}{2}$ 이고, $a_{n+1} = \frac{a_n}{1+7a_n}$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하면

$$a_2 = \frac{a_1}{1+7a_1} = \frac{\frac{1}{2}}{1+7 \times \frac{1}{2}} = \frac{1}{9}$$

$$a_3 = \frac{a_2}{1+7a_2} = \frac{\frac{1}{9}}{1+7 \times \frac{1}{9}} = \frac{1}{16}$$

$$a_4 = \frac{a_3}{1+7a_3} = \frac{\frac{1}{16}}{1+7 \times \frac{1}{16}} = \frac{1}{23}$$

⋮

즉 수열 $\{a_n\}$ 의 각 항의 분자는 1이고, 분모는 첫째항이 2, 공차가 7인 등차수열이므로

$$a_n = \frac{1}{2 + (n-1) \times 7} = \frac{1}{7n-5}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k} &= \sum_{k=1}^{10} (7k-5) \\ &= 7 \times \frac{10 \times 11}{2} - 5 \times 10 \\ &= 385 - 50 \\ &= 335 \end{aligned}$$

다른 풀이

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{1+7a_n} \text{에서 } \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1+7a_n}{a_n}$$

$$\therefore \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 7$$

$$\frac{1}{a_n} = b_n \text{이라 하면}$$

$$b_{n+1} = b_n + 7, b_1 = \frac{1}{a_1} = 2$$

즉 수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 2, 공차가 7인 등차수열이므로

$$b_n = 2 + (n-1) \times 7 = 7n-5$$

$$\text{따라서 } a_n = \frac{1}{7n-5} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k} &= \sum_{k=1}^{10} (7k-5) \\ &= 7 \times \frac{10 \times 11}{2} - 5 \times 10 \\ &= 385 - 50 \\ &= 335 \end{aligned}$$

16-1 답 11

$a_1 = 3 = \frac{6}{2}$ 이고, $a_{n+1} = \frac{2a_n}{2+a_n}$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하면

$$a_2 = \frac{2a_1}{2+a_1} = \frac{2 \times 3}{2+3} = \frac{6}{5}$$

$$a_3 = \frac{2a_2}{2+a_2} = \frac{2 \times \frac{6}{5}}{2+\frac{6}{5}} = \frac{6}{8}$$

$$a_4 = \frac{2a_3}{2+a_3} = \frac{2 \times \frac{6}{8}}{2+\frac{6}{8}} = \frac{6}{11}$$

⋮

즉 수열 $\{a_n\}$ 의 각 항의 분자는 6이고, 분모는 첫째항이 2, 공차가 3인 등차수열이므로

$$a_n = \frac{6}{2 + (n-1) \times 3} = \frac{6}{3n-1}$$

$$a_k = \frac{3}{16} \text{에서 } \frac{6}{3k-1} = \frac{3}{16} \text{이므로 } 9k-3=96$$

$$9k=99 \quad \therefore k=11$$

17 ㉡ 11

$a_1=7$ 이고, (가)에서 $a_{n+2}=a_n-4$ 의 n 에 1, 2, 3, 4를 차례로 대입하면

$$a_3=a_1-4=7-4=3$$

$$a_4=a_2-4$$

$$a_5=a_3-4=3-4=-1$$

(나)에서 $a_{n+6}=a_n$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 7, a_2 , 3, a_2-4 , -1 , a_2-8 이 이 순서대로 반복된다.

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{50} a_k &= 8(a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6)+a_{49}+a_{50} \\ &= 8(a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6)+a_1+a_2 \\ &= 8\{7+a_2+3+(a_2-4)+(-1)+(a_2-8)\}+7+a_2 \\ &= 25a_2-17 \end{aligned}$$

$$\text{즉 } 25a_2-17=258 \text{이므로}$$

$$25a_2=275$$

$$\therefore a_2=11$$

채점 기준	비율
① (가)를 이용하여 a_3, a_4, a_5, a_6 의 값을 구할 수 있다.	40%
② (나)를 이용하여 $\sum_{k=1}^{50} a_k$ 를 a_2 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
③ a_2 의 값을 구할 수 있다.	20%

17-1 ㉡ 164

$a_1=1$ 이고, (가)에서 $a_{n+1}=\frac{a_n}{2a_n+1}$ 의 n 에 1, 2, 3을 차례로 대입하면

$$a_2=\frac{a_1}{2a_1+1}=\frac{1}{2 \times 1 + 1}=\frac{1}{3}$$

$$a_3=\frac{a_2}{2a_2+1}=\frac{\frac{1}{3}}{2 \times \frac{1}{3} + 1}=\frac{1}{5}$$

$$a_4=\frac{a_3}{2a_3+1}=\frac{\frac{1}{5}}{2 \times \frac{1}{5} + 1}=\frac{1}{7}$$

(나)에서 $a_{n+4}=a_n$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}$ 이 이 순서대로 반복된다.

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{n=1}^{42} \frac{1}{a_n} &= 10\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4}\right) + \frac{1}{a_{41}} + \frac{1}{a_{42}} \\ &= 10\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4}\right) + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} \\ &= 10(1+3+5+7) + 1+3=164 \end{aligned}$$

18 ㉡ 45

$a_1=11$ 에서

$$a_2=a_1+3=14, a_3=\frac{1}{2}a_2=7$$

$$a_4=a_3+3=10, a_5=\frac{1}{2}a_4=5, a_6=a_5+3=8$$

$$a_7=\frac{1}{2}a_6=4, a_8=\frac{1}{2}a_7=2, a_9=\frac{1}{2}a_8=1$$

$$a_{10}=a_9+3=4, a_{11}=\frac{1}{2}a_{10}=2, a_{12}=\frac{1}{2}a_{11}=1, \dots$$

$$\therefore a_n = \begin{cases} 4(n=3m-2) \\ 2(n=3m-1) \quad (m \geq 3 \text{인 자연수}) \\ 1(n=3m) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore a_{101}+a_{102}+a_{103}+\dots+a_{120} \\ &= (a_{101}+a_{102}+a_{103}) \times 6 + a_{119}+a_{120} \\ &= (2+1+4) \times 6 + 2+1=45 \end{aligned}$$

$a_{119}=a_{3 \times 40-1}=2$
 $a_{120}=a_{3 \times 40}=1$

18-1 ㉡ ④

$a_1=15$ 에서

$$a_2=a_1+3=15+3=18$$

$$a_3=a_2-2=18-2=16$$

$$a_4=a_3+3=16+3=19$$

$$a_5=a_4-4=19-4=15$$

$$a_6=a_5+3=15+3=18$$

$\vdots$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 15, 18, 16, 19가 이 순서대로 반복되므로

$$a_{50}=a_{4 \times 12+2}=a_2=18$$

19 ㉡ $\frac{1}{8}$

$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$ ($n \geq 1$)이므로

$$a_{n+1}=-a_{n+1}+2-(-a_n+2) \quad \therefore a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이다.

이때 첫째항이 $a_1=4$ 이므로

$$a_n=4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \quad \therefore a_6=4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5=\frac{1}{8}$$

19-1 ㉡ ③

$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$ ($n \geq 1$)이므로

$$a_{n+1}=2a_{n+1}+n+1-(2a_n+n) \quad \therefore a_{n+1}=2a_n-1$$

$a_{n+1}=2a_n-1$ 의 n 에 1, 2, 3, $\dots$ 을 차례로 대입하면

$$a_2=2a_1-1=2 \times 1-1=1$$

$$a_3=2a_2-1=2 \times 1-1=1$$

$$a_4=2a_3-1=2 \times 1-1=1$$

$\vdots$

$$\therefore a_{99}=1$$

20 ㉡ -512

$$S_{n+1}=2S_n-3 \quad (n \geq 1) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①의 n 에 $n-1$ 을 대입하면

$$S_n=2S_{n-1}-3 \quad (n \geq 2) \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①-②을 하면 $S_{n+1}-S_n=2(S_n-S_{n-1})$

$$\therefore a_{n+1}=2a_n \quad (n \geq 2)$$

②에 $n=1$ 을 대입하면

$$S_2=2S_1-3=2 \times 1-3=-1$$

$$\therefore a_2=S_2-S_1=-1-1=-2$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 제2항부터 공비가 2인 등비수열이므로

$$a_n=-2 \times 2^{n-2}=-2^{n-1} \quad (n \geq 2)$$

$$\therefore a_{10}=-2^9=-512$$

다른 풀이

$S_1=1$ 이고, $S_{n+1}=2S_n-3$ 의 n 에 1, 2, 3, $\dots$, 9를 차례로 대입하면

$$\begin{aligned}
S_2 &= 2S_1 - 3 = 2 \times 1 - 3 = -1 \\
S_3 &= 2S_2 - 3 = 2 \times (-1) - 3 = -5 \\
S_4 &= 2S_3 - 3 = 2 \times (-5) - 3 = -13 \\
S_5 &= 2S_4 - 3 = 2 \times (-13) - 3 = -29 \\
S_6 &= 2S_5 - 3 = 2 \times (-29) - 3 = -61 \\
S_7 &= 2S_6 - 3 = 2 \times (-61) - 3 = -125 \\
S_8 &= 2S_7 - 3 = 2 \times (-125) - 3 = -253 \\
S_9 &= 2S_8 - 3 = 2 \times (-253) - 3 = -509 \\
S_{10} &= 2S_9 - 3 = 2 \times (-509) - 3 = -1021 \\
\therefore a_{10} &= S_{10} - S_9 = -1021 - (-509) = -512
\end{aligned}$$

20-1 ㉠ $-\frac{1}{3^{49}}$

$$S_{n+1} = \frac{1}{3}S_n + 1 \quad (n \geq 1) \quad \dots\dots ㉠$$

㉠의 n 에 $n-1$ 을 대입하면

$$S_n = \frac{1}{3}S_{n-1} + 1 \quad (n \geq 2) \quad \dots\dots ㉡$$

㉠-㉡을 하면

$$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{3}(S_n - S_{n-1})$$

$$\therefore a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n \quad (n \geq 2)$$

㉠에 $n=1$ 을 대입하면

$$S_2 = \frac{1}{3}S_1 + 1 = \frac{1}{3} \times 2 + 1 = \frac{5}{3}$$

$$\therefore a_2 = S_2 - S_1 = \frac{5}{3} - 2 = -\frac{1}{3}$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 제2항부터 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열이므로

$$a_n = -\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} = -\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \quad (n \geq 2)$$

$$\therefore a_{50} = -\left(\frac{1}{3}\right)^{49} = -\frac{1}{3^{49}}$$

21 ㉠ 2880

$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = S_n$ 이라 하면 주어진 식은

$$a_{n+1} = 3S_n$$

이때 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ 이므로

$$S_{n+1} - S_n = 3S_n \quad \therefore S_{n+1} = 4S_n$$

즉 수열 $\{S_n\}$ 은 첫째항이 $S_1 = a_1 = 3$, 공비가 4인 등비수열이므로

$$S_n = 3 \times 4^{n-1}$$

$$\begin{aligned}
\therefore a_5 + a_6 &= (S_5 - S_4) + (S_6 - S_5) = S_6 - S_4 \\
&= 3 \times 4^5 - 3 \times 4^3 = 2880
\end{aligned}$$

21-1 ㉠ 9

$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = S_n$ 이라 하면 주어진 식은

$$a_{n+1} = S_n$$

이때 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ 이므로

$$S_{n+1} - S_n = S_n \quad \therefore S_{n+1} = 2S_n$$

즉 수열 $\{S_n\}$ 은 첫째항이 $S_1 = a_1 = 4$, 공비가 2인 등비수열이므로

$$S_n = 4 \times 2^{n-1} = 2^{n+1}$$

$$\therefore a_n = S_n - S_{n-1} = 2^{n+1} - 2^n = 2^n \quad (n \geq 2)$$

$$a_k > 500 \text{에서 } 2^k > 500$$

$$2^8 = 256, 2^9 = 512 \text{이므로 } k \geq 9$$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 9이다.

22 ㉠ ㉢

(가), (나)에서 $p(1), p(3), p(3^2), p(3^3), \dots$ 이 참이다.

(가), (다)에서 $p(1), p(4), p(4^2), p(4^3), \dots$ 이 참이다.

$p(3)$ 이 참이므로 (다)에서 $p(3 \times 4), p(3 \times 4^2), p(3 \times 4^3), \dots$ 이 참이다.

$p(3^2)$ 이 참이므로 (다)에서 $p(3^2 \times 4), p(3^2 \times 4^2), p(3^2 \times 4^3), \dots$ 이 참이다.

$\vdots$

즉 음이 아닌 정수 a, b 에 대하여 $p(3^a \times 4^b)$ 이 참이다.

$$\textcircled{1} p(120) = p(2^3 \times 3 \times 5)$$

$$\textcircled{2} p(130) = p(2 \times 5 \times 13)$$

$$\textcircled{3} p(144) = p(3^2 \times 4^2)$$

$$\textcircled{4} p(216) = p(2^3 \times 3^3)$$

$$\textcircled{5} p(288) = p(2^5 \times 3^2)$$

따라서 반드시 참인 명제는 ㉢이다.

22-1 ㉠ ㉡

ㄱ. $p(1)$ 이 참이면

$$p(4), p(7), p(10), \dots, p(3n+1) \quad (n \text{은 자연수})$$

이 모두 참이지만 $p(3n)$ 이 참인지는 알 수 없다.

ㄴ. $p(3)$ 이 참이면

$$p(6), p(9), p(12), \dots, p(3n) \quad (n \text{은 자연수})$$

이 모두 참이므로 모든 3의 배수 k 에 대하여 $p(k)$ 는 참이다.

ㄷ. ㄱ에서 $p(1)$ 이 참이면 $k=3n+1$ (n 은 자연수)일 때, $p(k)$ 는 참이다.

또 $p(2)$ 가 참이면

$$p(5), p(8), p(11), \dots, p(3n+2) \quad (n \text{은 자연수})$$

가 모두 참이므로 $k=3n+2$ 일 때, $p(k)$ 는 참이다.

그러나 $n=3k$ 일 때, $p(k)$ 가 참인지는 알 수 없다.

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

23 ㉠ ㄱ, ㄷ

ㄱ. $p(1)$ 이 참이면

$$p(3), p(5), p(7), \dots, p(2l+1) \quad (l \text{은 자연수})$$

이 모두 참이므로 $p(25) = p(2 \times 12 + 1)$ 은 참이다.

ㄴ. 대우 ' $p(k)$ 가 참이면 $p(2k+1)$ 도 참이다.'에 의하여 $p(1)$ 이 참이면

$$p(2 \times 1 + 1) = p(3), p(2 \times 3 + 1) = p(7),$$

$$p(2 \times 7 + 1) = p(15), p(2 \times 15 + 1) = p(31), \dots$$

이 모두 참이지만 $p(25)$ 가 참인지는 알 수 없다.

ㄷ. $p(1)$ 이 참이면

$$p(5), p(5 \times 5) = p(25), \dots$$

가 모두 참이다.

따라서 (나)의 조건이 될 수 있는 것은 ㄱ, ㄷ이다.

23-1 ㉠ ㉢

ㄱ. $p(1)$ 이 참이면

$$p(4), p(7), p(10), \dots, p(3n+1) \quad (n \text{은 자연수})$$

이 모두 참이므로 $p(31) = p(3 \times 10 + 1)$ 은 참이다.

ㄴ. $p(1)$ 이 참이면

$$p(2), p(2^2), \dots, p(2^n) \quad (n \text{은 자연수})$$

이 모두 참이지만 31은 2의 거듭제곱이 아니므로 $p(31)$ 이 참인지는 알 수 없다.

ㄷ. 대우 ' $p(k)$ 가 참이면 $p(2k+1)$ 도 참이다.'에 의하여 $p(1)$ 이 참이면

$$p(2 \times 1 + 1) = p(3), p(2 \times 3 + 1) = p(7), \\ p(2 \times 7 + 1) = p(15), p(2 \times 15 + 1) = p(31), \dots$$

이 모두 참이다.

따라서 (나)의 조건이 될 수 있는 것은 ㄱ, ㄷ이다.

24 ㉡ ④

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=1, (\text{우변})=\frac{1 \times (1+1)}{2}=1$$

이므로 ㉡이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, ㉡이 성립한다고 가정하면

$$1+2+3+\dots+k=\frac{k(k+1)}{2} \quad \dots\dots ㉡$$

이 성립한다.

㉡의 양변에 $(k+1)$ 을 더하면

$$1+2+3+\dots+k+(k+1) \\ = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ㉡이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 ㉡이 성립한다.

따라서 $f(k)=k+1, g(k)=\frac{(k+1)(k+2)}{2}$ 이므로
 $f(1)+g(10)=2+66=68$

24-1 ㉡ ④

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=\frac{1}{1 \times 2}=\frac{1}{2}, (\text{우변})=\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$$

이므로 ㉡이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, ㉡이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1} \quad \dots\dots ㉡$$

가 성립한다.

㉡의 양변에 $(k+1)$ 을 더하면

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} \\ + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ = \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ = \frac{k(k+2)+1}{(k+1)(k+2)} \\ = \frac{(k+1)^2}{(k+1)(k+2)} \\ = \frac{k+1}{k+2}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ㉡이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 ㉡이 성립한다.

25 ㉡ ②

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=2^{1-1}=1, (\text{우변})=2^1-1=1$$

이므로 ㉡이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, ㉡이 성립한다고 가정하면

$$1+2+2^2+\dots+2^{k-1}=2^k-1 \quad \dots\dots ㉡$$

이 성립한다.

㉡의 양변에 $(k)2^k$ 을 더하면

$$1+2+2^2+\dots+2^{k-1}+(k)2^k=2^k-1+(k)2^k \\ =2 \times 2^k-1 \\ = (k+1)2^{k+1}-1$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ㉡이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 ㉡이 성립한다.

25-1 ㉡ 9

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=\frac{1}{1 \times 3}=\frac{1}{3}, (\text{우변})=\frac{1}{2 \times 1+1}=\frac{1}{3}$$

이므로 ㉡이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, ㉡이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\ = \frac{k}{2k+1} \quad \dots\dots ㉡$$

가 성립한다.

㉡의 양변에 $(k) \frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$ 을 더하면

$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\ + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ = \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ = \frac{k(2k+3)+1}{(2k+1)(2k+3)} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ = \frac{2k^2+3k+1}{(2k+1)(2k+3)} \\ = \frac{(2k+1)(k+1)}{(2k+1)(2k+3)} \\ = \frac{k+1}{2k+3}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ㉡이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 ㉡이 성립한다.

따라서 $f(k)=\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}, g(k)=\frac{k+1}{2k+3}$ 이므로

$$f(4)=\frac{1}{9 \times 11}=\frac{1}{99}, g(4)=\frac{4+1}{8+3}=\frac{5}{11}$$

$$\therefore \frac{g(4)}{5f(4)}=\frac{\frac{5}{11}}{\frac{5}{99}}=9$$

26 ㉡ 풀이 참조

$$1^3+2^3+3^3+\dots+n^3=(1+2+3+\dots+n)^2 \quad \dots\dots ㉡$$

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=1^3=1, (\text{우변})=1^2=1 \text{이므로 } ㉡ \text{이 성립한다.}$$

(ii) $n=k$ 일 때, ㉠이 성립한다고 가정하면

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3=(1+2+3+\cdots+k)^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

㉠의 양변에 $(k+1)^3$ 을 더하면

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3+(k+1)^3 \\ = (1+2+3+\cdots+k)^2 + (k+1)^3$$

$$= \left\{ \frac{k(k+1)}{2} \right\}^2 + (k+1)^3$$

$$= \frac{(k+1)^2 \{k^2+4(k+1)\}}{4}$$

$$= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$$

$$= \left\{ \frac{(k+1)(k+2)}{2} \right\}^2$$

$$= \{1+2+3+\cdots+(k+1)\}^2$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 ㉠이 성립한다.

26-1 풀이 참조

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right) \times \cdots \times \left(1+\frac{1}{n+1}\right) = \frac{n+2}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, (\text{우변}) = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}$$

이므로 ㉠이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, ㉠이 성립한다고 가정하면

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right) \times \cdots \\ \times \left(1+\frac{1}{k+1}\right) = \frac{k+2}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

가 성립한다.

㉠의 양변에 $1 + \frac{1}{k+2}$ 을 곱하면

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right) \times \cdots \times \left(1+\frac{1}{k+1}\right)\left(1+\frac{1}{k+2}\right)$$

$$= \frac{k+2}{2} \left(1+\frac{1}{k+2}\right)$$

$$= \frac{k+2}{2} \times \frac{k+3}{k+2}$$

$$= \frac{k+3}{2}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 ㉠이 성립한다.

27 ㉡ ③

(i) $n=1$ 일 때

$$2^2+3^1=7 \text{이므로 } 7 \text{의 배수이다.}$$

(ii) $n=k$ 일 때, $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 이 7의 배수라 가정하면

$$2^{k+1}+3^{2k-1}=7N \quad (N \text{은 자연수})$$

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$ 이면

$$2^{k+2}+3^{2k+1}=2 \times 2^{k+1} + \boxed{(7) 9} \times \boxed{(7) 3^{2k-1}} \\ = 2 \times 2^{k+1} + 2 \times 3^{2k-1} + 7 \times 3^{2k-1} \\ = 2(2^{k+1}+3^{2k-1}) + 7 \times 3^{2k-1} \\ = 2 \times \boxed{(7) 7N} + 7 \times \boxed{(7) 3^{2k-1}} \\ = 7(2N + \boxed{(7) 3^{2k-1}})$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 이 7의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 은 7의 배수이다.

27-1 ㉡ ⑤

(i) $n=2$ 일 때

$$4^2-3 \times 2-1=9 \text{이므로 } 9 \text{의 배수이다.}$$

(ii) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때, 4^n-3n-1 이 9의 배수라 가정하면

$$4^k-3k-1=9N \quad (N \text{은 자연수})$$

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$ 이면

$$4^{k+1}-3(k+1)-1 = \boxed{(7) 4 \times 4^k} - 3k - 4 \\ = 4(4^k-3k-1) + \boxed{(7) 9k} \\ = 4 \times 9N + \boxed{(7) 9k} \\ = 9(\boxed{(7) 4N + k})$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 4^n-3n-1 이 9의 배수이다.

(i), (ii)에서 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 4^n-3n-1 은 9의 배수이다.

28 ㉡ 17

(i) $n=1$ 일 때

$$4^2-1=15 \text{이므로 } 5 \text{의 배수이다.}$$

(ii) $n=k$ 일 때, $4^{2n}-1$ 이 5의 배수라 가정하면

$$4^{2k}-1=5a \quad (a \text{는 자연수})$$

로 놓을 수 있으므로 $4^{2k}=5a+1$

위의 식의 양변에 $\boxed{(7) 4^2}$ 을 곱하면

$$4^{2k+2}=4^2(5a+1) \\ = 4^2 \times 5a + 16 \\ = 5(\boxed{(7) 4^2}a + 3) + \boxed{(7) 1}$$

따라서 $4^{2(k+1)}-1$ 은 5의 배수이므로 $n=k+1$ 일 때도 $4^{2n}-1$ 은 5의 배수이다. $\boxed{5(4^2a+3)}$ 이므로 5의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $4^{2n}-1$ 은 5의 배수이다.

따라서 $p=4^2=16$, $q=1$ 이므로

$$p+q=16+1=17$$

28-1 ㉡ 35

(i) $n=1$ 일 때

$$3^2-1=\boxed{(7) 8} \text{이므로 } 8 \text{의 배수이다.}$$

(ii) $n=k$ 일 때, $3^{2n}-1$ 이 8의 배수라 가정하면

$$3^{2k}-1=8m \quad (m \text{은 자연수})$$

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$ 이면

$$3^{2(k+1)}-1=3^2 \times 3^{2k}-1 \\ = 9 \times \boxed{(7) 3^{2k}} - 1 \\ = 9(8m+1) - 1 \quad \boxed{3^{2k}=8m+1} \\ = 9 \times 8m + 8 \\ = 8(\boxed{(7) 9m} + 1)$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.

따라서 $a=8$, $f(k)=3^{2k}$, $g(m)=9m$ 이므로

$$a+f(1)+g(2)=8+3^2+9 \times 2=35$$

29 ㉡ 9

(i) $n=1$ 일 때

$$1^3+5 \times 1=6 \text{이므로 } 6 \text{의 배수이다.}$$

(ii) $n=k$ 일 때, n^3+5n 이 6의 배수라 가정하면

$$k^3+5k=6m \quad (m \text{은 자연수})$$

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$ 이면

$$\begin{aligned} (k+1)^3+5(k+1) &= k^3+3k^2+8k+6 \\ &= k^3+5k+6+3k^2+3k \\ &= 6m+6+3k^2+3k \\ &= 6\left(\frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}m+1\right) + \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}3k(k+1) \end{aligned}$$

이때 $k(k+1)$ 은 짝수이므로 $\frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}3k(k+1)$ 은 6의 배수이다.

따라서 $n=k+1$ 일 때도 n^3+5n 은 6의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 n^3+5n 은 6의 배수이다.

따라서 $f(m)=m+1, t=3$ 이므로

$$\sum_{m=1}^t f(m) = \sum_{m=1}^3 (m+1) = \frac{3 \times 4}{2} + 3 = 9$$

29-1 ㉑ 9

(i) $n=1$ 일 때

$$5^0+7=8 \text{이므로 } 2 \text{의 배수이다.}$$

(ii) $n=k$ 일 때, $5^{n-1}+7^n$ 이 2의 배수라 가정하면

$$5^{k-1}+7^k=2N \quad (N \text{은 자연수})$$

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$ 이면

$$\begin{aligned} 5^k+7^{k+1} &= 5 \times 5^{k-1} + 7 \times 7^k = 7(5^{k-1}+7^k) - \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}2 \times 5^{k-1} \\ &= 7 \times 2N - \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}2 \times 5^{k-1} = 2(7N - \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}5^{k-1}) \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $5^{n-1}+7^n$ 은 2의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $5^{n-1}+7^n$ 은 2의 배수이다.

따라서 $f(k)=2 \times 5^{k-1}, g(k)=5^{k-1}$ 이므로

$$f(2)-g(1)=2 \times 5^1-5^0=9$$

30 ㉑ 17

(i) $n=2$ 일 때

$$(\text{좌변})=1+\frac{1}{2^2}=\frac{5}{4}, (\text{우변})=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2} \text{이므로 } (\text{좌변}) < (\text{우변})$$

즉 ㉑이 성립한다.

(ii) $n=k \ (k \geq 2)$ 일 때, ㉑이 성립한다고 가정하면

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\dots+\frac{1}{k^2} < 2-\frac{1}{k}$$

이 성립한다.

위의 식의 양변에 $\frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}\frac{1}{(k+1)^2}$ 을 더하면

$$\begin{aligned} 1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\dots+\frac{1}{k^2} + \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}\frac{1}{(k+1)^2} &< 2-\frac{1}{k} + \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}\frac{1}{(k+1)^2} \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} 2-\frac{1}{k} + \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}\frac{1}{(k+1)^2} - \left(\frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}2 - \frac{1}{k+1} \right) &= -\frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} + \frac{1}{k+1} \\ &= \frac{-(k+1)^2+k+k(k+1)}{k(k+1)^2} \\ &= -\frac{1}{k(k+1)^2} < 0 \end{aligned}$$

이므로

$$2-\frac{1}{k} + \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}\frac{1}{(k+1)^2} < \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}2 - \frac{1}{k+1}$$

$$\therefore 1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\dots+\frac{1}{k^2} + \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}\frac{1}{(k+1)^2}$$

$$< \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}2 - \frac{1}{k+1}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ㉑이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 ㉑이 성립한다.

따라서 $f(k)=\frac{1}{(k+1)^2}, g(k)=2-\frac{1}{k+1}$ 이므로

$$f(2)=\frac{1}{3^2}=\frac{1}{9}, g(8)=2-\frac{1}{9}=\frac{17}{9}$$

$$\therefore \frac{g(8)}{f(2)} = \frac{\frac{17}{9}}{\frac{1}{9}} = 17$$

30-1 ㉑ ①

(i) $n=3$ 일 때

$$(\text{좌변})=3^{3+1}=81, (\text{우변})=(3+1)^3=64 \text{이므로}$$

$$(\text{좌변}) > (\text{우변})$$

즉 ㉑이 성립한다.

(ii) $n=k \ (k \geq 3)$ 일 때, ㉑이 성립한다고 가정하면

$$k^{k+1} > (k+1)^k$$

.....㉑

이때

$$\begin{aligned} (k+1)^{k+2} &= \frac{(k+1)^{k+2}}{k^{k+1}} \times k^{k+1} \\ &> \frac{(k+1)^{k+2}}{k^{k+1}} \times \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}(k+1)^k \quad (\because \text{㉑}) \\ &= \frac{(k+1)^{2k+2}}{k^{k+1}} \\ &= \left(\frac{k^2+2k+1}{k} \right)^{k+1} \\ &= \left(k+2+\frac{1}{k} \right)^{k+1} \\ &> \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}(k+2)^{k+1} \quad (\because k \geq 3) \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } (k+1)^{k+2} > \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}(k+2)^{k+1}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ㉑이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 ㉑이 성립한다.

31 ㉑ 16

(i) $n=5$ 일 때

$$(\text{좌변})=2^5=32, (\text{우변})=5^2=25 \text{이므로 } (\text{좌변}) > (\text{우변})$$

즉 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k \ (k \geq 5)$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$2^k > k^2$$

$$\text{위의 식의 양변에 } 2 \text{를 곱하면 } 2^{k+1} > 2k^2$$

그런데 $k \geq 5$ 이면

$$k^2-2k-1 = \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}(k-1)^2 - 2 > 0$$

$$\text{이므로 } k^2 > 2k+1$$

$$\therefore 2^{k+1} > 2k^2$$

$$= k^2 + k^2$$

$$> k^2 + 2k + 1$$

$$= \frac{(\text{㉗})}{(\text{㉗})}(k+1)^2$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 5$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.
 따라서 $f(k) = (k-1)^2, g(k) = (k+1)^2$ 이므로
 $f(2) = 1^2 = 1, g(3) = 4^2 = 16$
 $\therefore f(2)g(3) = 1 \times 16 = 16$

31-1 ㉮ ㉮

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = \frac{7+3}{2} = 5, (\text{우변}) = 5^1 = 5 \text{이므로 } (\text{좌변}) \geq (\text{우변})$$

즉 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{7^k + 3^k}{2} \geq \boxed{(7) 5^k}$$

위의 식의 양변에 5를 곱하면

$$5 \times \frac{7^k + 3^k}{2} \geq 5 \times \boxed{(7) 5^k} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \frac{7^{k+1} + 3^{k+1}}{2} - 5^{k+1} &\geq \frac{7^{k+1} + 3^{k+1}}{2} - 5 \times \frac{7^k + 3^k}{2} \\ &= \frac{2 \times 7^k - 2 \times 3^k}{2} \\ &= \boxed{(4) 7^k - 3^k} \geq 0 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{7^{k+1} + 3^{k+1}}{2} - 5^{k+1} \geq 0 \text{이므로}$$

$$\frac{7^{k+1} + 3^{k+1}}{2} \geq 5^{k+1}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 주어진 부등식은 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

따라서 $f(k) = 5^k, g(k) = 7^k - 3^k$ 이므로

$$f(2) = 5^2 = 25, g(1) = 7 - 3 = 4$$

$$\therefore f(2) + g(1) = 25 + 4 = 29$$

32 ㉮ 풀이 참조

$$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n > 2^n \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

(i) $n=4$ 일 때

$$(\text{좌변}) = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24, (\text{우변}) = 2^4 = 16 \text{이므로}$$

$$(\text{좌변}) > (\text{우변})$$

즉 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq 4$)일 때, $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times k > 2^k \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $k+1$ 을 곱하면

$$\begin{aligned} 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times k \times (k+1) &> 2^k \times (k+1) > 2^{k+1} \\ (\because k \geq 4 \text{이므로 } k+1 > 2) \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 4$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

32-1 ㉮ 풀이 참조

$$2^n > 2n+1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

(i) $n=3$ 일 때

$$(\text{좌변}) = 2^3 = 8, (\text{우변}) = 2 \times 3 + 1 = 7 \text{이므로}$$

$$(\text{좌변}) > (\text{우변})$$

즉 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq 3$)일 때, $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$2^k > 2k+1$$

위의 식의 양변에 2를 곱하면

$$2^{k+1} > 2(2k+1) \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

이때

$$2(2k+1) - \{2(k+1) + 1\} = 2k - 1 > 0 \quad (\because k \geq 3)$$

$$\text{이므로 } 2(2k+1) > 2(k+1) + 1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2}, \textcircled{3} \text{에서 } 2^{k+1} > 2(k+1) + 1$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

유형 완성하기

p.299

33 ㉮ ㉮

직선 1개를 그으면 2개의 평면이 생기므로 $a_1 = 2$

n 개의 직선이 그려진 평면 위에 문제의 조건에 맞는 1개의 직선을 추가하면 이 직선은 기존의 n 개의 직선과 각각 한 번씩 만나므로 $(n+1)$ 개의 새로운 평면이 생긴다. 즉 $(n+1)$ 개의 직선에 의하여 분할된 평면은 n 개의 직선에 의하여 분할된 평면보다 $(n+1)$ 개가 많으므로 $a_{n+1} = a_n + n + 1$

위의 식의 n 에 1, 2, 3, ..., 19를 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + 1 + 1 \\ a_3 &= a_2 + 2 + 1 \\ a_4 &= a_3 + 3 + 1 \\ &\vdots \\ +) \quad a_{20} &= a_{19} + 19 + 1 \\ a_{20} &= a_1 + \sum_{k=1}^{19} (k+1) \\ &= 2 + \frac{19 \times 20}{2} + 1 \times 19 \\ &= 2 + 190 + 19 = 211 \end{aligned}$$

34 ㉮ (1) 28 (2) $a_{n+1} = a_n + 2n + 4$ (3) 990

$$(1) a_1 = 4 \times 1 = 4$$

$$a_2 = a_1 + 6 \times 1 = 4 + 6$$

$$a_3 = a_2 + 8 \times 1 = 4 + 6 + 8$$

$$a_4 = a_3 + 10 \times 1 = 4 + 6 + 8 + 10 = 28$$

$$(2) a_1 = 4$$

$$a_2 = a_1 + 6 \times 1$$

$$a_3 = a_2 + 8 \times 1$$

$$a_4 = a_3 + 10 \times 1$$

$$\vdots$$

$$\therefore a_{n+1} = a_n + 2n + 4$$

(3) $a_{n+1} = a_n + 2n + 4$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 29를 대입한 후 변끼리 더하면

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + 2 \times 1 + 4 \\ a_3 &= a_2 + 2 \times 2 + 4 \\ a_4 &= a_3 + 2 \times 3 + 4 \\ &\vdots \\ +) \quad a_{30} &= a_{29} + 2 \times 29 + 4 \\ a_{30} &= a_1 + \sum_{k=1}^{29} (2k+4) \\ &= 4 + 2 \times \frac{29 \times 30}{2} + 4 \times 29 \\ &= 4 + 870 + 116 = 990 \end{aligned}$$

35 ㉡ 397

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = a_1 + 6 = a_1 + 6 \times 1$$

$$a_3 = a_2 + 12 = a_2 + 6 \times 2$$

⋮

$$\therefore a_{n+1} = a_n + 6n$$

$a_{n+1} = a_n + 6n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 11을 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$a_2 = a_1 + 6 \times 1$$

$$a_3 = a_2 + 6 \times 2$$

$$a_4 = a_3 + 6 \times 3$$

⋮

$$+ \left. \begin{array}{l} a_{12} = a_{11} + 6 \times 11 \\ a_{12} = a_1 + \sum_{k=1}^{11} 6k \\ = 1 + 6 \times \frac{11 \times 12}{2} \\ = 1 + 396 = 397 \end{array} \right\}$$

36 ㉡ (1) $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 20$ (2) 45

(1) n 회 시행 후 수족관에 남아 있는 물의 양이 a_n L이므로

$$a_{n+1} = a_n - \frac{1}{2}a_n + 20$$

$$\therefore a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 20$$

(2) $a_1 = 200 - \frac{1}{2} \times 200 + 20 = 120$ 이므로

$$a_2 = \frac{1}{2}a_1 + 20 = \frac{1}{2} \times 120 + 20 = 80$$

$$a_3 = \frac{1}{2}a_2 + 20 = \frac{1}{2} \times 80 + 20 = 60$$

$$a_4 = \frac{1}{2}a_3 + 20 = \frac{1}{2} \times 60 + 20 = 50$$

$$a_5 = \frac{1}{2}a_4 + 20 = \frac{1}{2} \times 50 + 20 = 45$$

37 ㉡ 10일

n 일 후 측정한 세균의 수를 a_n 이라 하면

$$a_1 = 20, a_{n+1} = 2(a_n - 5) \text{ 이므로}$$

$$a_1 = 20$$

$$a_2 = 2(a_1 - 5) = 2(20 - 5) = 30 = 10 \times 2 + 10$$

$$a_3 = 2(a_2 - 5) = 2(30 - 5) = 50 = 10 \times 2^2 + 10$$

$$a_4 = 2(a_3 - 5) = 2(50 - 5) = 90 = 10 \times 2^3 + 10$$

⋮

$$\therefore a_n = 10 \times 2^{n-1} + 10$$

$$\text{이때 } 10 \times 2^{n-1} + 10 = 5130 \text{에서 } 10 \times 2^{n-1} = 5120$$

$$2^{n-1} = 512 = 2^9, n-1 = 9$$

$$\therefore n = 10$$

따라서 측정한 세균의 수가 5130마리가 되는 것은 10일 후이다.

다른 풀이

n 일 후 측정한 세균의 수를 a_n 이라 하면

$$a_{n+1} = 2(a_n - 5) \quad \therefore a_{n+1} - 10 = 2(a_n - 10)$$

즉 수열 $\{a_n - 10\}$ 은 첫째항이 $a_1 - 10 = 10$, 공비가 2인 등비수열
이므로

$$a_n - 10 = 10 \times 2^{n-1} \quad \therefore a_n = 10 \times 2^{n-1} + 10$$

$$\text{이때 } 10 \times 2^{n-1} + 10 = 5130 \text{에서 } 10 \times 2^{n-1} = 5120$$

$$2^{n-1} = 512 = 2^9, n-1 = 9$$

$$\therefore n = 10$$

따라서 측정한 세균의 수가 5130마리가 되는 것은 10일 후이다.

학교 시험 대비 문제

p.300~302

01 ㉡ -140

$a_{n+1} = a_n - 2$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 -2 인 등차수열이다.

이때 첫째항이 $a_1 = 3$ 이므로

$$a_n = 3 + (n-1) \times (-2) = -2n + 5$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{14} a_k = \sum_{k=1}^{14} (-2k + 5)$$

$$= -2 \times \frac{14 \times 15}{2} + 5 \times 14$$

$$= -210 + 70$$

$$= -140$$

02 ㉡ ③

$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이다.

이때 첫째항이 $a_1 = 2$ 이므로

$$a_n = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

$$\therefore a_5 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

따라서 $p = 8, q = 1$ 이므로

$$p + q = 8 + 1 = 9$$

03 ㉡ ②

$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다.

이때 첫째항이 $a_1 = 6$, 공비가 $\frac{a_2}{a_1} = \frac{-3}{6} = -\frac{1}{2}$ 이므로

$$\sum_{k=1}^7 a_k = \frac{6 \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^7 \right\}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{129}{32}$$

04 ㉡ 17

$a_{n+1} = a_n + 2n - 1$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 7을 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$a_2 = a_1 + 2 \times 1 - 1$$

$$a_3 = a_2 + 2 \times 2 - 1$$

$$a_4 = a_3 + 2 \times 3 - 1$$

⋮

$$+ \left. \begin{array}{l} a_8 = a_7 + 2 \times 7 - 1 \\ a_8 = a_1 + \sum_{k=1}^7 (2k - 1) \\ = a_1 + 2 \times \frac{7 \times 8}{2} - 1 \times 7 \\ = a_1 + 49 \\ a_8 = 50 \text{에서 } a_1 + 49 = 50 \quad \therefore a_1 = 1 \end{array} \right\}$$

$$a_8 = a_1 + \sum_{k=1}^7 (2k - 1)$$

$$= a_1 + 2 \times \frac{7 \times 8}{2} - 1 \times 7$$

$$= a_1 + 49$$

$$a_8 = 50 \text{에서 } a_1 + 49 = 50 \quad \therefore a_1 = 1$$

$$\begin{aligned}\therefore a_5 &= a_1 + \sum_{k=1}^4 (2k-1) = 1 + 2 \times \frac{4 \times 5}{2} - 1 \times 4 \\ &= 1 + 20 - 4 = 17\end{aligned}$$

05 ㉓ ③

$a_{n+1} - a_n = 2$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 2인 등차수열이다.

이때 첫째항이 $a_1 = 3$ 이므로

$$a_n = 3 + (n-1) \times 2 = 2n + 1$$

$$\therefore a_{12} = 2 \times 12 + 1 = 25$$

$$b_{n+1} = b_n + 3a_n \text{에서 } b_{n+1} = b_n + 3(2n+1)$$

$$\therefore b_{n+1} = b_n + 6n + 3$$

위의 식의 n 에 1, 2, 3, ..., 20을 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$\begin{aligned}b_2 &= b_1 + 6 \times 1 + 3 \\ b_3 &= b_2 + 6 \times 2 + 3 \\ b_4 &= b_3 + 6 \times 3 + 3 \\ &\vdots \\ + \quad b_{21} &= b_{20} + 6 \times 20 + 3 \\ \hline b_{21} &= b_1 + \sum_{k=1}^{20} (6k+3) \\ &= 5 + 6 \times \frac{20 \times 21}{2} + 3 \times 20 \\ &= 5 + 1260 + 60 = 1325 \\ \therefore \frac{b_{21}}{a_{12}} &= \frac{1325}{25} = 53\end{aligned}$$

06 ㉓ 55

$a_{n+1} = 2^n a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., 10을 차례로 대입한 후 변끼리 곱하면

$$\begin{aligned}a_2 &= 2a_1 \\ a_3 &= 2^2 a_2 \\ a_4 &= 2^3 a_3 \\ &\vdots \\ \times \quad a_{11} &= 2^{10} a_{10} \\ \hline a_{11} &= 2 \times 2^2 \times 2^3 \times \cdots \times 2^{10} \times a_1 \\ &= 2^{1+2+3+\cdots+10} \times 1 = 2^{55} \\ \therefore \log_2 a_{11} &= \log_2 2^{55} = 55\end{aligned}$$

07 ㉓ ②

$\sqrt{n} a_{n+1} = \sqrt{n+1} a_n$ 에서 $a_{n+1} = \sqrt{\frac{n+1}{n}} a_n$ 이므로

n 에 1, 2, 3, ..., 63을 차례로 대입한 후 변끼리 곱하면

$$\begin{aligned}a_2 &= \sqrt{\frac{2}{1}} a_1 \\ a_3 &= \sqrt{\frac{3}{2}} a_2 \\ a_4 &= \sqrt{\frac{4}{3}} a_3 \\ &\vdots \\ \times \quad a_{64} &= \sqrt{\frac{64}{63}} a_{63} \\ \hline a_{64} &= \sqrt{\frac{2}{1}} \times \sqrt{\frac{3}{2}} \times \sqrt{\frac{4}{3}} \times \cdots \times \sqrt{\frac{64}{63}} \times a_1 \\ &= \sqrt{64 \times 5} = 8 \times 5 = 40\end{aligned}$$

08 ㉓ 12

$a_{n+1} = 2a_n + 2^{n+1}$ 에 $n=3$ 을 대입하면

$$a_4 = 2a_3 + 2^4 = 2a_3 + 16$$

이때 $a_4 = 80$ 이므로 $2a_3 + 16 = 80$

$$2a_3 = 64 \quad \therefore a_3 = 32$$

$a_{n+1} = 2a_n + 2^{n+1}$ 에 $n=2$ 를 대입하면

$$a_3 = 2a_2 + 2^3 = 2a_2 + 8$$

이때 $a_3 = 32$ 이므로 $2a_2 + 8 = 32$

$$2a_2 = 24 \quad \therefore a_2 = 12$$

09 ㉓ ⑤

$a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ ($n \geq 1$)이므로

$$S_{n+1} - S_n = 2S_n \quad \therefore S_{n+1} = 3S_n$$

즉 수열 $\{S_n\}$ 은 공비가 3인 등비수열이다.

이때 첫째항이 $S_1 = a_1 = 3$ 이므로

$$S_n = 3 \times 3^{n-1} = 3^n$$

$$\therefore a_{100} = S_{100} - S_{99} = 3^{100} - 3^{99} = 3^{99}(3-1) = 2 \times 3^{99}$$

10 ㉓ ③

(가), (나)에서 $p(1), p(3), p(3^2), p(3^3), \dots$ 이 참이다.

(가), (다)에서 $p(1), p(5), p(5^2), p(5^3), \dots$ 이 참이다.

$p(3)$ 이 참이므로 (다)에서 $p(3 \times 5), p(3 \times 5^2), p(3 \times 5^3), \dots$ 이 참이다.

$p(3^2)$ 이 참이므로 (다)에서 $p(3^2 \times 5), p(3^2 \times 5^2), p(3^2 \times 5^3), \dots$ 이 참이다.

$\vdots$

즉 음이 아닌 정수 a, b 에 대하여 $p(3^a \times 5^b)$ 이 참이다.

$$\textcircled{1} p(30) = p(2 \times 3 \times 5)$$

$$\textcircled{2} p(60) = p(2^2 \times 3 \times 5)$$

$$\textcircled{3} p(75) = p(3 \times 5^2)$$

$$\textcircled{4} p(90) = p(2 \times 3^2 \times 5)$$

$$\textcircled{5} p(105) = p(3 \times 5 \times 7)$$

따라서 반드시 참인 명제는 $\textcircled{3}$ 이다.

11 ㉓ 30

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = 1 \times 2 \times 3 = 6, (\text{우변}) = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4}{4} = 6$$

이므로 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때, $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m k(k+1)(k+2) = \frac{m(m+1)(m+2)(m+3)}{4} \quad \dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $\boxed{(\text{가}) (m+1)(m+2)(m+3)}$ 을 더하면

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^m k(k+1)(k+2) + (m+1)(m+2)(m+3) \\ &= \frac{m(m+1)(m+2)(m+3)}{4} \\ &\quad + \boxed{(\text{가}) (m+1)(m+2)(m+3)} \\ &= \frac{(m+1)(m+2)(m+3)}{4} \times (m+4) \\ &= \frac{(m+1)(m+2)(m+3)(\boxed{(\text{나}) m+4})}{4}\end{aligned}$$

따라서 $n=m+1$ 일 때도 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

따라서 $f(m) = (m+1)(m+2)(m+3)$, $g(m) = m+4$ 이므로

$$f(1) = 2 \times 3 \times 4 = 24, g(2) = 2 + 4 = 6$$

$$\therefore f(1) + g(2) = 24 + 6 = 30$$

12 풀이 참조

(i) $n=1$ 일 때

$$4^1 - 1 = 3 \text{이므로 } 3 \text{의 배수이다.}$$

(ii) $n=k$ 일 때, $4^n - 1$ 이 3의 배수라 가정하면

$$4^k - 1 = 3N \quad (N \text{은 자연수})$$

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$ 이면

$$\begin{aligned} 4^{k+1} - 1 &= 4 \times 4^k - 1 = 4(3N + 1) - 1 \\ &= 12N + 3 = 3(4N + 1) \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $4^n - 1$ 은 3의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $4^n - 1$ 은 3의 배수이다.

13 (가) 2 (나) $1+h$ (다) $1+(k+1)h$

(i) $n=$ (가) 2 일 때

$$(\text{좌변}) = (1+h)^2 = 1+2h+h^2, (\text{우변}) = 1+2h$$

이므로 (좌변) > (우변)

즉 $n=$ (가) 2 일 때 ㉠이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때, ㉠이 성립한다고 가정하면

$$(1+h)^k > 1+kh$$

.....㉡

㉡의 양변에 (나) $1+h$ 를 곱하면

$$\begin{aligned} (1+h)^{k+1} &> (1+kh)(1+h) \\ &= 1+(k+1)h+kh^2 \end{aligned}$$

그런데 $kh^2 > 0$ 이므로

$$1+(k+1)h+kh^2 > 1+(k+1)h$$

$$\therefore (1+h)^{k+1} > (다) 1+(k+1)h$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에서 $h > 0$ 일 때, $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 ㉠이 성립한다.

14 670

꼭대기 층에서부터 각 층에 놓이는 정육면체의 개수를 차례로

$a_1, a_2, a_3, \dots$ 이라 하면

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = a_1 + 4$$

$$a_3 = a_2 + 4 \times 2$$

$$a_4 = a_3 + 4 \times 3$$

⋮

$$\therefore a_{n+1} = a_n + 4n$$

$a_{n+1} = a_n + 4n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$a_2 = a_1 + 4 \times 1$$

$$a_3 = a_2 + 4 \times 2$$

$$a_4 = a_3 + 4 \times 3$$

⋮

$$+ \left) a_n = a_{n-1} + 4(n-1) \right.$$

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 4k$$

$$= 1 + 4 \times \frac{(n-1)n}{2}$$

$$= 2n^2 - 2n + 1$$

따라서 10층 탑을 쌓을 때, 필요한 정육면체의 개수는

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} (2k^2 - 2k + 1)$$

$$= 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - 2 \times \frac{10 \times 11}{2} + 1 \times 10$$

$$= 770 - 110 + 10 = 670$$

서술형 1 59

$$(a_{n+1} + a_n)^2 = 4a_n a_{n+1} + 36 \text{에서}$$

$$a_{n+1}^2 + 2a_n a_{n+1} + a_n^2 = 4a_n a_{n+1} + 36$$

$$a_{n+1}^2 - 2a_n a_{n+1} + a_n^2 = 36$$

$$\therefore (a_{n+1} - a_n)^2 = 36$$

$$\text{이때 } a_n < a_{n+1} \text{이므로 } a_{n+1} - a_n = 6 \quad \dots\dots ①$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 6인 등차수열이다.

이때 첫째항이 $a_1 = 5$ 이므로

$$a_n = 5 + (n-1) \times 6 = 6n - 1 \quad \dots\dots ②$$

$$\therefore a_{10} = 6 \times 10 - 1 = 59 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① 주어진 식을 변형할 수 있다.	40%
② 일반항 a_n 을 구할 수 있다.	40%
③ a_{10} 의 값을 구할 수 있다.	20%

서술형 2 15

$a_{2n+2} = a_{2n} + 3$ 의 n 에 1, 2, 3, 4를 차례로 대입하면

$$a_4 = a_2 + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$a_6 = a_4 + 3 = 5 + 3 = 8$$

$$a_8 = a_6 + 3 = 8 + 3 = 11$$

$$\therefore a_{10} = a_8 + 3 = 11 + 3 = 14 \quad \dots\dots ①$$

또 $a_{2n-1} = a_{2n+1}$ 의 n 에 1, 2, 3, 4, 5를 차례로 대입하면

$$a_1 = a_3 = 1$$

$$a_3 = a_5 = 1$$

$$a_5 = a_7 = 1$$

$$a_7 = a_9 = 1$$

$$a_9 = a_{11} = 1 \quad \dots\dots ②$$

$$\therefore a_{10} + a_{11} = 14 + 1 = 15 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① a_{10} 의 값을 구할 수 있다.	40%
② a_{11} 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $a_{10} + a_{11}$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

서술형 3 300

50%의 소금물 100g과 30%의 소금물 100g을 섞은 소금물의 농도가 $a_1\%$ 이므로

$$100 \times \frac{50}{100} + 100 \times \frac{30}{100} = 200 \times \frac{a_1}{100}$$

$$50 + 30 = 2a_1, 2a_1 = 80 \quad \therefore a_1 = 40 \quad \dots\dots ①$$

$a_n\%$ 의 소금물 100g과 30%의 소금물 100g을 섞은 소금물의 농도가 $a_{n+1}\%$ 이므로

$$100 \times \frac{a_n}{100} + 100 \times \frac{30}{100} = 200 \times \frac{a_{n+1}}{100}$$

$$a_n + 30 = 2a_{n+1} \quad \therefore a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 15 \quad \dots\dots ②$$

따라서 $k=40, p=\frac{1}{2}, q=15$ 이므로

$$kpq = 40 \times \frac{1}{2} \times 15 = 300 \quad \dots\dots ③$$

채점 기준	비율
① a_1 의 값을 구할 수 있다.	40%
② a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구할 수 있다.	40%
③ kpq 의 값을 구할 수 있다.	20%

10% 핵심 기출 문제

p.303~304

01 답 ①

$S_{n+1} - S_{n-1} = a_{n+1} + a_n$ 이므로 주어진 식은

$$(a_{n+1} + a_n)^2 = 4a_n a_{n+1} + 4$$

$$a_{n+1}^2 + 2a_n a_{n+1} + a_n^2 = 4a_n a_{n+1} + 4$$

$$a_{n+1}^2 - 2a_n a_{n+1} + a_n^2 = 4$$

$$\therefore (a_{n+1} - a_n)^2 = 4$$

이때 $a_n < a_{n+1}$ 이므로

$$a_{n+1} - a_n = 2$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 2인 등차수열이다.

이때 첫째항이 $a_1 = 1$ 이므로

$$a_n = 1 + (n-1) \times 2 = 2n - 1$$

$$\therefore a_{20} = 2 \times 20 - 1 = 39$$

02 답 15

$a_{n+1} - a_n = 2n - 14$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례로 대입한 후 변끼리 더하면

$$a_2 - a_1 = 2 \times 1 - 14$$

$$a_3 - a_2 = 2 \times 2 - 14$$

$$a_4 - a_3 = 2 \times 3 - 14$$

⋮

$$+) \quad a_n - a_{n-1} = 2(n-1) - 14$$

$$a_n - a_1 = \sum_{k=1}^{n-1} (2k - 14)$$

$$= 2 \times \frac{(n-1)n}{2} - 14(n-1)$$

$$= n^2 - 15n + 14$$

$$\therefore a_n = n^2 - 15n + 14 + a_1$$

$$= n^2 - 15n + 14 + 36$$

$$= n^2 - 15n + 50$$

이때 $a_n = 6$ 이므로 $n^2 - 15n + 50 = 6$ 에서

$$n^2 - 15n + 44 = 0, (n-4)(n-11) = 0$$

$$\therefore n = 4 \text{ 또는 } n = 11$$

따라서 모든 자연수 n 의 값의 합은

$$4 + 11 = 15$$

03 답 513

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 이므로

$$\frac{1}{n+2} < \frac{a_n}{k} < \frac{1}{n} \text{에서 } \frac{1}{(n+2)a_n} < \frac{1}{k} < \frac{1}{na_n}$$

$$\therefore na_n < k < (n+2)a_n$$

이때 $na_n, (n+2)a_n$ 은 모두 자연수이므로 주어진 부등식을 만족시키는 자연수 k 의 개수는

$$(n+2)a_n - na_n - 1 = 2a_n - 1$$

$$\therefore a_{n+1} = 2a_n - 1$$

위의 식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하면

$$a_2 = 2a_1 - 1 = 2 \times 2 - 1 = 3 = 2 + 1$$

$$a_3 = 2a_2 - 1 = 2 \times 3 - 1 = 5 = 2^2 + 1$$

$$a_4 = 2a_3 - 1 = 2 \times 5 - 1 = 9 = 2^3 + 1$$

⋮

$$\therefore a_{10} = 2^9 + 1 = 512 + 1 = 513$$

다른 풀이

$$a_{n+1} = 2a_n - 1 \text{에서 } a_{n+1} - 1 = 2(a_n - 1)$$

즉 수열 $\{a_n - 1\}$ 은 첫째항이 $a_1 - 1 = 1$, 공비가 2인 등비수열이므로

$$a_n - 1 = 1 \times 2^{n-1} \quad \therefore a_n = 2^{n-1} + 1$$

$$\therefore a_{10} = 2^9 + 1 = 512 + 1 = 513$$

04 답 ②

㉠의 n 에 $n-1$ 을 대입하면

$$\frac{S_n}{n} = \sum_{k=1}^{n-1} S_k \quad (n \geq 2)$$

..... ㉡

㉠-㉡을 하면

$$\frac{S_{n+1}}{n+1} - \frac{S_n}{n} = \sum_{k=1}^n S_k - \sum_{k=1}^{n-1} S_k = S_n$$

$$\frac{S_{n+1}}{n+1} = S_n + \frac{S_n}{n} = \frac{(n+1)S_n}{n}$$

$$\therefore \frac{S_{n+1}}{S_n} = \frac{(n+1)^2}{n} \quad (n \geq 2)$$

$$\text{㉡에서 } \frac{S_2}{2} = S_1 = a_1 = 1 \quad \therefore S_2 = 2$$

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{S_n}{S_{n-1}} \times \frac{S_{n-1}}{S_{n-2}} \times \frac{S_{n-2}}{S_{n-3}} \times \cdots \times \frac{S_3}{S_2} \times S_2 \\ &= \frac{n^2}{n-1} \times \frac{(n-1)^2}{n-2} \times \frac{(n-2)^2}{n-3} \times \cdots \times \frac{3^2}{2} \times 2 \\ &= n^2(n-1)(n-2) \times \cdots \times 3 \end{aligned}$$

$$= n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1 \times \frac{1}{2} \times n$$

$$= n! \times \left[\frac{n}{2} \right] \quad (n \geq 3)$$

이때 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 이므로

$$a_n = n! \times \frac{n}{2} - (n-1)! \times \frac{n-1}{2}$$

$$= \frac{n^2 - n + 1}{2} \times (n-1)! \quad (n \geq 3)$$

$$a_1 = 1, a_2 = S_2 - S_1 = 2 - 1 = 1 \text{이므로}$$

$$a_n = \begin{cases} 1 & (n=1, 2) \\ \frac{n^2 - n + 1}{2} \times (n-1)! & (n \geq 3) \end{cases}$$

따라서 $f(n) = (n+1)^2, g(n) = \frac{n}{2}$ 이므로

$$f(4) = 5^2 = 25, g(20) = \frac{20}{2} = 10$$

$$\therefore f(4) \times g(20) = 25 \times 10 = 250$$

05 ㉔ ①

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=1 \times 1=1, (\text{우변})=\frac{1 \times 2 \times 3 \times 4}{24}=1$$

$(\text{좌변})=(\text{우변})=\boxed{7}1$ 이므로 ㉔이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때, ㉔이 성립한다고 가정하면

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^m k\{k+(k+1)+(k+2)+\cdots+m\} \\ &= \frac{m(m+1)(m+2)(3m+1)}{24} \end{aligned}$$

이 성립한다.

$n=m+1$ 일 때, ㉔이 성립함을 보이자.

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{m+1} k\{k+(k+1)+(k+2)+\cdots+(m+1)\} \\ &= \sum_{k=1}^m k\{k+(k+1)+\cdots+(m+1)\} \\ & \quad + \sum_{k=m+1}^{m+1} k\{k+(k+1)+\cdots+(m+1)\} \\ &= \sum_{k=1}^m k\{k+(k+1)+\cdots+(m+1)\} + \boxed{7}(m+1)^2 \\ &= \sum_{k=1}^m k\{k+(k+1)+\cdots+m\} + (m+1) \sum_{k=1}^m k \\ & \quad + \boxed{7}(m+1)^2 \\ &= \boxed{7} \frac{m(m+1)(m+2)(3m+1)}{24} \\ & \quad + \frac{m(m+1)^2}{2} + \boxed{7}(m+1)^2 \\ &= \frac{(m+1)(m+2)(m+3)(3m+4)}{24} \end{aligned}$$

따라서 $n=m+1$ 일 때도 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 ㉔이 성립한다.

따라서 $a=1, f(m)=(m+1)^2$

$$g(m)=\frac{m(m+1)(m+2)(3m+1)}{24} \text{이므로}$$

$$f(2)=3^2=9$$

$$g(3)=\frac{3 \times 4 \times 5 \times 10}{24}=25$$

$$\therefore a+f(2)+g(3)=1+9+25=35$$

참고 위의 풀이 과정에서

$$\begin{aligned} & \frac{m(m+1)(m+2)(3m+1)}{24} + \frac{m(m+1)^2}{2} + (m+1)^2 \\ &= \frac{m(m+1)(m+2)(3m+1)}{24} + \frac{(m+2)(m+1)^2}{2} \\ &= \frac{(m+1)(m+2)}{2} \times \left\{ \frac{m(3m+1)}{12} + (m+1) \right\} \\ &= \frac{(m+1)(m+2)}{2} \times \frac{3m^2+13m+12}{12} \\ &= \frac{(m+1)(m+2)(m+3)(3m+4)}{24} \end{aligned}$$

06 ㉔ 142

a_n 이 홀수이면 $a_{n+1}=a_n+3$, 즉 a_{n+1} 은 짝수이다.

따라서 a_{n+1} 이 홀수이면 a_n 은 짝수이다.

이때 $a_5=5$ 이므로 a_4 는 짝수이어야 한다.

$$\text{즉 } a_5=\frac{a_4}{2}=5 \text{이므로 } a_4=10$$

수열 $\{a_n\}$ 의 규칙에 따라 a_5, a_4, a_3, a_2, a_1 의 값을 표로 나타내면 다음과 같다.

a_5	$a_5=5$		
a_4	$a_4=10$		
a_3	a_3 이 홀수	a_3 이 짝수	
	$a_3+3=10$ 에서 $a_3=7$	$\frac{a_3}{2}=10$ 에서 $a_3=20$	
a_2	$\frac{a_2}{2}=7$ 에서 $a_2=14$	a_2 가 홀수	a_2 가 짝수
		$a_2+3=20$ 에서 $a_2=17$	$\frac{a_2}{2}=20$ 에서 $a_2=40$
a_1 (짝수)	$\frac{a_1}{2}=14$ 에서 $a_1=28$	$\frac{a_1}{2}=17$ 에서 $a_1=34$	$\frac{a_1}{2}=40$ 에서 $a_1=80$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 될 수 있는 수는 28, 34, 80이므로 모든 수의 합은

$$28+34+80=142$$

참고 a_1 이 홀수인 경우

$$a_2=14 \text{일 때, } 14=a_1+3 \quad \therefore a_1=11$$

$$a_2=40 \text{일 때, } 40=a_1+3 \quad \therefore a_1=37$$

07 ㉔ ⑤

$$a_{n+2}=\begin{cases} a_{n+1}+a_n & (a_{n+1} \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \\ \frac{1}{3}a_{n+1} & (a_{n+1} \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \end{cases} \text{이고 } a_7=40 \text{이}$$

므로 a_6 의 값에 따라 경우를 다음과 같이 나누면

(i) a_6 이 3의 배수인 경우

$$a_7=\frac{1}{3}a_6=40 \quad \therefore a_6=120$$

이때 $a_7=40$ 은 3의 배수가 아니므로

$$a_8=a_7+a_6=40+120=160$$

$a_8=160$ 은 3의 배수가 아니므로

$$a_9=a_8+a_7=160+40=200$$

(ii) a_6 이 3의 배수가 아닌 경우

i) 자연수 k 에 대하여 $a_6=3k-2$ 이면

$$a_7=a_6+a_5 \text{에서}$$

$$a_5=a_7-a_6=40-(3k-2)$$

$$=42-3k=3(14-k)$$

이때 a_5 는 자연수이므로

$$a_5=3(14-k)>0 \text{에서}$$

$$14-k>0 \quad \therefore k<14$$

.....㉔

한편 $a_5=3(14-k)$ 는 3의 배수이므로

$$a_6=\frac{1}{3}a_5 \text{에서 } 3k-2=\frac{1}{3} \times 3(14-k)$$

$$3k-2=14-k, 4k=16 \quad \therefore k=4$$

이것은 ㉔을 만족시키므로

$$a_6=3 \times 4-2=10$$

$a_7=40$ 은 3의 배수가 아니므로

$$a_8=a_7+a_6=40+10=50$$

$a_8=50$ 은 3의 배수가 아니므로

$$a_9=a_8+a_7=50+40=90$$

ii) 자연수 k 에 대하여 $a_6 = 3k - 1$ 이면

$$a_7 = a_6 + a_5 \text{에서}$$

$$a_5 = a_7 - a_6 = 40 - (3k - 1) = 41 - 3k$$

이때 a_5 는 자연수이므로

$$a_5 = 41 - 3k > 0 \text{에서}$$

$$3k < 41 \quad \therefore k < \frac{41}{3} = 13.6 \cdots \quad \text{.....㉞}$$

한편 $a_5 = 41 - 3k$ 는 3의 배수가 아니므로

$$a_6 = a_5 + a_4 \text{에서}$$

$$a_4 = a_6 - a_5 = (3k - 1) - (41 - 3k)$$

$$= 6k - 42 = 3(2k - 14)$$

이때 a_4 는 자연수이므로

$$a_4 = 3(2k - 14) > 0 \text{에서}$$

$$2k - 14 > 0 \quad \therefore k > 7 \quad \text{.....㉟}$$

$$\text{㉞, ㉟에서 } 7 < k < 13.6 \cdots \quad \text{.....㊱}$$

한편 $a_4 = 3(2k - 14)$ 는 3의 배수이므로

$$a_5 = \frac{1}{3}a_4 \text{에서 } 41 - 3k = \frac{1}{3} \times 3(2k - 14)$$

$$41 - 3k = 2k - 14, 5k = 55 \quad \therefore k = 11$$

이것은 ㉞을 만족시키므로

$$a_6 = 3 \times 11 - 1 = 32$$

$a_7 = 40$ 은 3의 배수가 아니므로

$$a_8 = a_7 + a_6 = 40 + 32 = 72$$

$a_8 = 72$ 는 3의 배수이므로

$$a_9 = \frac{1}{3}a_8 = \frac{1}{3} \times 72 = 24$$

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 a_9 의 값은 200, 90, 24이므로 a_9 의
최댓값은 $M = 200$, 최솟값은 $m = 24$

$$\therefore M + m = 200 + 24 = 224$$

memo